









JOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OEC. ET CAMERAL. P. P. O. SOCIET. HAFN.

NORW. BEROL. LIPS. LUND. PETR. PARIS. AGRIC.

HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

ENTOMOLOGIA  
SYSTEMATICA  
EMENDATA ET AUCTA.

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES

ADJECTIS

SYNONIMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBUS,

DESCRIPTIONIBUS.

---

T O M. I.

3223

---

H A F N I A E ,

IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROFT.

M D C C X C I I .





## Proœmium.

**E**ntomologiam hic, nullo modo perfectam, attamen emendatam & auctam L. B. offero. Errores multos in systemate, in Mantissa Insectorum irreptos, aegre observavi, hic quotquot potui emendavi, classes mutavi, genera plura nova introduxi, reliqua hinc inde castigavi, specierum numerum egregie auxi, novis observationibus locupletavi, synonymiam nullo modo absolutam, attamen accuratiorem addidi, metamorphosin plurium observavi, ut tandem sistema nostrum firmiori stet talo.

Insectorum rite descriptorum numerum hic propono.  
Adjuvarunt in primis Collectanea, quae partim disposui,  
partim examinavi.

Musaeum Linnaei Upsaliæ

Reginae Sveciae Drotningholm

Clerkii Holmiae

Academiae Charlottenburgensis Hafniae

Scheftedii, Lundii Hafniae

Schulzii Hamburgi

Schieffermylleri Linzii

Podae Vindobonae

Hermannii Strasburgi

Gerningii Francofurti

Lefkii Lipsiae

Scopoli Idriae

Crameri Amstelodami

Principis Auransiaci Hagae

Académiae Lugdunensis

Gronovii Lugduni

Banksii Londini

Drury Londini

Yeats Londini

Hunter Londini

## IV

---

Musaeum Britannicum Londini

Jones Londini

Monson Londini

Lee Hammerfmith.

Bosc Parisiae

Olivier Parisiae

Desfontaines Parisiae

Geoffroy Parisiae

Mus. Regis Galliae

Allioni Taurini

Fortis Venetiae

Boeberi Petersburgi.

Itinera varia Entomologiae causa institui

Sueicum 1764

Belgicum 1766

Scoticum 1767

Anglicum 1768. 1773. 75. 80. 82. 87. 90.

Italicum, Helveticum 1769

Holsaticum 1770

Norwagicum 1778

Vindobonnense 1784

Russicum 1786

Gallicum 1789

Amicorum discipulorumque dilectissimorum itinera mihi  
saepius proficia. Adiit

Smeathmann Sierra Leon

Smidt Americae meridionalis Insulas

von Rohr Cajennam

Pflug Americae meridionalis Insulas

Koenig Tranquebariam

Isert Guineam

Daldorf Tranquebariam

von Paykull Lapponiam.

Quibus omnibus numerum Insectorum collegi haud  
exiguum & cursum, quem dedit fortuna, peregi.

---

---

## Infecta.

**A**nimalcula mole parva, foecunditate numeroque immensa distinguuntur polypoda corpore cute ossea, cataphracta tecta, ab domine annulato, poris respirantibus utrinque pertuso capiteque saepius antennis sensoriis articulatis instructo.

*Caput* rudimentum cerebri, sensorium commune sensusque proferens, liberum aut pectori additum, antice fronte, supra vertice: stemmatibus tribus rotundatis nitidis saepe notato, subtus gula continet os, oculos, aures, antennas.

*Os*, quo cibum hauriunt, instrumenta praebet cibaria differentia secundum numerum, situm, figuram & proportionem. Sunt vero *Labia* horizontalia os superne inferne que tegentia ultimo interdum elongato in linguae lacinias interiores.

*Mandibulae* transversales latera oris superne includentes, corneae, validae, saepius dentatae, interdum exsertae.

*Maxillae* transversales latera oris inferne includentes, saepius membranaceae aut bifidae, interdum galea cylindrica, obtusa suffultae, aut in linguae lacinias exteriores elongatae.

*Palpi* articulati, sensorii, mobiles differunt numero saepius quatuor, interdum duo aut sex.

*Lingua spiralis elongata, tenuis, bisida,  
convoluta intra palpos stuposos, re-  
flexos, pilosos.*

*Rostrum cylindricum, exsertum vagina  
articulata setisque plerumque tribus,  
rarissime pectorale.*

*Proboscis brevissima, retractilis, labiata,  
carnosa, saepius stipite canaliculata.*

*Haustellum saepius porrectum, interdum  
in canali proboscidis reconditum setis  
plerumque tribus constans vagina in-  
articulata aut nulla.*

*Oculi plerumque duo, interdum plures, sim-  
plices aut compositi, rarius pedunculo  
mobili impositi, ut capite quamvis immo-  
bili undique tamen observent.*

*Aures tympano simplicissimo, nudo ad basin  
antennarum inserti, sensorio communi im-  
mediate communicantes sonum sexus al-  
terius allicientem percipiunt, in Cancris  
Astacisque omnino distincti.*

*Antennae articulatae capite plerumque ante  
oculos insertae, interdum seta instructae,  
sensoriae sensu nobis ignoto.*

*Thorax organa circulationis respirationisque  
continens supra dorso, subtus pectore, ster-  
no in medio diviso, antice posticeque inter-  
dum porrecto. In glossatis ocyus volanti-  
bus accedit acrombium abbreviatum,  
ovatum basin alarum deprimens.*

*Scutellum thorace postice additum ad expan-  
sionem alarum, rarius elongatum, rotun-  
datum aut triangulum, elytris connatis  
nullum.*

*Abdomen* visceribus genitalibusque plerumque foetum, segmentis pluribus aut paucioribus annulatum porisque lateralibus respirantibus pertusum, supra tergo, subtus ventre terminatur ano interdum aculeato exitu communis pro genitura et excrementis.

*Artus* infectorum sunt Alae, Pedes, Cauda.

*Alae* duae aut quatuor aut nullae, nudae aut squamis elevatis coloratae teguntur interduin coleoptris duris, corneis, rarius connatis, saepius sutura in elytra mobilia divisus. *Glossatorum* basis alae inferioris rotundata prominet aut radius elasticus, rigidus, marginalis proflit ad elevandam alam superiorem.

*Pedes* plerumque sex, interdum plures, thorace affixi constant femore, tibia, tarso articulato, digito, ungue, at natorii mutici, ciliati, manusque interdum pollice inobili chelatae,

*Cauda* abdomen terminans setis 1 - 3, rarius foliolis planis, latioribus, aut pollice mobili chelata, aut aculeo punctorio, recondito armata.

*Sexus* infectorum triplex

*Max* minor, agilis, generans, vivificans, faeminae obtrusens.

*Faemina* crassior, tardior, interdum aptera, concipiens, ovipara, marem attrahit aut sono aut luce phosphorea.

---

strant. Unica ubi tantum species habitus & descriptio idem.

*Entomologus* ideo verus in construēndis generibus characteribus certis, firnis munitis lege artis & systematis desūdabit. Plura adhuc confienda, quae attingere nondum valui; at genus proponere absque charactere, aut charactere vacillante omnino absurdum. Genera sic multiplicata scientiae nitorem polluunt.

*Nomina* valent uti nummi praetio certo, determinato. Optima sunt, quae omnino nil significant. Characterem essentialē generis genericō nomine indicare impossibile. Character vero accidentalis ex habitu aut loco desumptus unius speciei saepius reliquis contrarius, nec nomine exprimendus, sub quo totum genus militat.

*Auctores* entomologiae nunc numerosi verbositate, descriptionibus figurisque decies repetitis saepius taedium pariunt. Systematici veri pauci, observatores plures, at ichniographi plurimi, splendidissimi; damnandae vero memoriae John Hill & Louis Renard, qui insecta ficta proposuere.

His utere L. B. usque dum alii plura melioraque fstant.

Kiliae d. 30. Martis 1792.

---

---

# CHARACTERES GENERUM ELEUTERATA MAXILLA NUDA, LIBERA.

\* *Antennis rostro elongato, corneo insidentibus.*

102. CURCULIO. Maxilla unidentata. Antennae clava solida: articulo secundo longissimo.

103. BRENTUS. Rostrum rectum, porrectum, cylindricum. Antennae moniliformes ultra medium insertae.

100. ATTELABUS. Rostrum elongatum, incurvum. Maxilla bifida. Antennae extrorsum crassiores.

101. RHINOMACER. Palpi quatuor extrorsum crassiores: articulo ultimo obliquo, truncato. Antennae fetaceae.

98. ANTHRIBUS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum. Antennae articulis rotundatis: ultimis tribus ovatis crassioribus; ultimo acuto.

99. BRACHYCYCUS. Palpi quatuor brevissimi. Labium corneum, rotundatum. Antennae extrorsum crassiores.

\*\* *Antennis clava lamellata.*

80. LUCANUS. Penicilli duo sub labio palpigeri.

81. PASSALUS. Palpi filiformes. Maxilla cornea, arcuata, dentata, acuta. Labium sinuatum.

82. SCARABAeus. Palpi filiformes. Labium emarginatum: apicibus elongatis, palpigeris.

XII

---

7. TROX. Palpi quatuor capitati. Maxilla bifida.  
Labium corneum, emarginatum.
4. HEXODON. Palpi antici sub clavati. Maxilla  
cornea tridentata: dentibus fissis. Labium late  
emarginatum,
77. MELOLONTA. Maxilla brevis, cornea, apice  
multidentata.
75. TRICHIUS. Palpi quatuor filiformes. Maxilla  
bifida.
76. CETONIA. Maxilla apice setosa, Labium coria-  
ceum, emarginatum, palpos tegens.
94. SYNODENDRON. Palpi filiformes. Labium  
filiforme, corneum, apice palpigerum.
1. LETHRUS. Mandibula adunco falcata. An-  
tennae clava truncata, tunicata.

\*\*\* *Antennis clava perfoliata.*

95. APATE. Palpi aequales, filiformes. Maxilla  
unidentata. Labium membranaceum, trun-  
catum.
32. MELYRIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla  
unidentata, acuta. Labium clavatum, emar-  
ginatum.
111. IPS. Palpi aequales, filiformes: articulo ul-  
timo obtuso, truncato. Maxilla bifida. Labium  
truncatum, emarginatum.
6. BYRRHUS. Palpi aequales: articulo ultimo  
obtuso, truncato, subcraffiori. Labium por-  
rectum, bifidum: laciniis conniventibus.
104. COLYDIUM. Palpi aequales, clavati. Labium  
membranaceum, bifidum.

32. DERMESTES. Palpi inaequales, filiformes.  
Maxilla bifida. Labium corneum, obtusum.
110. SCAPHIDIUM. Palpi inaequales, filiformes:  
articulo ultimo acuto. Maxilla membranacea,  
bifida. Labium corneum, rotundatum.
5. SPHAERIDIUM. Palpi inaequales, filiformes.  
Labium quadratum, emarginatum.
109. TETRATOMA. Palpi inaequales, crassiusculi.  
Maxilla membranacea, bifida. Labium breve,  
rotundatum, integrum.
67. COSSYPHUS. Palpi inaequales: anteriores  
securiformes. Maxilla bifida. Labium integrum.
108. TRITOMA. Palpi antici securiformes. Labium  
emarginatum.
38. NICROPHORUS. Labium cordato emargina-  
tum, crenatum.
39. SILPHA. Maxilla unidentata. Labium dilata-  
tum, bifidum.
24. HYDROPHILUS. Palpi filiformes. Maxilla  
bifida. Labium corneum, subemarginatum.
112. DIAPERIS. Palpi subfiliformes. Maxilla bifida.  
Labium cylindricum apice palpigerum.

\*\*\*\* *Antennis clava solida.*

3. HISTER. Maxilla unidentata. Labium cor-  
neum, cylindricum, integrum.
96. BOSTRICHUS. Maxilla cornea. Labium cylin-  
dricum, apice palpigerum.
107. LYCTUS. Palpi brevissimi, filiformes. Maxilla  
membranacea, bifida.

## XIV

---

42. ANTHRENUS. Palpi inaequales, filiformes.  
Maxilla linearis, bifida. Labium integrum.
26. ELOPHORUS. Maxilla cornea, apice membranacea. Labium corneum, quadratum, apice palpigerum.
40. NITIDULA. Palpi filiformes. Maxilla cylindrica, membranacea. Labium cylindricum, integrum, medio palpigerum.
43. COCCINELLA. Palpi antici securiformes, postici filiformes. Labium cylindricum.

\*\*\*\*\* *Antennis flabelliformibus.*

106. HYPOPHLAEUS. Palpi aequales, clavati. Maxilla membranacea, unidentata. Labium filiforme medio palpigerum.
35. PTILINUS. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium breve, subemarginatum.
36. MELASIS. Palpi clavati: articulo ultimo ovato. Labium membranaceum, integrum.
72. RHIPIPHORUS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla brevissima, ovata. Labium acutum.

\*\*\*\*\* *Antennis extrorsum crassioribus.*

16. TROGOSITA. Palpi aequales: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium corneum, bifidum: laciniis rotundatis, ciliatis.
105. MYCETOPHAGUS. Palpi inaequales: articulo ultimo obtuso. Maxilla unidentata. Labium rotundatum, integrum. JH
15. TENEBRIÖ. Palpi inaequales: antici subclavati, postici filiformes. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.

63. MYLABRIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, apice bifida. Labium subemarginatum.
27. CLERUS. Palpi inaequales: postici longiores, securiformes.
28. NOTOXUS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis conniventibus, obtusis.
33. ANOBIUM. Palpi aequales, clavati. Maxilla cornea. Labium integrum.
48. EROTYLUS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, apice dilatatum, emarginatum.

\*\*\*\*\* *Antennis moniliformibus.*

9. ERODIUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, emarginatum.
61. CEROCOMA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla linearis, integra. Labium membranaceum, bifidum.
93. SPONDYLIS. Palpi aequales, subfiliformes. Maxilla conica, integra. Labium corneum, bifidum.
46. CRIOCERIS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida: laciniis cylindricis. Labium corneum, integrum.
114. STAPHYLINUS. Palpi aequales, filiformes. Labium trifidum.
10. SCAURUS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla obconica, unidentata. Labium truncatum, integrum.

51. ZYGIA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium elongatum, membranaceum.
113. MELOE. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla recta, bifida. Labium cylindricum, late emarginatum.
64. HORIA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis linearibus, distantibus.
14. BLAPS. Palpii clavati. Maxilla recta, bifida. Labium membranaceum, fissum.
17. HELOPS. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium corneum, integrum.
116. PAEDERUS. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla unidentata. Labium lineare, integrum.
44. CASSIDA. Palpi inaequales: antici capitati. Maxilla simpex. Labium elongatum, integrum.
8. OPATRUM. Palpi inaequales: antici clavati: clava oblique truncata. Labium corneum, subemarginatum.
73. MORDELLA. Palpi inaequales: antici clavati. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
115. OXYPORUS. Palpi inaequales: postici clavati. Labium emarginatum cum mucrone.
45. CHRYSOMELA. Palpi sex filiformes. Labium corneum, integrum.
11. SCARITES. Palpi sex filiformes. Labium corneum, bifidum: laciniis distantibus.
- \*\*\*\*\* *Antennis filiformibus.*
53. APALUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium truncatum, integrum.

18. MANTICORA. Palpi filiformes. Maxilla cornea, arcuata, acutissima. Labium cornuum, trifidum.
13. PIMELIA. Palpi filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium membranaceum, unidentatum.
25. GYRINUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata, acutissima. Labium emarginatum.
66. CUCUJUS. Palpi aequales: articulo ultimo truncato, crassiori. Labium breve, bifidum: laciniis distantibus.
22. SCOLYTUS. Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo obconico. Maxilla cornea, acuta, integra. Labium breve, membranaceum, acuminatum.
41. HETEROCERUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata longitudine palporum. Labium membranaceum, late emarginatum.
56. CRYPTOCEPHALUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla membranacea, unidentata. Labium cornuum, integrum.
97. BRUCHUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla membranacea, bifida. Labium acuminatum.
34. PTINUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium bifidum.
37. PARNUS. Palpi clavati: clava orbiculata. Maxilla bifida. Labium emarginatum.
69. OMALYSUS. Palpi extrorsum crassiores. Maxilla membranacea, bifida. Labium membranaceum, emarginatum.
57. HISPA. Palpi in medio crassiores. Maxilla bifida. Labium integrum.

## XVIII

---

71. LYCUS. Os rostro cylindrico inflexo. Palpi articulo ultimo crassiori, truncato.
49. CEBRIO. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, apice palpigerum.
30. MALACHIUS. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, rotundatum.
78. BUPRESTIS. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato. Maxilla unidentata. Labium acuminatum.
50. CISTELA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
12. SEPIDIUM. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium breve, corneum, emarginatum.
91. NECYDALIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium porrectum, membranaceum, late emarginatum.
55. SAGRA. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla cornea, unidentata. Labium breve, corneum, ciliatum, fissum.
70. PYROCHROA. Palpi inaequales, subfiliformes. Maxilla integra. Labium corneum, lineare, integrum.
68. LAMPYRIS. Palpi inaequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium corneum, integrum.
29. CANTHARIS. Palpi inaequales, securiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, integrum.
79. ELATER. Palpi inaequales, clavati. Maxilla obtusa, unidentata. Labium bifidum.

86. CALOPUS. Palpi inaequales: antici clavati.  
Maxilla bifida. Labium bifidum.
62. LYTTA. Palpi inaequales: postici clavati.  
Maxilla bifida. Labium membranaceum, truncatum.
65. LYMEXYLON. Palpi inaequales: antici porrecti; articulo penultimo magno, appendiculato, fisco, ultimo arcuato, acuto.
60. LAGRIA. Palpi inaequales: antici securiformes, postici clavati. Labium membranaceum, integrum.
59. TILLUS. Palpi inaequales: postici securiformes. Labium inter palpos rotundatum, integrum.
58. DRYOPS. Palpi inaequales: antici subsecuriformes, postici filiformes. Labium membranaceum, late emarginatum.
54. ALURNUS. Palpi sex acuti, brevissimi. Maxilla fornicata.
47. GALLERUCA. Palpi sex: articulo ultimo acuto. Labium bifidum.
19. CARABUS. Palpi sex: articulo ultimo obtuso. Labium truncatum, integrum.

\*\*\*\*\* *Antennis setaceis.*

74. DONACIA. Palpi aequales, filiformes. Maxilla unidentata. Labium cylindricum, integrum.
83. CERAMBYX. Palpi aequales, filiformes: articulo ultimo setaceo. Maxilla unidentata. Labium bifidum.
82. PRIONUS. Palpi aequales, filiformes. Maxilla cylindrica, integra. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum.

## XX

---

88. SAPERDA. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium cordatum, truncatum.
  84. LAMIA. Palpi subaequales, filiformes. Maxilla cornea, bifida. Labium corneum, bifidum.
  90. LEPTURA. Palpi inaequales, filiformes: articulo ultimo truncato. Maxilla unidentata. Labium membranaceum, bifidum.
  92. MOLORCHUS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla bifida. Labium membranaceum, bifidum.
  52. ZONITIS. Palpi inaequales, filiformes. Maxilla elongata, integra. Labium emarginatum.
  89. CALLIDIUM. Palpi aequales, subclavati. Maxilla bifida. Labium bifidum: laciniis tenuissimis.
  87. RHAGIUM. Palpi inaequales, capitati. Maxilla unidentata. Labium bifidum: laciniis rotundatis.
  85. STENOCORUS. Palpi inaequales: postici clavati.
  20. CICINDELA. Palpi sex filiformes: postici pilosi, multiarticulati. Labium corneum, tridentatum.
  21. ELAPHRUS. Palpi sex filiformes. Labium rotundatum apice acuminatum, integrum.
  23. DYTISCUS. Palpi sex filiformes. Labium corneum, truncatum, integrum.
-

## CLASSIS I.

### ELEUTERATA.

1. LETHRUS. *Mandibula* aduncofalcata.

*Antennae* clava truncata,  
tunicata.

1. **L.** Corpore subrotundo nigro. *cephalotes.*

*Lethrus cephalotes* Oliv. Inf. 1. 2. 4. 1. tab. 1. fig. 1.

*Lethrus* Scopol. Introd. hist. nat. 439.

*Bulbocerus cephalotes* Acharius Act. Svec. 1781.  
246. tab. 5. fig. 3 - 12.

*Lucanus apterus* subhæmisphæricus, ater opacus  
thorace convexo, marginato, elytra brevisima  
coalita, subæquante. Pall. Icon. Inf. 1. tab. A.  
fig. 1.

*Lucanus cephalotes* Pall. Itin. 1. App. 461. 23.

*Lucanus apterus* Laxm. Nov. Comm. Petrop. 14.  
59. 4. tab. 24. fig. 1.

---

*Lethri* corpus subrotundum, gibbum, glabrum *capite*  
longitudine thoracis mandibulis arcuatis prominulis,  
oculisque utrinque ad basin insertis, *antennis* capite  
brevioribus pone basin mandibularum insertis, *thorace*  
gibbo lateribus deflexis rotundatis scutello nullo,  
*Elytris* connatis abdomine longioribus margine deflexo  
linea unica ante marginem carinata, apice inflexa  
*pedibus* brevibus validis compressis tibiis anticis den-  
tatis posticis ciliatis tarsisque quinque articulatis.

A

**Clunipes scarabæoides** Act. Soc. Berol. 6. 347.

Habitat in Europæ Australioris desertis aridis,  
monogamus, fodiens. Corpus subrotundum,  
læve, nigrum, subopacum, apterum.

*aeneus.* 2. L. Corpore oblongo viridiæneo.

Habit. in Insula Norfolk maris pacifici Mus. D. Banks.

Forte proprii generis. Corpus oblongum, magnitudine L. cephalotes. Antennæ uniarticulatae, extrorsum crassiores, breves, nigrae, apice pertusae. Caput viridi æneum triangulo medio elevato. Mandibulæ magnæ exsertæ, validæ, recurvæ, apice truncatae, emarginatae, intus ferrugineo hirtæ. Maxillæ, breves, membranaceæ, setosæ. Labium cornuum, rotundum, integrum. Palpi mihi desunt. Thorax magnus, lævis, æneus, subpunctatus: margine utrinque angulo deflexo. Elytra subrugosa, ænea, nitida, immaculata, haud connata. Pedes ænei tibiis latioribus, dentatis.

2. SCARABAEUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* emarginatum apicibus elongatis palpigeris.

*Antennæ* clavato lamellatae.

\* *Scutellati thorace cornuto.*

*Hercules.* 1. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo maximo subtus barbato utrinque unidentato, capitis recurvato dentato. Linn. syst. nat. 2. 541.  
1. Mus. Lud. Ulr. 3. Jablonsk Coleopter 1. tab. 1. fig. 1. 2. Oliv. Inf. 1. 3. 6. 1. tab. 1. fig. 1. tab. 23. fig. 1.

**Scarabæus maximus Indicus** Roef. Inf. 2. Scar. 1.  
tab. A. fig. 1. & 4. tab. 5. fig. 3. Drury. Inf. 1.  
tab. 30. fig. 1. 2.

**Scarabæus scaber scutellatus clypei centro pro-**  
**minulo, elytris antice scabris** Mant. Inf. 1. 9. 79.  
Linn. syst. nat. 2. 549. 37. Mus. Lud. Ulr. 17.  
fæmin.

Habitat in America meridionali.

Thoracis cornu longissimum subtus barbatum an-

ticē nudum, emarginatum. Fæmina mutica.

Variat elytris piceis & glaucis nigro punctatis.

**2. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo subtus bar-** *Alcides.*  
**bato unidentato, capitis recurvato mutico.**

**Scarabæus Alcides Oliv.** Inf. 1. 3. 7. 2. tab. 1.  
fig. 2.

Habitat in India orientali. Mus. D. Banks.

Affinis certe Sc. Hercules, cuius forte mera varie-

tas. Differt tamen magnitudine duplo minore,  
cornu capitis omnino inerme, thoracis dentibus  
magis versus basin nec apice emarginato.

**Conf. Scarabæus Perseus Oliv.** Inf. 1. 3. 8. 3.  
tab. 1. fig. 3. vix distinctus videtur.

Scarebaeorum *corpus* ovatum fere subrotundum, gib-

bum, immarginatum, supra glabrum, subtus pilosum,

*clypeo* os tegente oculis utrinque pertuso maris saepius

cornuto, *antennis* capite brevioribus clava lamellata

subrotunda sub *clypeo* ante oculos insertis, *thorace*

gibbo maris saepius cornuto marginibus rotundatis,

*scutello* brevi, rotundato aut nullo, *elytris* longitudine

abdominis, *pedibus*, brevibus validis femoribus com-

pressis tibiis anticis compressis dentatis posticis incur-

vis ciliatis tarsis quinque articulatis, *colore* plerum-

que nigro aut obscuro.

**Gideon.** 3. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo maxime apice bifido capitis recurvato bifido supra unidentato Linn. syst. nat. 2. 541. 2. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 1. fig. 3.

Rhinoceros minor Roefs Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 5.

Scarabæus Gideon Oliv. Inf. 1. 3. 14. 10. tab. II. fig. 102. Edw. Av. tab. 40. Seligm. Av. 2. tab. 79. Voet. Scarab. tab. 12. fig. 100.

Habitat in Indiis.

**Oromedon.** 4. Sc. scutellatus, thoracis cornu brevi emarginato; capitis recurvato bifido Jablonsk Coleopt. 1. tab. 2. fig. 2.

Scarabæus Oromedon Oliv. Inf. 1. 3. 17. 14. tab. 18. fig. 165. Voet. Coleopt. tab. 13. fig. 102. Aub. Miscell. tab. 40. fig. 4.

Habitat in Indiis.

Forte mera varietas praecedentis quamvis duplo fere minor & proportio cornuum nimis differt.

**Centaurus.** 5. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo basi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 2. fig. 1.

Scarabæus Centaurus Oliv. Inf. 1. 3. 14. 9. tab. II. fig. 104. Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 1.

Habitat in India orientali, Africa.

**Aegeon.** 6. Sc. scutellatus rufus thoracis cornu brevi incurvo subtus barbato capitis recurvo subulato Jablonsk Coleopt. 1. tab. 1. fig. 4.

Scarabæus Aegeon Oliv. Inf. 1. 3. 26. 26. tab. 26. fig. 219. Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 5.

Habitat in Indiis.

7. Sc. scutellatus thoracis cornu subulato protenso, *dispar.*  
 capitis subulato subrecurvo, scutello cordato.  
 Jabl. Coleopt. I. tab. 2. fig. 3. 4.  
 Scarabæus *dispar* Oliv. Inf. I. 3. 58. 64. tab. 3.  
 fig. 20. Rosf. Fn. Etrusc. I. 4. 6.  
 Scarabæus Ammon Pall. Icon. Inf. I. tab. A.  
 fig. 8. A. B.  
 Habitat in regionibus Rosfiae australioribus Mus.  
 D. Banks.  
 Mas capitis thoracisque cornu subulato. Fæmina  
 capitis medio antico denticulis duobus erectis,  
 acutis, thorace antice dentibus duobus elevatis,  
 prominulis.
8. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido, capitum longiori bifido  
 Jablonsk Coleopt. I. tab. 2. fig. 5.  
 Scarabæus Jason scutellatus thoracis cornu  
 crassissimo apice emarginato capitum unidentato  
 bifido Mant. Inf. I. 4. 15.  
 Scarabæus Chorinæus Oliv. Inf. I. 3. 15. 10.  
 tab. 2. fig. 4.  
 Aubent Miscell. tab. 15. fig. 4.  
 Voet. Inf. tab. 13. fig. 104.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Tunstall.  
 Affinis Scar. Pan.
9. Sc. scutellatus thoracis cornu bidentato, capitum *dichotomus*.  
 dichotomo, elytris rufis. Linn. Mantiss. I. 529.  
 Jablonsk Coleopt. I. tab. 2. fig. 6.  
 Scarabæus *dichotomus* Oliv. Inf. I. 3. 20. 17.  
 tab. 17. fig. 156.  
 Aubent Miscell. tab. 40. fig. 5. Voet. Coleopt.  
 tab. 14. fig. 107.  
 Sulz Hist. Inf. tab. I. fig. I.  
 Habitat in Indiis.  
 Corpus magnum, rufum.

- 
- Claviger.* 10. Sc. scutellatus rufus thoracis cornu elevato capitis subulato recurvo Linn. Mant. I. 529.  
*Scarabæus Claviger* Oliv. Inf. I. 3. 20. 18.  
 tab. 5. fig. 40.  
 Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 3.  
 Voet. Coleopt. tab. 14. fig. 108.  
 Aubent. Miscell. I. tab. 40. fig. 1.  
 Habitat in Indiis.
- haftatus.* 11. Sc. scutellatus thoracis cornu brevi fornicato haftato subtus hirto, capitis recurvo.  
*Scarabæus hastatus* Oliv. Inf. I. 3. 21. 19.  
 tab. 19. fig. 175.  
 Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.  
 Medius capitis clypeus reflexus, dentatus cornu magno arcuato, acuto, inermi. Thorax punctatus cornu medio brevi incumbente, supra laevi, subtus fornicato, hirto, apice haftato vel trilobo. Elytra punctata stria unica adfuturam. Color niger elytris femoribusque testaceis.
- Enema.* 12. Sc. scutellatus thoracis cornu incurvo simplici basi crassissimo, capitis recurvo bifido.  
*Scarabæus Enema* Oliv. Inf. I. 3. 22. 20.  
 tab. 12. fig. 114. tab. 17. fig. 157.  
 Habitat in India Mus. Dr. Hunter.  
 Statura & summa affinitas Sc. Pan at thoracis cornu elongatum, simplex, & capitis bifidum absque dente.
- Pan.* 13. Scutellatus thoracis cornu incurvo basi crassissimo apice bifido capitis recurvo unidentato.  
 Habitat in Indiis Dom. Drury.  
 Corpus magnum, nigrum. Thorax lateribus scaber medio glaber, elevatus crassissimus defens in cornu incurvum apice bifidum.

- 14.** Sc. scutellatus thorace prominente bilobo, capitis cornu simplici, elytris striatis. Linn. syst.  
nat. 1. 2. 544. 12. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 3.  
fig. 2.

Scarabæus bilobus Oliv. Inf. 1. 3. 31. 33. tab. 5.  
fig. 35. tab. 23. fig. 35. tab. 1. fig. 5.  
Edw. Av. tab. 105. fig. 2.  
Voet. Coleopt. tab. 14. fig. 106.  
Aubent Miscell. tab. 15. fig. 3.  
Habitat in Europa australi.  
Simillimus Sc. chorinæus at minor.

- 15.** Sc. scutellatus, thorace antice fornicato exca- *Daedalus*.  
vato: cornu brevisimo, capitum cornu piano  
utrinque impresso.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.  
Minor Sc. nasicorni & singularis. Caput parvum.  
Cornu capite longius totum caput tegente,  
rectum latum, basi utrinque puncto impresso  
marginaque unidentato, acutiusculum, Thorax  
antice ultra medium excavatus, fornicatus linea  
dorsali transversa, elevata, carinata cornuque  
apicis brevi, lato, elevato. Elytra vix striata.  
Pedes, uti corpus subitus, ferruginei femori-  
bus posticis clavatis, tibiisque posticis incras-  
satis, truncatis.

Fæmina thorace mutico, capitum cornu breviori  
apice emarginato.

- 16.** Sc. scutellatus thorace retuso: cornu brevi trun- *truncatus*.  
cato, capite mutico.

Scarabæus truncatus Oliv. Inf. 1. 3. 31. 32.  
tab. 11. fig. 103.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

- 17.** Sc. scutellatus thorace antice retuso mucronato, *Zoilus*.  
capitis cornu brevisimo recurvo.

- Scarabæus Zoilus* Oliv. Inf. I. 3. 45. 51.  
tab. 9. fig. 84.  
Habitat Cajennæ Mus. Dom. Olivier.  
Corpus medium atrum. Caput cornu antico  
elevato, brevi, recurvo. Thorax antice retu-  
sus mucrone marginali elevato.
- Aetæon.* 18. *Sc. scutellatus glaber*, thorace bicorni, capitis  
cornu unidentato bifido, elytris lœvibus Linn.  
syst. nat. 2. 541. 3. Mus. Lud. Ulr. 4. Jabl.  
Coleopt. I. tab. 3. fig. 4.  
*Scarabæus Aetæon* Oliv. Inf. 3. 20. 5. tab. 5.  
fig. 32. tab. 6. fig. 49.  
Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 5. Voet. Coleopt.  
tab. 16. fig. 111. 112. Roef. Inf. 2. Scarab. I.  
tab. A. fig. 2.  
Habitat in America meridionali.  
Variat elytris nigris & glaucis nigro maculatis.
- Simson.* 19. *Sc. scutellatus* thorace bicorni, capitis cornu  
apice bifido, clypeo denticulato Linn. syst.  
nat. 2. 542. 4. Mus. Lud. Ulr. 5.  
*Scarabæus Simson* Oliv. Inf. I. 3. 13. 8. tab. 15.  
fig. 142.  
Habitat in Indiis Mus. Britannicum.
- Elephas.* 20. *Sc. scutellatus villosus*, thorace gibbo bicorni,  
capitis cornu unidentato apiceque bifido.  
*Scarabæus Elephas* Oliv. Inf. I. 3. II. 6. tab. 15.  
fig. 138. Olear. Mus. tab. 16. fig. 2.  
Habitat in Guinea Mus. Brit.  
Affinis certe *Sc. Actæon* at totus pilis ferrugi-  
neo griseis testus. Elytra vase punctata.
- Boas.* 21. *Sc. scutellatus* thorace retuso excavato biden-  
tato, capitis cornu recurvo simplici.  
*Scarabæus Boas* Oliv. Inf. I. 3. 35. 38. tab. 4.  
fig. 24.

Habitat in Sierra Leon. Dom. Drury.

Magnitudo Sc. Rhinoceros. Capitis clypeus emarginatus. Thorax excavatus niger pilis ferrugineis erectis. Elytra picea linea unica ad futuram.

22. Sc. scutellat. thorace bicorni corpore ferrugineo. *Coryphaeus*.  
Scarabæus *Coryphæus* Oliv. Inf. I. 3. 61. 68.  
tab. 16. fig. 150.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lee.

Magnitudo Sc. vernalis. Caput planum clypeo antice bicorni: cornubus recurvis apice nigris, posticeque mucro elevatus, brevisimus, niger. Thorax antice retusus cornubus duobus brevibus approximatis apice nigris, postice gibbere obtuso. Elytra substriata.

23. Sc. scutellatus thorace bicorni, capitis cornu *bicornis*.  
recurvo unidentato, elytris rufis Jablonsk  
Scarab. I. tab. 4. fig. 1.

Scarabæus *bicornis* Lesk. Anf. Gr. I. tab. 9. fig. 1.  
Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

Magnitudo Sc. *nasicornis*. Corpus nigrum elytris rufis.

24. Sc. scutellatus brunneus thorace bicorni: cor-  
nibus compressis, capite tricorni: intermedio Orion.  
brevisimo.

Scarabæus *Orion* Oliv. Inf. I. 3. 47. 52. tab. 4.  
fig. 30. tab. 5. fig. 30.

Habitat in Senegallia Mus. D. Olivier.

Parvus. Capitis cornu elevatum, crassum, com-  
pressum, desinens in cornua duo lateralia,  
distantia, recurva & denticulo parvo in media  
Thorax valde impressus cornubus duobus va-  
lidis, compressis. Elytra lævia, nitida.

- Tityus.* 25. Sc. scutellatus glaucus thorace tricorni: laterilibus breuisimis subulatis, medio subtus barbato, capitis recurvo simplici Linn. syst. nat. 2. 542. 5. Amoen. acad. 6. 391. 1. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 4. fig. 2.  
*Scarabæus Tityus* Oliv. Inf. 1. 3. 9. 4. tab. 4.  
 fig. 31. tab. 10. fig. 31.  
 Voet. Coleopt. tab. 12. fig. 99.  
 Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 10.  
*Scarabæus Marianus* scutellatus capite tuberculato, elytris laevibus glaucis fusco punctatis Mant. Inf. 1. 978. Linn. syst. nat. 2. 549. 35. fæmin.  
 Aubent. Miscell. 1. tab. 40. fig. 2.  
 Habitat in America.  
 Variat colore clytrorum nigro griseo maculato & griseo nigro maculato.
- Atlas.* 26. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio brevissimo, capitis recurvo Linn. syst. nat. 2. 542. 6. Mus. Lud. Ulr. 6. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 4. fig. 5.  
 Sulz. Icon. tab. 1. fig. 1.  
 Habitat in America meridionali.  
 Capitis cornu intus tridentatum.
- Geryon.* 27. Sc. scutellatus thorace excavato tricorni: laterilibus compressis unidentatis, capitis recurvo simplici.  
*Scarabæus Geryon* Oliv. Inf. 1. 3. 30. 31. tab. 24. 24. fig. 208.  
 Jablonsk Coleopt. 1. tab. 4. fig. 6.  
 Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 6.  
 Habitat in Indiis.  
 Magnitudo sc. nasicornis. Cornu thoracis medium, erectum, subulatum basi postice dilatum, emarginatum, scutellum tegens.

28. Sc. scutellatus thorace tricorni : intermedio *Aloeus.*  
 longiori simplici, capite submutico, elytris uni-  
 striatis. Linn. syst. nat. 2. 54. 2. 7. Mus. Lud.  
 Ulr. 7. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 4. fig. 3.  
 Scarabæus Alœus Oliv. Inf. 1. 3. 23. 22.  
 tab. 3. fig. 22.  
 Aubent. Miscell. tab. 15. fig. 7.  
 Voet. Coleopt. tab. 18. fig. 122. mas. tab. 19.  
 fig. 128. fæmina.  
 Rœsf. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 6.  
 Scarabæus validus scutellatus thorace antice  
 retuso cornu conico brevissimo, capite bibu-  
 berculato Mant. Inf. 1. 4. 16.  
 Habitat in America meridionali.  
 Mas dentibus duobus brevibus in fronte.
29. Sc. scutellatus thorace tricorni intermedio emar- *Typhon.*  
 ginato, capitis longiori recurvo basi uniden-  
 tato apice bifido.  
 Scarabæus Typhon Oliv. Inf. 1. 3. 12. 7.  
 tab. 16. fig. 152.  
 Habitat — — Mus. Britann.  
 Statura magna fere sc. Alœi. Capitis clypeus  
 bidentatus. Cornu porrectum, recurvum basi  
 dente dorsali valido, obtuso, apice bifidum,  
 glabrum, atrum, Thorax cinereo pubescens  
 cornubus tribus atris, subæqualibus : inter-  
 medio incurvo subtus fulvo villoso, apice late  
 emarginato. Elytra fusca, sublævia. Pedes an-  
 tici parum elongati, nigri.
30. Sc. scutellatus thorace tricorni: lateralibus bre- *Vulcanus.*  
 vioribus compressis ante apicem dilatatis, ca-  
 pite mutico, elytris striato punctatis.  
 Habitat in Insula Guadalupe D. de Badier.

Afficinis certe Sc. Syphax at major. Caput muticum, nigrum clypeo bidentato. Thorax cornubus tribus porrectis: intermedio longiori, recurvo, lateralibus paullo minoribus, rectis, compressis ante apicem parum dilatatis. Elytra punctata stria ad futuram distinctiore.

- Antaeus.* 31. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris laevissimis. Jablonsk Coleopt. 1. tab. 4. fig. 4.  
 Scarabæus Antæus Oliv. Inf. 1. 3. 25. 23. tab. 12. fig. 105. tab. 13. fig. 125.  
 Voet. Coleopt. tab. fig. 115.  
 Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 1.  
 Habitat in America meridionali.  
 Simillimus & magnitudine & statura Sc. Charon, at cornua simplicia & elytra stria omnino nulla.  
 Fæmina mutica.
- Syphax.* 32. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio longiori simplici, capite mutico, elytris punctatis.  
 Scarabæus Syphax Oliv. Inf. 1. 3. 25. 24. tab. 11. fig. 99. tab. 22. fig. 99. tab. 25. fig. 99.  
 Habitat in America.  
 Affinis Sc. Antæo at differt cornubus lateralibus minoribus & elytrisque punctatis.
- Maimon.* 33. Sc. scutellatus thorace tricorni: cornubus æquilibus brevisimis, elytris laevibus.  
 Scarabæus Maimon Oliv. Inf. 1. 3. 29. 30. tab. 11. fig. 101.  
 Habitat in America Mus. Dom. Banks.  
 Affinis præcedenti at minor & cornua brevissima.  
 Thorax utrinque retusus. Caput muticum.
- Typhoeus.* 34. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio minori, lateralibus porrectis longitudine capitis mutici Linn. syst. nat. 2. 543. 9. Mus. Lud.

- Ulr. 8. Geoff. Inf. 1. 72. tab. 1. fig. 3. Jabl.  
Coleopt. 1. tab. 6. fig. 1. 2.
- Scarabæus Typhœus Oliv. Inf. 1. 3. 59. 68.  
tab. 7. fig. 52.
- Voet. Coleopt. tab. 19. fig. 124. 125.
- Schæff. Icon. tab. 26. fig. 4.
- Habitat substercore bovino cuniculos in terra  
profundos fodiens nidulansque.
- Variat cornubus capite æqualibus & duplo  
longioribus.
35. Sc. scutellatus thorace tricorni: intermedio bre- *Momus*.  
vissimo, elytris laevibus.  
Habitat in India orientali Dom. Lee.  
Statura omnino & magnitudo Sc. Typhoei.  
Caput inermè postice paruin attenuatum.  
Thorax tricornis, lateralibus capite longiori-  
bus in medio paullo flexuosis uti in Sc. Ty-  
phoeo medio brevisimo, subulato, acuto.  
Thorax et elytra laevisima, nigra.
36. Sc. scutellatus thorace tricorui: intermedio lon- *Titanus*,  
giori apice bifido, lateralibus subarcuatis acu-  
tis, capite mutico Jabl. Coleopt. 1. tab. 6. fig. 3.  
Scarabæus Titanus Oliv. Inf. 1. 3. 26. 25.  
tab. 5. fig. 38.  
Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 3. 4.  
Habitat in America.  
Thorax valde retusus. Abdomen subtus pilis  
rufis hirtum.
37. Sc. scutellatus thorace tricorni: medio longiori *Aenobarbus*  
emarginato, lateralibus obtusis, capite bitu-  
berculato.  
Scarabæus Eurytus scutellatus thorace antice  
retufo, cornu brevi incumbente emarginato,  
capite mutico Mant. Inf. 1. 5. 18. fæm.

*Scarabæus Aenobarbus* Oliv. Inf. I. 3. 28.

28. tab. 16. fig. 147.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Statura præcedentis at minor. Thorax aternitens utrinque puncto ferrugineo. Cornua lateralia brevia, obtusa & potius tubercula. Elytra nigra. Abdomen hirtum.

*nasicornis*. 38. Sc. scutellatus thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris laevibus. Linn. syst. nat. 2. 544. 15. Fn. Sv. 378. Jablonsk Coleopt. I. tab. 6. fig. 4. 5. Roef. Inf. 2. Scarab. I. tab. 6. 7.

*Scarabæus nasicornis* Oliv. Inf. I. 3. 37. 41. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europæ fimetis.

Fæmina vix rudimento cornu.

Larva grisea capite spiraculis pedibusque rufis.

*sylvanus*. 39. Sc. scutellatus thorace retuso: prominentia triplici: intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo.

*Scarabæus sylvanus* Oliv. Inf. I. 3. 29. 29. tab. 12. fig. 107.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Magnitudo præcedentis niger. Thorax valde retusus. Elytra punctato striata fere picea.

*Lazarus*. 40. Sc. scutellatus thorace trituberculato, capitis cornu brevi emarginato.

*Scarabæus Lazarus* Oliv. Inf. I. 3. 63. 70. tab. 16. fig. 146.

Habitat in America boreali Dom. Yeats.

Statura parva Sc. mobilicornis. Capitis clypeus emarginatus, utrinque sinuatus. Thorax fuscus, canaliculatus tuberculis tribus medio transverso. Elytra striata rufa.

41. Sc. scutellatus thorace retuso: prominentia qua- *quadrifispinofus.*  
druplici, capitis cornu recurvo.  
Scarabæus 4 spinosus Oliv. Inf. I. 3. 33. 35.  
tab. 19. fig. 179.  
Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.  
Magnus. Capitis clypeus reflexus submarginatus. Thorax in medio retusus postice tuberculo elevato, quadridentato: dentibus intermediis paullo majoribus. Elytra nigra stria unica ad futuram. Pedes pilosi femoribus ferrugineis.
42. Sc. scutellatus thorace quadridentato, capitis *quadridens.*  
cornu elevato simplici, corpore ferrugineo.  
Scarabæus quadridens Oliv. Inf. I. 3. 62. 69.  
tab. 12. fig. 108. fæm.  
Scarabæus Aeneas Panz. Beytr. Inf. Gesch.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Corpus parvum gibbum ferrugineum. Clypeus maris cornu brevi' erecto fæmina bidentatus. Thorax gibbus antice dentibus quatuor elevatis erectis: lateralibus paullo minoribus. Elytra striata.
43. Sc. scutellat. thorace quadridentato capitis cornu *mobilicornis.*  
recurvo mobili. Jabl. Coleopt. I. tab. 8. fig. 6. 7. nis.  
Scarabæus mobilicornis Oliv. Inf. I. 3. 63. 71.  
tab. 10. fig. 88. mas. tab. 25. fig. 88. fæm.  
Laichart. Inf. tab. I. fig. 11.  
Scarabæus bicolor scutellatus thorace subinermi, capite tuberculo unico; elytris nigris, abdomine rufo Mant. Inf. I. 9. 71.  
Habitat in Germania, Anglia.  
Corpus nigrum. Elytra striata.
44. Sc. scutellatus thorace quadricorni: cornubus *Cyclops.*  
lateralibus majoribus, capite bidentato, corpore ferrugineo.

*Scarabæus Cyclops* Oliv. Inf. 1. 3. 60. 67.  
tab. 15. fig. 140.

Habitat in Indiis Dom. Lee.

Medius. Capitis clypeus rotundatus ante densibus duobus elevatis acutis. Thorax utrinque cornu elevato, erecto, valido & pone cornu fovea excavata; in medio elevatus dentibus duobus parvis acutis. Elytra striata. Corpus supra ferrugineum, subtus magis pallidum.

*Milon.* 45. Sc. scutellat. thorace cornubus quinque: postico longiori incumbente, capitis recurvo serrato.

*Scarab.* Milon Oliv. Inf. 1. 3. tab. 20. fig. 185.

Habitat in Brasilia.

Magnus. Capitis cornu elongatum incurvum, interne in medio emarginatum, ante apicem ferratum.

\* \* *Scutellati thorace inermi, capite cornuto.*

*Rhinoceros.* 46. Sc. scutellatus thorace retuso subbituberculato, capitis cornu simplici, clypeo bifido, elytris punctatis. Linn. syst. nat. 2. 544. 14. Mus. Lud. Ulr. 10.

*Scarabæus Rhinoceros* Oliv. Inf. 1. 3. 34. 36.  
tab. 18. fig. 166.

Voet. Coleopt. tab. 18. fig. 117. 118.

Barrel. Icon. tab. 163.

Wulf Inf. Capenf. tab. 2. fig. 18.

Roesf. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 44. fig. 9. & tab. 100. fig. 3.  
Habitat in Asia.

Alium vidimus vix distinctum cornu capitis medio interiori dente brevi, emarginato.

*Augias.* 47. Sc. scutellatus thorace rétuso bituberculato, capitis cornu simplici longitudine thoracis, elytris laevisimis.

Scarab. Augias Oliv. Inf. I. 3. tab. 24. fig. 212.

Habitat in Guinea Dom. Ifert.

Statura & magnitndo praecedentis at distinctus videtur. Clypeus emarginatus cornu recurvo longitudine thoracis. Thorax antice retusus pilis brunneis erectis; postice laevis tuberculis duobus elevatis. Elytra lævia stria unica ad futuram.

48. Sc. scutellatus thorace inermi antice scabro, capitis cornu recurvo brevi. *Barbarossa.*

Scarabaeus Barbarossa Oliv. Inf. I. 3. 32. 34. tab. 12. fig. 109.

Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.

Magnitudo Sc. Rhinoceros at latior. Capitis clypeus antice elongatus subemarginatus cornu recurvo, subulato longitudine capitis. Thorax rotundatus, antice scaber: postice glaber. Elytra picea, punctato striata. Tibiae anticae quadridentatae.

49. Sc. scutellatus thorace inermi antice truncato, *Satyrus.* capitis cornu recurvo capite longiori.

Scarabaeus Satyrus Oliv. Inf. I. 3. 39. 43. tab. 11. fig. 49.

Habitat in America boreali Dom. Banks.

Major Sc. nasicorni. Clypeus late emarginatus. Cornu capite triplo longius. Thorax antice valde truncatus, glaber, laevis, ater. Elytra striata. Corpus subtus ferrugineum, hirtum. Tibiae dentatae.

Faemina clypeo tuberculato, thorace plano.

50. Sc. scutellatus thorace inermi antice retuso, *Jamaicensis* capitis cornu recurvo, elytris striatis.



*Scarabaeus Jamaicensis* Oliv. Inf. 1. 3. 40. 44.  
tab. 16. fig. 148.

Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 1. 2.

Habitat in Jamaica.

*Faemina mutica*.

*Silenus.* 51. *Sc. scutellatus thorace inermi antice excavato,*  
*capitis cornu recurvo, elytris laevisimis.*

*Scarabaeus Silenus* Oliv. Inf. 1. 3. 41. 45.  
tab. 8. fig. 62.

Scopol. Del. Flor. & Fn. Inf. 1. tab. 21. fig. 6.

Ross. Fn. Etruf. 1. 3. 8.

Barrel. Plant. Hisp. tab. 163.

Habitat in Europa australiori.

Statura & summa affinitas *Sc. nasicornis* at duplo  
minor, totus piceus.

*Syrichtus.* 52. *Sc. scutellatus thorace inermi rotundato, capi-*  
*tis cornu recurvo.*

*Scarabaeus Syrichtus* Oliv. Inf. 1. 3. 50. 57.  
tab. 6. fig. 48. tab. 20. fig. 48.

Jabl. Coleopt. tab. 11. fig. 4.

Voet. Coleopt. tab. 20. fig. 138.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti, at thorax rotundatus nec  
retusus, nec excavatus.

*Apelles.* 53. *Sc. scutellatus, thorace inermi, capitis cornu*  
*brevisimo, elytris cinereis: punctis elevatis*  
*atris, tarfis anticis nullis.*

*Scarabaeus Apelles* Oliv. Inf. 1. 3. 141. 170.  
tab. 11. fig. 97.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 9.

Voet. Coleopt. tab. 25. fig. 33.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. D. Banks.

Parvus. Clypeus rotundatus, integer suturis  
elevatis cornuque medio elevato brevi, griseo

fusca ante marginem flavus, Thorax inæqualis, griseo fuscus margine punctisque duobus anticis flavis. Elytra griseo fusca lineis elevatis striata & in his puncta oblonga, elevata, atra. Pedes flavi nigro maculati, tibiis anticis incurvis absque tarfis.

54. Sc. scutellatus thorace inermi, capitis cornu *Hylax*. emarginato, tibiis posticis brevissimis apice spinosis.

*Scarabaeus Hylax* Oliv. Inf. 1. 3. 50. 58.  
tab. 11. fig. 95.

Habitat in Africa Dom. Lee.

Medius. Clypeus dentatus cornu brevi, erecto, compresso, late emarginato. Thorax rotundatus, postice canaliculatus. Elytra laevia rufa. Corpus hirtum, obscure rufum. Femora incrassata, rufa: Ungues magni, arcuati.

55. Sc. scutellatus thorace inermi rotundato, capitis cornu brevissimo subulato, corpore subtus rufo piloso.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Prof. Vahl.

Clypeus antice emarginatus, in medio cornu brevissimo, subulato. Elytra substriata.

Fæmina Sc. Satyri observante Olivier an rite?

56. Sc. scutellatus thorace inermi, capitis cornu *Clinias*. brevissimo, tarfis anticis nullis.

*Scarab. Hungaricus* Herbst. Arch. tab. 16. fig. 4.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura omnino Sc. Sphinx at paullo minor. Capitis clypeus rotundatus, integer, in medio cornu brevissimo. Ante cornu tuberculum parvum & pone cornu linea elevata transversa. Thorax rotundatus, niger macula utrinque flava. Elytra substriata, nigra. Tarfi antici nulli,

*Monodon.* 57. Sc. scut. thorace inermi rotundato, capitis tuber-  
culo elevato subcornuto, corpore subtus nudo.  
Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

Statura omnino Sc. Aries at paullo minor. Ca-  
pitis clypeus obtusus in medio tuberculo magno  
elevato, subcornuto. Thorax rotundatus, lævis  
opacus. Elytra nigra, opaca vix striata. Cor-  
pus nudum, nigrum.

*coronatus.* 58. Sc. scutellatus thorace inermi, capitis clypeo  
postice emarginato.

Scarabæus coronatus Oliv. Inf. 1. 3. 52. 61.  
tab. 12. fig. 110.

Habitat in Java Mus. Dom. Banks.

Statura Sc. Apelles. Corpus piceum. Clypeus  
utrinque elevatus postice emarginatus. Thorax  
punctatus. Elytra lævia. Femora postica bre-  
via, incrassata.

*Dionyfius.* 59. Sc. scutellatus thorace inermi excavato, capitis  
cornu recurvo depresso apice crassiori.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura & summa affinitas Sc. Sileni, a quo tamen  
differt cornu capitis recurvo, depresso & haud  
acuto, sed apice crassiori, obtuso. Elytra sub-  
striata.

*Meliboeus.* 60. Sc. scut. thorace inermi antice inæquali, capitis  
cornu brevissimo truncato, elytris striatis.

Habitat in America boreali Dom. Lee.

Parvus. Antennae crassae, piceae. Caput nigrum  
cornu medio, brevi, erecto, truncato, obtuso.  
Thorax niger antice parum inæqualis. Elytra  
crenato striata, obscure picea. Pedes nigri.

*Didymus.* 61. Sc. scutellatus depresso thorace fossula exarato,  
capite tricuspidate, elytris striatis Linn. syst.  
nat. 20. 545. 19. Mus. Lud. Ulr. 14.

- Scarab. didymus Oliv. Inf. 1. 3. 42. 46. t. 2. f. 9.  
 Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.  
 Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 3.  
 Voet. Scarab. tab. 19. fig. 126.  
 Habitat in America.  
 Alter sexus in antico thoracis mucrone parvo  
 elevato armatus.
- 62. Sc. scutellatus depresso thorace sulcato mucronato, capite cornubus duobus brevibus *valgus.***  
 Scarab. valgus exscutellatus thorace mutico, capite cornuto, femoribus secundi paris remotis  
 Linn. syst. nat. 2. 54. 6. 20. Mus. Lud. Ulr. 15.  
 Scarabæus valgus Oliv. Inf. 1. 3. tab. 17. fig. 160.  
 Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.  
 Habitat Cajennæ.  
 Affinis Sc. didymo at minor.
- 63. Sc. scutellatus thorace inermi scabro, capite linea *hircus.* transversa carinata, clypeo bidentato.**  
 Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
 Statura Sc. nasicornis. Capitis clypeus emarginatus dentibus duobus elevatis erectis. In medio linea transversa, carinata. Thorax scaber. Elytra substriata. Corpus nigrum, ferrugineo hirtum. Videtur mihi potius Fæmina mutica aliis Scarabæi.
- 64. Sc. scut. thorace inermi punctato, capitis clypeo *punctatus.* integro: dentibus duobus elevatis obtusis.**  
 Scarab. punctat. Oliv. Inf. 1. 3. 52. 60. t. 8. f. 70.  
 Scarab. Algerinus Jabl. Coleopt. 2. tab. 17. f. 6.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Paullo minor Sc. Hirco. Capitis clypeus rotundatus, nullo modo nec reflexus, nec emarginatus. In medio linea transversa carinata, quæ in medio dentibus duobus elevatis armata.

- — —
- Thorax rotundatus, punctatus, niger, nitidus.  
Elytra punctato striata, nigra. Corpus nigrum.
- farctus.* 65. Sc. scutellatus brunneus capite subbicorni, elytris  
punctato striatis apice nigris.  
Scarabæus Cephus Mant. I. 10. 85.  
Scarab. Cephus Oliv. Inf. I. 3. 68. 76. t. II. f. 96.  
Voet. Coleopt. tab. 10. fig. 92.  
Habitat in Pennsylvania.  
Magnitudo Sc. vernalis. Thorax ciliatus, ferru-  
gineus margine postico nigro. Antice ruga  
transversalis, abbreviata. Scutellum nigrum.  
Elytra apice nigra macula brunea.
- retusus.* 66. Sc. scutellatus thorace retuso, capitis cornu brevi  
plano, femoribus posticis incrassatis.  
Scarab. retusus Oliv. Inf. I. 3. 46. 55. t. II. f. 100.  
Habitat in Cap. Bon. spei Dom. Banks.  
Minor Sc. nasicorni. Clypeus subemarginatus.  
Thorax niger, obscurus antice retusus. Elytra  
laevia, nigra. Corpus ferrugineo hirtum.  
Pedes rufi.
- piceus.* 67. Sc. scutellatus piceus thorace inermi glabro,  
capite bicorni, elytris striatis.  
Scarab. piceus Oliv. Inf. I. 3. 52. 63. t. 24. f. 211.  
Jablonsk Coleopt. tab. II. fig. 3.  
Fyesl Coleopt. I. 4. 6. tab. 19. fig. I.  
Habitat in Indiis Dom. Drury.  
Statura parva Sc. Fosforis. Clypeus emarginatus  
in medio cornubus duobus brevisimis approxi-  
matis. Thorax glaber, laevis. Elytra punctato  
striata.
- Inuus.* 68. Sc. scut. thorace inermi quadripunctato, capite  
quadrituberculato, tarsis anticis nullis.  
Scarabæus Inuus Oliv. Inf. I. 3. 138. 165.  
tab. 14. fig. 135.  
Habitat in Sierra Leon. Africæ.

Corpus supra viridi æneum.

69. Sc. scutellatus thorace inermi quadripunctato, *Aygulus*.  
capite tuberculato, elytris testaceis, tarsis  
anticis nullis.

*Scarabæus Aygulus* Oliv. Inf. I. 3. 136. 164.  
tab. 13. fig. 120. tab. 4. fig. 28.

Voet. Coleopt. tab. 28. fig. 42.

Habitat in India Mus. Dom. Banks.

Nimis præcedenti affinis at major. Clypeus  
integer, viridis lineolis quinque transversis  
tuberculoque postico elevatis. Thorax inermis,  
æneus puncto utrinque unico & duobus dor-  
salibus approximatis ad marginem posticum.  
Tibiae anticae utrinque dentatae.

70. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis *subterraneus*  
tribus, elytris striis crenatis Linn. syst. nat. 2. *neus*:  
548. 28. Fn. Sv. 382.

*Scarabæus subterraneus* Oliv. Inf. I. 3. 76. 79.  
tab. 18. fig. 162.

Jablonsk Coleopt. I. tab. 11. fig. 6.

Habitat in Europæ stercore.

Affinis certe Sc. Fosfor at duplo minor.

71. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis *Sorex*.  
tribus: medio subcornuto, elytris striatis gri-  
feis: margine nigro.

Habit. in China & India orientali D. de Sehestedt.

Statura & magnitudo omnino Sc. Fosfor. Cly-  
peus reflexus, late emarginatus, ater, imma-  
culatus. Thorax vase punctatus, ater. Scu-  
tellum atrum. Elytra striata, grisea margine  
exteriori futuraque nigris Corpus atrum.

72. Sc. scutellatus thorace inermi retuso, capite *Fosfor*.  
tuberculis tribus: medio subcornuto. Linn.  
syst. nat. 2. 548. 31. Fn. Sv. 384. Geoff.  
Inf. I. 82. 20.

Scarab. Fosfor Oliv. Inf. 1. 3. 75. 78. t. 20. f. 148.

Jablonsk Coleopt. tab. 12. fig. 1.

Voet. Coleopt. tab. 21. fig. 141. 142.

Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 7. 8.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 7.

Habitat in Europae stercore.

*scrutator.* 73. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis tribus, elytris abdomineque rufis.

Scarabaeus scrutator Herbst. tab. 16. fig. 6.

Scarabaeus rabidus Oliv. Inf. 1. 3. 77. 81. tab. 26. fig. 224

Habitat in Europa australi Prof. Helwig.

Statura & summa affinitas Sc. simetarii. Clypeus rotundatus tuberculis tribus. Thorax punctatus, ater, nitidus margine late rufo. Elytra striata, rufa, puncto baseos & apicis elevato. Abdomen totum rufum. Pedes nigri.

*fulcatus.* 74. Sc. scutellatus ater nitidus thorace inermi, capite tuberculis tribus validis, elytris fulcatis: fulcis rugosis.

Habitat in Germania Dom. de Loewenskiold.

Omnino distinctus. Sc. fossori minor. Antennae fuscae. Caput atrum, nitidum tuberculis tribus validis, elevatis, acutis. Clypeus subemarginatus. Thorax punctatus, ater, nitidus. Elytra depressiuscula, sulcata: fulcis lineolis transversis rugosis, nigra, immaculata. Corpus nigrum.

*foetens.* 75. Sc. scutellat. thorace inermi, capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo.

Scarabaeus foetens Oliv. Inf. 1. 3. 85. 92. tab. 9. fig. 71. Jablonsk Coleopt. 1. 173. 109.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Forte mera varietas Sc. simetarii, Duplo minor Sc. fossor. Thorax latus, ater, nitidus macula marginali ferruginea. Elytra striata nigra

limbo in primis baseos ferrugineo. Abdomen atrum ano rufo. Pedes atri.

76. Sc. scut. thorace inermi, capite tuberculis tribus *analis*.  
æqualibus niger, elytris apice ferrugineis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Clypeus rotundatus, subemarginatus postice tuberculis tribus æqualibus, elevatis, subcornutis.  
Thorax rotundatus, lævis, ater, nitidus. Elytra striata, nigra macula magna apicis ferruginea, margine tamen ipso tenuissime nigro.  
Pedes dentati, nigri tibiis posticis compresso dilatatis.

77. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis *scybalariae*  
tribus: medio acuto, elytris testaceis striatis.

Scarabæus scybalariae Oliv. Inf. I. 3. 80. 84.  
tab. 26. fig. 226.

Jablonsk Colept. I. tab. 12. fig. 2.

Voet. Coleopt. tab. 21. fig. 146.

Scarabæus foetidus Herbst. Arch. 6.

Habitat in Germania.

Minor Sc. fossori. Os thoracisque margo subtestacea. Elytra striata striis haud crenatis.

78. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis *terrestris*.  
tribus æqualibus, elytris striatis obscurioribus.

Scarabæus terrestris Oliv. Inf. I. 3. 77. 8. tab. 24.  
fig. 209.

Habitat in Anglia, Germania.

Sc. fossori triplo minor. Tubercula capitis minora, breviora. obtusiora.

79. Sc. scutellatus niger obscurus, thorace inermi, *obscurus*.  
capite tuberculis tribus obsoletis, elytris striatis.

Habitat in Germania.

Magnitudo præcedentis. Clypeus rotundatus, vix emarginatus, niger, obscurus tuberculis tribus brevissimis, fere obsoletis. Thorax lævis,

- niger, minime nitidus. Elytra obscura striis  
lævibus. Pedes nigri.
- ater.* 80. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis  
tribus: medio subcornuto, elytris striatis  
lævisimis.  
Scarabæus ater Degeer Inf. 4. 158.  
Habitat Kiliae.  
Statura Sc. fossoris at quadruplo minor. Clypeus  
rotundatus, subemarginatus tuberculis tribus  
minutis: medio majori. Thorax subpunctatus,  
nitidus, ater. Elytra atra, nitida, striata at  
nullo modo crenata. Corpus nigrum pedibus  
piceis.  
Variat rarius puncto thoracis parvo laterali rufo.
- Porcus.* 81. Sc. scutellatus thorace inermi, capite tuberculis  
tribus: medio subcornuto, elytris substriatis  
rufis.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Parvus. Palpi & antennæ piceæ. Clypeus ro-  
tundatus, ater tuberculis tribus elongatis: in-  
termedio majori subcornuto. Thorax inermis,  
ater, immaculatus. Elytra substriata, rufa.  
Corpus atrum pedibus rufis.
- bimacula-* 82. Sc. scutellatus thorace inermi, capite subtritu-  
*tus.* berculato, elytris striatis: macula baseos rufa.  
Scarabæus bimaculatus Oliv. Inf. 1. 3. 85. 91.  
tab. 9. fig. 72.  
Roff. Fn. Etrusc 6. 11.  
Panz. Naturf. 24. 3. 2. tab. 1. fig. 2.  
Habitat in Germania Dom. Hybner.  
Statura Sc. terrestris. Caput atrum tuberculis  
minutissimis. Thorax lævis glaber, ater, im-  
maculatus. Elytra striata, atra macula baseos  
oblonga rufa. Corpus atrum.  
Mera varietas Sc. terrestris observante Helwigio.

83. Sc. scutellatus *testaceus*, capite bituberculato, *testaceus*.  
elytris punctato striatis.
- Sarabæus *testaceus* Oliv. Inf. I. 3. 69. 77.  
tab. 17. fig. 158.
- Jabl. Coleopt. I. tab. 12. fig. 3.
- Habitat in Anglia Dom. Lee.
- Statura Sc. vernalis, at triplo minor, totus pallide *testaceus*. Tubercula duo parva in fronte. Thorax punctatus. Corpus hirtum.
- Forte varietas Sc. mobilicornis fæm.
84. Sc. scutellatus, ater, thorace inermi, capite *fimetarius*.  
tuberculato, elytris rubris Linn. syst. nat. 2.  
548. 32. 10. Fn. Sv. 385. Geoff. I. 81. 18.  
Scarabæus *fimetarius* Oliv. Inf. I. 3. 78. 82.  
tab. 18. fig. 167.
- Schaeff. Icon. tab. 144. fig. 68.
- Voet. Scarab. tab. 21. fig. 147.
- Habitat in Europæ stercore frequens.
85. Sc. scutellatus ater, thorace inermi immaculato, *confagrat-*  
*tus*.  
elytris striatis griseis: macula nigra.  
Scarab. *confagratatus* Oliv. Inf. I. 3. 80. 85.  
tab. 26. fig. 220.
- Jabl. Coleopt. I. tab. 12. fig. 7.
- Habitat in Germaniae stercore D. Smidt.
- Statura & magnitudo omnino praecedentis, at differt thorace omnino immaculato & elytris griseis macula magna disci nigra. Scutellum nigrum. Corpus nigrum pedibus piceis.
86. Sc. scutellatus thorace inermi laevi, capite tu- *erraticus*.  
berculo unico, elytris fuscis Linn. syst. nat. 2.  
548. 29. Fn. Sv. 383. Schaeff. Icon. t. 26. f. 9.  
Scarabæus *erraticus* Oliv. Inf. I. 3. 179. 83.  
tab. 18. fig. 163.
- Jabl. Coleopt. I. tab. 12. fig. 6.

Herbst. Arch. tab 49. fig. 2.

Habitat in Europae stercore.

*confusca*- 87. Sc. scutellatus thorace inermi: marginibus lateribus albidis, capite tuberculato, elytris striatis griseis fusco maculatis, Linn. syst. nat. 2.

549. 34. Fn. Sv. 387. Geoff. Inf. 1. 82. 19.

Scarabaeus confuscus Oliv. Inf. 1. 3. 81. 86. tab. 24. fig. 210. tab. 25. fig. 214.

Jablonsk Coleopt. tab. 12. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 8.

Voet. Scarab. tab. 21. fig. 145.

Habitat in Europae stercore frequens.

Margo thoracis anticus posticusque tenuissime pallidus.

*inquinatus*. 88. Sc. scutellatus, capite trituberculato, elytris griseis fusco maculatis.

Scarabaeus inquinatus Oliv. Inf. 1. 33. 48. 90. tab. 26. fig. 221.

Scarabaeus inquinatus Herbst. Arch. 6. 16.

Habitat in Saxoniae stercore Dom. Hybner.

Parvus. Caput atrum tuberculis tribus elevatis. Thorax laevis, ater, nitidus margine subrufescente. Elytra striata, nitida, grisea maculis variis fuscis.

Variat elytris totis atris nullo modo distinctus.

*futuralis*. 89. Sc. scutellatus nigricans capite trituberculato, elytris testaceis: futura nigra.

Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.

Statura parva Sc. inquinati. Caput obscurum tuberculis tribus elevatis, aequalibus labioque subemarginato. Thorax niger margine testaceo: punto parvo nigro. Elytra striata, testacea: futura nigra. Corpus obscurum pedibus flavescentibus.

**90. Sc. scutellatus capite tuberculato, thorace nigro: *fordidus*.**

margine pallido; puncto nigro, elytris griseis.

*Scarabaeus fordidus* Oliv. Inf. 1. 3. t. 25. f. 216.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 12. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 74. fig. 3.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 3.

*Scarab. 4 punctatus* Panz. Naturf. 24. 4. t. 1. f. 4.

Habitat in Europae stercore.

*Paullo major Sc. conspurcato.* Clypeus integer, niger macula utrinque pallida. Thorax laevis, glaber, ater margine omni pallido. Elytra striata, grisea: sutura obscuriore. Subtus nigro griseoque variegatus pedibus pallidis.

Variat elytris nigro bipunctatis & immaculatis.

**91. Sc. scutellatus capite tuberculato ater, elytris *luridus*, griseis nigro striatis.**

*Scarabaeus luridus* Oliv. Inf. 1. 3. 90. 100. tab. 18. fig. 68. & tab. 26. fig. 168.

*Scarabaeus tessellatus* Myll. Zool. Dan.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 18. fig. 3.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax mutica, atra, nitida. Elytra striata, grisea lineolis maculisque nigris. Varietatem elytris totis nigris misit Dom. Helwig.

**92. Sc. scutellatus niger, thorace mutico, clypeo *granarius*.**

tuberculo solitario, elytris postice testaceis

Linn. syst. nat. 2. 547. 23.

*Scarabaeus granarius* Oliv. Inf. 1. 3. 82. 88. tab. 18. fig. 172.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 12. fig. 10.

Habitat in Europae suffocatis.

Elytra postice ultra dimidium testacea.

**93. Sc. scutellatus niger, thorace mutico punctato, *haemorrhoidalis*.**

capite tuberculato, elytris striatis apice rufis dialis.

Linn. syst. nat. 2. 548. 33. Fn. Sv. 386.

*Scarabaeus haemorrhoidalis* Oliv. Inf. 1. 3. 83. 89.

tab. 26. fig. 223.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 12. fig. 11.

*Scarabaeus sanguinolentus* Herbst. Arch.

Habitat in Europae stercore.

Affinis certe Sc. granario, attamen distinctus  
videtur. Thorax punctatus. Elytra magis striata  
apice determinate rufa.

*nitidulus.* 94. Sc. scutellatus ferrugineus, capite quadrituberculato, elytris pallidis.

Habitat in Europae stercore.

Parvus. Clypeus integer, ferrugineus tuberculis  
quatuor elevatis 1. 3. Thorax rotundatus, laevis,  
inermis, ferrugineus, nitidus. Scutellum fer-  
rugineum. Elytra laevia, pallida. Corpus  
ferrugineum.

*marianus.* 95. Sc. scutellat. capite tuberculato, elytris laevibus  
glaucis fusco punctatis Linn. syst. nat. 2. 549. 35.

Habitat in America.

Mihi haud rite notus. Videtur faemina mutica  
Sc. Herculis aut alias. Abdomen & femora  
ferruginea.

\*\*\* *Scutellati mutici, capite thoraceque inermi.*

*longimanus.* 96. Sc. scutellatus muticus, pedibus anticis arcuatis  
longissimis Linn. syst. nat. 2. 549. 39. Mus.  
Lud. Ulr. 18.

Aubent Miscell. tab. 41. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 11. fig. 79.

*Scarabaeus longimanus* Oliv. Inf. 1. 3. 48. 55.  
tab. 4. fig. 27.

Jablonsk Coleopt. 2. tab. 17. fig. 1.

Habitat in Indiis.

*stercorarius.* 97. Sc. scutellatus muticus ater, clypeo rhombeo:  
vertice prominulo, elytris sulcatis Linn. syst.  
nat. 2. 541. 32. Fn. Sv. 388. Geoff. Inf. 1. 75. 9.

**Scarabaeus stercorarius Oliv.** Inf. 1. 3. 54. 72.

tab. 5. fig. 39.

Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 134.

Habitat in Europa sub stercore.

Vesperi circumvolitat magno cum fusurro,  
serenum diem auncuntians. Infestatur Acaris,  
Ichneumone.

Alium simillimum at subtus aeneum nitidis-  
simum misit Dr. Allioni ex Italia.

**98. Sc. scutellatus muticus,** elytris glabris laevis- *vernalis.*

simis, clypeo rhombeo : vertice prominulo

Linn. syst. nat. 2. 541. 33. Fn. Sv. 389.

Geoff. Inf. 77. 10.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 135.

**Scarabaeus vernalis Oliv.** Inf. 1. 3. 66. 74.

tab. 2. fig. 15.

Habitat in Europae stercore Moschum spirans.

Macula ovata ferrugineo villosa ad basin infe-  
riorem femorum anticorum uti in praecedente.

**99. Sc. scutellatus muticus ater,** thorace antice *cordatus.*

cordato impresso mucronato, capite bituber-  
culato.

Habitat in Insula Guadaloupe de Badier.

Major Sc. stercorario. Caput nigrum tuber-  
culis duobus elevatis, brevibus clypeo que  
emarginato. Thorax rotundatus, subpuncta-  
tus, ater antice macula cordata impressa,  
mucrone parvo elevato. Elytra punctata.  
Tibiae dentatae.

**100. Sc. scutellatus muticus thorace retuso mucro-** *excavatus.*  
nato, clypeo reflexo integro.

**Scarabaeus candidae Petagna Spec.** Inf. Calabr.  
ulter. 3. 9. tab. 1. fig. 6.

Cyrilli Ent. Neap. 1. tab. 1. fig. 12.

Melolontha cornuta Oliv. Inf. 1. 5. 20. 16.  
& 173. tab. 9. fig. 74.

Habitat in regno Neapolitano D. de Schlanbusch.  
Statura & magnitudo Sc. Juvencus. Clypeus  
rotundatus, reflexus, integer. Thorax gla-  
ber, laevis, niger, nitidus valde & fere totus  
retusus margine antico in mucronem validum,  
acutum extenso. Elytra vix striata, picea  
puncto calloso baseos. Corpus hirtum piceum.  
Femora valde incrassata.

*Talpa.* 101. Sc. scutellatus muticus, thorace antice mucro-  
nato, capitis clypeo linea elevata transversa  
apice reflexo emarginato.

Habitat in Insula St. Bartholomaei Indiae occi-  
dentalis Dom. de Paykull.

Affinis certe Sc. Juvenco at duplo major. Cly-  
peus reflexus, emarginatus linea media trans-  
versa, elevata, acuta. Thorax punctatus niger,  
nitidus antice mucrone parvo & ante mucro-  
nem punctum parvum impressum. Elytra  
striata, nigra. Corpus hirtum, piceum.

*juyencus.* 102. Sc. scutellatus muticus thorace antice impresso  
mucronato, clypeo subemarginato.

Scarabaeus Juvencus Oliv. Inf. 1. 3. 45. 50.  
tab. 16. fig. 143. tab. 8. fig. 66.

Habitat in America Dom. Banks.

Paullo minor Sc. stercorario. Clypeus rotunda-  
tus striga media transversa elevata. Thorax  
rotundatus, punctatus, ater antice puncto  
parvo impresso & sub hoc, prominet mucro  
brevisimus. Elytra crenato striata, picea.  
Corpus hirtum, piceum.

*splendidus.* 103. Sc. scutellatus muticus viridi nitens elytris  
striatis

- Scarabaeus splendidus Oliv. Inf. I. 3. 67. 75.  
tab. 14. fig. 126.  
Habitat in America Dom. Drury.  
Statura Sc. stercorarii at triplo minor totus viridis, nitens, immaculatus. Clypeus emarginatus. Thorax rotundatus, laevis puncto lateraliter utrinque impresso. Elytra crenato striata. Tibiae dentatae.
104. Sc. scutellatus muticus rufus, capite thorace- *Veter.*  
que linea carinata elevata.  
Habitat in India orientali Dom. Vahl.  
Clypeus angulatus, rufus margine lineaque elevata, transversa, abbreviata nigris. Thorax rufus antice lineola transversa, elevata tuberculisque duobus. Pectus hirtum. Elytra striata rufa.
105. Sc. scutellatus muticus ater thorace punctato, *laborator.*  
elytris striatis, clypeo emarginato.  
Scarabaeus laborator Oliv. Inf. I. 3. 53. 62.  
tab. 14. fig. 132.  
Habitat in stercore bovino Brasiliae Mus. Dom.  
Banks.  
Statura omnino sequentis at duplo major, totus ater. Clypeus emarginatus. Thorax vase punctatus. Elytra striata. Pedes nigri.
106. Sc. scutellatus muticus niger thorace laevi, *arator,*  
elytris punctato striatis.  
Habitat ad Cap B. Spei.  
Clypeus integer, subscaber. Antennae ferrugineae. Thorax glaber, laevis. Elytra striato punctata. Femora antica ferruginea.
107. Sc. scutellatus muticus thorace elytrisque *globator.*  
punctatis obscure nigris.  
Melolontha globator Oliv. Inf. I. 5. 40. 49.  
tab. 6. fig. 60.

Habitat ad Cap. B. Spei Mus. Dom. Banks.  
 Clypeus rotundatus margine reflexo striaque  
 media elevata. Thorax obscurus punctis plu-  
 rimis impressus. Elytra itidem nigra, obscura,  
 punctata: punctis uti videtur, piliferis. Cor-  
 pus hirtum, piceum.

Melolontha teste Olivier an rite?

*7 macula-* 108. Sc. muticus obscurus elytris striatis pallidis  
*tus.* nigro maculatis.

Scarabaeus *7 maculatus* Oliv. Inf. 1. 3. 86. 96.  
 tab. 14. fig. 134.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. D. Banks.

Statura Sc. conspurcati at paullo major &  
 omnino muticus. Clypeus rotundatus, inte-  
 ger, pallescens, macula media nigra. Thorax  
 punctatus obscure rufus punctis dorsalibus  
 atris. Elytra striata pallida macula baseos  
 parva, majori in medio marginis exterioris,  
 conica communi versus apicem & apice nigris.  
 Corpus uti & pedes picea.

*2 punctatus.* 109. Sc. scutellatus muticus thorace nigro rubro  
 marginato, elytris rubris: puncto nigro.

Scarabaeus *2 punctatus* Lepech. Itin. 2. 324.  
 tab. 10. fig. 7.

Scarabaeus coccinelloides Pall. Icon. Inf. 1. 12.  
 tab. A. fig. 12.

Habitat in stercore equino Rossiae.

Thoracis margo rufus puncto nigro.

*rufipes.* 110. Sc. scutellatus muticus ater thorace glabro  
 nitido, elytris striatis, pedibus rufis Linn.  
 syst. nat. 2. 559. 86. Fn. Sv. 403.

Scarabaeus *rufipes* Oliv. Inf. 1. 3. 87. 94.  
 tab. 18. fig. 171.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 28. fig. 2.

- Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 6.  
 Habitat in Europae stercore.
111. Sc. scutellatus muticus niger thorace sub. *nigripes*.  
 punctato, elytris striatis, pedibus nigris.  
*Scarabaeus gagates* Oliv. Inf. 1. 3. tab. 24.  
 fig. 213.  
*Scarabaeus totus niger*, capite inermi Geoff.  
 Inf. 1. 83. 21.  
*Scarabaeus Arator* Herbst. Arch. 7. 20.  
 Habitat in Europae stercore.
- Praecedente paullo minor. Clypeus rotundatus  
 integer, subreflexus. Caput & thorax sub-  
 punctata, nigra, opaca. Elytra striata, im-  
 maculata. Pedes nigri. Speciminibus plurimis  
 a Dom. Helwigio lectis mera varietas Scarab.  
 luridi videtur.
112. Sc. scutellatus muticus niger elytris striatis *lutarius*.  
 piceis.  
 Habitat in Germaniae stercore D. Smidt.  
 Statura omnino praecedentis at paullo minor.  
 Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra  
 striata, picea sive fusca rufo colore inprimis  
 basi margineque tincta. Pedes nigri digitis  
 omnibus rufis.
113. Sc. scutellatus muticus thorace nigro æneo, *Blackburnii*  
 elytris striatis atris.  
 Habitat in America Dom. Blackburn.  
 Clypeus rotundatus centro paullum prominulo.  
 Thorax rotundatus puncto utrinque impresso,  
 nigro æneus, obscure nitens. Elytra striata,  
 atra.
114. Sc. scutellatus muticus ater elytris striatis gri- *contamina-*  
 seis: signaturis fuscis. *tus.*  
*Scarab. contaminatus* Herbst. Arch. t. 19. f. 13.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.

Summa affinitas Sc. conspurcāti at distinctus.

Caput omnino muticum, atrum, nitidum, immaculatum: clypeo rotundato, integro. Thorax laevis, ater margine antico & laterali tenuissime flavescentibus. Elytra crenato striata, grisea: macula magna media minori baseos connexa fuscis. Corpus nigrum pedibus griseis.

Variat rarius elytris immaculatis thoracisque margine ciliato.

*4 macula-* 115. Sc. scutellatus muticus oblongus niger thorace elytrorum maculis duabus pedibusque rubris.

Linn. syst. nat. 2. 558. 84. Fn. Sv. 395.

Scarabaeus *4 maculatus* Oliv. Inf. 1. 3. 92. 103.  
tab. 19. fig. 174.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 18. fig. 10.

Panz. Naturf. 24. 43. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Anglia, Germania.

Thorax glaber, nitens, obscure rufus. Elytra obsolete striata.

*4 pustula-* 116. Sc. scutellatus muticus oblongus niger, thorace immaculato, elytris maculis duabus rubris, pedibus nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Paullo minor Sc. quadrimaculato & distinctus.

Caput & thorax laevia, nigra, immaculata.

Elytra striata maculis duabus rufis. Pedes omnino nigri.

*Sus.* 117. Sc. scutellatus muticus oblongus obscure rufus elytris testaceis nigro maculatis. Herbst. Arch. 9. 29.

Scarabaeus pubescens Oliv. Inf. 1. 3. t. 1. f. 14.

Habitat in Germaniae stercore.

Corpus glabrum, nitidum, obscure rufum.

Elytra testacea atomis migris.

118. Sc. scutellatus muticus gibbus ater elytris *elevatus*.  
striato punctatis, clypeo emarginato.

Scarabaeus elevatus Oliv. Inf. 1. 3.

Habitat in Gallo Provincia Mus. Dom. Olivier.

Sc. plagiato magis gibbus. Clypeus late emarginatus. Antennarum clava ferruginea. Thoracis latera punctata.

119. Sc. scutellatus muticus niger elytris plaga *plagiatus*.  
rufescente Linn. syst. nat. 2. 539. 85.

Scarabaeus plagiatus Oliv. Inf. 1. 3. 92. 104.  
tab. 25. fig. 215.

Habitat in Svecia.

Statura & magnitudo Sc. subterranei.

Variat elytris totis nigris observante Helwigio.

120. Sc. scutellatus muticus niger thoracis elyto-*marginellus*  
rumque marginc testaceo.

Scarabaeus marginellus Oliv. Inf. 1. 3. 91. 103.  
tab. 13. fig. 116.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Parvus. Clypeus rotundatus, integer, niger  
fascia media obscure rufa. Thorax niger, nitidus  
marginc exteriori testaceo. Elytra cre-  
nato-striata, nigra marginc testaceo, qui color  
ante apicem extenditur. Pedes picei.

121. Sc. scutellatus muticus niger, elytris striatis: *fasciatus*.  
marginc fasciaque postica ferrugineis.

Scarabaeus fasciatus Oliv. Inf. 1. 3. 90. 99.  
tab. 14. fig. 130.

Habitat in Kamshatka Mus. Dom. Banks.

Statura parva praecedentis. Caput nigrum,  
immaculatum. Thorax laevis, niger marginc  
antico parum flavescente. Elytra striata nigra  
marginc exteriori ante apicem fasciam ex-  
ferente, ferrugineo. Corpus nigrum.

- testudina-* 122. Sc. scutellatus muticus niger elytris sulcatis  
piceis ferrugineo punctatis.  
Scarabaeus testudinarius Oliv. Inf. 1. 3. 93. 105.  
tab. 20. fig. 186.  
Scarabaeus Moeris Pall. Icon. tab. 3. fig. 2,  
Jablonsk Coleopt. 2. tab. 18. fig. 13.  
Herbst. Arch. tab. 19. fig. 7.  
Habitat in Anglia Dr. Solander.  
Parvus. Clypeus rotundatus, emarginatus.  
Thorax scaber, ater. Elytra profunde sul-  
cata, picea, punctis ferrugineis per paria  
distributis adspersa. Pedes picei.
- Scrofa.* 123. Sc. scutellatus muticus oblongus niger elytris  
fuscis substriatis.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura parva praecedentis. Caput & thorax  
nigra. Elytra obscura.
- quisquilius.* 124. Sc. scutellatus muticus ater, elytris lividis:  
futura nigra Linn. syst. nat. 2. 558. 83.  
Fn. Sv. 397.  
Scarabaeus quisquilius Oliv. Inf. 1. 3. 95. 108.  
tab. 18. fig. 170.  
Jabl. Coleopt. 2. tab. 18. fig. 15.  
Herbst. Arch. tab. 19. fig. 8.  
Scarabaeus minimus Scop. Carn. 29.  
Habitat in Europaë stercore.
- Pecari.* 125. Sc. scutellatus muticus ater nitidus elytris  
striatis rufis: futura nigra, pedibus rufis.  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Statura parva Sc. simetarii at omnino muticus,  
laevis, ater, nitidus. Elytra rufa futura nigra  
in medio maculam efficiente. Corpus nigrum  
pedibus rufis.
- porcatus.* 126. Sc. scutellatus muticus fuscus elytris porcatis

- Scarabaeus porcatus** Oliv. Inf. I. 3. 90. 109.  
tab. 19. fig. 128.
- Jabl. Coleopt. 2. tab. 18. fig. 12.
- Herbst. Arch. tab. 19. fig. 9.
- Habitat in Saxoniae stercore.
- Parvus totus obscure fuscus. Elytra profunde  
falcata sulcis transversim striatis.
- 127. Sc. scutellatus muticus ater elytris striato *stercorator.***  
crenatis, clypeo emarginato.
- Scarabaeus stercorator** Oliv. Inf. I. 3. 89. 98.  
tab. 17. fig. 155.
- Habitat in America meridionali.
- Parvus. Clypeus laevis, niger. Thorax laevis,  
ater margine antico pallescente. Elytra sul-  
cata sulcis crenulatis.
- 128. Sc. scutellatus muticus capite thoraceque *asper.***  
transversim sulcatis, elytris striatis.
- Scarabaeus asper** Oliv. Inf. I. 3. 94. 106.  
tab. 23. fig. 204.
- Herbst. Arch. tab. 19. fig. 10.
- Habitat in Europae quisquiliis.
- Parvus. Clypeus emarginatus. Pedes rufescen-  
tes.
- 129. Sc. scutellatus muticus rufus elytris striatis. *rufus.***  
Habitat in Svecia Dom. de Sehestedt.
- Parvus. Caput punctatum, rufum striga media  
atra. Thorax punctatus, rufus puncto late-  
rali nigro. Elytra immaculata. Corpus rufum  
femoribus posticis incrassatis.
- 130. Sc. scutellatus muticus ater, elytris striatis, *arenarius.***  
tibiis piceis.
- Scarab. niger pedibus rufis.** Geoff. Inf. I. 86. 29.
- Scarabaeus arenarius** Oliv. Inf. I. 3. 96. 110.  
tab. 24. fig. 206.

Habitat in Sveciae arenosis de Paykull.

Parvus totus ater tibiis solis piceis.

*foetidus.* 131. Sc. scutellatus muticus ater elytris crenato striatis rufis.

Habitat in Germaniae stercore D. Smidt.

Parvus. Caput atrum, immaculatum. Thorax ater, nitidus macula marginali rufa. Elytra rufa scutello nigro. Interdum & futura punctumque medium nigra, quod rarius in fasciam extenditur. Pedes nigri digitis rufis.

\*\*\* *Exscutellati thorace cornuto.*

*Oedipus.* 132. Sc. scutellatus thoracis cornu plano subtus dentato capitis truncato tridentato.

Scarabaeus Oedipus Oliv. Inf. 3. 112. 129.  
tab. 13. fig. 121.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. D. Banks.

Medius. Clypeus rotundatus, emarginatus. Capitis cornu erectum, breve, truncatum denticulis tribus: intermedio paullo longiore. Thorax postice rotundatus lateribus puncto impresso. Cornu brevissimum, planum sere fornicatum apice rotundatum subtus tridentatum. Elytra striata.

*Rhadami-* 133. Sc. exscutellatus thorace late foveolato antice cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis: futura punctisque duobus nigris.

Habitat in Coromandel Dr. Koenig.

Parvus. Clypeus rotundatus integer, aeneus antice albicans argento nitens. Thorax magnus elytris longior dorso valde excavato & antice cornu parvo recurvo, aeneus lateribus pallidis puncto parvo aeneo. Elytra striata, rufa futura punctisque duobus nigris. Subtus nigricans margine pallescente. Pedes nigri femoribus pallidis.

134. Sc. exscutellatus thorace cornubus duobus *nemestri-*  
porrectis acutis, capitis erecto subulato. *nus.*  
Scarabaeus tricornutus Degeer Inf. 7. 6. 37.  
tab. 47. fig. 16.  
Scarabaeus nemestrinus Oliv. Inf. 1. 3. 104.  
120. tab. 12. fig. 115.  
Jabl. Coleopt. 1. tab. 7. fig. 6.  
Herbst Arch. tab. 43. fig. 1.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Affinis sequenti. Clypeus rotundatus, integer.  
Cornu erectum basi crassiusculum apice sub
  - latum. Thorax antice retusus cornubus dor-
  - salibus, porrectis, rotundatis, acutis. Punctum
  - utrinque impressum. Elytra striata. Corpus
  - hirtum.
135. Sc. exscutellatus thorace prominente bilobo, *Jachus.*  
capitis cornu recurvo simplici.  
Scarabaeus Jachus Oliv. Inf. 1. 3. 105. 121.  
tab. 21. fig. 195.  
Jabl. Coleopt. 1. tab. 7. fig. 7.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Banks.  
Clypeus rotundatus margine reflexo apice  
emarginato. Cornu elongatum, erectum, apice  
recurvum. Thorax subpunctatus, utrinque  
retusus dorso prominente, plano, bilobo.  
Lineolae duae elevatae utrinque ad marginem. *Sabaeus.*
136. Sc. exscut. thorace prominentia dupli, capitis  
cornu erecto simplici longitudine thoracis.  
Scarabaeus Sabaeus Oliv. Inf. 1. 3. 118. 137.  
tab. fig. 85.  
Habitat in Coromandel Dr. Koenig.  
Statura praecedentis. Clypeus porrectus, ro-  
tundatus margine parum reflexo vix emargi-  
nato. Cornu erectum, simplex. Thorax ater,  
nitidus in medio prominentia dupli, obtusa

punctoque laterali impresso. Elytra striata,  
atra, nitida.

*Nanus.* 137. Sc. exscutellatus thorace prominentia dupli,  
capitis cornu erecto simplici longitudine  
capitis.

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Nimis affinis Sc. Sabaeo at minor, nec faemina.  
Clypeus rotundatus. Thorax prominentia  
dupli punctoque utrinque impresso. Elytra  
striata.

*splendidulus.* 138. Sc. exscutellatus thorace aeneo: cornibus duo-  
bus compressis nigris, capitis erecto apice  
compressio.

Scarabaeus splendidulus Oliv. Inf. I. 3. 111.  
128. tab. 2. fig. 18.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
Clypeus rotundatus, vix emarginatus, niger  
lateribus aeneis, cornu magno erecto apice  
compresso, obtuso. Thorax angulatus, aeneus,  
nitidus, in medio cornibus duobus compressis,  
subarcuatis, obtusis, atris. Elytra sulcata,  
viridia, obscura. Pedes nigri femoribus aeneis.

*festivus.* 139. Sc. exscutellatus thorace gibbo bicorni, capitis  
cornu erecto, elytris rubro aeneis. Linn. syst.  
nat. 2. 552. 52.

Roef. Inf. 2. Scarab. I. tab. B. fig. 8.

Voet. Scarab. tab. 23. fig. 5. 7.

Scarabaeus festivus Oliv. Inf. I. 3. 110. 127.  
tab. 3. fig. 2.

Jabl. Coleopt. I. tab. 7. fig. 8. 9.

Habitat in America.

*Pactolus.* 140. Sc. exscutellatus thorace bidentato, capitis  
cornu elongato recurvo: medio bidentato.  
Scarabaeus Pactolus Oliv. Inf. I. 3. 119. 139.  
tab. 16. fig. 144.

Jabl. Coleopt. I. tab. 8. fig. 1.

Habitat in Brasilia Mus. Dr. Hunter.

Medius. Clypeus rotundatus, integer, aeneus  
cornu elongato, recurvo, nigro in medio  
dentibus duobus acutis. Thorax antice canali-  
culatus denticulis duobus viridiaeneus, niti-  
dus lateribus pallidioribus. Elytra testacea  
futura aenea. Corpus viridi aeneum.

I41. Sc. exscutellatus thorace bicorni: cornubus *Pithecius*.  
brevisimis, capitis cornu erecto subulato.

Scarabaeus Pithecius Oliv. Inf. I. 3. 117. 136.

tab. 9. fig. 73.

Habitat in Indiis Mus. Brit.

Magnitudo Sc. stercorarii totus ferrugineus.

Clypeus rotundatus, integer cornu erecto,  
subulato, simplicissimo. Thorax rotundatus  
in medio cornubus duobus erectis, brevisi-  
mis. Elytra striata.

I42. Sc. exscutellatus thorace antice clypeo postice *Seniculus*.  
bicorni. Panz Naturf. 24. 4. 5. tab. I. fig. 5.

Scarabaeus Seniculus Oliv. Inf. I. 3. 124. 146.

tab. 7. fig. 56.

Jabl. Coleopt. I. tab. 8. fig. 4. 5.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 16.

Habitat Tranquebariae Dom. Schulz.

Statura Sc. Bonasii. Elytra substriata, nigra  
strigis duabus baseos e punctis ferrugineis.  
Pedes breves, ferruginei.

Variat punto uno alterove flavescente apicis.

Faemina inermis.

I43. Sc. exscutellatus thorace bidentato aeneo, *Guineensis*.  
capitis cornu elevato brevi.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Statura omnino Sc. Seniculi at duplo minor.

Antennae testaceae. Clypeus rotundatus,

aeneus margine parum reflexo obscuriore. Thorax rotundatus, aeneus, antice denticulis duobus. Elytra substriata, nigra striga baseos interrupta apiceque testaceis. Corpus atrum.

*pygmaeus*. 144. Sc. exscutellatus thorace bidentato aeneo, clypeo inermi emarginato, elytris testaceis nigro punctatis.

Scarabaeus pygmaeus Act. Hall. I. 239.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Parvus. Clypeus rotundatus, aeneus, antice late emarginatus. Thorax viridiaeneus, nitidus cornubus duobus porrectis, approximatis, supra planis uti in Sc. Seniculo. Elytra substriata, testacea nigro maculata. Corpus atrum.

Faecmina mutica.

*Catta*. 145. Sc. exscutellat. thorace antice bidentato, clypeo lineis duabus elevatis transversis carinatis.

Scarabaeus Catta Oliv. Inf. I. 3. 124. 147. tab. 23. fig. 201.

Habitat in Coromandel Dom. Zschuck.

Clypeus rotundatus, vix emarginatus. Thorax aeneus margine omni flavescente antice dentibus duobus validis, obtusis punctoque utrinque laterali impressio. Elytra striata, fusca margine flavescente. Femora flava macula magna nigra.

*Rosalius*. 146. Sc. exscutellatus, thorace antice bicorni postice elevato tricorni, capitinis cornu compresso ferrato.

Habitat in America Dom. Baker.

*Anmon*. 147. Sc. exscutellatus thorace tridentato, capitinis cornu recurvo, elytris striatis.

**Scarabaeus Ammon Oliv.** Inf. I. 3. 123. 145.  
tab. 12. fig. 111.

**Scarabaeus Lar exscutellatus thorace tridentato**  
capitis cornu erēcto, clypeo fissio. Mant.  
Inf. I. 13. 124.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

Parvus. Clypeus rotundatus, emarginatus in  
medio cornu porrecto, acuto, recurvo.  
Thorax glaber dentibus tribus intermedio  
majori, transverso. Elytra crenato striata.

**148. Sc. exscutellatus thorace tricorni, capitis cly- *Midas.***  
peo sinuato bicorni.

**Scarabaeus Midas Oliv.** Inf. I. 3. 99. 114.  
tab. 30. fig. 183.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

Magnitudo Sc. Molosii. Clypeus porrectus,  
rugosus, in medio fovea lata excavatus, mar-  
gine sinibus tribus erosus denteque utrinque  
laterali valido recurvo armatus. Cornua duo  
brevia, erecta, subulata in anteriori clypei  
parte denticulique duo in medio. Thorax  
punctatus antice retusus pilisque ferrugineis  
hirtus, tricornis cornubus depresso, planis,  
lateralibus crenatis, acutiusculis, intermedio  
latiori emarginato. Elytra striata.

**149. Sc. exscutellatus thorace tricorni: intermedio *Hamadryas***  
plano acuto bidentato, clypeo reflexo bicorni.

**Scarabaeus Hamadryas Oliv.** Inf. I. 3. 98. 112.  
tab. 10. fig. 92. tab. 23. fig. 92.

Voet. Scarab. tab. 27. fig. 38?

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Statura Sc. Midas at paullo major. Clypeus  
reflexus, rotundatus, integer, in medio  
elevatus cornubus duobus erēctis, brevibus,  
obtusis. Thorax antice retusus utrinque fovea

magna impressus. Cornua tria brevia, plana, acuta: intermedio majori bidentato. Elytra striata basi denticulis tribus elevatis, brevibus.

*lunaris.* 150. Sc. exscutellatus thorace tricorni: medio obtuso bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. Linn. syst. nat. 2. 543. 10. Fn. Sv. 379. Geoff. Inf. 1. 88. 1.

*Scarabaeus lunaris* Oliv. Inf. 1. 3. 114. 132. tab. 5. fig. 36.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 8. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 3.

Voet. Scar. tab. 25. fig. 24. 25. tab. 26. fig. 26.

Habitat in Europae stercoreatis.

Clypeus in utrinque sexu cornutus, at faemina thorace mutico.

*emarginatus.* 151. Sc. thorace inaequali subtricorni, capitis cornu erecto emarginato.

*Scarabaeus emarginatus* Oliv. Inf. 1. 3. 115. 133. tab. 8. fig. 64.

Degeer Inf. 4. 257. 2. tab. 10. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 2.

Habitat in Europae stercore Dom. Olivier, in Dania Prof. Vahl.

Nimis affinis Sc. lunari. Clypeus emarginatus centro cornu parvo, erecto, emarginato.

Thorax antice inaequalis vix cornutus at utrinque puncto lato impresso. Elytra striata.

Varietas Sc. lunaris Prof. Vahl.

*Belzebul.* 152. Sc. exscutellatus thorace prominentia triplici, capite tricorni: medio majori. Oliv. Inf. 1. 3. 107. 124. tab. 14. fig. 136.

Habitat in America Dom. Drury.

Statura Sc. Carolini at duplo minor. Clypeus rotundatus, vix emarginatus. Capitis cornu breve, simplex basi corniculis duobus mino-

ribus armatum. Thorax antice prominentiis tribus : intermedio multo latiore. Elytra striata. Tibiae intermediae clavatae, dentatae.

153. Sc. exscutellatus thorace prominentia triplici, *bifasciatus*.  
capitis cornu erecto, elytris nigris: fasciis duabus rufis.

*Scarabaeus bifasciatus* Oliv. Inf. 1. 3. 129. 135.  
tab. 13. fig. 119.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Magnitudo Sc. nuchicornis. Clypeus rotundatus, integer, niger, in medio cornu erecto, brevi, obtuso. Thorax rotundatus, ater, nitidus, punctatus antice prominentia triplici. Elytra striata, atra fasciis duabus rufis, altera baseos, altera apicis, quae tamen futuram haud attingunt.

154. Sc. exscutellatus thorace quadridentato, capi- *Sinon*.  
tis cornu recurvo subulato.

*Scarabaeus Sinon* Oliv. Inf. 1. 3. 128. 144.  
tab. 9. fig. 79.

Habitat in Goree Africæ Mus. Regis Gallorum.

Statura Sc. lunaris at duplo minor. Clypeus bidentatus. Corpus brunnæum.

155. Sc. exscutellatus thorace quadricorni: mediis *Faunus*.  
brevisimis, capitis cornu recurvo serrato.

*Scarabaeus Faunus* Oliv. Inf. 1. 3. 103. 119.  
tab. 10. fig. 87. tab. 22. fig. 87.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 9. fig. 3.

Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 6.

Voet. Scarab. tab. 24. fig. 15.

Habitat Cajennæ.

Magnitudo Sc. Molossi. Clypeus rotundatus, integer. Thorax gibbus lateribus retusis, postice rotundatus, punctis duobus parvis impressis. Elytra sulcata.

Faemina similis at cornubus minoribus: lateralibus haud truncatis, sed acutis, conicis, compressis.

*Tarandus.* 156. Sc. exscutellatus, thorace quadricorni, capite cornubus duobus compressis.

Habitat in India orientali Dom. Lee.

Parvus. Clypeus subangulatus, niger postice linea elevata, quae utrinque terminatur cornu brevi, compressio inter cornua exteriora thoracis recondendo. Thorax subscaber, niger cornubus quatuor aequalibus, intermediis basi connatis, lateralibus acutis. Elytra testacea adsuturam nigra. Corpus nigrum. Pedes testacei.

*capucinus.* 157. Sc. exscutellatus thorace quadridentato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato.

*Scarabaeus capucinus* Oliv. Inf. I. 3. 117. 135. tab. 2. fig. 12. tab. 25. fig. 12.

Jabl. Coleopt. I. tab. 9. fig. 4.

Habitat in India orientali Dom. Banks.

Statura Sc. Carolini. Clypeus rotundatus, sub-emarginatus. Thorax elevatus, niger, antice quadridentatus puncto que utrinque impresso. Elytra striata nigra interdum picea.

*Lemur.* 158. Sc. exscutellatus thorace quadridentato cupreо, clypeo postice transverso carinato, elytris testaceis.

*Scarabaeus Lemur* Oliv. Inf. I. 3. 129. 152. tab. 21. fig. 191.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 9.

*Scarabaeus 10 punctatus* Act. Hall. I. 237.

Panz. Naturf. 24. 5. 6. tab. I. fig. 6.

Habitat in Germania haud infrequens.

Elytra testacea interdum fascia e punctis quinque fuscis.

- 159.** *Scarabaeus exscutellatus thorace quadridentato, Camelus.*  
 clypeo postice subbicorni, corpore atro.  
*Scarabaeus Vitulus* Mantiss. 15. 145.  
 Oliv. Inf. 1. 3. 149. tab. 20. fig. 181.  
*Panz. Naturf.* 24. 6. 7. tab. 1. fig. 7.  
 Habitat in Germania.  
 Affinis Sc. Lemur, at distinctus.  
 Faemina clypeo tantum linea dupli transversa,  
 carinata: posteriore majore.
- 160.** *Sc. exscutellatus thorace quinquedentato ater, unifasciatus.*  
 elytris testaceis: fascia nigra. *tus.*  
*Scarabaeus unifasciatus* A&G. Hall. 1. 240.  
 Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.  
 Parvus. Clypeus rotundatus, inermis, ater,  
 immaculatus. Thorax gibbus, ater, tuber-  
 culis quinque: lateralibus duobus majoribus,  
 intermediis tribus in triangulum positis. Ely-  
 tra vix striata, testacea punto distincto baseos,  
 fascia lata dentata in medio lituraque apicis  
 nigris. Corpus atrum antennarum clava  
 ferruginea.
- 161.** *Sc. exscutellatus thorace sexdentato, clypeo Boas.*  
 rhombeo: centro prominulo, elytris laevibus.  
 Habitat in India Dom. Daldorff.  
 Magnitudo Sc. vernalis. Caput nigrum clypeo  
 rhombeo angulis centroque prominulis. Tho-  
 rax rotundatus, ciliatus, antice sexdentatus  
 poro utrinque impresso. Elytra glabra, atra.
- 162.** *Sc. exscutellatus thorace truncato multidentato, Antenor.*  
 capitilis cornu elevato tridentato.  
*Scarabaeus Antenor* Oliv. Inf. 1. 3. 97. 111.  
 tab. 6. fig. 42.  
 Habitat in Senegal Dom. Olivier.  
 Magnus ater. Clypeus repandus cornu elevato,  
 lato, truncato, tridentato: dente medio paullo

— — —

majori. Thorax dente acuto laterali medioque antico elevato, truncato, dentato. Elytra striata.

\*\*\*\*\* *Exscutellati thorace incruciato,*  
*capite cornuto.*

**Bonasus.** 163. Sc. exscutellatus thorace prominentia duplice, capite tricorni: lateralibus majoribus arcuatis.

**Scarabaeus Bonasus** Oliv. Inf. 1. 3. 121. 142.  
tab. 9. fig. 82.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 3. 4.

Herbst. Arch. tab. 43. fig. 2.

Pall. Icon. 5. tab. A. fig. 5.

Habitat in India orientali.

Thorax æneus. Elytra obscura. Corpus nigrum.

**Bison.** 164. Sc. exscutellatus thorace antice mucronato, capite cornubus duobus lunatis Linn. syst. nat. 2. 547. 27.

**Scarabaeus Bison** Oliv. Inf. 1. 3. 120. 140.  
tab. 6. fig. 43.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 6.

Ross. Fn. Etrusc. 12. 25.

Habitat in Hispania, Gallia.

Thorax postice punctis duobus impresis. Fæmina thoracis margine antico carinato capitisque mucrone parvo.

**Sagittarius.** 165. Sc. exscutellatus thorace antice mucronato, capitinis cornu solitario erecto.

**Scarabaeus sagittarius** Oliv. Inf. 1. 3. 126. 148.  
tab. 14. fig. 133.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Statura Sc. nuchicornis. Clypeus rotundatus, integer, niger cornu longitudine clypei. Antennarum clava pallida. Thorax niger margine pallido, antice mucronatus in spinam promi-

nentem, validam. Elytra striata, grisea.  
Penes antici atri macula baseos aurea, reliqui  
variegati.

166. Sc. exscutellatus thorace retuso quadridentato, *Bucephalus*  
capitis clypeo angulato: cornu emarginato.

Scarabaeus Bucephalus Oliv. Inf. 1. 3. 99. 113.  
tab. 4. fig. 26. tab. 10. fig. 92. tab. 22. fig. 92.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 1. 2.

Habitat in Indiis Mus. Britann.

Statura Sc. Molosi at duplo major totus ater.  
Clypeus porrectus cornu brevi, recurvo,  
emarginato. Thorax scaber. Elytra striata.

167. Sc. exscutellatus thorace retuso bidentato utrinque impresso, clypeo lunato unicorni integro,  
elytris levibus Linn. syst. nat. 2. 543. 8.  
Mus. Lud. Ulr. 11.

Scarabaeus Molossus Oliv. Inf. 1. 3. 100. 115.  
tab. 5. fig. 37. tab. 4. fig. 25. tab. 19. fig. 25.

Jabl. Coleopt. 1. tab. 8. fig. 10.

Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 2.

Habitat in China officinalis.

168. Sc. exscutellatus violaceus, thorace dentato, *lancifer*.  
capitis cornu angulato, elytris fulcatis. Linn.  
syst. nat. 2. 544. 13.

Scarabaeus lancifer Oliv. Inf. 1. 3. 102. 117.  
tab. 4. fig. 32.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 23. fig. 1. 2.

Schroet. Abhandl. 1. tab. 3. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Duplo fere major Sc. Mimas & violaceus.

169. Sc. exscutellatus thorace retuso elevato, capitatis cornu recurvo, clypeo fistulo. Linn. syst.  
nat. 2. 546. 20. Mus. Lud. Ulr. 15.

**Scarabaeus Paniscus Oliv.** Inf. I. 3. 112. 130.

tab. 5. fig. 34.

**Roes.** Inf. 2. Scarab. I. tab. B. fig. 2.

Habitat in America meridionali.

**Minor Sc. Molosio totus ater.** Thorax antice  
valde retusus in medio elevatus margine acuto,  
subdentato.

**Carolinus.** 170. **Sc. exscutellatus** thorace retuso binodi, capitibus  
cornu erecto brevissimo, clypeo integro, ely-  
tris sulcatis Linn. syst. nat. 2. 545. 16.

**Scarabaeus carolinus Oliv.** Inf. I. 3. 134. 160.  
tab. 22. fig. 113.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 14. fig. 2.

Drury Inf. I. tab. 35. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 24. fig. 14.

Habitat in Carolina.

Simillimus praecedenti at capitibus cornu multo  
brevius. Elytra profunde sulcata, quorum  
fulci quatuor interiores postice profundiores  
tomento cinereo repleti. Subtus pilis ferru-  
gineis.

**Nifus.** 171. **Sc. exscutellatus**, thorace inermi rotundato,  
capitibus cornu brevissimo emarginato.

**Scarabaeus Nifus Oliv.** Inf. I. 3. 139. 166.  
tab. 2. fig. 17.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Affinis Sc. emarginato at distinctus videtur.

Clypeus emarginatus cornuque centrali bre-  
vissimo, emarginato. Antennae nigrae clava-  
lutea. Thorax inermis puncto utrinque im-  
presso. Elytra striata.

Faemina minor tubculo capitibus transverso.

**orientalis.** 172. **Sc. exscutellatus**, thorace rotundato, capitibus  
cornu brevissimo, elytris striatis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Statura omnino præcedentis at triplo minor.

Clypeus rotundatus, integer dente verticis elevato fere compresso. Thorax rotundatus, inermis, antice obsolete bituberculatus, lævis, obscurus. Elytra striata, nigra.

173. Sc. exscutellatus thorace mutico: punctis quæ *Sphinx*. tuor impressis, capite subcornuto, tarsis anticis nullis.

*Scarabaeus Sphinx* Oliv. Inf. 1. 3. 135. 162.  
tab. 7. fig. 57.

*Scarab. fulcratus* Wulff Inf. cap. tab. 2. fig. 17.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 8.

Voet. Coleopt. tab. 26. fig. 30.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 17.

*Scarabaeus spinipes* Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 8.

*Scarab. Menalcas* Pall. Icon. 14. tab. A. fig. 4.

Habitat in America, Gallia meridionali.

Pedes antici femoribus crassis, compressis, tibiisque porrectis, arcuatis, dentatis, apice acutis. Pedes secundi parisi femoribus in-  
crassatis, tibiis clavatis, dentatis, tarsis brevisimis.

174. Sc. exscutellatus thorace inermi, capite lineis duabus transversis, femoribus dentatis, tibiis anticis subtus unguiculatis, tarsis nullis. *unguiculatus*

*Scarabaeus unguiculatus* Oliv. Inf. 1. 3. 157.  
192. tab. 20. fig. 280.

Habitat in Senegalio Dom. Olivier.

Statura Sc. *Sphinx*. Clypeus integer, niger lineis duabus transversis elevatis. Thorax magnus, nitidus puncto utrinque, duobus que baseos impressis. Elytra brevia, striata. Pedes singulares. Femora omnia apice dente valido. Tibiae anticae subtus in medio ungue

valido, incurvo. Tarsi nulli. Faemina pedibus simplicibus at tarsis nullis.

- Nicanor.* 175. Sc. exscutellatus thorace mutico: punctis quatuor impressis, capitis cornu recurvo bidentato, elytris striatis.

*Scarabaeus fulcatus* Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 1.  
Habitat in America.

Clypeus porrectus, antice emarginatus. Thorax niger, antice truncatus puncto utrinque impresso, postice rotundatus punctis duobus impressis, approximatis. Elytra striata, nigra.

- Fricator.* 176. Sc. exscutellatus thorace antice elevato acuto, capitis cornu truncato subemarginato.

*Scarabaeus fricator* Oliv. Inf. 1. 3. 122. 143. tab. 16. fig. 149.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter.

Magnitudo praecedentis totus ater, nitidus. Clypeus rotundatus, fissus. Thorax puncto utrinque impresso. Elytra sulcata.

- Mimas.* 177. Sc. exscutellatus, thorace mutico retuso angulato, capite obsolete bicorni, elytris inauratis striatis. Linn. syst. nat. 2. 545. 17. Mus. Lud. Ulr. 9.

*Scarabaeus Mimas* Oliv. Inf. 1. 3. 108. 123. tab. 7. fig. 50.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 2. 3.

Voet. Coleopt. tab. 23. fig. 4.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 1.

Sulz. Hist. Infect. tab. 1. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

- Taurus.* 178. Sc. exscutellatus thorace mutico, occipite cornibus binis reclinatis arcuatis Linn. syst. nat. 2. 547. 26. Geoff. Inf. 1. 92.

*Scarabaeus Taurus* Oliv. Inf. 1. 3. 144. 174. tab. 8. fig. 73.

- Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 5. 6.  
 Voet. Coleopt. tab. 24. fig. 16.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 5.  
 Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 4.  
 Habitat in Germania, Gallia.
179. Sc. exscutellatus thorace mutico acuminato, *Vacca*.  
 occipite spina erecta gemina Linn. syst. nat.  
 2. 547. 23. Geoff. Inf. 1. 90. 5.  
 Scarabaeus Vacca Oliv. Inf. 1. 3. 128. 151.  
 tab. 8. fig. 65.  
 Jabl. Coleopt. 2. tab. 14. fig. 3. 4.  
 Schaeff. Icon. tab. 73. fig. 4. 5.  
 Schroet. Abhandl. 1. tab. 3. fig. 5.  
 Habitat in Germaniae stercore bovino.  
 Faemina clypeo lineis duabus elevatis.
180. Sc. exscutellatus thorace mutico, occipite cor- *Capra*.  
 nubus duobus subarcuatis, corpore nigro  
 obscurō.  
 Scarabaeus Capra Oliv. Inf. 1. 3. 145. 175.  
 tab. 20. fig. 182.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Magnitudo præcedentis. Clypeus rotundatus  
 postice corniculis duobus, elevatis. Thorax  
 gibbus rotundatus, niger, immaculatus. Ely-  
 tra sublævia.  
 Mera varietas Sc. Tauri observante Helwigio.
181. Sc. exscutellatus thorace mutico, capite cor- *Ibex*,  
 nubus duobus brevisimis, corpore nigro flavo  
 submaculato.  
 Habitat in India orientali Dom. Lee.  
 Parvus. Clypeus rotundatus, integer, niger  
 cornubus duobus brevisimis, subcompresfis,  
 acutis. Antennæ testaceae. Thorax muticus,  
 niger margine parum flavo maculato, postice

- rotundatus. Elytra striata, nigra, itidem flavo  
submaculata. Subtus niger, femoribus flavis.
- Alces.* 182. Sc. scutellatus thorace mutico biretuso, capitis  
clypeo linea elevata transversa subbicorni,  
corpo lœvi atro.  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Statura & magnitudo Sc. Tauri. Clypeus rotun-  
datus, integer, in medio linea transversa ele-  
vata utrinque subcornuta, quae tamen margi-  
nes haud attingit. Thorax rotundatus antice  
biretus denticulisque duobus obsoletis.
- gazella.* 183. Sc. scutellatus thorace submutico æneo, occipite  
cornubus duobus arcuatis, elytris testaceis.  
Habitat in Guinea Mus. Dom. Lund.  
Statura Sc. Tauri. Clypeus reflexus, integer,  
niger striga media elevata, carinata. Cornua  
duo occipitis arcuata, atra. Thorax æneus  
marginè omni flavescente puncto utrinque  
impresso. Elytra striata, testacea. Femora  
testacea puncto æneo.
- Oryx.* 184. Sc. scutellatus thorace submutico, clypeo antice  
cornubus duobus erectis, elytris griseis.  
Habitat in China Dom. Lund.  
Statura præcedentium. Antennæ pallide testa-  
ceae. Clypeus rotundatus niger, nullo modo  
reflexus, antice cornubus duobus, erectis,  
validis. Thorax punctatus antice parva gibbo-  
sitate notatus, griseus. Elytra striata, grisea.  
Corpus nigricans pedibus testaceis. Femora  
macula magna ænea.
- Tragus.* 185. Sc. exscutellatus thorace mutico, capite cor-  
nibus duobus rectissimis, corpore atro.  
Habitat in China Mus. Dom. de Sehestedt.  
Statura omnino præcedentium. Clypeus rotun-  
datus, integerrimus cornubus duobus elong-

gatis, rectis nec ullo modo arcuatis. Thorax punctatus, ater, antice truncatus, muticus. Elytra striata.

186. Sc. exscutellatus thorace mutico angulato, capitis cornu reflexo, corpore æneo Linn. syft. nat. 2. 546. 22.

*Scarabaeus carnifex* Oliv. Inf. 1. 3. 185. 161.  
tab. 6. fig. 46. tab. 10. fig. 86.

Jablonsk Coleopt. 2. tab. 15. fig. 4. 5.

Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 3. 5.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 8.

Habitat in America.

187. Sc. exscutellatus, thorace inermi cupreο, capite *tridens*. basi tridentato, elytris nigris.

*Scarabaeus tridens* Oliv. Inf. 1. 3. 139. 167.  
tab. 12. fig. 106.

Habitat in Africa Mus. D. Banks.

Clypeus rotundatus, integer, antice niger, postice cupreus striiga transversa, elevata, integra in medio, & alia tridentata ad basin. Thorax cupreus punctis elevatis scaber, antice subretusus. Elytra vix striata. Corpus nigrum.

188. Sc. exscutellatus thorace mutico retuso, clypeo *hispanus*. cornuto emarginato, elytris striatis. Linn. syft. nat. 2. 546. 21. Mus. Lud. Ulr. 12.

*Scarabaeus hispanus* Oliv. Inf. 1. 3. 113. 131.  
tab. 6. fig. 47.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 3.

Petiv. Gaz. 13. tab. 8. fig. 4.

Ross. Fn. Etrus. 12. 26.

Voet. Scarab. tab. 24. fig. 13.

Habitat in Europa australiori.

- Mopsus.* 189. Sc. exscutellatus niger, thorace rotundato mutico, capitis cornu erecto brevisimo.  
 Habitat in India orientali Dom. Lee.  
 Minor Sc. nuchicorni. Clypeus rotundatus, niger, in medio cornu brevi, erecto, acuto. Antennae testaceae. Thorax postice rotundatus, niger, immaculatus. Elytra striata, nigra. Pedes nigri.
- spinifex.* 190. Sc. exscutellatus thorace rotundato mutico, occipite spina recurva.  
 Scarabaeus spinifex Oliv. Inf. 1. 3. 148. 180. tab. 12. fig. 112.  
 Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
 Statura & magnitudo Sc. nuchicornis. Clypeus rotundatus, integer spina longitudine thoracis. Thorax glaber dorso planiusculo niger, viridi nitens. Elytra striata, nigra viridi nitida. Pedes nigri femoribus incrassatis.
- Coenobita.* 191. Sc. exscutellatus thorace mutico retuso viridi, capitis cornu basi dilatato apice nutante.  
 Scarabaeus Coenobita Oliv. Inf. 1. 3. 147. 178. tab. 26. fig. 228.  
 Jabl. Coleopt. 2. tab. 14. fig. 2. 3.  
 Voet. Coleopt. tab. 25. fig. 20.  
 Scarabaeus Coenobita Herbst. Arch. 4. 40.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Capitis clypeus ovatus, viridis, nitens, apice emarginatus postice cornu erecto basi dilatato, plano apice nutante. Thorax retusus, viridis nitens puncto obsoleto lateraliter elevato. Elytra grisea five testacea nigro irrorata. Corpus nigrum æneo nitidum.
- nuchicornis.* 192. Sc. exscutellatus thorace rotundato mutico, occipite spina erecta armato, clypeo emarginato Linn. syst. nat. 2. 547. 24. Fn. Sv. 381.

**Scarabaeus nuchicornis Oliv.** Inf. 1. 3. 6. 14.

177. tab. 7. fig. 55.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 14. fig. 5. 6.

Geoff. Inf. 1. 89. 3. ♂. 4. ♀.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. A. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 1.

Habitat in Europae stercore.

**193. Sc. exscutellatus thorace mutico antice subacuminato, occipite spina erecta, clypeo integro.** *Xiphias*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino Sc. nuchicornis at paullo minor. Clypeus rotundatus, integer, niger occipite spina erecta, acuta. Thorax rotundatus, antice subacuminatus, niger, immaculatus. Elytra laevia testacea, nigro maculata. Faemina clypeo lineis duabus transversis, elevatis.

**194. Sc. exscutellatus thorace antice impresso, occipite spina erecta apice nutante, corpore nigro.** *nutans*.

**Scarabaeus nutans Oliv.** Inf. 1. 3. 145. 176.

tab. 21. fig. 188.

Scarabaeus verticicornis Laichart.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 14. fig. 10.

Panz. Naturf. 24. 7. 8. tab. 1. fig. 8.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Clypeus rotundatus, integer occipite spina erecta basi latiore apice nutante. Corpus nigrum.

**195. Sc. exscutellatus thorace mutico æneus capitis cornu erecto truncato.** *aeneus*.

**Scarabaeus æneus Oliv.** Inf. 1. 3. 131. 155.

tab. 14. fig. 128.

Herbst. Arch. tab. 43. fig. 4. faem.

**Scarabaeus truncaticornis Act.** Hall. 1. 238.

Habitat Tranquebariae.

Marem cornutum denique accepit & communicavit Dom. Hybner. Thorax omnino muticus nullo modo prominens. Faemina obscurior thorace antice tuberculis duobus elevatis.

*thoracicus.* 196. Sc. exscutellatus thorace inermi cupreο nitido, capitis cornu elongato simplici, elytris testaceis: fascia nigra.

Scarabaeus thoracicus Oliv. Inf. 1. 3. 149. 181.  
tab. 25. fig. 218.

Habitat in Senegal Dom. Olivier.

Statura omnino Sc. nuchicornis. Clypeus rotundatus, integer cornu longitudine thoracis, subrecurvo. Thorax lævis, cupreus, nitidus. Elytra lævia, testacea: fascia inaequali fusca.

*scabrosus.* 197. Sc. exscutellatus thorace mutico rugoso, capitis cornu erecto brevissimo, elytris testaceis nigro scabris.

Voet. Scarab. tab. 25. fig. 23.

Habitat Surinami Dr. Schulz.

Sc. nuchicornis paullo major. Clypeus cuproæneus, antice truncatus. Thorax obscurus, variolosus margine pallidiore. Elytra testacea punctis nigris elevatis striata: Corpus nigricans. Pedes testacei femoribus supra tibiisque apice nigris.

*furcatus.* 198. Sc. exscutellatus, thorace inermi rotundato, capite cornibus tribus erectis approximatis: medio breviori.

Scarabaeus furcatus Oliv. Inf. 1. 3. 150. 182.  
tab. 8. fig. 61.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 13. fig. 5.

Ross. Fn. Etrusc. 1. 14. 31.

Scarabaeus Vitulus Laich. Inf. tab. 1. fig. 20.

Panz Naturf. 24. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Europa australiori.

199. Sc. exscutellatus thorace inermi griseo nigro *verticicor-*  
*punctato*, capitis cornu erecto brevisimo. *nis.*  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Tunstall.  
 Sc. nuchicorni minor. Thorax rotundatus,  
 griseus antice punctis duobus & uno utrinque ad latera nigris. Elytra laevia, grisea.  
 Pedes pallidi.
200. Sc. exscutellatus ater, capitis tuberculo uno, *fulcator.*  
*elytris striatis.*  
 Scarabaeus fulcator Oliv. Inf. 1. 3. 142. 171.  
 tab. 26. fig. 225.  
 Habitat Cajennae Dom. Mallet.  
 Statura oblonga Sc. Fosforis at paullo major.  
 Clypeus rotundatus, emarginatus. Thorax gibbus, laevis, ater, puncto baseos impresso.  
 Elytra striata, atra.
201. Sc. exscutellatus ater thorace inermi, capite *4 pustula-*  
*bituberculato*, elytris maculis duabus rubris. *tus.*  
 Scarabaeus 4 pustulatus Oliv. Inf. 1. 3. 175.  
 219. tab. 19. fig. 141.  
 Habitat in nova Hollandia Dom. Banks.  
 Sc. Schreberi duplo minor, ater, nitens. Clypeus rotundatus basi tuberculis duobus approximatis, & fere connexis. Thorax gibbus, rotundatus, ater, nitens, laevis. Elytra abdomine breviora, striata, atra macula baseos apicisque rubra. Pedes nigri.
202. Sc. exscutellatus niger, thorace inermi, capite *reflexus.*  
*trituberculato*, clypeo reflexo emarginato.  
 Habitat in China Mus. Dom. Banks.  
 Statura oblonga & magnitudo Sc. Fosforis.  
 Clypeus rotundatus, reflexus, emarginatus.  
 In fronte tubercula tria, atra. Pedes nigri.
203. Sc. exscutellatus ater, thorace inermi, clypeo *Hybneri.*  
*tuberculis tribus*: intermedio subcornuto.

*Scarabaeus* *Tages* Oliv. Inf. 1. 3. 143. 173.  
tab. 9. fig. 76.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino Sc. Tauri. Clypeus rotundatus, integer postice tuberculis tribus intermedio majori subcornuto. Thorax & elytra lævia, glabra, atra.

*eriflatus*. 204. Sc. exscutellatus niger thorace inermi crenato, clypeo tuberculato quadridentato.

Habitat in Aegypto Prof. Forskahl.

Minor Sc. laticollis. Clypeus antice quadridentatus & in medio tuberculo elevato, ferrugineo. Thorax inermis, rotundatus marginibus crenatis. Elytra lævia. Pedes pilosi.

\*\*\*\*\* *Exscutellati mutici*.

*facer*. 205. Sc. exscutellatus clypeo sexdentato thorace inermi crenulato, tibiis posticis ciliatis, elytris lævibus. Linn. syst. nat. 2. 545. 18. Mus. Lud. Ulr. 18.

*Scarabaeus facer* Oliv. Inf. 1. 3. 150. 183.  
tab. 8. fig. 59.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 2.

Sulz. Hist. tab. 1. fig. 3.

Voet. Scarab. tab. 27. fig. 39. 40.

Habitat in Europa australi, frequens in Rossia meridionalis aridis cylindrum e stercore bovino voluens.

*laticollis*. 206. Sc. exscutellatus muticus niger, clypeo sexdentato, elytris fulcatis Linn. syst. nat. 2. 549. 38.

*Scarabaeus laticollis* Oliv. Inf. 1. 3. 152. 185.  
tab. 8. fig. 68.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 6.

Geoff. Inf. 1. 89. 2.

- Voet. Scarab. tab. 27. fig. 41.  
 Habitat in China, Europa australiori.  
 Affinis certe Sc. facer, attamen distinctus.
- 207.** Sc. exscutellatus muticus ater clypeo sexdentato, thorace punctato, elytris laevibus. *semipunctatus.*  
 Habitat in Barbariae stercore Dom. Vahl.  
 Statura & summa affinitas Sc. variolosus, at elytra omnino laevia. Fortemera ejus varietas.
- 208.** Sc. exscutellatus muticus, clypeo sexdentato, *variolosus.* elytrisque nigris: punctis impressis variolosis.  
 Scarabaeus variolosus Oliv. Inf. 1. 3. 131. 184. tab. 8. fig. 60.  
 Habitat in Fiume austrorum D. Saldoner.  
 Statura omnino praecedentium at paullo minor.  
 Thorax ciliatus. Tibiae anticae valde dentatae, reliquae quatuor pilosae.
- 209.** Sc. exscutellatus muticus clypeo sexdentato, *miliaris.* thorace elytrisque nigris: maculis elevatis atris.  
 Scarabaeus miliaris Oliv. Inf. 1. 3. 167. 206. tab. 18. fig. 164.  
 Habitat in India Mus. Dr. Hunter.  
 Statura parva Sc. Koenigii. Thorax rotundatus, obscurus maculis majoribus elevatis, atris, nitidulis. Punctum parvum utrinque impressum. Elytra obscura maculis parvis elevatis atris, nitidis.
- 210.** Sc. exscutellatus muticus clypeo sexdentato, *morbillorum.* thorace punctato, elytris striatis punctatisque, tibiis posticis hirsutis. *sus.*  
 Habitat in Germania Dom. Isert.  
 Quadruplo minor Sc. facer. Clypeus rotundatus, sexdentatus. Thorax rotundatus, ater punctis impressis numerosis margineque ciliato. Elytra atra striis punctisque numerosis

**exarata.** Pedes nigri tibiis anticis tridentatis, posticis ciliato pilosis.

**profanus.** 211. Sc. exscutellatus muticus clypeo sexdentato nigro cyaneus, elytris lœvibus.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Parvus. Clypeus brevis, sexdentatus, dentibus intermediis longioribus. Thorax & elytra nigro cyanea, æneo nitidula, sublævia. Pedes cyanei.

**Bacchus.** 212. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisque glabris, tibiis undique ferratis.

Scarabaeus Bacchus Oliv. Inf. 1. 3. 153. 186.  
tab. 17. fig. 161.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 4.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Schulzianum.

Magnus, gibbus. Clypeus porrectus, medio dentibus quatuor porrectis, obtusis. Thorax elevatus, valde gibbus, glaber, ater margine omni integro. Elytra lœvia, glabra, nigra. Tibiae omnes valde dentatae,

**gibbosus.** 213. Sc. exscutellatus muticus, clypeo quadridentato, elytris basi gibbere notatis.

Scarabaeus gibbosus Oliv. Inf. 1. 3. 154. 188.  
tab. 16. fig. 151.

Habitat in America.

Paullo major Sc. stercorario obscure niger, minime nitidus. Clypeus rotundatus apice quadridentatus palpis antennarumque clava ferrugineis. Thorax lœvis, glaber, obscurus antice excisus pro capite, lateribus angulatis postice rotundatus absque scutello. Elytra abdome breviora, lœvia, obscura basi ad futuram gibbere elevato notata. Femora

- antica nigra basi puncto ferrugineo. Pedes postici sublongiores, incurvi.
214. Sc. exscutellatus muticus clypeo quadridentato, *Hollandiae*.  
*Scarabaeus Hollandiae* Oliv. Inf. 1. 3. 174,  
 217. tab. 13. fig. 117.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Magnitudo Sc. ovati totus ater. Thorax sub punctatus. Elytra fulcata.
215. Sc. exscutellatus obscure cupreus subtus niger, clypeo emarginato.  
 Habitat in India orientali Dom. Lee.  
 Statura Sc. Koenigii capite, thorace elytrisque supra obscure cupreis subholosericeis subtus niger. Pedes nigri tibiis in primis posticis ferratis.
216. Sc. exscutellatus muticus clypeo bidentato, *Koenigii*.  
 thorace scabro, elytris variolosis.  
*Scarabaeus Koenigii* Oliv. Inf. 1. 3. 163. 200.  
 tab. 9. fig. 77.  
 Jabl. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 8.  
*Scarab. Scriptus* Pall. Icon. 17. tab. A. fig. 7.  
 Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
 Clypeus scaber, antice bidentatus. Thorax rotundatus, scaber, postice foveola parva in medio excavata. Elytra variolosa sive striata punctisque majoribus vagis impressis excavata.
217. Sc. exscutellatus muticus cinereo pubescens *granulatus*.  
 thorace elytrisque punctis elevatis atris, clypeo emarginato.  
*Scarabaeus granulatus* Oliv. Inf. 1. 3. tab. 8.  
 fig. 67.  
 Habitat — — Dom. de Sehestedt.  
 Nimis affinis Sc. Koenigii & forte ejus mera varietas. Capitis clypeus emarginatus, cine-

reo pubescens. Thorax elytraque pubescentia punctis plurimis elevatis, atris, glabris, nitidis. Pedes nigri.

*cupreus.* 218. Sc. scutellatus muticus nigro cupreus clypeo emarginato, thorace gibbo.

Scarabaeus cupreus Oliv. Inf. 1. 3. 156. 119.  
tab. 7. fig. 58.

Habitat in Africa aequinoctiali D. Yeats.

Major Sc. laticolli niger, cupreo colore tintus, glaber, laevis. Thorax valde gibbus antice punctis duobus impressis, postice rotundatus.

*flagellatus.* 219. Sc. exscutellatus muticus niger clypeo emarginato, thorace elytrisque scabris.

Scarabaeus flagellatus Oliv. Inf. 1. 3. 162. 199.  
tab. 7. fig. 51.

Scarabaeus coriarius Jabl. Coleopt. 2. t. 20. f. 4.

Habitat ad Cap. Bon. Spei, in Europa australiori.

Statura Sc. Schaefferi. Clypeus rotundatus, late emarginatus. Thorax gibbus, rotundatus, laevis. Elytra punctis elevatis majoribus in lineas digestis scabra. Pedes majores, mutici.

*Schaefferi.* 220. Sc. exscutellatus muticus thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posticis elongatis dentatis. Linn. syst. nat. 2. 550. 41. Geoff. Inf. 1. 92. 9.

Scarabaeus Schaefferi Oliv. Inf. 1. 3. 164. 201.  
tab. 5. fig. 41.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 5. fig. 8.

Voet. Scarab. tab. 25. fig. 17.

Habitat in Germaniae collibus apricis globulos e stercore ovino confectos voluens.

*voluens.* 221. Sc. exscutellatus muticus niger opacus laevis thorace postice rotundato, clypeo emarginato, elytris integris.

**Scarabaeus voluens** Oliv. Inf. 1. 3. 161. 197.  
tab. 10. fig. 89.

**Scarabaeus lœvis** Drury Inf. 1. tab. 35. fig. 7.  
Voet. Coleopt. tab. 27. fig. 37.

Degeer Inf. 4. tab. 18. fig. 14.

Habitat in Europa australiori globulos e ster-  
core conficiens, voluens.

**222. Sc. exscutellatus** muticus niger opacus lœvis *pillularius*.  
clypeo subemarginato: lineis duabus elevatis  
obliquis. Linn. syst. nat. 2. 550. 40. Mus.  
Lud. Ulr. 19.

**Copris niger**, capite clypeato, elytris mar-  
gine exteriore sinuatis. Geoff. Inf. 1. 91. 8.

**Scarabaeus pillularius** Oliv. Inf. 1. 3. 161. 198.  
tab. 10. fig. 91.

**Scarabaeus Mopsus** Pall. Icon. tab. A. fig. 3.

Sulz. Icon. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Europa australiori Dom. Smidt.

Nimis affinis Sc. pillulario ejusdemque magni-  
tudinis ac statura. Clypeus rotundatus, vix  
emarginatus lineis duabus obliquis, elevatis,  
postice coeuntibus. Thorax gibbus, niger,  
immaculatus postice rotundatus. Elytra lœvia,  
nigra longitudine abdominis in medio margi-  
nis exterioris retusa vel potius excisa. Pedes  
dentati, nigri.

**223. Sc. scutellatus** muticus fuscus thorace æneo *obliquus*.  
antice utrinque oblique retuso, clypeo integro.

**Scarabaeus obliquus** Oliv. Inf. 1. 3. 165. 203.  
tab. 9. fig. 78.

Habitat in Senegal D. Olivier.

Statura & magnitudo præcedentis. Clypeus  
rotundatus, integer, æneo nitens. Thorax  
æneus. margine antico utrinque obliquo.  
Elytra striata, fusca.

*squalidus.* 224. Sc. exscutellatus muticus ater clypeo emarginato, elytris striatis.

Habit. in stercore bovino Brasiliae Mus. D. Banks.  
Magnitudo Sc. Schreberi. Caput & thorax atra,  
lævia, nitida clypeo emarginato: lobis rotundatis. Elytra obscuriora, striata.

*Schreberi.* 225. Sc. exscutellatus muticus ater glaber elytris maculis duabus rubris. Linn. syst. nat. 2.  
551. 45. Geoff. Inf. 1. 91. 7.

Scarabaeus Schreberi Oliv. Inf. 1. 3. 172. 214.  
tab. 19. fig. 176.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 73. fig. 6.

Voet. Scarab. tab. 28. fig. 49.

Habitat Halae Saxonum.

Alium simillimum vix distinctum misit Dom.  
Daldorf e Germania at majorem & thorace quadritudculato.

*glabratus.* 226. Sc. exscutellatus muticus glaber ater pedibus obscure rufis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.  
Corpus totum subrotundum, glabrum, læve,  
atrum pedibus foliis rufis.

*2 pustula-* 227. Sc. exscutellatus muticus ater elytris basi  
macula rufa.

Scarabaeus 2 pustulatus Oliv. Inf. 1. 3. 175.  
218. tab. 13. fig. 118.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Nimis affinis Sc. 4 pustulato at paullo minor,  
caput muticum & macula unica ad basin  
elytorum.

*pallipes.* 228. Sc. exscutellatus muticus capite thoraceque  
pallido viridiisque variegatis, pedibus pallidis.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Parvus. Capitis clypeus inaequalis, integer, pallido viridique variegatus. Thorax rotundatus, pallescens, maculis viridibus variegatus. Elytra substriata, obscura. Antennae & pedes omnes pallidi.

Varietatem Sc. flavipes credit Olivier an rite?

229. Sc. exscutellat. muticus niger thoracis margine *triangulafemoribusque* pallidis, clypeo emarginato. *ris.*

*Scarabaeus triangularis* Oliv. Inf. I. 3. 166. 204.

tab. 15. fig. 139.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 5. 6.

Voet. Scarab. tab. 28. fig. 40-44.

Drury Inf. I. tab. 36. fig. 7.

Habitat Surinami.

Statura omnino Sc. nuchicornis.

230. Sc. exscutellatus muticus testaceus clypeo *melanocephalum* bidentato, capite thoracisque linea dorsali *nigrum*. *phalus.*

*Scarabaeus melanocephalus* Oliv. Inf. I. 3.

173. 216. tab. 2. fig. 18.

Habitat in Americae Insulis. Olivier.

Caput nigrum antennis flavis. Thorax nitidus linea dorsali nigra. Elytra vix striata.

231. Sc. exscutellatus muticus niger elytrorum *cinctus.* margine pallido, clypeo emarginato. Olivier

Inf. I. 3. 169. 209. tab. 10. fig. 90.

Habitat in China Dom. Drury.

Thorax lævis, ater, nitens. Elytra crenato striata nigra margine pallido, qui tamen color basin elytrorum haud attingit.

232. Sc. exscutellatus muticus fuscus thorace griseo: punctis sex nigris, clypeo integro Oliv.

Inf. I. 3. 167. 205. tab. 2. fig. 16.

Habitat Cajennae Dom. Olivier.

Elytra abbreviata, lævia. Corpus griseum.

*flavipes.* 233. Sc. exscutellatus muticus nigricans thoracis marginibus elytris pedibus que flavescentibus.

Laichart 1. 24. 17.

Schaeff. Icon. tab. 74. fig. 6.

Oliv. Inf. 1. 3. 169. 210. 7. fig. 57. 54.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 7.

Herbst. Arch. 19. fig. 19.

Habitat in Germaniae stercore.

*Smaragdus.* 234. Sc. exscutellatus muticus æneus nitidus clypeo bidentato.

Scarabaeus smaragdulus Oliv. Inf. 1. 3. 159. 194. tab. 14. fig. 131.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Corpus parvum, æneum, nitidum, glaberrimum.

Clypeus dentibus duobus obtusis. Elytra obtusa, lævissima.

*discoideus.* 235. Sc. exscutellatus muticus nigricans clypeo bidentato, elytris testaceis: macula communis fusca.

Scarabaeus discoideus Oliv. Inf. 1. 171. 212. tab. 22. fig. 196.

Habitat in Africa Mus. D. Olivier.

Parvus. Elytra striata.

*minutus.* 236. Sc. exscutellatus muticus niger clypeo sexdentato, pedibus posticis elongatis.

Scarabaeus longipes Oliv. Inf. 1. 3. 154. 202. tab. 19. fig. 177.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lee.

Minor Sc. ovato totus niger & distinctus clypeo sexdentato pedibusque posticis elongatis.

*ovatus.* 237. Sc. exscutellatus muticus niger thorace rotundato subæneo, elytris abbreviatis Linn. syst. nat. 2. 551. 46.

*Scarabaeus ovatus* Oliv. Inf. I. 3. 175. 220.

tab. 20. fig. 187.

Jabl. Coleopt. 2. tab. 20. fig. 9.

Herbst. Arch. tab. 19. fig. 18.

Habitat in Europae stercore bovino.

Sc. nuchicorni quadruplo minor.

3. HEXODON. *Maxilla* porrecta cornea  
apice tridentata: den-  
tibus fisis.

*Labium* late emargin-  
atum.

*Antennae* lamellatae.

I. H. atrum elytris reticulatis griseis. *reticula-*

Hexodon reticulatum Oliv. Inf. I. 7. tab. I. fig. I. *tum.*

Habitat in Madagascar Mus. Regis Galliae.

Statura oblonga fere Melolonthae. *Antennae clava*  
*ovata* lamellis tribus constante: intermedia  
majori. Caput & thorax atra, immaculata.  
Elytra reticulata, cinerea. Abdomen ferru-  
gineum. Os maxillis palpisque. Palpi quatuor  
inæquales: anteriores subclavati, quadriarticu-  
lati: articulis tribus subaequalibus, ultimo  
ovato crassiori, obtuso adhaerentes maxillæ  
dorso, posteriores filiformes, triarticulati:  
articulo ultimo obtuso adnati labii basi. Man-  
dibula porrecta, cornea, crassa, arcuata, obtusa.

---

Hexodon corpus ovatum supra convexum, subtus  
planum, immarginatum, capite parvo oculis rotun-  
datis, antennis brevibus articulo primo crassiori,  
secundo brevisimo, ultimis tribus lamellatis, thorace  
lato, scutello brevi, lato, elytris longitudine abdominis,  
pedibus mediocribus, tibiis anticis dentatis reliquis  
pilosis, tarsis quinque articulatis.

*Maxilla cornea, crassa, tridentata : dentibus fisis. Labium latum, corneum, late emarginatum.*

- unicolor.* 2. *H. atrum immaculatum.*  
*Hexodon unicolor* Oliv. Inf. 1. 7. tab. 1. fig. 2.  
*Habitat in Madagascar Mus. Regis Galliae.*  
*Affinitas summa praecedentis, at corpus immaculatum.*

4. **HISTER.** *Maxilla unidentata.*  
*Labium corneum, cylindricum, integrum.*  
*Antennae clava, solida.*

- major.* 1. *H. ater elytris substriatis, thoracis marginibus ciliatis* Linn. syst. nat. 2. 566. 2.  
*Hister major* Oliv. Inf. 1. 6. 6. 3. tab. 1. fig. 4.  
*Voet. tab. 31. fig. 6.*  
*Habitat in Africa.*  
*Hister maximus* Linn. Oliv. vix differre videtur.  
*Simillimus H. unicolori, at duplo major & thorax pilis densis ferrugineis ciliatus.*
- unicolor.* 2. *H. ater elytris oblique striatis.* Linn. syst. nat. 2. 567. 3. Fn. Sv. 440. Geoff. Inf. 1. 91. tab. 1 fig. 4.  
*Hister unicolor* Oliv. Inf. 1. 6. 7. 5. tab. 1. fig. 1.  
*Voet. Coleopt. tab. 31. fig. 5.*

---

*Histerum corpus subrotundum, antice posticeque obtusum, fere truncatum, glabrum, capite parvo subrecondito, antennis articulo primo longissimo, ultimis tribus crassioribus thorace glabro margine parum elevato, scutello minuto triangulari, elytris abdome brevioribus, truncatis, arête adhaerentibus, pedibus brevibus, validis, femoribus subcompressis, tibiis compressis anticis dentatis, posticis spinosis, tarsis quinque articulatis, colore atro nitido.*

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 10.

Sulz. Icon. tab. 2. fig. 8. 9.

Habitat in Europae, Americae stercore.

3. H. ater nitidus, elytris punctato substriatis longitudine abduminis. *glabratus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Os & antennae omnino hujus generis. Maxillae porrectae, arcuatae, acutae, medio unidentatae. Antennae clavatae, nigrae. Thorax nigroæneus, nitidisimus. Elytra atra, nitida, subtilissime punctato striata longitudine fere abduminis postice retusa. Corpus atrum.

4. H. ater æneo nitidus, elytris basi striis obliquis apice obsolete punctatis. *semipunctatus.* Herbst Arch. t. 35. f. 6.

Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.

Statura omnino H. unicoloris. Antennarum primus articulus incrustatus, prominens. Caput & thorax atra æneo parum nitida. Elytra basi oblique striata, apice obsolete punctata. Tibiae omnes valde compressæ, ferratae.

5. H. niger punctis elevatis scaber.

*scaber.*

Habitat in Hispania Dom. Vahl.

Thorax, elytra & abdomen prominulum punctis magnis elevatis scabra. Pedes nigri.

6. H. thorace æneo elytris coerulecentibus.

*cyaneus.*

Hister cyaneus Oliv. Inf. 1. 88. 6. tab. 3. fig. 17.

Habitat in nova Hollandia Dom. Banks.

Caput obscurum. Thorax lœvis, æneus, nitidus margine obscure subpunctato. Elytra coerulecentia, nitidisima, abbreviata, basi oblique striata. Pedes nigri.

7. H. planus opacus ater elytris lœvisimis Fyesl. *planus.*  
Inf. Helvet. N. 68.

Hister planus Oliv. Inf. 1. 8. 15. tab. 3. fig. 22.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 9.

Habitat in Europa australiori.

*brunneus.* 8. H. ferrugineus elytris substriatis.

Hister brunneus Oliv. Inf. 1. 8. 17. 27.

tab. 3. fig. 21.

Ross. Fn. Etrusc. 1. 29. 66.

Habitat in Sveciae stercore D. Banks.

Simillimus H. unicolori, at totus brunneus.

*pygmaeus.* 9. H. ater elytris lævisimis. Linn. syst. nat. 2.

567. 4. Fn. Sv. 441.

Hister pygmaeus Oliv. Inf. 1. 8. 28. 23.

tab. 3. fig. 24.

Habitat frequens primo vere in Bryo rurali  
arenae mobilis.

Nimis affinis H. unicolori.

*depressus.* 10. H. depressus ater nitidissimus elytris substriatis.

Hister depressus Oliv. Inf. 1. 8. 15. 17. t. 2. f. 9.

Hister compressus Herbst Arch. 20. 7.

Habitat sub Betulae corticibus Dom. Zschuck.

Diffrerit manifeste ab H. pygmaeo magis depre-  
sus & nitidissimus.

*dentatus.* 11. H. depressus ater nitidus elytris stria unica,  
mandibulis exsertis capite longioribus.

Hister quadridentatus Oliv. Inf. 1. 8. 14. 15.  
tab. 2. fig. 11.

Voet. Coleopt. tab. 31. fig. 8.

Habitat in America boreali Dom. Lee.

Magnitudo omnino H. unicoloris at totus de-  
pressus. Elytra brevia, nitida stria tantum  
unica ad marginem. Mandibulae capite lon-  
giores.

*sulcatus.* 12. H. ater thorace lineis elevatis quinque elytris  
tribus: interstitiis punctatis.

- Hister sulcatus Oliv. Inf. I. 8. 17. 20. tab. I. fig. 6.  
 Hister striatus Forst. Cent. I.  
 Ross. Fn. Etr. 30. 70. tab. 2. fig. 3.  
 Habitat in stercore equino Germaniae, Galliae  
 Dom. Helwig.
- Parvus. Caput utrinque supra oculos prominu-  
 lum. Antennae clavatae. Elytra connata, sub-  
 tilissime striata lineis elevatis tribus & pree-  
 terea inter has lineas striae duae punctorum  
 impressorum. Pedes anteriores dentati.
13. H. depressus ater nitidus elytris striatis, cor- *oblongus*.  
 pore oblongo.  
 Habitat in Svecia in radicibus Fagi sub cortice  
 Dom. Afzelius.  
 Difert a praecedentibus in primis corpore ob-  
 longo, atro, nitido.
14. H. ater elytris crenato striatis: striis interio-*abbreviatus*.  
 bus abbreviatis.  
 Habitat in America boreali Dom. Drury.  
 Statura H. pygmaei ater, nitidus. Elytra striis  
 quatuor crenatis & inter has & futuram duae  
 brevisimae.
15. H. ater elytris macula media sinuata rufa. Voet. *sinuatus*.  
 Coleopt. tab. 3 I. fig. 3.  
 Hister reniformis Oliv. Inf. I. 8. 10. 8. tab. I. f. 5.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Duplo major H. bimaculato. Caput & thorax  
 atra, nitida, immaculata. Elytra atra ad mar-  
 ginem interiorem striata, ad futuram lævia,  
 in medio macula magna angulata rufa. Pedes  
 nigri. Sequenti fane valde affinis, attamen  
 distinctus videtur.
16. H. ater coleoptris testaceis: cruce communi *cruciatus*.  
 atra.  
 Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.

Statura omnino H. sinuati, attamen distinctus videtur. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra laevissima, nitidissima, testacea futura maculaque communi in medio disci atris. Margo posticus niger.

*2 macula-* 17. H. ater elytris striatis: macula postica rubra.  
*tus.* Linn. syst. nat. 2. 567. 5. Fn. Sv.

Hister bimaculatus Oliv. Inf. 1. 8. 11. 10.  
tab. 2. fig. 12.

Attelabus niger, elytro singulo macula rufa  
Geoff. Inf. 1. 95. 2.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 9.

Voet. Scarab. tab. 31. fig. 1.

Habitat in Europae stercore bovino.

*4 macula-* 18. H. ater elytris bimaculatis Linn. syst. nat. 2.  
*tus.* 567. 6. Fn. Sv. 443.

Hister quadrimaculatus Oliv. Inf. 1. 8. 9. 7.  
tab. 3. fig. 18.

Schaeff. Elem. tab. 24. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 31. fig. 3.

Habitat in America boreali.

Hister 2 pustulatus Oliv. Inf. 1. 8. 10. 9. tab. 5.  
fig. 19. mera varietas videtur.

*aeneus.* 19. H. æneus elytris basi striatis apice punctatis.  
Geoff. Inf. 1. 8. 12. 12. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Anglia, Gallia.

Corpus parvum totum æneum, nitidum.

*detritus.* 20. H. ater nitens elytris piceis apice obscuris.

Hister detritus Oliv. Inf. 1. 8. 12. 11. t. 2. f. 16.  
Roff. Fn. Etr. 1. 29. 67.

Habitat in nova Hollandia D. Banks.

Totus ater nitens. Elytra basi sub picea nitida  
striis quatuor obliquis, lateralibus minoribus  
apice obscura punctata & quasi detrita.

**21.** *H. oblongus niger elytris brevisimis, antennis picipes. pedibusque piceis.*

*Hister elongatus Oliv. Inf. 1. 8. 16. 18. t. 2. f. 14.*

*Habitat in Germania Dom. Smidt.*

*Differet a praecedentibus omnibus minor & magis oblongus, niger, laevis nitidulus, elytris abbreviatis nullo modo striatis. Antennae & pedes piceae.*

**22.** *H. niger, thorace fulco transverso impresso, caesus. antennis ferrugineis.*

*Hister caesus Herbst Arch. tab. 36. fig. 3.*

*Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.*

*Minutus, distinctus antennis ferrugineis thorace- que fulco transverso lato impresso.*

## 5. SPHAERIDIUM. *Palpi quatuor filiformes.*

*Labium quadratum emarginatum.*

*Antennae clava perfoliata.*

**1.** *S. ovatum atrum elytris maculis duabus ferrugineis. scarabaeoides.*

*Sphaeridium scarabaeoides Oliv. Inf. 2. 45. 4. 1. tab. 1. fig. 1.*

*Dermestes scarabaeoides Linn. syst. nat. 2. 563.*

*17. Fn. Sv. 428.*

Sphaeridii corpus rotundatum, supra convexum, subtus planum, glabrum, capite parvo inflexo, antennis brevibus articulo primo longissimo, ultimi- tribus crassioribus, perfoliatis, thorace convexo, immarginato, glabro, elytris laevibus, immarginatis, pedibus brevibus, validis, femoribus subcompresso- tibiis spinosis, tarsis quinque articulatis.

Geoff. Inf. 1. 106. 17.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 17.

Habitat in Europae stercore frequens.

- lunatum.* 2. S. ovatum atrum elytris apice macula lunata lutea.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & summa certe affinitas S. scarabaeoides at macula elytrorum tantum unica lunata, lutea. Pedes nigri.

Forte potius facinora major S. 2 pustulati uti varietas minor maculis duabus ferrugineis mas Sph. scarabaeoides.

- 2 *pustula-*  
*tum.* 3. S. atrum nitidum elytris macula apicis rubra, pedibus piceis.

Sphaeridium 2 pustulatum Oliv. Inf. 2. 15. 5. 2. tab. 2. fig. 111.

Schrantz Enum. Inf. 44.

Habitat Kiliae in stercore.

Praecedentibus affinis at minor.

- Colon.* 4. S. luteum thorace punctis elytris macula marginali nigris.

Dermestes Colon thoracis lateribus flavis, elytris griseis: puncto nigro. Linn. syst. nat. 2. 564. 27. Fn. Sv. 438.

Habitat in Svecia Dom. de Paykull.

Statura & magnitudo praecedentium, Caput nigrum antennis luteis clava nigra. Thorax villosus, luteus punctis sex in strigam positis nigris. Elytra lutea macula magna marginali nigra. Abdomen nigrum margine luteo.

- globus.* 5. Globosum atrum thorace rufo.

Habitat Parisiis Dom. Tigny.

Statura globosa S. lutei at paullo minor. Caput atrum nitidum antennis fuscis, Thorax obscure

- rufus, nitidus, immaculatus. Elytra lœvia, atra,  
nitida. Corpus atrum pedibus piceis.
- 6. S. luteum elytris pubescentibus lœvibus.** *luteum.*  
Nitidula lutea Oliv. Inf. 2. 12. 16. 22. t. 3. f. 28.  
Habitat in Svecia Dom. de Paykull.  
Statura praecedentium. Corpus totum luteum  
elytris pubescentibus haud striatis.
- 7. S. ferrugineum elytris atris.** *dytiscoides.*  
Habitat in Insula St. Helena Dom. Banks.  
Corpus totum glabrum, nitidum. Antennae per-  
foliatae, rufae. Caput, thorax, pectus, abdomen  
rufa. Elytra glabra, atra.
- 8. S. atrum antennis pedibusque rufis, elytris lae-** *glabratum.*  
**vibus.**  
Sphaeridium glabratum Oliv. Inf. 2. 15. 10. 12.  
tab. 2. fig. 9.  
Habitat in Insula Madera, in Germania Mus. Dom.  
Banks.  
Statura omnino praecedentium paullo minor.  
Corpus latum, lœve, atrum, nitidum, antennis  
pedibusque rufis.  
Simillimum vix distinctum e Germania misit Dom.  
Smidt.
- 9. S. atrum nitidum elytris macula baseos rubra.** *humerale.*  
Oliv. Inf. 2. 15. 8. 8. tab. 1. fig. 2.  
Habitat in Sveciae arboribus Mus. Dom. Lund.  
Statura & magnitudo S. glabri. Caput & thorax  
atra, nitida, immaculata. Elytra glabra, atra,  
nitida macula magna baseos rufa. Abdomen  
rufum. Antennae & pedes piceae. Antennae  
articulis quinque perfoliatis.
- 10. S. atrum nitidum abdomine pedibusque fetru-** *abdominale.*  
**gineis.**  
Habitat in Americae meridionalis insulis D. Pflug.

S. glabrato paullo minus. Corpus supra atrum, glabrum, nitidum. Elytra substriata. Abdomen & pedes ferruginea.

*margina-* 11. S. læve atrum elytrorum margine pedibusque ferrugineis.

*tum.* Sphaeridium marginatum Oliv. Inf. 2. 15. 6.  
tab. 1. fig. 3.

Dermestes niger subrotundus, elytris lævibus.  
Geoff. Inf. 1. 107. 18.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura & magnitudo S. glabratii at antennæ nigrae & elytrorum margo tenuissime ferrugineus.

*ferrugi-* 12. S. ferrugineum elytris striatis.

*neum.* Sphaeridium ferrugineum Oliv. Inf. 2. 15. 7. 6.  
tab. 3. fig. 14.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Corpus totum ferrugineum, immaculatum. Antennæ articulis quinque perfoliatis.

*atomarium.* 13. S. læve atrum elytris crenato striatis, pedibus pallidis.

Silpha atomaria Linn. syst. nat. 574. 35.

Geoff. Inf. 1. 107. 19.

Habitat in Europæ stercore.

*melanoce-* 14. S. atrum glabrum, elytris griseis: macula comphalum.

*phalum.* Sphaeridium melanocephalum Oliv. Inf. 2. 15. 8. 9. tab. 1. fig. 4.

Dermestes melanocéphalus Linn. syst. nat. 2. 563. 16. Fn. Sv. 425.

Habitat in Europæ stercore.

Corpus atrum, læve, nitidum. Elytra grisea macula magna triangulari nigra ad basin. Pedes atri.

- 15.** *S. atrum nitidum elytris striatis, pedibus rufis. lugubre.*  
*Sphaeridium lugubre Oliv. Inf. 2. 15. 7. 7.*  
*tab. 2. fig. 12.*  
*Habitat Parisiis Dom. Bosc.*  
*Affine certe S. atomario at triplo minor.*
- 16.** *S. ferrugineum elytris laevibus griseis. stercoreum.*  
*Habitat in Germaniae stercore Dom. Smidt.*  
*Statura & magnitudo omnino S. melanocephali.*  
*Antennae pallide ferruginea. Caput & thorax*  
*glabra, nitida, obscure ferruginea, immacu-*  
*lata. Elytra grisea sutura tenuissime nigra.*  
*Corpus & pedes ferruginea.*
- 17.** *S. atrum elytris punctis fasciculatis ferrugineis. fasciculare.*  
*Byrrhus fascicularis Oliv. Inf. 2. 13. 8. 7.*  
*tab. 2. fig. 7.*  
*Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.*  
*Corpus magnitudine S. atomarii at distinctum*  
*striis plurimis punctatis e pilis fasciculatis fer-*  
*rugineis.*
- 18.** *S. atrum elytris apice rufis, pedibus nigris. haemorrhoidale*  
*Sphaeridium haemorrhoidale Oliv. Inf. 2. 15. 9. dale.*  
*10. tab. 2. fig. 6.*  
*Habitat in Europae stercore bovino.*  
*Corpus S. atomario paullo minus. Elytra striata,*  
*abdomine paullo longiora apice rufa.*
- 19.** *S. atrum elytris apice pedibusque rufis. flavipes.*  
*Habitat in Selandiae stercore bovino Mus. Dom.*  
*de Sehestedt.*  
*Statura & summa affinitas praecedentis. Differt*  
*tantum pedibus rufis. Elytra vix striata.*
- 20.** *S. atrum, coleoptris flavescensibus : puncto unipunctatum.*  
*communi atro. tum.*  
*Sphaeridium unipunctatum Oliv. Inf. 2. 15. 6. 5.*  
*tab. 2. fig. 8.*  
*Scarabaeus unipunctatus Mant. Inf. 1. 11. 104.*

*Coccinilla unipunctata* Linn. *synt. nat.* 2. 579. 6.

*Fn. Sv.* 470.

*Habitat in Europa boreali tempore fereno per aera volitans. Variat coleoptris immaculatis.*

*limbatum.* 21. *S. atrum nitidum thoracis limbo rufo, elytris laevissimis.*

*Habitat in Germania Dom. Smidt.*

*Statura & magnitudo omnino praecedentis.*

*Corpus totum læve, atrum, nitidum thoracis limbo rufo. Abdomen & pedes rufa.*

*ruficolle.* 22. *S. atrum nitidum thorace pedibusque anticus rufis.*

*Sphaeridium ruficolle Oliv. *Inf.* 2. 15. 9. 11.*

*tab. 2. fig. 7.*

*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*

*Statura parva, gibba praecedentium. Caput, elytra, corpus glabra, atra, nitida. Elytra atra, truncata, nitida macula magna rufa versus basi. Abdomen acutissimum. Pedes nigri.*

*nigripenne.* 23. *S. rufum nitidum elytris atris, antennis fuscis.*

*Habitat in Germania Dom. Smidt.*

*Affine certe S. dytiscoides at triplo minus. Caput & thorax rufa, nitida, immaculata. Antennae articulis quinque perfoliatis, fuscae, basi rufae. Elytra glaberrima, atra, nitida. Corpus pedesque rufa.*

*bicolor.* 24. *S. supra atrum subtus ferrugineum elytris glaberrimis: puncto ferrugineo.*

*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*

*Corpus parvum, atrum, nitidum, subtus ferrugineum. Elytra lævia puncto magno determinato rufo ante apicem.*

*fimetarium.* 25. *S. atrum immaculatum elytris laevissimis.*

*Habitat in Europæ stercore.*

Statura omnino praecedentium totum atrum,  
inmaculatum.

26. *S. testaceum* capite obscuriore. *testaceum.*

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.

Smidt.

Corpus parvum, glabrum, nitidum, lœve, totum  
testaceum, capite solo obscuriore.

Simillimum at magis obscurum Parisiis a Dom.

Bosc accepti.

27. *S. æneum* nitidulum elytris lœvissimis, pedi- *aeneum.*  
bus nigris.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affine *S. fimetario* at duplo minus & totum  
æneum, nitidum. Pedes nigri.

28. *S. atrum* abdome pedibusque rufis Linn. syst. *seminulum.*  
nat. 2. 570. 8. Fn. Sv. 447.

Habitat in Europae stercore Mus. Dom. Banks.

Parvum distinctum abdome pedibusque rufis.

29. *S. atrum* elytris striatis, pedibus concoloribus. *minutum.*  
Sphaeridium minutum Oliv. Inf. 2. 15. 11. 14.

tab. 2. fig. 5.

Silpha atomaria Linn. syst. nat. 2. 574. 35.  
Fn. Sv. 467.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

Elytra postice pallidiora.

30. *S. oblongum* nigrum elytris abbreviatis, abdo- *pulicarium.*  
mine acuto.

Nitidula pulicaria Oliv. Inf. 2. 12. 20. 31.  
tab. 3. fig. 27.

Dermestes pulicarius Linn. syst. nat. 2. 564. 24.

Silpha pulicaria Linn. syst. nat. 2. 574. 33.

Habitat in Europae floribus.

6. BYRRHUS. *Palpi æquales subclavati.**Maxilla bifida.**Labium bifidum.**Antennæ clava perfoliata.**gigas.* 1. B. niger elytris punctatis ferrugineis.

Habitat in Austria Mus. Dom. Zschuck.

Major B. pilula. Corpus nigrum elytris solis  
punctatis, ferrugineis, immaculatis. Pedes  
nigri tibiis compressis, incurvis. Faemina  
aculeo ani.*pilula.* 2. B. fuscus elytris striis atris interruptis. Linn.  
synt. nat. 2. 568. 4.

Dermestes pilula Fn. Sv. 427.

Cistela subvillosa Geoff. Ins. 1. 116. 1. tab. 1. fig. 8.

Degeer Ins. 4. tab. 7. fig. 23.

Oliv. Ins. 2. 13. 5. 1. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 32. fig. 3.

Sulz. Hist. tab. fig.

Habitat in Europæ quisquiliis.

*albopuncta-3.* B. thorace cinereo nigroque vario, elytris nigris:  
*tus.* striis duabus punctorum alborum.

Habitat in Germaniae quisquiliis Dom. Daldorff.

Byrrhi corpus ovatum, convexum, immarginatum,  
capite inflexo, oculis ovatis vix prominulis, antennis  
capite longioribus: articulo primo crassiori, secundo  
parvo globoso, ultimis ovatis perfoliatis, thorace  
antice attenuato, scutello minutissimo, Elytris arcte  
abdomine adhaerentibus, inflexis, pedibus brevibus,  
validis, femoribus compressis, intus canaliculatis ad  
receptionem tarsorum, tarsis quinquearticulatis.

Nimis forte affinis B. pilula ejusdemque magnitudinis. Corpus fuscum. Thorax villosus, nigro cinereoque maculatus. Elytra vix striata nigra striis duabus e punctis minutissimis albis. Pedes nigri.

4. B. nigricans elytris fascia undata obsoleta rufa. *fasciatus.*  
 Byrrhus fasciatus nigricans, elytris fascia lata fusca. Linn. syst. nat. 2. 16. 13. 8.  
 Cistela subvillosa atrâ: fascia elytrorum transversa, aurato fusca. Geoff. Inf. 1. 116. 2.  
 Oliv. Inf. 2. 13. 6. 2. tab. 1. fig. 2.  
 Voet. Coleopt. tab. 32. fig. 2.  
 Habitat in Europae quisquiliis.
5. B. niger immaculatus. *ater.*  
 Cistela nigra nitens glabra Geoff. Inf. 1. 117. 3.  
 Oliv. Inf. 2. 13. 6. 4. tab. 1. fig. 4.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
 Affinis praecedentibus at totus ater. Elytra obsolete striata.
6. B. nigricans coleoptris macula transversa ferruginea Linn. syst. nat. 2. 16. 13. 7.  
 Oliv. Inf. 2. 13. 7. 4. tab. 1. fig. 5.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
 Nimis praecedenti affinis. Thorax maculis aliquot obsoletis. Elytra nullo modo striata, nigricantia macula communi transversa, ferruginea.
7. B. niger thorace aeneo, elytris striatis viridibus. *varius.*  
 Linn. syst. nat. 2. 16. 13.  
 Oliv. Inf. 2. 13. 7. 5. tab. 1. fig. 6.  
 Voet. Coleopt. tab. 32. fig. 4.  
 Habitat in Anglia. Captus die 28 Jun.  
 Variat elytris obscurioribus five fuscis nigro punctatis. Elytra semper tamen obscurius punctata.

*aeneus.*8. *B. totus aeneus.*

Byrrhus aeneus Linn. syst. nat. 2. 16. 13.

Cistela aenea Laichart. Inf. 1. 73. 3.

Oliv. Inf. 2. 13. 8. 6. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Europa boreali.

Triplo minor *B. pilula* supra *totus aeneus*, subtus  
muranus. Scutellum album.7. TROX. *Palpi* quatuor capitati.*Maxilla* bifida.*Antennae* clavato lamellatae.*gemma*tus. 1. *T. cinerus* thorace inaequali, elytris striatis  
punctisque elevatis atris.

Trox gemmatus Oliv. Inf. 1. 4. 7. 5. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Senegalia Dom. Olivier.

Statura omnino *T. fabulosi*. Antennae piceae:  
primo articulo hirto. Thoracis margo integer.  
Elytra crenato striata punctis atris, elevatis,  
nitidis.*fabulosus*. 2. *T. thorace* elytrisque rugosis, thorace integer-  
rimo.

Trox fabulosus Oliv. Inf. 1. 4. 8. 6. tab. 1. fig. 1.

Scarabaeus fabulosus niger opacus tuberculis ru-  
gosus, antennis basi pilosus. Linn. syst. nat. 2.  
551. 48. Fn. Sv. 390.

---

Trox corpore ovato gibbo utrinque obtuso, anten-  
nis longitudine capitibus saepius pilosus: clava ovata  
e lamellis tribus, brevibus ante oculos insertis, capite  
parvo, recondito, thorace inaequali marginato, scutello  
parvo, rotundato, elytris inaequalibus, immarginatis  
longitudine abdominis, pedibus validis, compressis,  
tibiis apice dilatatis triangularibus, edentulis, tarsis  
quinque articulatis, colore obscure cinereo, nunquam  
laeto aut maculato.

<sup>xii</sup> Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 12.

Habitat in Europæ collibus fabulosis.

3. T. thorace subcanaliculato, elytris striatis, cor- *arenarius*.  
pore obscurō.

Trox barbosus Laicharting. Enumerat.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Praecedente duplo minor totus obscure fuscus.

Antennæ testaceæ. Thoracis margo ferrugineo ciliatus. Elytra obsolete striata punctisque numerosis e pilis fasciculatis ferrugineis.

4. T. griseus thorace marginato: margine postico *suberosus* dentato, elytris striatis.

Trox suberosus Oliv. Inf. 1. 4. 6. 3. tab. 1. fig. 6.

Trox granulatus Herbst Arch. tab. 19. fig. 20.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Thorax carinatus, marginatus postice dente unico armatus. Elytra minus rugosa quam in T. fabuloſo.

5. T. ater thorace elytrisque spinosis. *horridus.*

Trox horridus Oliv. Inf. 1. 4. 5. 1. tab. 1. fig. 2.

Scarabaeus pectinatus Pall. Icon. 1. 10. t. A. f. 10.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter.

Statura T. fabuloſi. Thorax marginatus, ciliatus spinisque plurimis, brevibus, erectis armatus. Elytra striis quinque spinosis margineque ciliato.

6. T. niger thorace marginato inaequali, elytris *luridus.*  
striato spinosis.

Trox luridus Oliv. Inf. 1. 4. 5. 2. tab. 1. fig. 5.

Scarabaeus Morticinii clypeo inaequali ciliato, elytris striatis convexe punctatis, hispidulis Pall. Inf. 2. tab. A. fig. 11.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Vahl.

Statura praecedentis. Corpus totum obscure fuscum. Thorax marginatus ciliatus, inaequa-

lis at haud spinosus. Elytra striis numerosis elevato spinosis.

*cornutus.* 7. T. thorace elytrisque spinosis ferratisque, capite cornubus duobus porrectis arcuatis.

Habitat in Ceylonia Dom. de Paykul.

Minor T. fabulofo. Caput parvum, obscurum cornubus duobus arcuatis longitudine fere thoracis, validis apice obtusis, dentatis. Thorax marginatus, in medio parum elevatus undique spinosus margineque serrato. Pedes desunt.

Faemina mari simillima at capite mutico.

*spinicornis.* 8. T. nigricans thorace postice utrinque emarginato, antennis spinosis.

Habitat — — Mus. Dom. Tunstall.

T. fabulofo minor. Antennae lamellatae: primo articulo spina longitudine fere stipitis armato. Clypeus rotundatus, integer. Thorax scaber angulis posticis emarginatis. Elytra punctis elevatis vix striata. Pedes nigri.

8. OPATRUM. *Palpi antici clavati: clava oblique truncata postici filiformes.*

*Labium subemarginatum.*  
*Antennae moniliformes,*  
*extrorsum crassiiores.*

*griseum.* 1. O. cinereum thorace plano marginato, elytris striis tribus elevatis postice dentatis.

---

Opatri corpus oblongum gibbum, glabrum utrinque obtusum, capite parvo in emarginatura lata thoracis, oculis rotundatis, lateralibus, antennis sub oculis insertis, thorace glabro marginato, elytris immarginatis, rigidis abdomine longioribus, arte adhaerentibus apice inflexis, pedibus brevibus, validis, simplicibus, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro, griseo aut nigro, minime nitido.

Opatrum griseum Ross. Fn. Etrusc. 57. 138.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Majus O. fabuloſo. Corpus ſupra cinereum, imma-  
culatum, ſubtus fulcum. Thorax planus mar-  
gine parum elevato. Elytra ſtriis tribus abbre-  
viatis, elevatis poſtice dentatis.

2. O. griseum thorace plano marginato, elytris *porcatum*.  
fulcatis: punctis interiectis elevatis atris.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Statura & magnitudo praecedentis at diſtinctum  
elytris omnino porcatis, five fulcatis & inter  
fulcos puncta elevata, glabra, atra in dupli-  
ſerie. Pedes nigri.

3. O. fulcum elytris lineis elevatis tribus dentatis, *fabulosum*.  
thorace emarginato.

Silpha fabulosa Linn. syst. nat. 2. 572. 17. Fn.  
Sv. 456.

Tenebrio Geoff. Inf. 1. 350. 7.

Habitat in Europae, Americae fabulosis.

4. O. nigrum elytris lineis elevatis plurimis obfo- *gibbum*.  
letis.

Panz Naturf. 24. 14. 19. tab. 1. fig. 19.

Habitat in Sveciae collibus arenosis.

Praecedente magis oblongum & poſtice magis  
gibbum.

5. O. nigrum clypeo anticè piceo, elytris ſubſtriatis. *laevigatum*.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax laevia, nigra clypeo antice in-  
tegro, piceo. Thorax antice poſticeque trun-  
catus, ſubſinuatus. Elytra nigra, obſolete  
ſtriatia. Pedes nigri.

6. O. atrum thoracis margine crenato: angulo antico *crenatum*.  
poſtice, poſtico spinoso elytris crenato ſtriatis.

Habitat in Sveciae arenosis Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentium. Clypeus rotundatus.  
Thorax marginatus, niger, margine crenulato  
angulo antico porrecto, postico acute spinoso.  
Elytra crenato striata. Pedes nigri.

*glabratum.* 7. O. nigrum thorace elytrisque laevibus cinereis.  
Habitat in India orientali.

Statura & magnitudo O. fabulosi, at Corpus to-  
tum laeve, glabrum, subtus nigrum.

*arenarium.* 8. O. griseum elytris striatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Clypeus emarginatus. Thorax laevis. Elytra  
striata. Pedes nigri.

*clathratum.* 9. O. nigrum elytris striatis: striis punctatis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Statura omnino praecedentium at distinctum  
elytrorum striis punctis impressis.

*planum.* 10. O. depresso nigrum opacum elytris striatis  
laevibus.

Habitat in Siberia Dom. de Sehestedt.

Statura & magnitudo praecedentium at corpus  
magis depresso, planum. Caput, thorax,  
elytra omnino nigra opaca, immaculata. Elytra  
striata striis laevibus.

*granula-*  
*tum.* 11. O. atrum thoracis margine subreflexo, elytris  
striis elevatis tribus: fulcis punctatis.

Habitat in Barbariae fabulosis Mus. Dom. Des-  
fontaines.

Caput & thorax laevia, atra, immaculata margine  
omni subreflexo, integro. Elytra atra striis  
elevatis laevibus posice coeuntibus fulcis inter-  
mediis punctis numerosis impressis.

**12.** *O. cinereum thorace elytrisque rugosis, tibiis *orientales* anticis dilatatis triangularibus.*

Silpha multifasciata Forst. descript. 77. 1.

Habitat in Oriente Forstahl.

Caput ruga transversali elevata clypeoque fisso.

Thorax scaber, rugosus, inaequalis. Elytra scabra striisque longitudinalibus rugosa. Pedes cinerei.

**13.** *O. nigrum elytris punctatis subrugosis, tibiis *tibiale* anticis compresso triangularibus.*

Habitat in Svecia sub lapidibus Dom. Banks.

Clypeus emarginatus. Caput & thorax laevia, nigra, immaculata. Elytra lineis elevatis obsoletis rugosa. Tibiae anticae basi bidentatae, apice compressiae triangulares.

Magnitudine variat Dom. Desfontaines.

**14.** *O. nigrum thorace laevi, elytris striatis.* *Agricola.*

Opatum Agricola Ross. Fn. Etr. 57. 139.

Opatum Agricola Herbst Arch. 30.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum totum obsure nigrum, elytris striatis.

**15.** *O. cinereum thorace rugoso, elytris lineis elevatis quatuor laevibus.* *minutum.*

Habitat in Svecia.

Præcedentibus quadruplo minus totum cinereum, obscurum. Elytra laevia lineis elevatis quatuor.

**16.** *O. cinereum thorace scabro, elytris multo *pumillum*.* *striatis.*

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura parva præcedentis.

**9. ERODIUS.** *Palpi quatuor filiformes.* *Maxilla cornea, truncata, bifida.*  
*Labium corneum, emarginatum.*  
*Antennae moniliformes.*

*testudina-  
rius.*

**1.** *E. gibbus ater elytris connatis scabris: lateribus  
pulverulento albidis.*  
*Habitat Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.*  
*Corpus magnum, gibbum, subitus planum, atrum.  
Thorax gibbus, antice late emarginatus pro  
receptione capitis, ater margine pulverulento,  
albido. Elytra valde gibba punctis elevatis sca-  
bra, atra lateribus pulverulento albidis. Pedes  
simplices, atri.*

*gibbus.*

**2.** *E. gibbus ater elytris lineis elevatis tribus.*  
*Habitat in Arabia. Prof. Forstkahl.*  
*Medius, valde gibbus, ater. Thorax rotundatus  
margine anteriore pilis flavescentibus ciliatus.  
Elytra connata, obtusa lineis elevatis tribus  
laevibus. Tibiae anticae dente medio apicisque  
valido.*

*planus.*

**3.** *E. ater elytris linea elevata unica.*  
*Habitat in Arabia Prof. Forstkahl.*  
*Praecedente duplo minor, totus ater. Elytra  
connata linea dorsali elevata. Pedes inermes.*

*Erodii corpus subrotundum, gibbum, glabrum, im-  
marginatum, capite ovato arête thorace innato, oculis  
parvis, rotundatis, antennis sub capitinis margine infer-  
tis, thorace transverso, elytris connatis, abdomine lon-  
gioribus, inflexis, rigidis, arête adhaerentibus, pedibus  
brevibus, validis, tibiis anticis compressis, dentatis,  
reliquis apice bispinosis, tarsis quinquearticulatis: po-  
sticis quadriarticulatis, colore atro opaco.*

4. E. ater elytris laevissimis. *minutus.*  
 Habitat in Oriente Prof. Forskahl.  
 Reliquis multo minor totus ater, glaberrimus.  
 Thoracis dorsum punctis duobus impressis.  
 Elytra connata. Pedes inermes.
10. SCAURUS. *Palpi inaequales, filiformes.*  
*Maxilla obconica, unidentata.*  
*Labium corneum, integrum.*  
*Antennae moniliformes.*
1. S. ater elytris striato punctatis *atratus.*  
 Habitat in Aegypto Prof. Forskahl  
 Medius, totus ater, glaber. Thorax suborbiculatus, planus, punctatus capite addito fere longitudine elytrorum. Elytra connata, obtusa, striato punctata. Pedes antici dente crasso, valido altero versus apicem femorum, altero ad basin tibiarum.
2. S. ater elytris lineis elevatis tribus *striatus.*  
 Habitat in Italia meridionali D. de Schlanbusch.  
 Statura omnino praecedentis. Antennae moniliformes. Thorax punctatus. Elytra laevia lineis tribus elevatis laevisibus, postice coeuntibus. Corpus nigrum.
3. S. alatus ater elytris sulcatis. *fulcatus.*

---

Scauri corpus oblongum, glabrum, immarginatum, capite magno, prominulo, ovato: margine elevato, sub quo antennae inseruntur, thorace plano, subrotundo, scutello nullo, elytris connatis, rigidis margine apiceque inflexis, abdome longioribus, pedibus validis, femoribus incrassatis subtus canaliculatis, tibiis compressis intus unidentatis, tarsis anticis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis, colore atro opaco.

Habitat in Gallia meridionali. Mus. Dom. Olivier.  
 Statura sc. atrati. Antennae magis filiformes articulis apice crassioribus. Caput grande, planum, antice utrinque parum impressum, subpunctatum. Thorax lunatus ab elytris remotus, niger, punctatus. Elytra striata. Pedes picei tibiis ante apicem spinosis.

**II. SCARITES.** *Palpi sex filiformes.*

*Labium cornuum, dentatum.*

*Antennae moniliformes.*

*depressus.* 1. *S. thorace subquadrato atro, elytris laevissimis.*  
 Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Magnus. Mandibulae exsertae intus dente crassiori obtuso armatae. Caput planum antice lineis duabus impressis. Thorax subquadratus nec uti in reliquis postice rotundatus, marginatus, subcanaliculatus. Elytra submarginata, laevia. Pedes nigri tibiis anticis palmato dentatis.

*marginatus.* 2. *S. thorace subquadrato ater, elytris sulcatis: margine cyaneo.*

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Statura praecedentis & forte mera ejus varietas.

*gigas.* 3. *S. ater pedibus anticis palmato digitatis, mandibulis sulcatis, elytris laevibus.*

Scaris corpus oblongum, glabrum, planiusculum, immarginatum, capite magno, inserto, mandibulis exsertis, forcipatis, oculis vix prominulis, ovatis, marginalibus, thorace transverso, postice rotundato, scutello nullo, elytris connatis, rigidis, longitudine abdominalis, pedibus validis, femoribus compressis, tibiis anticis digitatis, intermediis dentatis, posticis pilosociliatis, tarsis quinquearticulatis, colore nigro.

- Oliv. Inf. 36. tab. 1. fig. 1.  
 Herbst. Arch. tab. 47. fig. 4.  
 Habitat in Africa æquinoctiali D. Banks.  
 Nimis S. subterraneo affinis at triplo major. Mandibulae porrecte, sulcatae. Caput antice fulcatum. Elytra obsolete striata.
4. S. ater pedibus anticis palmato digitatis, capite *subterrante* antice sulcato, elytris striatis: striis laevibus *neus*.  
 Oliv. Inf. 36. tab. 1. fig. 11.  
 Carabus spinipes. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 4.  
 Voet Scarab. tab. 33. fig. 2.  
 Habitat in America.  
 Pedes antici femoribus validis, tibiis sex dentatis.
5. S. thorace canaliculato postice rotundato ater, *laevigatus*.  
 elytris laevissimis.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Statura omnino praecedentis at minor. Antennæ moniliformes, fuscae. Mandibulae validae, exsertae, supra subfulcatae, intus bidentatae. Caput atrum. Thorax in medio canaliculatus, postice rotundatus, ater, immaculatus. Elytra laevissima, atra. Pedes antici palmato digitati.
6. S. thorace subquadrato ater elytris striatis: striis *crenatus*.  
 crenatis, capite antice acuminato.  
 Habitat in India orientali Mus. D. Lund.  
 Statura & magnitudo omnino S. subterranei.  
 Caput atrum, nitidum antice dente parvo elevato. Mandibulae elongatae dente baseos porrecto, bifido. Thorax glaber, laevis ater, nitidus, in medio canaliculatus. Elytra striata: striis omnibus crenatis. Corpus nigrum.  
 Pedes antici palmato digitati.
7. S. cyaneus glaberrimus antennis pedibusque nigris. *cyaneus*.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
 Caput magnum, exsertum, cyaneum fronte li-

neis duabus impressis. Mandibulae exsertae, nigrae, dentatae. Antennae nigrae. Thorax canaliculatus, cyaneus, postice rotundatus. Elytra thorace addito capite breviora, conata, cyanea, glaberrima, basi retusa. Pedes nigri tibiis anticis dentatis.

*sabulosus.* 8. S. gibbus ater elytris striatis, antennis ferrugineis, pedibus simplicibus.

Habitat in Barbariae fabulosis. Mus. Dom. Desfontaines.

Omnino hujus generis, a quo tamen differt capite thoraceque magis gibbis pedibusque omnino simplicibus. Antennae obscure ferrugineae. Caput grande, gibbum, mandibulis laevibus. Thorax marginibus rotundatis, laevis, nitidus. Elytra striata, atra. Pedes antici haud palmato digitati, sed tibiae spina tantum unica, acuta, valida, atri apice ferruginei.

*arenarius.* 9. S. piceus tibiis anticis palmato digitatis.

Tenebrio fossor Linn. Syst. nat. 2. 675. 7. Fn. Sv. 817.

Attelabus fossor Degeer Inf. 4. 350. 1. t. 30. f. 12.  
Habitat in Europae collibus arenosis.

*gibbus.* 10. S. ater thorace orbiculato canaliculato, elytris substriatis.

Scarites thoracicus. Herbst Arch. tab. 29. fig. 17.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Parvus. Antennae breves, moniliformes. Thorax gibbus, orbiculatus, in medio canaliculatus, laevis, glaber. Elytra remota, substriata, atra, nitida. Pedes nigri.

*Curfor.* 11. S. testaceus thorace oblongo: angulis quinque denticulatis.

Tenebrio Curfor Linn. Syst. nat. 2. 675. 8. Fn.  
Sv. 818.

Myll. Zool. Dan. 74. 798.

Habitat in Europae fabulosis.

12. S. niger thorace ferrato, antennis pedibus que *Arabs.*  
testaceis

Habitat in Oriente Dom. Forskahl.

Duplo fere praecedente major. Antennae longi-  
tudine corporis. Elytra striata.

12. SEPIDIUM. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla brevis*, uniden-  
tata.

*Labium breve*, corneum,  
ad basin emarginatum.  
*Antennae filiformes.*

1. S. thorace tricuspidato, corpore griseo. *tricuspidata-*  
Habitat in Arabia Prof. Forskahl. *tum.*

Magnitudo media. Antennae articulis undecim,  
cylindricis. Thorax gibbus, carinatus denti-  
bus tribus validis, obtusis, quorum alter in  
margine anteriore obtusior caput tegit. Elytra  
connata, obtusa, linea media lateralique ele-  
vatis, muricatis.

2. S. thorace tricuspidato obscurum, elytorum disco  
albido linolis obliquis fuscis.

Habitat in Barbariae fabulosis. Mus. Dom. Des-  
fontaines.

Affinis certe S. tricuspidato & mera forte ejus va-  
rietas. Antennae nigrae. Caput fronte albida.  
Thorax spina antica prominente obtusa lateraliter

Sepidii corpus oblongum, immarginatum, con-  
vexum, capite ovali, oculis reniformibus, antennis sub-  
oculis insertis; thorace rotundato, scutello nullo, elytris  
connatis, inæqualibus, rigidis, ab domine longioribus  
marginie apiceque inflexis, pedibus simplicibus, tarsis  
anticis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis.



que, fuscus dorso elevato sulcis duobus profundis villoso-albis. Elytra connata linea laterali ferrata, obscura disco communi albo lineolis quinque ad suturam obliquis nigris. Corpus obscurum. Pedes cinerascentes tarsis nigris.

- cristatum.* 3. S. thorace tricuspidato cristato, corpore variegato, Pall. Icon. tab. C. fig. 26.

Habitat in Arabia Prof. Forskahl.

Paullo praecedente major. Caput planum, griseum.

Thorax tricuspidatus spina anteriore crista sifia, niger lineis tribus albis. Elytra nigro alboque varia lineis duabus carinatis postice spinosis. Pedes grisei.

- reticulatum.* 4. S. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo S. tricuspidati. Caput & thorax nigra, interdum cinereo villosa maculis aliquot villosis, fuscis. Thorax utrinque in angulum acutum excurrit. Elytra in junioribus grisea, in adultioribus nigra lineis elevatis numerosis longitudinalibus transversalibus que reticulata. Linea intermedia magis elevata coit ante apicem cum intermedia elytri alterius, inde dorsum quasi planum. Pedes nigri.

- rugosum.* 5. S. thorace laevi nitido atrum, elytris rugosis: linea elevata unica.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Statura & summa affinitas praecedentis. Antennae cinereo villosae. Caput & thorax atra, nitida, laevia, immaculata. Elytra nitida lineolis transversis elevatis rugosa lineaque unica elevata, laevi, quae tamen apicem haud attingit. Pedes atri.

- vittatum.* 6. S. thorace subangulato, elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
 Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum. Thorax marginatus angulo parvo obtuso in medio niger margine cinereo pubescente. Elytra linea unica elevata, inmedio atra vittis duabus albis, quarum interior apicem haud attingit.

**13. PIMELIA.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum, rotundatum, emarginatum.

*Antennae* filiformes, apice moniliformes.

**1. P. atra glabra elytris striis quatuor sanguineis. *striata*.**

Tenebrio glandiformis. Pall. Icon. 1. tab. 6.

Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 11.

Wulf Inf. Capens. tab. 2. fig. 16.

Habitat in India.

Gibba, atra. Antennae apice fuscae. Elytra connata striis quatuor ante apicem coeuntibus.

**2. P. glabra nigra elytris lineis tribus elevatis ob- *unicolor*.  
 soletis.**

Tenebrio gibbus Pall. Icon. 1. tab. C. fig. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 9.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Praecedente paullo minor & elytra immaculata.

---

Pimeliae corpus ovatum, glabrum, immarginatum, gibbum, capite thoracis emarginatura inserto, ovato, obtuso, antennis sub margine insertis, oculis marginalibus, reniformibus, inflexis, thorace gibbo, rotundato, rarius plano, marginato: margine reflexo, scutello nullo, elytris connatis, rigidis, inflexis, longitudine abdominis, pedibus simplicibus, tarsis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis, colore atro.

- gibba.* 3. P. atra thorace globoso, elytris linea abbreviata elevata: laterali carinata.  
Habitat in India Mus. Dom. Hunter.  
Statura omnino praecedentium. Thorax valde elevatus, gibbus. Elytra laevia at ante marginem linea abbreviata. elevata, carinata. Pedes nigri.
- laevigata.* 4. P. oblonga atra thorace globoso, elytris laevissimis unicoloribus.  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Paullo minor P. gibba tota atra, immaculata, reliquis longior. Thorax lateribus rotundatis elytris latior. Elytra laevissima.
- glabrata.* 5. P. ovata atra thorace globoso, elytris laevissimis unicoloribus. Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 14.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & summa affinitas praecedentis at corpus magis ovatum. Thorax globosus elytris paullo angustior.
- hispida.* 6. P. nigra corpore muricato hispido.  
Tenebrio hispidus Forsk. Descript. 79. 8.  
Tenebrio setosus Pall. Icon. 1. tab. 6. fig. 7.  
Habitat rarius in hortis Alexandrinis sub sarmen-  
tis. Prof. Forstkahl.  
Corpus obscure nigrum pilisque erectis hispidum.
- longipes.* 7. P. nigra elytris connatis muricatis, pedibus elongatis.  
Habitat in Aegypto. Prof. Forstkahl.  
Thorax brevis rotundatus, niger, glaber, cana-  
liculatus. Pedes imprimis postici elongati.
- muricata.* 8. P. nigra coleoptris obtusis: striis muricatis.  
Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 1.  
Tenebrio muricatus. Linn. syst. nat. 2. 676, 17.  
Mus. Lud. Ulr. 100. Geoff. Inf. 1. 352.  
Tenebrio echinatus Pall. Icon. 1. 706. 51.

Habitat in Europa australi, Oriente.

9. P. nigra thorace scabro, elytris tuberculato mu- *tuberculata*.  
ricatis.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch.

Praecedente duplo minor. Thorax punctis elevatis scaber. Elytra punctis elevatis, subspinosis muricata.

10. P. atra thorace globoſo: punctis duobus impreſſis, elytris rugosis: striis tribus elevatis laevibus. *punctata*.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Statura omnino praecedentium.

11. P. atra elytris scabris, antennis pedibusque fuscis. *scabra*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Muf. Dom. Banks.

Caput atrum antennis fuscis. Thorax gibbus, ater, glaber, laevis. Elytra atra punctis parvis, elevatis, numerosis scabra. Pedes omnes fusci.

12. P. atra elytris scabris lineisque tribus elevatis *grossa*.  
laevibus Oliv. Inf. 59. tab. 1. fig. 5.

Habitat in arena Barbariae Prof. Vahl.

Corpus P. scabra majus & differt elytrorum striis tribus elevatis, distinctis.

13. P. elytris spinosis: linea laterali elevata ferrata. *angulata*.  
Tenebrio spinosus Forfk. Desc. 80. 18.

Tenebrio asperrimus Pall. Icon. 1. 55. 22.

Habitat Alexandriae Prof. Forstkahl.

Reliquis grossior, tota atra, nitida. Thorax rotundatus lateribus scabris. Elytra connata, obtusa spinis majoribus elevatis in tres series digestis. Inter has lineae quatuor spinarum minorum. Linea lateralis ferrata prominet.

14. P. thoracis lateribus spinosis, elytris lineis tribus elevatis *echinata*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Muf. Dom. Banks.

Caput obſcurum. Thorax cinereus punctis longioribus nigris scaber, margine antico dentato,

laterali in medio spina acuta, reflexa. Elytra deflexa, fusco, cinerea lineis tribus elevatis, echinatis, in primis lateralibus. Abdomen nigrum. Pedes cinerei.

- dentipes.* 15. P. thorace scabro, elytris pilosis muricatis, femoribus anticis unispinosis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei.

Praecedentibus paullo minor. Corpus obscure cinereum, minime nitens. Thorax subhirtus, scaber sive cinereus punctis numerosissimis, elevatis, nigris. Elytra pilosa, cinerea punctis majoribus atris muricata. Pedes cinerei femoribus ante apicem unidentatis.

- dentata.* 16. P. thorace glabro nigra, elytris fuscis: lineis tribus elevatis ferratis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Lund.

Caput & thorax laevia, obscure nigra, immaculata. Elytra pallidiora, scabra lineis tribus valde elevatis, ferratis, atris. Corpus nigrum. Pedes elongati, inermes.

- porcata.* 17. P. thorace laeui nitido, elytris lineis elevatis tribus: interiectis punctis elevatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus minor. Caput & thorax laevia, atra, nitida. Elytra connata, deflexa lineis tribus elevatis, laevibus, quae tamen apicem haud attingunt. Spatium inter lineas punctis elevatis scabrum. Pedes postici longiores.

- maculata.* 18. P. thorace nigro, elytris cinereis fusco maculatis: lineis tribus elevatis, secunda subundata.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax nigra punctis elevatis longioribus scabra. Elytra grisea lineis duabus macularum fuscarum, altera linea elevata interiori divisa. Lineae tres elevatae nigricantes, qua-

- rum intermedia undata. Pedes cinerei punctis elevatis nigris irrorati.
19. P. thorace varioloso, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elongatis.
- Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Parva, atra. Thorax punctis impressis. Elytra lineis tribus elevatis, ferratis. Pedes elongati tibiis obscure rufis.
20. P. thorace laevi obscuro, elytris cinereis hispidis: lineis tribus elevatis laevibus. Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 21.
- Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Pedes cinerei tibiis anticis apice dentibus tribus rufis.
21. P. thorace scabro, elytris rugosis antice angustioribus.
- Habitat in Aegypto Prof. Forstkahl.  
Corpus atrum, opacum. Thorax elytris angustior, rotundatus, immarginatus. Coleoptera connata, lineis tribus elevatis & spatio interjecto rugoso. Basis elytrorum angustior.
22. P. thorace marginato antice postice que spinoso, spinosa. elytris striis elevatis laevibus.
- Tenebrio spinosus. Linn. syst. nat. 2. 677. 24. 1.  
Mus. Lud. Ulr. 111.
- Habitat in Europa australi, Oriente.  
Statura ab hoc genere differt. Thorax valde marginatus antice posticeque spinosus.
23. P. thorace marginato: marginibus antice posticeque spinosis, elytris laevibus connatis.
- Habitat in Europa australiori Dom. Boeber.  
Statura & summa affinitas praecedentis tota atra.  
Elytra omnino laevia, glabra linea unica laterali carinata.

- reflexa.* 24. *P. thorace marginato: marginibus reflexis, elytris muricatis: linea laterali carinata laevi.*  
*Tenebrio vulgaris* Forf. descript. 79. 9.  
*Tenebrio pterygodes* Pall. Icon. tab. C. fig. 6.  
*Habitat in Oriente Prof. Forf kahl.*  
*Thorax antice lunatus lateribus valde marginatis. Elytra connata striis duabus punctorum elevatorum & linea laterali valde carinata.*
- fasciata.* 25. *P. thorace suborbiculato atra elytris fasciis duabus abbreviatis flavis.*  
*Habitat in India Mus. Dr. Lund.*  
*Hujus generis videtur specimen mutilatum. Caput prominens, subcylindricum, atrum. Thorax elytris angustior, laevis, ater. Elytra connata, striata, atra fasciis duabus flavis, quarum anterior suturam haud attingit, posterior vero nec suturam, nec marginem. Pedes atri.*
- collaris.* 26. *P. nigra elytris laevibus uniangulatis, thorace angustiore, capite depresso carinato.*  
*Tenebrio collaris.* Linn. syst. nat. 2. 671. 21.  
*Habitat in Europa australiori,*  
*E geniculis oleum slave scens fecernit.*
- carinata.* 27. *P. nigra thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus laevibus.*  
*Tenebrio Aegyptius* Forf kahl Descript. 786.  
*Habitat in Europa australiori.*  
*Thorax rotundatus lateribus gibbis, Elytra connata.*
- ciliata.* 28. *P. nigra depressa thorace elytrisque reflexo marginatis ciliatis.* Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 19.  
*Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.*  
*Caput parvum intra emarginaturam thoracis.*  
*Thorax glaber, depresso margine dilatato, subreflexo, ciliato, antice emarginato. Elytra con-*

- nata, plana, deppressa, laevia margine subreflexo, ciliato.
29. P. thorace rotundato scabro, elytris striis tribus *lineata*.  
punctato scabris postice lineolis albis.  
Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.  
Corpus parvum. Caput nigrum ante antennas  
utrinque prominens, subspinosum. Thorax ro-  
tundatus, punctis elevatis scaber. Elytra dorso  
plano lateribus deflexis lineisque tribus pun-  
ctorum elevatorum & inter has lineolae tres  
apicis albae. Linea lateralis elevata, ferrata.  
Tibiae anticae extus ferratae.
30. P. thorace rotundato scabro, coleoptris cine- *leucogra-*  
reis: lineis elevatis novem nigris. *pha.*  
Tenebrio leucographus. Pall. Icon. tab. C. fig. 2.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Parva. Caput & thorax nigra, scabra. Elytra cine-  
rea lineis elevatis quatuor quintoque communi  
scabris, nigris. Pedes nigri tibiis anticis ferratis.
31. P. atra thorace rotundato, elytris glaberrimis: *glabra*.  
Oliv. Inf. 59. tab. 2. fig. 13.  
Tenebrio laevis Forskahl descript. 78. 7.  
Habitat in Aegypto Prof. Forskahl.  
Similis P. rugosae ad duplo minor, tota atra,  
nitida. Thorax rotundatus, laevis. Elytra con-  
nata, obtusa, glaberrima. Magnitudine maxi-  
me variat Dom. Desfontaines.
32. P. glabra thorace postice angustato, elytris acu- *angustata*.  
minatis.  
Rhinomacer brentoides Ross. Fn. Etr. I. 135.  
tab. 3. fig. 14.  
Habitat in Oriente Prof. Forskahl.  
Statura praecedentis tota atra, glabra, nitida.  
Thorax rotundatus postice angustior. Elytra  
connata, acuminata, subtilissime striato punctata.

*orbiculata.* 34. P. glabra thorace orbiculato, elytris acuminatis.

Tenebrio Vomas Pall. Icon. tab. C. fig. 8.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Tota atra, glabra, Thorax elytris angustior, orbiculatus. Elytra connata, glaberrima, postice acutiuscula.

14. BLAPS. *Palpi* quatuor clavati.

*Maxilla* recta, bifida.

*Labium membranaceum*, fissum.

*Antennae* apice moniliformes.

*Gages.* 1. B. nigra thorace rotundato, elytris mucronatis laevissimis.

Tenebrio gages, Linn. syst. nat. 2. 676. 14.

Sulz. Hist. Ins. 64. tab. 7. fig. 9.

Habitat in Europa australiori.

Simillima B. mortisaga at duplo major.

*fulcata.* 2. B. coleoptris mucronatis fulcatis.

Tenebrio polychrestus Forsk. Descript. 79. 10.

Habitat in Orient. Prof. Forskahl.

Duplo fere minor B. mortisaga. Elytra connata, mucronata fulcis octo vel novem laevibus exarata.

Blaps corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, capite prominulo, obtuso, oculis lateralibus, oblongis, antennis ante oculos sub capitinis margine insertis, thorace vix marginato: margine rotundato, postice truncato absque scutello, elytris connatis lateribus deflexis, arcte abdomine adhaerentibus, rigidis, pedibus validis, femoribus compressis subtus canaliculatis, tarsis quinque articulatis, posticis quadriarticulatis, colore atro.

Turcis officinales laudantur contra aurium do-  
lores mortisunque scorpionum. Butyro coctae  
a feminis Turcis saginandi caussa comeduntur.  
Forstahl.

3. B. atra coleoptris mucronatis subpunctatis. *mortisaga.*  
Tenebrio mortisaga Linn. syst. nat. 2. 676. 15.  
Fu. Sv. 822. Geoff. Inf. 1. 346.  
Frisch Inf. 13. tab. 25.  
Schaeff. Icon. tab. 37. fig. 6. tab. 6. fig. 13.  
Habitat in Europae suffocatis.  
A plebe Sueciae intra domos ambulans mortis  
nuncius creditur.
4. B. thorace postice angulato, elytris excavato *excavata*,  
punctatis acutiusculis.  
Petiv. Gazoph. tab. 92. fig. 14.  
Act. Engl. 211. 861. 13.  
Habitat in Coromandel Mus. Britann.  
B. mortisaga minor & planior. Thorax laevis, ater,  
marginatus, postice subsinuatus angulis acu-  
tis. Elytra atra punctis late excavatis striata.
5. B. atra depresso elytris granulato subspinosis. *granulata.*  
Helops granulatus Mant. 1. 214. 13.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Dom. Lund.  
Reliquis latior.
6. B. ovata atra elytris connatis laevissimis. *buprestoi-*  
Tenebrio buprestoides Mant. 1. 212. 13. *des.*  
Pall. Icon. 2. 719. 44.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei.  
Clypeus integer.
7. B. nigra ovata elytris obsolete striatis, clypeo *dermestoi-*  
emarginato. *des.*  
Tenebrio Dermestoides Mant. 1. 212. 14.  
Habitat Halae Dom. Hybner.  
Statura omnino praecedentis at distinctus clypeo  
emarginato elytrisque substriatis.

- striata.* 8. B. thorace postice angulato atra, elytris obtusis striatis.  
 Habitat in Coromandel Mus. Britann.  
 Caput & thorax laevia, atra, minime nitida.  
 Thorax margine postice utrinque angulato. Elytra connata, nitidiora, atra, striata striis sublaevis.
- emarginata.* 9. B. atra elytris crenato striatis, labio emarginato.  
 Habitat in Marocco Dom. de Sehestedt.  
 Medius. Palporum ultimus articulus crassior, truncatus. Caput quadratum, atrum, labio emarginato. Thorax ater, lateribus rotundatis. Elytra crenato striata, obtusa.
- variolosa.* 10. B. atra elytris lineis elevatis tribus punctisque granulatis, thorace emarginato.  
 Silpha granulata. Mant. Inf. 1. 49. 12.  
 Oliv. Inf. 2. 11. 13. 10. tab. 2. fig. 10.  
 Silpha rugosa Scop. carn. 53.  
 Habitat in Africa D. Prof. Vahl.  
 Thorax marginatus, punctatus, antice emarginatus. Elytra lineis tribus elevatis, quae tamen apicem haud attingunt & inter has punctis elevatis granulata. Corpus & pedes atra.
- laevigata.* 11. B. depressa atra elytris lineis elevatis tribus sublaevis.  
 Habitat in Marocco Dom. de Sehestedt.  
 Thorax planus, niger margine elevato, subreflexo. Elytra sublaevia nigra lineis tribus elevatis apicem haud attingentibus. Corpus & pedes nigra.
- triflisis.* 12. B. atra elytris fulcatis: fulcis laevis.  
 Habitat in Barbariae fabulosis Mus. Dom. Desfontaines.  
 Clypeus retusus, integer. Thorax planus, subquadratus, laevis, niger, minime nitidus.

- Elytra fulcata fulcis omnino laevibus. Corpus nigrum.
13. B. atra femoribus posticis subtus canaliculatis *femoralis*. ferrugineo villosis.  
Habitat in Germania de Sehestedt.  
Caput antice emarginatum. Corpus totum atrum elytris vix striatis.
14. B. thorace postice angulato griseo fusca, elytris *crenata*. crenato striatis obtusis.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Praecedente duplo minor. Caput & thorax laevia, griseo fusca, immaculata. Elytra striata: striis crenatis.
15. B. oblonga atra elytris laevissimis. *glabra*.  
Helops glabra. Mant. Inf. I. 214. 23.  
Habitat in Europae quisquiliis.  
Corpus parvum. Antennae omnino hujus generis. Thorax & elytra laevia, atra, immaculata. Pedes nigri.
16. B. atra antennis ferrugineis, elytris punctato *punctata*. striatis.  
Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.  
Statura parva praecedentium laevis, atra antennis solis ferrugineis. Elytra punctato striata.
17. B. atra elytris clathratis, antennis apice ferrugineis. *clathrata*,  
Habitat in America meridionali Dom. Smidt.  
Antennae filiformes articulis tribus ultimis ferrugineis. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra striata & inter strias lineae punctorum impressorum.

15. TENEBRI<sup>O</sup>. *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* clavati.

*postici* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* truncatum,  
integrum.

*Antennae* moniliformes.

*cupreus.* 1. T. niger thorace subquadrato: margine crenato, elytris punctatis cupreis.

Habitat in Guinea Dom. Ifert.

Magnus in hoc genere. Antennae breves, moniliformes, atrae. Caput & thorax nigra, immaculata. Thorax subquadratus margine exteriori crenulato. Elytra vase punctata, cuprea, immaculata. Corpus nigrum parum nitidum. Pedes nigri, omnino inermes.

*fulcatus.* 2. T. niger thorace subrotundato integro, elytris striatis cupreis.

Habitat in Guinea Dom. Ifert.

Magnitudo praecedentium. Antennae breves, moniliformes, atrae. Caput nigrum. Thorax subrotundatus, margine omni mutico, laevis, niger, immaculatus. Elytra striata cuprea.

Tenebriorum corpus oblongum, glabrum, immarginatum, capite subrotundo, obtuso, oculis ovatis, marginalibus, antennis ante oculos sub capitib marginis insertis, thorace marginibus rotundatis, scutello parvo rotundato, elytris longitudine corporis haud deslexis, rigidis, pedibus brevibus, validis, femoribus crassioribus, canaliculatis, tibiis incurvis, tarsis quinquearticulatis, posticis quatriarticulatis, colore plerumque obscuro.

Corpus atrum femoribus omnibus ante apicem  
canaliculatis, bidentatis.

3. T. niger, thorace subquadrato, elytris crenato *curvipes*,  
striatis, tibiis anticis incurvis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Corpus elongatum, angustum. Antennae mihi  
desunt. Caput ovatum, nigrum, antice sub-  
emarginatum. Thorax subquadratus, lœvis, ater.  
Elytra crenato striata, atra, immaculata. Pedes  
atri, tibiis anticis incurvis.

4. T. glaber ater elytris striatis, tibiis posticis *serratis*,  
*ferratis*.

Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.

Caput exsertum, basi attenuatum. Thorax nitens.  
Pedes atri femoribus canaliculatis. Tibiae posti-  
cae incurvae, elevatae, intus ferratae.

5. T. oblongus niger obscurus, thorace quadrato, *obscurus*.  
elytris substriatis.

Habitat in Germania Dom. de Leuwenskiold  
Paullo major T. molitori. Antennæ moniliformes,  
nigrae articulo ultimo ferrugineo. Caput & tho-  
rax nigra, obscura, immaculata. Elytra om-  
nino concolora, substriata. Corpus nigrum,  
tibiis anticis incurvis.

6. T. oblongus piceus elytris striatis. Linn. syst. nat. *molitor*.  
674. 2. Fn. Sv. 875. Geoff. Ins. 1. 349. 6.

Frisch. Ins. 8. tab. 1.

Sulz. Ins. 7. fig. 52.

Habitat in farina pistorum, pane.

Larva alba mollis luscinarum gratissimus cibus.

7. T. oblongus ater elytris laeviusculis. *laevigatus*.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. Dom. Banks.

T. molitori paullo minor, totus ater, laevis, glaber.

8. T. violaceus antennis pedibusque piceis. Linn. *chalybeus*.  
syst. nat. 2. 674. 3.

Degeer Inf. 5. 53. 4. tab. 13. fig. 11.

Habitat in Guinea.

Affinis videtur T. molitori.

*variegatus.* 9. T. oblongus fuscō cinereoque varius.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. D. Banks.

Statura oblonga & magnitudo praecedentium,  
at totus fuscus pilis griseis variegatus.

*abbreviatus.* 10. P. ovatus ater elytris striatis, capite tuberculato.

Habitat in India Mus. Britannicum.

Statura T. atrati & duplo brevior. Thorax pa-  
rum marginatus, laevis, glaber, angulis ro-  
tundatis. Clypeus rotundatus utrinque tuber-  
culo parvo elevato. Ultimus antennarum arti-  
culus globosus. Elytra crenato striata.

*depressus.* 11. T. oblongus thorace ferrugineo: maculis dua-  
bus impressis, elytris striatis basi ferrugineis  
apice nigris.

Habitat in Carolina meridionali Mus. Dom. Gi-  
got d'Orcy.

Corpus elongatum, depresso. Antennæ tho-  
niliformes, extrorsum crassiores, piceæ. Ca-  
put nigrum ore ferrugineo. Thorax depresso.  
rufus: maculis duabus dorsalibus magnis im-  
pressis. Elytra striata basi margineque exte-  
riori rufis, apice cyaneo nigris. Pedes rufi.

*fessor.* 12. T. ovatus niger elytris striatis, tibiis anticis  
dentato spinosis.

Habitat ad Cap. Bon, Spei Mus. Dom. Banks.

Corpus supra nigrum, subtus piceum. Caput  
& thorax glabra, laevia. Elytra crenato stria-  
ta. Pedes antici breves, validi tibiis apice den-  
tato spinosis. Scaritis genere affinis.

*cornutus.* 13. T. thoracis marginibus crenatis angulisque pro-  
minulis, thorace bicorni.

Habitat Smirnae Dom. Drury.

Duplo major T. molitor. Antennae moniliformes. Caput cornubus duobus recurvis, apice refractis longitudine capitis, dente utrinque parvo ante oculos. Thorax submarginatus: margine crenato, antice retusus: angulis prominentibus. Elytra striata, picea. Femora antica crassiora tibiis apice lamina orbiculata, prominente.

14. T. ater antennis pedibusque sanguineis. . . . *sanguinipes*  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Duplo minor T. molitor. Caput obtusum, atrum, nitidum. Thorax ater, glaber, nitens. Elytra striata, atra. Pedes sanguinei, tibiis quatuor anticis extus ferratis.
15. T. niger subtus piceus elytris striatis. *mauritanicus*.  
Tenebrio mauritanicus alatus, niger, subtus *cus*.  
piceus, Thoracis marginibus antice posticeque dente angulatis. Linn. syst. nat. 2. 674. 4.  
Habitat in Americæ merid. Insulis Dr. Pflug.  
Parvus. Antennæ ferrugineæ. Caput & thorax atra, nitida, laevia, immaculata. Elytra striata, nigra, obscuriora. Corpus & pedes picea.
16. T. alatus ferrugineus elytris crenato striatis. *calinaris*.  
Linn. syst. nat. 2. 675. 5. Fn. Sv. 816.  
Habitat in Hispaniae Arena mobili Prof. Vahl.  
Distinctus clypeo emarginato elytrisque striatis.
17. T. pallide testaceus thorace transverso, elytris *pallens*.  
laevibus. Linn. syst. nat. 2. 874. 10. Fn. Sv. 8. 20.  
Habitat in Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Pedes pallidi, tibiis basi nigris.
18. T. pallide testaceus elytris striatis, ab domine *cadaverinus*.  
subtus nigricante.  
Habitat in Germaniae Cadaveribus Dom. Smidt.  
Reliquis brevior, & statura sere Chrysomelæ.  
Caput & thorax glabra, testacea, nitidula.

Elytra striata, paullo pallidiora. Abdomen nigrum. Pedes pallidi.

*villosum.* 19. *T. fuscus cinereo villosum elytris laevibus ferrugineis.*

Habitat in Europae quisquiliis.

Parvus. Antennae nigrae. Caput & thorax fusca, cinereo villosa. Elytra laevia, villosa, ferruginea.

*filiformis.* 20. *T. subfiliformis niger capite thoraceque elongatis cylindricis.*

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Parvus vix hujus generis videtur. Antennae breves, moniliformes. Palpi antici articulo ultimo, crassiori, obtuso truncato. Maxilla brevis, bifida. Caput grande, magnitudine thoracis, planum laevissime striatum. Thorax cylindricus, tenuis, laevissime striatus, niger. Elytra laevia, nigra. Pedes nigri.

16. TROGOSITA. *Palpi quatuor aequales: articulo ultimo truncato.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium corneum, bifidum: lacincis rotundatis ciliatis.*

*Antennae moniliformes: articulis tribus ultimis crassioribus, subcompressis.*

*cœrulea.* 1. *T. cœrulea nitida capite linea impressa.*

Trogosita cœrulea Oliv. Inf. 2. 19. 6. 1. t. 1. fig. 1.

Habitat in Galliae pane diutius affervato Mus. Dom. Olivier.

**Os maxillis palpisque.** Palpi quatuor aequales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulo ultimo subcrassiori, ovato, truncato, obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati: articulo ultimo obtuso, truncato adnati labii basi. Mandibula cornea, crassa, dentata, acuta. Maxilla membranacea, rotundata, medio unidentata. Labium breve, corneum, bifidum: laciinis aequalibus distantibus ciliatis.

Corpus sequente majus, totum coeruleum, nitidum, elytris subpunctatis.

**2. T. niger thorace ovali marginato, elytris striatis. *caraboides*.**

Trogosita mauritanica Oliv. Inf. 2. 19. 6. 2.  
tab. 1. fig. 2.

Tenebrio caraboides Mant. Inf. 1. 212. 19.

Tenebrio caraboides. Linn. syst. nat. 2. 677. 25.  
Fn. Sv. 825.

Carabus coadunatus. Degeer Inf. 4. 97. 7.  
tab. 3. fig. 13.

Platycerus fuscus elytris striatis. Geoff. Inf. 1. 64. 5.

Habitat in Europa.

**3. T. mandibulis tridentatis, corpore viridi aeneo. *virescens*.**

Trogosita virescens Oliv. Inf. 2. 19. 8. 5. t. 1. f. 5.

Lucanus virescens. Mant. Inf. 1. 2. 10.

Habitat in America.

Trogositae corpus elongatum, depresso, glabrum, immarginatum, capite ovato, canaliculato, oculis rotundatis in medio marginis, antennis ante oculos insertis, thorace ovato, plano, postice rotundato, scutello minuto, elytris rigidis, haud deflexis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, femoribus compressis, tibiis rotundatis, tarsis quinquearticulatis, colore plerumque nigro.

Mandibulae exsertae, tridentatae, capite breviores. Caput canaliculatum, virescens. Thorax & elytra laevia, glabra, viridia, obscure nitida. Corpus subtus obscurum.

- bidens.* 4. T. ater thorace ovali marginato, elytris striatis, tibiis anticis bidentatis.

Habitat in Gallia.

T. caraboides duplo major. Labium rotundatum, linea ante marginem impressa. Antennae breves: articulis utrinque prominulis. Thorax depresso, ovalis, ater, nitidus. Elytra punctato striata, atra. Pedes breves nigri tibiis anticis bidentatis.

- Thoracicus.* 5. T. ater glaber capite thorace pedibusque obscure rufis.

Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.

Statura & magnitudo omnino T. caraboides. Antennae nigrae. Caput & thorax laevia, glabra, obscure rufa. Elytra laevia, nigra: margine exteriori parum rufo.

- fulcata.* 6. T. brunnea thorace plano fulcato.

Ips fulcata Oliv. Inf. 4. 1. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Hujus generis mihi videtur. Antennae fere perfoliatae. Thorax planus fulcis sive striis indeterminatis abbreviatis exaratus. Elytra striata.

- ferruginea.* 7. T. ferruginea elytris striatis testaceis, clypeo integro.

Tenebrio ferrugineus. Mant. Inf. 1. 212. 17.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. Dom. Banks, in Americae Insulis Dr. Pflug.

Corpus parvum, depresso ferrugineum, elytra striata testacea.

17. HELOPS. *Palpi inaequales.**antici securiformes.**postici clavati.**Labium corneum, integrum.**Antennae filiformes.*

1. *H. niger thorace subquadrato laevi, elytris fulca-laminatus. tibiis anticis incurvis apice lamina ferruginea auctis.*

Tenebrio laminatus. Mant. Inf. I. 211. 1.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Maximus in hoc genere. Caput planum, laeve, nigrum. Thorax quadratus, laevis, niger, minime nitidus dorso parum impresso. Elytra sulcata, nigra, minime nitida. Pedes fabelongati, atri, nitidi tibiis incurvis, anticis apice lamina rotundata, villosa, ferruginea auctis.

Tarsi subtus basi ferrugineo villosi.

2. *H. niger thorace quadrato: marginibus subdenti-punctulatus culatis, elytris striato punctatis.*

Tenebrio punctulatus Mant. Inf. I. 211. 2.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Magnus. Thorax quadratus: lateribus dentibus tribus parvis armatus, laevis, niger: punctis duobus dorsalibus impressis. Elytra magis nitida punctis lineolisque parvis distinctis striata. Pedes atri tarsis subtus ferrugineo villosis.

---

Helops corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, capite ovato, obtuso, oculis oblongis, marginalibus, antennis sub ocalis insertis, thorace plano: marginibus rotundatis, scutello parvo, rotundato, elytris longitudine corporis, haud deflexis, rigidis, pedibus simplicibus, femoribus compressis, tibiis incurvis, tarsis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis, colore plerumque nigro obscuro.

- cœruleus.* 3. *H. cœrulescens thorace suborbiculato, elytris striatis.*  
 Tenebrio cœruleus Linn. syst. nat. 2. 677. 19.  
 Mus. Lud. Ulr. 98.  
 Petiv. Gazoph. tab. 22. fig. 6.  
 Habitat in Europa australiori.  
 Antennae pedesque nigrae.
- lanipes.* 4. *H. aeneus elytris striatis acuminatis.*  
 Tenebrio lanipes Linn. Mant. 1. 533.  
 Geoff. Inf. 1. 349. 5.  
 Habitat in Germania.  
 Antennae nigrae. Thorax quadratus.
- margina-*  
*tus.* 5. *H. ater coleoptrorum margine omni sanguineo.*  
 Habitat in Guinea Dom. Isert.  
 Statura & magnitudo omnino praecedentis. Antennae filiformes, nigrae. Caput glabrum, lœve, nigrum, nitidum, immaculatum. Elytra striata, nigra, cyaneo nitida, margine anteriore & extiore sanguineo. Pectus rufum. Abdomen nobis deest. Pedes nigri.
- aeruginofus.* 6. *H. viridi aeneus antennis elytris pedibusque nigris.*  
 Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Schulz.  
 Statura præcedentis. Antennae ferratae, extrorsum parum crassiores, nigrae. Caput & thorax glabra, viridi aenea, immaculata. Elytra crenato striata, nigra. Pedes nigri.
- bicolor.* 7. *H. supra obscure aeneus subtus ater, elytris striatis.*  
 Habitat in Americæ meridion. Insulis. D. Smidt.  
 Statura omnino praecedentium at duplo minor.  
 Caput cum antennis atrum. Thorax laevis, obscure aeneus. Elytra striata striis omnino laevibus, obtusis, obscure aeneis. Corpus atrum.
- serratus.* 8. *H. niger digitis ferrugineis, palpis porrectis.*  
 Chrysomela caraboides. Linn. syst. nat. 2. 602.  
 116. Fn. Sv. 574.

Tenebrio rufibarbis Schall. Act. Hall. I. 324.  
Habitat in Europa.

Corpus oblongum. Thorax planus puncto utrinque impresso. Elytra substriata, obtusa, aeneo colore tincta.

9. H. niger palpis porrectis pedibusque flavescentibus *barbatus.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Praecedente duplo minor. Caput, thorax, elytra striata, nigra, immaculata. Antennae fuscae, basi apiceque ferrugineae. Palpi porrecti, flavi. Pedes flavi.

10. H. niger thorace canaliculato utrinque impresso, *canaliculatus.*  
elytris striatis, palpis porrectis.

Tenebrio dubius Schall. Act. Hall. I. 326.

Habitat Halae Saxonum D. Schaller.

Statura omnino H. serrati totus niger. Thorax inaequalis, in medio canaliculatus, utrinque impressus. Elytra elevato striata. Pedes nigri tarsis piceis.

11. H. capite thoraceque cyaneis, elytris crenato *haemorrhoidalis.*  
striatis viridibus, ano rufo.

Habitat in India Mus. Britann.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax rotundatus, subpunctatus, cyaneus. Elytra crenato striata, obscure viridia, immaculata. Corpus viridiaeum, nitidum ano five abdominis ultimis segmentis rufis.

12. H. niger pedibus fuscis. *luridus.*

Tenebrio luridus Mant. Inf. I. 211. 5.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae. Caput & thorax obscure nigra, minime nitida thoracis basi puncto parvo utrinque impresso. Elytra striata. Pedes fusi.

- laevis.*      13. *H. niger thorace canaliculato postice attenuato, elytris laevibus.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura omnino praecedentis. Corpus nigrum, minime nitidum.
- vittiflris.*    14. *H. ater elytris fascia abbreviata aurea.*  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae nigrae articulis obconicis. Thorax rotundatus, gibbus, pubescens, ater, immaculatus. Elytra pubescentia, laevia, atra, ante medium fascia aurea, quae tamen suturam haud attingit. Pedes inermes, nigri.
- maurus.*       15. *H. ater thorace utrinque laevi rotundato, elytris excavato punctatis.*  
 Habitat in India orientali Mus. D. Lund.  
 Magnus. Caput atrum, laeve, clypeo rotundato, integra. Elytra connata punctis latis, distantibus, excavatis striata.
- morio.*        16. *H. ater thorace quadrato laevi, elytrorum sulcis punctatis.*  
 Habitat in America boreali.  
 Affinis *H. Nigrita* at paullo major & longior. Antennae apice submoniliformes articulo ultimo longiori, ovato. Thorax laevis, quadratus lateribus vix rotundatis. Elytra sulcata sulcis punctis impressis. Corpus subtus & pedes atra, nitida.
- nigrita.*       17. *H. ater thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato sulcatis.*  
 Habitat in America meridionali.  
 Corpus magnum, atrum, immaculatum. Antennae apice submoniliformes. Thorax glaber, laevis lateribus rotundatis anguloque postico acuto. Plantae subtus lana rufa.

18. *H. ovatus ater elytris striatis, antennis abdomi-* *plicicornis.*  
neque piceis.

Habitat in India orientali Dom. de Sehestedt.

Medius. Antennae filiformes, obscure piceae,  
Caput & thorax laevia, glabra, atra, immaculata. Elytra atra, obsoletius striata. Corpus atrum ab domine piceo.

19. *H. niger elytris antennis pedibusque rufis.* *rufipes.*

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Minor *H. lanipes.* Caput nigrum, obscurum antennis ferrugineis. Thorax niger, minime nitens postice utrinque punctis duobus impressis. Elytra striata, ferruginea. Corpus nigrum. Pedes ferruginei.

20. *H. niger elytris striatis, pedibus elongatis: tibiis longipes.*  
secundi paris barbatis.

Habitat in Africa æquinoctiali Dom. Banks.

Corpus magnum, gibbum, totum nigrum, obscurum. Thorax gibbus, laevis. Elytra striata. Pedes omnes elongati tibiis secundi paris pilis rufis barbatis.

Alium simillimum in Musaeo Dom. Hunter vidi tibiis omnibus laevibus.

21. *H. ater elytris striatis.* *ater.*

Pyrochroa nigra Degeer Inf. 4.

Habitat Lipsiae.

Thorax antice rotundatus, postice truncatus.  
Elytra striata striis laevibus.

22. *H. thorace antice rotundato niger elytris puncta-* *Pimelia.*

to striatis, antennis apice rufis.

Habitat in Anglia rarius.

Antennae apice moniliformes articulo ultimo ovato, rufo. Thorax antice rotundatus, postice truncatus.

- Hotten-* 23. *H. ater elytris striatis: striis crenatis.*  
*totta.* Habitat in Gallia.  
 Minor & alius. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Palpi securiformes. Elytrorum striae crenatae. Corpus atrum.
- dentipes.* 24. *H. ater elytris sulcato punctatis, femoribus anticis acute dentatis.*  
 Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks,  
 Statura H. atri at paullo minor. Caput & thorax laevia, atra, obscura. Elytra sulcata & in singulo sulco linea punctorum impressorum. Pedes nigri femoribus anticis medio anteriori acute dentatis.
- undatus.* 25. *H. ater thorace rufo: maculis, elytris rufis: fasciis undatis nigris.*  
 Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
 Statura omnino H. atri. Antennae breviores, filiformes, nigrae. Caput atrum. Thorax rufus margine tenuissime maculisque dorsalibus oblongis nigris: inter media majore fere vittam constitente. Elytra laevia, rufa: fasciis quatuor undatis nigris: prima baseos ferrata punctataque, 2. 3. in medio valde undatis, 4. apicis macula magna oblonga, ferruginea. Corpus atrum.
- quisquilius.* 26. *H. niger antennis pedibusque ferrugineis.*  
 Tenebrio quisquilius Linn. syst. nat. 2. 676. 3.  
 Fn. Sv. 821.  
 Habitat in Europae quisquiliis.  
 Duplo minorem e Cap. Bon. Spei misit Dom. Lund vix distinctum.
- flavipes.* 27. *H. fuscus ore antennis pedibusque ferrugineis, elytrorum striis crenatis.*  
 Habitat in Americae merid. Insul. Dom. Smidt.

Paullo minor H. quisquilio. Antennae filiformes, ferratae, ferrugineae. Caput fuscum ore palpisque ferrugineis. Thorax laevis, fuscus, obscurus. Elytra striata, nigra. Pedes ferruginei.

28. *H. ferrugineus* elytris striatis nigris. *ruficollis*.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura praecedentis. Caput obscurum antennis nigris. Corpus & thorax laevia, glabra, ferruginea, nitida.

29. *H coeruleus* thorace punctato, elytris striatis. *cyaneus*.

Habitat Hafniae Dom. de Sehestedt.

Parvus totus coeruleus, immaculatus. Elytra striato punctata. Pedes obscuriores.

### 18. MANTICORA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Labium* corneum, trifidum.

*Antennae* filiformes : articulis cylindricis.

- i. *Manticora*. *maxillofa*.

*Carabus tuberculatus* Degeer Inf. 7. 623. 10.

tab. 46. fig. 14.

*Cecindela gigantea* Thunb. nov. spec. 1. 25.  
tab. 1. fig. 38.

Herbst Arch. tab. 46. fig. 6.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Corpus magnum, atrum. Caput subglosum, utrinque impressum mandibulisque porrectis basi interiori dentatis. Thorax antice rotundatus, in medio impressus, postice elevatus margine rotundato, apice emarginato. Elytra connata, supra plana, scabra margine deflexo & linea laterali acutissima, ferrata. Pedes simplices nigri.

19. CARABUS. *Palpi sex: articulo ultimo obtuso, truncato.*

*Labium integrum, truncatum.*

*Antennae filiformes.*

*Thorace cordato.*

*maxillosus.* 1. C. apterus ater mandibulis exsertis longitudine capitis, thorace postice producto bilobo Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 90.

*Carabus maxillosus*, Thunb. sp. nov. Inf. 3. 69.

Voet. Coleopt. tab. 39. fig. 47. 48.

Herbst. Arch. tab. 47. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Maximus in hoc genere. Antennae nigrae apice fuscae. Caput exsertum fronte plana clypeoque rotundato, integro. Mandibulae exsertae, acutae, integrae. Thorax cordatus, marginatus dorso elevato, medio, concavo & postice producto lamellis duabus depresso, obtusis. Elytra glabra, atra, vix punctata.

*thoracicus.* 2. C. apterus ater thorace postice producto bilobō: lateribus elytrorumque marginibus albo villosis.

*Carabus thoracicus* Thunberg nov. Inf. spec. 3. 69. fig. 82.

Herbst. Arch. tab. 47. fig. 12.

Caraborum corpus agile, oblongum, glabrum, immarginatum, capite ovato, exerto, acutiusculo, oculis globosis, prominutis, lateralibus, antennis ante oculos insertis, thorace plano figura differente, scutello parvo, subrotundo, elytris longitudine abdominis, rigidis, haud deflexis, pedibus longioribus, cursoriis, femoribus compressis, tibiis rotundatis fetis rigidis intus ciliatis, anticis ante apicem spinosis, tarsis quinquearticulatis, colore saepius nigro aut aeneo.

- Habitat ad Cap. Bon. Spei.  
Praecedenti affinis videtur.
3. *C. apterus ater opacus elytris connatis: punctis coriaceus. intricatis subrugosis.* Linn. syst. nat. 2. 668. 1.  
Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 1.  
*Buprestis ater* Geoff. Inf. 1. 141. 1.  
Paykull Monogr. 1. 1.  
Degeer Inf. 4. 90. 4.  
Sulz. Inf. tab. 6. fig. 44.  
Schaeff. Icon. tab. 34. fig. 1. mas tab. 141,  
fig. 1. faem.  
Habitat in Europae nemoribus.
4. *C. apterus ater elytris laevissimis unicoloribus. glabratus.*  
*Carabus glabratus* Paykull Monogr. 14. 5.  
*Carabus convexus* Herbst. Arch. tab. 29. fig. 2.  
Habitat in Germania Dom. Smith.  
Statura *C. violacei* totus ater, nitidus, laevissimus.
5. *C. apterus niger thorace elytrorumque margini- violaceus.*  
bus violaceis, elytris laevibus.  
*Carabus violaceus.* Paykull Monogr. 12. 4.  
Linn. syst. nat. 2. 669. 8. Fn. Sv. 787.  
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 1. tab. 88. fig. 1.  
Frish. Inf. 13. tab. 23.  
Habitat in Europae sylvis.
6. *C. apterus ater thoracis elytrorumque margine purpureo- violaceo, elytris striatis.*  
Payk. Monogr. 13. 4.  
Schaeff. Icon. tab. 88. fig 1.  
Habitat in Germania Dr. Schulz.  
Magnus a *C. violaceo* omnino distinctus. Elytra  
haud connata at absque alis.
7. *C. apterus ater thoracis elytrorumque margine catenula- cyaneo, elytris striatis punctisque impressis triplici serie.*  
*Carabus catenulatus* Scop. carn.

- Carabus problematicus Herbst. Arch.  
 Habitat in Germania Dom. Helwig.  
 Nimiris praecedenti affinis at tamen distinctus vide-  
 tur corpore multo breviore & elytrorum punctis  
 impressis.
- carolinus.* 8. C. apterus ater thorace elytrisque laevissimis  
 viridiaeneis.  
 Habitat in Carolina meridionali Mus. Dom. Gy-  
 got d'Orcy.  
 Magnus. Caput atrum, postice aeneum. Tho-  
 rax cordatus, aeneus linea dorsali impressa.  
 Elytra laevissima, obscure aenea, immaculata.  
 Corpus & pedes atra.
- cyaneus.* 9. C. apterus niger violaceo nitens, elytris punctis  
 intricatis rugosis. Paykull Monogr. 10. 2.  
 Carabus intricatus Linn. Fn. Sv. 780.  
 Buprestis nigroviolaceus Geoff. Inf. 1. 144. 4.  
 Habitat in Europae sylvis.  
 Elytra haud connata at absque alis.
- hispanus.* 10. C. apterus niger thorace cordato cyaneo, elytris  
 rugosis aureis.  
 Habitat in Hispania Prof. Vahl.  
 Statura omnino praecedentis. Corpus atrum  
 thorace supra cyaneo. Elytra subrugosa, aurea  
 margine cyaneo. Pedes atri.
- monilis.* 11. C. apterus ater thorace cupreo, elytris striatis  
 viridi cupreis: striis tribus e punctis elevatis  
 oblongis.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Magnitudo C. hortensis. Caput obscure cupreum  
 ore antennisque atris. Thorax cordatus, cupreus.  
 Elytra dense striata, magis viridia, at striae tres-  
 haud continuae, sed interruptae, seu constant  
 potius e punctis elevatis oblongis. Puncta ideo  
 haud impressa, uti nudo oculo fere videntur.

12. *C. apterus niger elytris striatis: punctis aeneis gemmatus.*  
bilobis excavatis triplice serie.

*Carabus gemmatus* Paykull Monogr. 15. 6.

*Carabus striatus* Degeer Ins. 4. 90. 5. tab 3. fig. 1.

Habitat Hamburgi Mus. Dr. Schulz.

Distinctus punctis elytrorum bilobis.

13. *C. apterus niger elytris subrugosis: punctis exca-* *hortensis.*  
vatis aeneis triplici serie, margine cyaneo. Linn.

sys. nat. 2. 668. 3. Fn. Sv. 783.

*Carabus hortensis* Paykull Monogr. 16. 17.

*Carabus violaceus* Degeer Ins. 4. 89. 3.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 3.

Habitat in Europae hortis & sylvis.

Variat colore nigro & viridi aeneo.

14. *C. apterus ater elytris striatis: punctis exca-* *concolor.*  
vatis triplici serie.

Habitat in Germania, Holstia.

Minor *C. hortensi.* Caput atrum, cupro nitidum  
immaculatum. Thorax ater, cyaneo parum  
nitens. Elytra striata striis tribus parum altio-  
ribus: punctis concoloribus impresis. Cor-  
pus atrum.

15. *C. apterus capite thoraceque cupreis, elytris irregularis.*  
obscurioribus, margine punctisque excavatis  
triplici serie cupreis.

Habitat in truncis putridis Fagi. Dom. Helwig.

Statura omnino *C. hortensis* at distinctus videtur.

Antennae nigrae articulo primo ferrugineo.

Caput cupreum ore atro. Thorax cordatus,  
immaculatus. Elytra irregulariter punctata,  
obscura margine punctisque triplici serie cu-  
preis. Corpus atrum.

16. *C. apterus niger elytris sublaevibus fuscis: taedatus.*  
punctis excavatis triplici serie.

Habitat in America boreali Mus. D. Banks.

Elytra fusca sutura nigra.

- aruensis.* 17. C. apterus nigro cupreus elytris striatis punctis excavatis triplici serie.

Carabus aruensis Paykull Monogr. 21. 10.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Praecedente paullo minor. Corpus atrum, nitidum. Caput & thorax obscure cuprea. Elytra striata, obscuriora margine cupreo punctisque excavatis triplici serie.

- hungaricus.* 18. C. apterus ater elytris laevissimis: punctis triplici serie concoloribus.

Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

Statura omnino C. convexi at duplo fere major, Corpus totum atrum nullo modo margine cyaneo punctisque triplici serie.

- retusus.* 19. C. apterus elytris striatis virescentibus: punctis aeneis excavatis triplici serie basi retusis.

Habitat ad Pattagoniae littora Dom. Banks.

Summa affinitas C. hortensis. Antennae fuscae basi atrae. Caput virescens ore atro. Thorax cordatus, viridis basi utrinque impressus. Elytra crenato striata, viridia punctis aeneis excavatis triplici serie. Basis elytrorum retusa. Corpus atrum. Variat corpore supra nigro.

- Maderae.* 20. C. apterus ater elytris basi retusis.

Habitat in Madera Mus. Dom. Banks.

Summa affinitas praecedentis. Antennae nigrae, apice fuscae. Thorax cordatus basi utrinque impressus. Elytra vix striata punctisque triplici serie viridibus, minutissimis impressa. Basis elytrorum retusa. Pedes nigri.

21. *C. apterus convexus* ater lævis thorace postice *convexus*.  
emarginato.
- Carabus convexus* Paykull Monogr. 25. 15.
- Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 2.
- Habitat in Germania.
- Corpus C. glabrato duplo minus totum atrum,*  
læve.
22. *C. apterus elytris auratis sulcatis, antennis pedi- auratus.*  
busque rufis. Linn. syst. nat. 2. 669. 7.  
Fn. Sv. 786.
- Carabus auratus* Paykull Monogr. 23. 11.
- Degeer Inf. 4. 104. 1. tab. 17. fig. 20.
- Geoff. Inf. 1. 142. 2. tab. 2. fig. 5.
- Schaeff. Icon. tab. 202. fig. 4.
- Habitat in Europæ locis suffocatis.
23. *C. apterus supra æneus nitens elytrorum sutura splendens.*  
cuprea.
- Habitat in Jamaica Mus. Dom. Bosc.
- Magnus. Caput bisulcatum, æneum, nitidum ore  
antennis que atris. Thorax canaliculatus, æneus,  
nitidus, interdum cupreus. Elytra lævissima,  
ænea, nitidissima sutura cuprea. Corpus nigrum.
24. *C. apterus elytris porcatis scabris viridibus, fe- auronitens.*  
moribus rufis.
- Habitat in Saxonia Dom. Hybner.
- Medius quasi inter *C. auratum* & *nitentem*. Cum  
aurato omnino convenit magnitudine & statura,  
cum nitente elytrorum sulcis. Os & palpi nigra.  
Antennæ nigrae articulo primo tantum rufo.  
Caput & thorax cupro nitida. Elytra uti in *C.*  
*nitente viridia*, scabra, nitentia lineis tribus  
elevatis nigris, interiore longiore. Corpus ni-  
grum. Femora rufa tibiis piceis. Tarsi nigri.
25. *C. apterus elytris striatis viridibus: sutura aurea. futuralis.*  
Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.

Statura præcedentium. Antennæ fuscae basi ferrugineæ. Caput viride ore fusco. Thorax viridis margine aureo. Elytra substriata, viridia striis tribus fere obsoletis punctorum convexorum, ferrugineorum. Sutura aurea, nitens. Pectus virescens. Abdomen atrum. Pedes ferruginei plantis nigris.

- morbillosus.* 26. C. apterus thorace cupreo, elytris striatis cuperis: fulcis scabris punctisque elevatis longitudinalibus.

Habitat in Mauritania Dom. de Sehestedt.

Affinis certe C. granulato, cuius varietatem olim credidi at duplo major. Caput cum antennis nigrum. Thorax lineola baseos utrinque impressus. Elytrorum fulci scabri punctisque elevatis longitudinalibus. Corpus atrum.

- rugosus.* 27. C. apterus ater elytris striatis: striis rugosis punctisque interiectis elevatis longitudinalibus.

Habitat in Marocco Mus. D. de Sehestedt.

Affinis certe C. granulato at duplo major. Thorax cordatus, rugosus, totus ater. Elytra atra, striata at striae haud lœves uti in C. granulato, sed potius rugosae punctisque elevatis triplici serie. Corpus atrum nitidum.

- granulatus.* 28. C. apterus nigricans elytris æneis striatis interiectis punctis elevatis longitudinalibus. Linn. syst. nat. 2. 668. 2. Fn. Sv. 789. Geoff. Inf. 1.

143. 3.

Carabus granulatus Paykull Monogr. 19. 9.

Degeer Inf. 4. 88. 4.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 6. & tab. 156. fig. 1.

Sulz. Hist. tab. 7. fig. 2.

Habitat in Europæ arvis.

Antennarum primus articulus rufus. Variat rarius totus nigricans.

- 29.** *C. apterus nigricans elytris æneis striatis interiectis punctis excavatis cupreis.* Linn. syst. nat. 2. 669. 5. Fn. Sv. 782. Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 13.  
*Carabus clathratus* Paykull Monogr. 18. 8.  
*Degeer Inf. 4. 87. 1. tab. 3. fig. 12.*  
*Habitat in Europæ arvis.*  
*Diffr. manifeste a præcedente elytris striatis & inter striae puncta elevata longitudinalia, & inter hæc puncta excavata, cuprea.*
- 30.** *C. apterus elytris porcatis scabris viridibus: nitens.*  
*margine aureo, pedibus nigris.* Linn. syst. nat. 2. 669. 6. Fn. Sv. 185.  
*Carabus nitens* Paykull Monogr. 24. 12.  
*Carabus aureus* Degeer Inf. 4. 94. 9.  
*Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 1.*  
*Sulz. Hist. tab. 7. fig. 3.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*
- 31.** *C. apterus elytris lævibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo.*  
*Tenebrio rostratus* Linn. syst. nat. 2. 577. 20.  
*Fn. Sv. 823.*  
*Carabus rostratus* Paykull Monogr. 26. 14.  
*Carabus coadunatus* Degeer Insect. 4. 92. 7.  
*tab. 3. fig. 13.*  
*Habitat in Europæ sylvis.*  
*Hujus generis at elytra deflexa uti in Tenebrionibus.*
- 32.** *C. apterus niger elytris subcupreis: punctis artenuatus.*  
*elevatis triplici serie, thorace angustiore, capite angustissimo.*  
*Habitat in Germania Dom. Helwig.*  
*Nimis C. rostrato affinis.* Diffr. tamen paulo,  
*minor thorace adhuc angustiore posticeque*

magis rotundato & elytris cupro nitidis, striatis punctisque elevatis triplici serie.

- elevatus.* 33. C. apterus thoracis margine reflexo, elytris violaceis, corpore atro.

Habitat in America merid. Mus. Dr. Hunter.  
Statura praecedentis. Caput porrectum, tenue, atrum, nitidum, immaculatum. Thorax fuscus margin'e elevato, reflexo. Elytra striata, violacea, nitida. Corpus atrum.

- unicolor.* 34. C. apterus thoracis margine reflexo, corpore atro, elytris striatis.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Præcedenti affinis at major. Caput exsertum, angustum mandibulis prominentibus. Thorax niger, subcordatus margine reflexo. Elytra striata, nigra.

- attelaboides* 35. C. apterus ater thorace subcordato angustiori, capite postice attenuato, elytris sulcatis truncatis.

Habitat in India Mus. Dom. Banks.

Caput porrectum atrum oculis testaceis antice subretusum, postice attenuatum. Thorax angustus, parum marginatus, punctatus, ater. Elytra sulcis novem æqualibus exarata, atra, immaculata, postice truncata, integra. Corpus nigrum.

- leucophtal-* 36. C. apterus ater elytris striatis, thorace lineolis baseos impressis. Linn. syst. nat. 2. 668. 4.

Fn. Sv. 784.

Carabus leucophtalmus Payk. Monog. 29. 16.

Geoff. Inf. 1. 146. 7.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Europæ quisquiliis.

Magnitude valde variat.

37. *C. alatus depressus ater elytris substriatis.* *planus.*  
*Carabus spiniger* Payk. Monogr. 45. 25.  
*Carabus nigro striatus alatus totus niger nitidus,*  
*elytris striatis* Dégeer Inf. 4. 96. 12.  
*Habitat in Germaniae sylvis.*  
*Paullo major C. leucophtalmo. Corpus totum*  
*atrum, immaculatum. Thorax cordatus om-*  
*nino laevis lineolis nullis baseos impressis.*  
*Elytra leviter striata.*
38. *C. alatus niger thoracis basi utrinque puncto striatulus.*  
*impresso, elytris striatis medio glabris.*  
*Habitat ad Patagoniae littora Mus. Dom. Banks.*  
*Caput atrum, nitidum utrinque lineola parya supra*  
*os impressum. Thorax cordatus puncto utrin-*  
*que impresso. Elytra striata striis mediis sensim*  
*abbreviatis unde discus glaber evadit.*
39. *C. alatus pallidus coleoptris maculis dorsalibus arenarius.*  
*duabus atris.*  
*Habitat in Arena mobili Cambriae Dom. Banks.*  
*Maxillae exsertae, pallidae, apice nigrae. Caput*  
*pallidum oculis testaceis. Thorax pallidus.*  
*Elytra striata, pallida maculis duabus commu-*  
*nibus, angulatis, atris. Pedes pallidi.*
40. *C. alatus pallidus capite coleoptrorumque ma-* *fabulosus.*  
*cula dorsali nigra.*  
*Carabus lividus thorace pedibusque ferrugineis,*  
*elytris nigris: lateribus lividis Linn. syst. nat.*  
*2. 670. 15. Fn. Sv. 791.*  
*Carabus fabulosus* Payk. Monog. 48. 28.  
*Habitat in Saxoniae fabuletis Dom. Romanus.*  
*Affinis praecedenti. Caput atrum, nitidum man-*  
*dibulis pallidis apice nigris. Antennae pallidae.*  
*Elytra striata, pallida macula magna communi*  
*nigra a basi ultra medium ducta. Corpus nigri-*  
*cans. Pedes pallidi.*

- lateralis.* 41. *C. alatus niger thorace elytrorumque margine ferrugineis.*  
*Habitat in Europae sylvis Dom. Daldorf.*  
*Præcedenti nimis affinis. Pedes ferruginei femoribus nigris.*
- ruficornis.* 42. *C. alatus ater elytris sulcatis subtomentosis, antennis pedibusque rufis.*  
*Carabus ruficornis Payk. 121. 74.*  
*Geoff. Inf. 1. 146. 8.*  
*Lister. Scarab. Angl. 390. 24.*  
*Habitat frequens in Europae sylvis.*  
*Similis *C. leucophtalmo.* Elytra interdum colore fugaci aureo nitens.*  
*Conf. *Carabus pubescens* Myll. Zool. Dan. vix distinctus, quamvis minor.*
- fulvipes.* 43. *C. alatus ater thorace canaliculato, elytris striatis lœvibus, antennis pedibusque rufis.*  
*Habitat in Germaniae sylvis Dom. Smidt.*  
*Nimis præcedenti affinis at duplo minor. Caput atrum, nitidum antennis palpisque rufis. Thorax cordatus, canaliculatus puncto baseos utrinque impresso, ater, nitidus. Elytra nullo modo tomentosa, striata, nigra, obscuriora. Corpus atrum, nitidum pedibus rufis.*
- picicornis.* 44. *C. alatus ater capite antennis pedibusque rufis.*  
*Habitat in Italia Dom. Allioni.*  
*Statura & magnitudo omnino sequentis. Caput obscure rufum, immaculatum. Antennae rufae apice cinerascentes. Thorax cordatus, marginatus, in medio canaliculatus, niger. Elytra striata, nigra. Corpus nigrum abdominis apice pedibusque rufis.*
- flavicornis.* 45. *C. alatus niger thoracis margine, antennis pedibusque flavescentibus.*

*Carabus flavigornis* Payk. Monog. 47. 27.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput atrum antennis flavescensibus.

Thorax cordatus, ater margine flavo. Elytra striata, nigra in altero sexu ad futuram rufa.

Pedes flavescens.

46. *C. alatus thorace canaliculato utrinque bistriato, piceus,*  
antennis tibiis que piceis Linn. syst. nat. 2.

672. 30.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 9.

Habitat in Europae sylvis.

Magnitudo omnino *C. flavigornis* at pedes haud rufi sed picei femoribus nigris. Elytra striata.

47. *C. alatus capite thoraceque aeneis, elytris stria- femoralis.*  
tis obscurioribus, femoribus rufis.

Habitat in Sierra Leon Africæ Mus. D. Banks.

Magnitudo *C. ruficornis*. Caput aeneum, nitidum antennis fuscis articulo primo rufo. Thorax aeneus, nitidus lineola baseos utrinque impresus. Elytra striata, nigra, aeneo splendentia. Corpus atrum femoribus rufis.

48. *C. alatus thorace postice utrinque impresso niger, madidus.*  
femoribus rufis.

*Carabus madidus* Payk. Monog. 28. 15.

Habitat in Angliae nemoribus.

Corpus atrum quasi humore inunctum. Antennæ apice fuscescentes. Thorax basi puncto majori utrinque excavatus. Abdomen obtusum.

Variat femoribus nigris an distinctus?

49. *C. alatus ater nitidus elytrorum striis laevibus, terricola.*  
antennarum apice pedibusque rufis. Paykull  
Monog. 31. 17.

Habitat in Germania sub lapidibus.

Minor *C. madido*. Caput atrum palpis antennarumque apice rufis. Thorax cordatus, canali-

culatus lineolaque baseos utrinque impressus.  
Elytra striata. Pedes rufi.

*americanus*. 50. C. alatus niger thorace antennis pedibusque ferrugineis.

Degeer Inf. 4. 107. 3. tab. 17. fig. 21.

Habitat in America.

Affinis C. crepitanti at quadruplo major & caput nigrum.

*Janus*. 51. C. alatus thorace ferrugineo, elytris cyaneis.

Carabus bicolor Oliv. Inf.

Habitat in Carolina D. Gigot d'Orcy.

Statura C. fumans. Antennae villosae, nigrae primo articulo rufo. Caput porrectum, cylindricum, fuscum. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

*fumans*. 52. C. alatus ferrugineus elytris nigro cyaneis.

Habitat in America Mus. Dom. Blackburn.

Affinis C. crepitanti at duplo major & totus ferrugineus elytris solis cyaneis.

*crepitans*. 53. C. alatus capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris. Linn. syst. nat. 2. 67 I. 18. Fn. Sv. 272. Geoff. Inf. 1. 151. 19.

Carabus crepitans Payk. Monog. 107. 66.

Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 13.

Degeer Inf. 4. 103. 22. tab. 3. fig. 18.

Habitat in Europae nemoribus.

Terrefactus crepitu ani hostem pellere tentat.

Varietatem duplo minorem e Germania misit Dom. Smidt.

*sclopeta*. 54. C. ferrugineus elytris cyaneis sutura basi ferruginea.

Habitat frequens Parisiis sub lapidibus.

—  
Triplo minor C. crepetans omnino ferrugineus  
elytris substriatis, cyaneis, nitidis sutura basi  
ferruginea.

Variat rarius elytrorum sutura concolore.

55. C. alatus cyaneus ore antennis tibiisque rufis. *spinibarbis*  
Habitat in Anglia Dom. Lee.  
Caput prominens ore antennisque rufis.

56. C. alatus nigro coerulescens elytris striatis : *aeneocephalus.*  
macula postica rufa.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Statura praecedentium. Caput viridi aeneum,  
nitidum. Antennae nigrae articulo primo rufo.  
Thorax cordatus, punctatus, viridi aeneus li-  
neola baseos utrinque impressa. Elytra striata,  
obscura macula magna ante apicem rufa. Pedes  
flavescentes.

57. C. alatus ater elytris striatis : macula baseos *humeralis.*  
pedibusque rufis.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Medius inter minores. Caput atrum antennis  
palpisque rufis. Thorax omnino cordatus, ca-  
naliculatus, ater, nitidus margine parum ru-  
fescente. Elytra striata, atra macula marginali  
baseos rufa. Corpus nigrum abdomine rufo  
lateribus nigris. Pedes rufi.

58. C. alatus viridi aeneus elytris maculis duabus *trilobus.*  
albis, antennis pedibusque flavis.

Habitat in Aquapim Guineae Dom. Isert.

Statura & magnitudo C. cuprei. Caput viridi  
aeneum ore antennis que flavescentibus. Tho-  
rax cordatus, marginatus, in medio canalicu-  
latus, aeneus, immaculatus. Elytra striata,  
aenea maculis duabus flavis: posteriore majore  
triloba. Subtus niger pedibus flavis.

- multipunctatus.* 59. *C. alatus subaenius elytris punctis vagis plurimis impressis* Linn. syst. nat. 2. 6-2. 32. Fn. Sv. 805.  
*Carabus multipunctatus* Payk. Monog. 49. 29.  
*Habitat in Europae sylvis.*
- oblongo-punctatus.* 60. *C. alatus niger elytris striatis: punctis dorsalibus plurimis impressis.*  
*Carabus oblongo punctatus* Payk. Mon. 55. 33.  
*Habitat Havniae Dom. Lund.*  
*Medius ater. Elytra obscuriora, striata punctis plurimis, dorsalibus, impressis. Margo exterior itidem punctatus.*
- cinctus.* 61. *C. alatus fuscus capite thoraceque viridi aeneis, elytrorum margine pedibusque pallidis.*  
*Carabus cinctus* Herbst Arch. tab. 29. fig. 7.  
*Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.*  
*Major C. marginato. Elytra striata, obscuriora, attamen viridia margine versus apicem incrassato pallido. Corpus fuscum abdominis margine pallido. Pedes pallidi. Duplo minorem at similimum e Germania misit Dom. Smidt.*
- rufipes.* 62. *C. alatus ater antennis pedibus elytrorumque margine rufis.*  
*Habitat — — Mus. Dom. Lund.*  
*Medius. Caput thorax elytraque striata, nigra, opaca, minime nitida. Stria rufa in margine deflexo elytrorum. Corpus nigrum. Antennae & pedes rufae.*
- nitidulus.* 63. *C. alatus niger elytrorum margine aeneo nitido.*  
*Habitat in Kamtschatka Mus. Dom. Banks.*  
*Statura & magnitudo C. cuprei. Caput & thorax nigra, cupro colore nitentia. Elytra striata striis alternis punctatis, ad suturam nigra, in medio longitudinaliter cuprea & a medio ad marginem aenea, nitida. Pedes nigri.*

64. C. alatus ater elytris striatis: lunula baseos pedibusque ferrugineis. *Dianat.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput laeve, atrum, nitidum antennis ferrugineis. Thorax cordatus, canaliculatus, ater margine parum rufescente. Elytra striata, atra macula lunata baseos ferruginea. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

65. C. alatus thorace ferrugineo, elytris truncatis *ruficollis.*  
striatis viridibus, capite plano atro.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Medius. Antennae nigrae apice fuscae. Caput planum atrum. Thorax elongatus, cordatus, subcanaliculatus, ferrugineus. Elytra striata, truncata, viridia, nitida. Abdomen atrum ano ferrugineo. Pedes nigri femoribus basi rufis.

66. C. alatus thorace rufo, coleoptris fuscis: maculis *olens.*  
tribus rufis.

Carabus olens Ross. Fn. Etr. tab. 5. fig. 2.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Cicindelis affinis videtur. Corpus medium, elongatum, depresso vix hujus generis. Antennae ferrugineae articulo primo longiori, incurvo, extrosum crassiori. Caput atrum, glabrum, nitidum ore ferrugineo. Thorax cordatus, tenuis, laevis, ferrugineus. Coleoptra vix striata, fusca maculis duabus magnis baseos minorique apicis communi ferrugineis. Pedes rufi.

67. C. alatus rufus elytris abdomineque nigris Payk. *agilis.*  
Monogr. 102. 64.

Habitat Upsaliae Dom. de Paykull.

Capitis vertex niger. Elytra truncata.

68. C. alatus thorace rufo, coleoptris flavescentibus: *fasciatus.*  
fascia communi nigra.

*Carabus fasciatus* Payk. Monog. 97. 60.

Habitat primo vere sub foliis putrescentibus Sveciae Dom. de Paykull.

Statura omnino C. Andreeae at minor et thorax rufus. Pedes rufi.

*atricapillus*. 69. C. alatus thorace rufo, elytris obtusis testaceis, capite atro Linn. syst. nat. 2. 673. 42.

Habitat in Europa.

Variat frequens elytrorum margine nigro.

Varietas C. agilis teste de Paykull.

*4pusflulatus*. 70. C. alatus flavus elytris fuscis: maculis duabus flavis.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. D. Banks.

Parvus. Antennæ fuscae. Thorax cordatus, flavus linea dorsali impressa. Elytra substriata, truncata, fusca maculis duabus flavis, altera baseos, altera versus apicem.

*oblongus*. 71. C. alatus ater thorace oblongo, elytris striatis fuscis, antennis pedibusque flavis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Parvus. Caput atrum, nitidum antennis palpisque flavis. Thorax oblongus, canaliculatus, ater, nitidus. Elytra crenato striata, fusca. Abdomen piceum. Pedes flavi.

*oblongus*. 72. C. alatus nigricans antennis pedibusque pallidis.

Habitat in Germania Mus. D. Lund.

Parvus. Caput nigrum palpis antennisque pallidis. Thorax cordatus, nigricans, nitidus, immaculatus. Elytra striata. Pedes pallidi.

*rubens*. 73. C. alatus thorace ferrugineo, elytris rotundatis testaceis, capite fusco.

Habitat Kiliae.

Affinis C. atricapillo, at caput fuscum & elytra striata apice rotundata, testacea, immaculata.

= = =

*\*\* Thorace postice angustato.*

74. *C. apterus ater coleoptris novem sulcatis punctis- 10 guttatus.*  
 que decem albis Linn. syst. nat. 2. 669. 10.  
 Mus. Lud. Ulr. 96. Oliv. Inf. 35. t. 9. fig. 15. C.  
*Carabus alboguttatus* Degeer Inf. 7. 624. 21,  
 tab. 46. fig. 15.  
 Wulf. Inf. Capens. tab. 1. fig. 13.  
 Habitat in Africa.
75. *C. apterus niger elytris lœvibus : punctis duo- 6 guttatus.*  
 bus griseis Oliv. Inf. 35. tab. 1. fig. 6.  
*C. 6 guttatus* Thunb. nov. sp. 3. 70. fig. 84.  
 Habitat in India Mus. Dom. Banks.  
 Magnus. *Clypeus quadratus, integer. Maxillæ porrectæ, arcuatae, acutæ. Thorax postice attenuatus, niger utrinque puncto magno griseo, piloso. Elytra connata, laevissima, nigra punctis duobus magnis pilosis, griseis. Pedes nigri.*
76. *C. apterus ater elytris lœvibus : macula baseos Venator.*  
 grisea.  
 Carabus Oliv. Inf. 35. tab. 10  
 Habitat Senegal Mus. D. Olivier.  
 Reliquis fere major. Caput porrectum, grande fronte utrinque impressa. Thorax postice angustatus margine acuto. Elytra glabra, lœvia macula magna baseos griseo villosa.
77. *C. apterus ater thoracis margine albo, elytris sulcatus.*  
 sulcatis: margine maculisque tribus albis.  
 Carabus sulcatus Oliv. Inf. 35. tab. 8. fig. 97.  
 Habitat in Senegal D. Olivier.  
 Statura praecedentium. Elytra lineola parva baseos obliqua puncto ante medium, pone medium apicisque albis.
78. *C. apterus ater thoracis margine albo, elytris 6 macula-*  
*substriatis: maculis tribus albis.* *tus.*  
 Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

C. 6 guttato duplo sere minor. Antennae nigrae supra villoso abbidae. Thorax ater, medio canaliculatus, margine laterali albo in medio interrupo. Elytra substriata macula magna baseos, altera pone medium paullo minore, & tertia ad apicem villoso albis. Margo ante apicem itidem albus.

*Nimrod.*

79. C. apterus ater elytris fulcatis: maculis duabus griseis remotis.

Carabus Oliv. Inf. 35. tab. 10.

Habitat in Senegalia Mus. D. Olivier.

Statura magna praecedentium. Corpus atrum.

Thorax immaculatus. Elytra fulcata sulcis levibus maculisque duabus griseis villosis, altera ad basin, altera ad apicem.

4 *guttatus*. 80. C. apterus niger elytris fulcatis: maculis duabus griseis remotis Oliv. Inf. 35. tab. 2. fig. 15. A.

Herbst Arch. tab. 29. fig. 1.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Frons sulcis duobus impressa. Thorax canaliculatus, submarginatus, niger tuberculis duobus magnis piceis, & puncto parvo griseo utrinque ad marginem anticum. Elytra connata, sulcata, lineis elevatis, carinatis, atra maculis duabus parvis, griseis, altera ad basin, altera ad apicem. Variat rarius elytrorum sulcis rufo villosis punctisque tribus griseis.

*tabidus.*

81. C. apterus ater elytris rugoso fulcatis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Duplo minor praecedente. Frons utrinque sulcata. Thorax lineis duabus dorsalibus, elevatis, quae tamen marginem anticum haud attingunt. Elytra connata, sulcata sulcis rugosis, atra postice ad futuram subacuminata. Corpus atrum.

32. *C. apterus elytris planis lœvibus : margine sinuato variegatus.*  
*punctisque disci albis.*  
*Cicindela Forsk. Icon. tab. 24. fig. A.*  
*Habitat in Oriente Mus. Dom. Lund.*  
*Oculi testacei. Thorax margine laterali albido.*  
*Elytra connata, plana, lœvia margine bis*  
*sinuato albo. Indisco præterea puncta quinque*  
*alba. Corpus atrum.*
33. *C. apterus thorace margine albo, elytris margine exclama-*  
*stria lineola punctoque medio albis. tionis.*  
*Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.*  
*Affinis certe C. trilineato at differt magnitudine*  
*majore, margine thoracis exteriori tantum albo*  
*elytrisque planis atris margine exteriori, stria*  
*integra ad futuram, lineola baseos in medio &*  
*pone hanc puncto albis. Corpus atrum.*
34. *C. apterus ater thoracis marginibus albis, ely- trilinatus.*  
*tris albidis : futura lineaque atris.*  
*Carabus lineatus Thunb. nov. Sp. 3. 71. fig. 85.*  
*Herbst Arch. tab. 47. fig. 6.*  
*Habitat in Germania Mus. Dom. Banks.*  
*Caput interdum immaculatum, interdum lineolis*  
*duabus albidis. Thorax ater lateribus late villoso*  
*albidis. Elytra albida futura tota lineaque me-*  
*dia atris, quarum ultima nec basin nec apicem*  
*atttingit. Corpus atrum.*
35. *C. alatus ater lœvissimus thorace convexo Linn. cephalotes,*  
*syft. nat. 2. 669. 9. Fn. Sv. 688. Paykull*  
*Monog. 105. 65.*  
*Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 1.*  
*Frisch. Inf. 13. tab. 22.*  
*Habitat in Europæ suffocatis.*
36. *C. alatus depresso ater thorace elytrisque lae- laevigatus,*  
*vissimis.*  
*Habitat in Coromandel Dom. Banks.*

Corpus majusculum, at præcedentibus magis planum, læve, glabrum, atrum, immaculatum.

*interruptus*. 87. C. alatus ater thorace elytrisque remotis.

Scarites clypeatus Ross. Fn. Etr. 228. 57<sup>o</sup>.

Herbst Arch. tab. 29. fig. 4.

Habitat in Oriente Dom. Forstkahl.

Corpus totum atrum. Caput latitudine thoracis.

Thorax antice emarginatus postice angustatus, rotundatus, ab abdomen remotus. Elytra striata.

*tricuspidata*- 88. C. alatus niger antennis pedibusque ferrugineis, clypeo tricuspidato.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Medius. Palpi filiformes antennaeque ferrugineae. Mandibulae arcuatae, inermes. Caput punctatum, atrum clypeo porrecto, tricuspidato. Thorax punctatus, pilosus, ater postice angustatus. Elytra crenato striata. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

*calydonius*. 89. C. alatus capitis cornu porrecto obtuso, mandibulis cornutis.

Scarites calydonius Ross. Fn. Etr. tab. 8. fig. 8. 9.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Caput magnum antice cornu magno, compresso, obtuso. Mandibulae dente valido, recurvo, corniformi. Elytra striata striis punctatis. Corpus nigrum.

*complana*- 90. C. alatus flavescens elytris fasciis duabus nigris. Linn. syst. nat. 2. 671. 17.

Habitat in Insula St. Domingo.

Caput prominens cum antennis rufum. Thorax canaliculatus, rufus, immaculatus. Elytra striata, truncata, rufa fasciis duabus magnis undatis, nigris.

91. C. alatus niger capite elytrisque truncatis: *bimacula-*  
*puncto baseos fasciaque media ferrugineis.* *tus.*  
 Linn. Mant. 532.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 5.

Habitat in India orientali.

Thorax colore variat, mox flavus, mox niger,  
 mox maculatus.

92. C. alatus niger elytris maculis duabus pedibus- *tripustula-*  
*que flavis.* *tus.*

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo omnino praecedentis, cu-  
 jus forte mera varietas. Caput planum, laeve,  
 nigrum ore testaceo. Thorax planus, laevis,  
 niger, immaculatus. Elytra striata, nigra ma-  
 culis duabus magnis flavis, anteriore distincta  
 posteriore apicis communi. Pedes flavi tibiis  
 anticis unidentatis.

93. C. rufus elytris nigris: punctis tribus rubris. *6 pustula-*  
 Habitat in India orientali Dom. Edler. *tus.*

Caput & thorax rufa. Elytra striata, nigra  
 punctis tribus rufis, quorum ultimum in apice  
 lunatum. Abdomen rufum margine nigro.  
 Pedes rufi.

\*\*\* *Thorace quadrato.*

94. C. apterus ater elytris punctis variolosis im- *variolosus,*  
 pressis.

Habitat in Transsylvania Dom. Saldoner.

Magnus, totus ater. Antennae nigrae, apice  
 fuscae. Thorax marginatus, planus, subquadra-  
 tus. Elytra connata punctis magnis variolosis  
 sparsis hinc inde confluentibus impressus. Cor-  
 pus atrum.

*striola.*

95. *C. apterus depresso ater thorace lineis utrinque duabus baseos impressis, elytris striatis.*

*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*

*Affinis C. leucophtalmo at magis depresso latior, totus ater, immaculatus, postice utrinque lineolis duabus impressis. Elytra striata postice latiora.*

*metallicus.*

96. *C. apterus niger thorace lineolis baseos utrinque impressis, thorace elytrisque æneis.*

*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*

*Praecedente paullo minor, Caput atrum palpis subferrugineis. Thorax aeneus, nitens, quadratus in medio canaliculatus basi utrinque lineolis duabus impressis. Elytra vix striata, ænea, nitida. Corpus nigrum. Variat thorace obscuriore elytrisque cupreis.*

*politus.*

97. *C. alatus ater nitidus elytris striatis, antennis rufis.*

*Habitat in India orientali Dom. Lund.*

*Statura & magnitudo omnino C. leucophtalmi. Antennæ rufae primo articulo nigro. Caput magnum, exsertum, atrum, nitidum labio cordato maxillisque validis apice incrassatis. Thorax quadratus, canaliculatus, basi utrinque impensus, ater, nitidus. Corpus atrum.*

\*\*\*\* *Thorace rotundato margine prominulo obtuso.*

*alternans.*

98. *C. apterus niger elytris reticulato striatis: striis alternis latioribus punctisque elevatis æneis triplici serie apice retusis.*

*Habitat in Americae Insulis.*

*Summa affinitas C. calidi at aliis & distinctus.*

*Antennæ nigrae, apice cinereae. Caput magnum, atrum oculis globosis, prominulis, testaceis. Thorax ater, immaculatus. Elytra profun-*

dius striata striisque minoribus transversis reticulata. Striae longitudinales alternatim latiores & praeterea striae tres punctorum aeneorum, oblongorum, elevatorum. Pedes atri.

99. *C. apterus niger elytris crenato striatis: striis calidus.*  
aequalibus punctisque aureis excavatis triplici serie.

Habitat in Americae Insulis Dom. von Rohr.  
Antennae apice rufescentes. Elytra striis elevatis, crenatis punctoque aureo solitario utrinque ad basin suturae.

100. *C. apterus ater thorace puncto baseos utrinque sericeus.*  
impresso, elytris substriatis punctisque aeneis triplici serie.

Habitat in Germaniae fabuletis Dom. Smidt.  
Statura et magnitudo omnino C. calidi at tamen distinctus videtur. Antennae nigrae, apice fuscae. Caput atrum. Thorax niger marginibus rotundatis punctisque duobus baseos impressis. Elytra striata punctisque aeneis triplici serie. Corpus atrum.

101. *C. apterus ater elytris striatis apice granulatis, porcatus.*  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Medius. Elytra nigra, striata striis ad marginem exteriorem apicemque granulis elevatis, oblongis, interruptis. Corpus atrum nitidum.

102. *C. apterus ater elytris sulcatis: maculis duabus flavis reflexus.*

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Caput atrum, utrinque impressum. Thorax inaequaliter punctatus margine rotundato, parum reflexo. Elytra connata sulcis octo exarata, atra maculis duabus transversis flavis. Pedes nigri.

*angulatus.* 103. C. apterus hirtus ater thorace canaliculato,  
coleoptris sulcatis: fasciis duabus flavis in-  
terruptis.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Thorax vix marginatus,  
canaliculatus. Coleoptrorum maculae majores  
fascias in medio interruptas constituunt. Pedes  
nigri.

*cassideus.* 104. C. apterus ater thorace marginato, elytris lae-  
vibus.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Minor inter majores. Palpi obtusi, truncati &  
fere securiformes. Caput atrum, nitidum. Tho-  
rax rotundatus, valde marginatus postice late  
emarginatus, subpunctatus. Elytra subtilissime  
punctata, apice parum emarginata. Corpus  
atrum tibiis posticis ferratis.

*filphoides.* 105. C. apterus ater thorace marginato, elytris  
punctato striatis punctisque impressis majo-  
ribus.

Carabus filphoides Ross. Fn. Etr. 215. t. 1. f. 7.

Habitat in Gallia, Italia Mus. D. Bosc.

Statura praecedentis. Caput magnum, atrum.  
Thorax planus rotundatus, marginatus, pun-  
ctatus, subcanaliculatus. Elytra lineis elevatis  
obsoletis punctisque majoribus impressis stria-  
ta, quae utrinque punctis minoribus includun-  
tur apice subemarginata.

*globosus.* 106. C. apterus ater thorace convexo, elytris striatis.  
Habitat in Marocco Dom. de Sehestedt.

Antennae nigrae apice piceae. Caput atrum  
nitidum antice lineolis duabus abbreviatis im-  
pressum. Thorax canaliculatus, glaber, ater,  
nitidus. Elytra striata. Corpus atrum.

107. C. apterus ater elytris laevissimis punctis: aeneis *indagator.*  
triplici serie.

Carabus auropunctatus Payk. Monog. 68. 41?

Habitat in Barbaria Prof. Vahl.

Statura magna, brevis, lata, C. sycophanti.

Elytra brevia, atra punctis aeneis triplici serie.

Margo concolor.

108. C. alatus violaceo nitens elytris striatis aureis *sycophanta*  
Linn. syst. nat. 2. 670. 12.

Mus. Lud. Ulr. 95. Fn. Sv. 790.

Geoff. Inf. 1. 144. 5.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 6.

Reaum. Inf. 2. tab. 37. fig. 18.

Sulz. Hist. Inf. 17. fig. 1.

Carabus sycophanta Payk. Monog. 63. 36.

Degeer Inf. 4. 105. 2. tab. 17. fig. 19.

Habitat in Europae sylvis.

Elytrorum striae crenatae.

Larva nigra vixitat larvis Phalaenarum.

109. C. alatus elytris striatis viridi aeneis: punctis *inquisitor.*  
triplici ordine Linn. syst. nat. 2. 669. 11.  
Fn. Sv. 789.

Carabus inquisitor Payk. Monog. 65. 39.

Geoff. Inf. 1. 145. 6.

Degeer Inf. 4. 94. 9.

Bergstræff. nomencl. 1. tab. 12. fig. 3.

Habitat in Europae sylvis.

Variat elytris aeneis & nigris.

110. C. alatus elytris striatis viridibus: punctis tri- *scrutator.*  
plici serie, thorace cyaneo: margine reflexo  
aurato.

Habitat in Virginia Mus. Dom. Banks.

Simillimus praecedenti. Thorax violaceus marginé subreflexo, aureo. Elytrorum margo aureus. Abdomen viride auro maculatum.

Variat rarius abdomine toto violaceo.

*reticulatus.* 111. C. alatus niger elytris reticulatis viridi zeneis, thoracis margine virescente.

Habitat in Europa Mus. Dom. Zschuck.

Statura & magnitudo C. inquisitoris. Antennae nigrae ultimo articulo ferrugineo. Thorax nigricans margine reflexo aureo. Elytra subtilissime reticulata, viridia micantia.

*longicornis.* 112. C. alatus niger capite thoraceque punctatis, elytris crenato striatis, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Marocco Mus. Dom. de Sehestedt. Antennae ferrugineae longitudine fere corporis. Caput nigrum palpis ferrugineis. Thorax lateribus rotundatis punctatus, niger. Elytra crenato striata, nigra, immaculata. Pedes ferruginei femoribus nigricantibus.

*brevicollis.* 113. C. alatus ater antennis ferrugineis.

Habitat in Germania D. Prof. Helwig.

Minor. Caput atrum nitidum antennis palpisque ferrugineis. Thorax laevis, rotundatus, ater, nitens linea media impressa. Elytra striata striis connatis. Corpus atrum tibiis ferrugineis.

*punctulatus.* 114. C. alatus depresso ater elytris punctato substriatis basi retusis.

Carabus depresso Payk. Monog. 34. 19. apterus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minor C. leucophtalmo. Caput laeve, atrum antennis brevibus, fuscescentibus. Thorax laevis, ater, iminaculatus. Elytra fere laevia

attamen oculo armato visa subtilissime punctis striata & basi in medio retusa, atra, immaculata. Corpus atrum tibiis valde spinosis.

115. C. alatus elytris auro micantibus apice macula *micans*. testacea, pedibus rufis.

Habitat — — Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo & statura C. ruficornis. Caput laeve, cupreum, obscure nitidum antennis piceis. Thorax rotundatus, canaliculatus, viridi micans. Elytra obscura, certo situ auro micanaria, striata, macula postica sinuata, testacea. Corpus nigrum pedibus rufis.

116. C. ater alatus thorace punctato, elytris striatis, *obscurus*. pedibus piceis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. ruficornis. Differt tamen magnitudine paullo majore, thorace rotundato, punctato, elytrisque haud tomentosis. Variat pedibus obscure piceis & rufescentibus.

117. C. alatus supra niger subtus ferrugineus. *bicolor*.

Habitat in America boreali Dom. Lewin.

Statura omnino praecedentis at corpus totum subtus cum pedibus & antennis ferrugineum. Elytra striata.

118. C. alatus holosericeo niger capite æneo nitido. *holosericeus*

Carabus holosericeus Payk. Monog. 110. 69..

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Statura omnino C. picei. Caput æneum, nitidum ore antennisque nigris. Thorax & elytra quasi holosericea, minime nitida. Elytra striata. Pedes nigri.

119. C. alatus ater capite punctis duobus frontalibus 2 *notatus*. rufis, antennis basi flavis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Corpus totum atrum. Caput laeve, nitidum punctis duobus impressis & inter haec puncta duo minutissima rufa. Thorax laevis, glaber. Elytra striata.

Variat pedibus nigris & rubris.

*punctatus* 120. C. alatus ater elytris striatis interiectis punctis impressis.

Habitat in Barbaria Mus. D. Desfontaines.

Medius. Antennae nigrae apice fuscae. Caput & thorax laevia, atra, nitida, immaculata. Elytra striata & inter striae punctis numerosis, impressis, auro parum nitentibus, apice parum sinuata. Corpus atrum.

*fulvicollis.* 121. C. alatus cyaneus ore thorace femoribusque rufis, elytris striatis truncatis.

Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.

Statura praecedentium. Antennae nigrae primo articulo rufo, apice cinereae. Caput cyaneum labio palpisque rufis. Thorax rufus. Elytra striata, apice truncata, cyanea, immaculata. Corpus cyaneum femoribus rufis.

*pilicornis.* 122. C. alatus elytris striatis punctisque impressis, antennis pilosis Payk. Monog. 78. 47.

Habitat in Anglia Mus. D. Banks.

Antennae pilis longioribus hirtae, ferrugineae articulo primo aeneo. Thorax rotundatus, aeneus, postice utrinque impressus. Elytra striata, ænea punctisque tribus impressis. Pedes rufi femoribus nigris.

Variat colore nigro & aeneo.

*coerulescens* 123. C. alatus nigro coerulescens elytris striatis, antennis basi rubris Linn. syst. nat. 2. 672. 28. Fn. Sv. 800.

- Carabus virens Myll. Zool. Dan. Prodr. 76. 817.  
 Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 3. 4.  
 Habitat in Europae aridis.  
 Color nimis variat coerulescens, æneus, cupreus, viridis.
- 124.** C. alatus viridiaeneus thorace utrinque bistriato, *lepidus*.  
 elytris striatis. . .  
 Carabus lepidus Payk. Monog. 32. 18.  
 Carabus lepidus Lefke Itin. 1. 17. 8. t. A. f. 6.  
 Habitat in Lusatiae arenosis Prof. Lefke.  
 Magnitudo & statura praecedentis. Corpus nigro violaceum, supra viridiaenum, nitidum. Antennæ pedesque nigri. Thorax canaliculatus & postice utrinque lineolis duabus approximatis impressis. Elytra striata nullisque punctis impressa. Color variat æneus, nigricans, coerulescens. . .
- 125.** C. alatus ater elytris striatis: macula magna *Schach.* oblonga postica, antennis pedibusque rufis.  
 Habitat in Americae meridion. Insulis Dr. Pflug.  
 Statura & magnitudo C. pilicornis. Caput nigrum. Thorax orbiculatus, ater. Elytra crenata nigra macula magna oblonga apicis rufa. Corpus atrum. Pedes rufi.
- 126.** C. alatus cupreus antennis basi rubris Linn. *cupreus*.  
 syst. nat. 2. 672. 29. Fn. Sv. 801.  
 Carabus cupreus Payk. Monog. 113. 71.  
 Geoff. Inf. 1. 161. 40.  
 Degeer Inf. 4. 97. 13. tab. 3. fig. 15.  
 Habitat in Europae sylvis.  
 Colore cupreo distinctus.
- 127.** C. alatus viridinaeus antennis pedibusque *carnifex*. rufis.  
 Habitat in Terra del Fuego Dom. Banks.

Parvus. Caput æneum, nitidum ore antennisque ferrugineis. Thorax transversus, glaber, æneus, postice utrinque impressus. Elytra striata aenea, apice subretusa. Pedes omnes ferruginei.

*vulgaris.* 128. C. alatus nigro æneus antennis pedibusque nigris Linn. syst. nat. 2. 672. 27. Fn. Sv. 799. Geoff. Inf. 1. 158.

Degeer Inf. 4. 97. 14.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 2.

Habitat in Europæ fabulosis.

Corpus subtus nigrum.

*latus.* 129. C. alatus niger elytris crenato striatis, antennis pedibusque ferrugineis Linn. syst. nat. 2. 672. 24.

Degeer Inf. 4. 101. 18.

Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 7.

Habitat in Europæ sylvis.

Variat corpore subtus toto nigro & ferrugineo.

*abdominalis.* 130. C. alatus niger antennis abdominis disco pedibusque ferrugineis.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput atrum nitidum antennis palpisque ferrugineis. Thorax laevis, ater, nitidus. Elytra striata, nigra, immaculata. Pectus abdominalisque discus ferruginea. Pedes ferruginei.

*ovatus.* 131. C. alatus niger elytrorum striis laevibus, antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Saxonia Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino C. lati. Corpus totum atrum, nitidum. Thorax lunulis duabus baseos impressis. Elytra striata, at striis omnino laevibus. Corpus atrum. Pedes rufi femoribus nigris. Antennae apice nigrae.

132. C. alatus ater elytrorum striis laevibus, anten- *helopiooides*.  
nis pedibusque nigris.  
Habitat in Germania Dom. Helwig.  
Statura omnino C. ovati at totus ater.
133. C. alatus cyaneus antennis pedibusque rubris *azureus*.  
Bergstr. nomencl. 1. tab. 10. fig. 3.  
Habitat in Lipsiae collibus arenosis.  
Statura C. lati. Elytra striata.
134. C. alatus niger capite rufo, antennis pedibus- *erythroce-*  
*que flavis.* *phalus.*  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Medius. Caput rufum, nitidum. Thorax glaber,  
niger, nitidus. Elytra striata, nigra. Pedes  
& antennae flavescentes.
135. C. alatus niger ore antennis ano pedibusque *analis*.  
ferrugineis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo omnino praecedentis.  
Caput atrum ore antennisque ferrugineis.  
Thorax ater, nitidulus linea dorsali lineolis-  
que baseos impressis. Elytra crenato striata,  
nigra. Corpus nigrum ano pedibusque rufis.
136. C. alatus ferrugineus elytris lineola nigra. *lineola.*  
Habitat in America boreali Mus. D. Banks.  
Statura & summa affinitas C. ferruginei.  
Elytra striata thorace pallidiora macula linearis  
nigra.
137. C. alatus ferrugineus elytris striatis obscurio-*ferrugineus*.  
ribus Linn. syst. nat. 2. 672. 25.  
Carabus ferrugineus Payk. Monog. 124. 76.  
Herbst Arch, tab. 29. fig. 6.  
Geoff. Inf. 1. 162. 43.  
Degeer Inf. 4. 101. 19.  
Habitat in Europae aridis.

- paliens.* 138. *C. alatus pallidus elytris striatis.*  
Habitat in Saxoniae fabuletis.  
Totus pallidus. Varietas praecedentis Paykull.
- Surinamen-* 139. *C. alatus testaceus, thorace elytrisque striatis fuscis.*  
Habitat Surinami Mus. Dom. Lund.  
Statura omnino *C. pallens*, at duplo fere minor. Caput testaceum, laeve, nitidum. Thorax fuscus, in medio canaliculatus. Elytra striata, fusca. Corpus testaceum, immaculatum. Pedes testacei.
- dorfiger.* 140. *C. alatus ferrugineus abdomine coleoptrorumque lunula lata nigris.*  
Habitat in Barbaria Prof. Vahl.  
Caput obscurum. Thorax transversus, ferrugineus. Coleoptra striata, ferruginea lunula magna communi nigra in medio dorfi. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.
- aterrimus.* 141. *C. alatus thorace marginato, ater elytris striatis: punctis tribus impressis.*  
Carabus aterrimus Payk. Monog. 127. 78.  
Habitat in Europae sylvis.  
Similis *C. oblongo punctato*, at distinctus & aliis. Corpus paullo majus, aterrimum, nitidum. Thorax rotundatus, marginatus, margine parum reflexo, in medio canaliculatus. Elytra striata punctis duobus in stria secunda a futura, tertioque anteriori in tertia impressis.
- aeneus.* 142. *C. alatus supra æneus antennis pedibusque ferrugineis.*  
Carabus Proteus Payk. Monog. 115. 72.  
Habitat in Germaniae hortis.  
Vix *C. cupreo minor*. Caput thorax elytraque ænea, nitida. Pedes & antennæ ferruginei. Corpus mox nigrum, mox ferrugineum.

**143.** C. alatus niger, thorace cupreο, elytris striatis *nigricornis*.  
viridibus, pedibus piceis.

Carabus nigricornis Payk. Monog. 112. 73.

Carabus nitidulus Thunberg Act. Ups.

Habitat in Dania Mus. Dom. de Sehestedt.

Paullo major C. 6 punctato. Caput viridi aeneum ore antennisque nigris. Thorax cupreο, nitidus linea dorsali punctoque utrinque impressis. Elytra striata, viridia. Corpus nigrum, coeruleo nitidum. Pedes picei apice nigri.

**144.** C. alatus oblongus supra aeneus, subtus ater *parumpunctatus*: punctis sex impressis, tibiis *ctatus*.  
piceis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Diffrer manifeste a C. 6 punctato magis oblongus. Caput aeneum ore antennisque nigris. Thorax aeneus, nitidus puncto baseos utrinque impressio. Elytra striata, aenea, paullo obscuriora punctis paucis impressa. Corpus atrum tibiis piceis.

**145.** C. alatus capite thoraceque viridibus, elytris *6 punctatus*.  
.cupreis. Linn. syst. nat. 2. 672. 35. Fn.

Sv. 807. Geoff. Inf. 1. 149. 14.

Carabus 6 punctatus Payk. Monog. 70. 42.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 7.

Degeer Inf. 4. 99. 16.

Goed. Inf. 2. 126. tab. 31.

Habitat in Europae quisquiliis.

Elytra striata striaque unica e punctis impressis.

**146.** C. alatus niger elytrorum margine exteriori *discoideus*.  
antennisque rufis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura C. lati at paullo major. Caput atrum  
antennis ferrugineis. Thorax ater, nitidus

dorso canaliculato lineolaque baseos utrinque impressa. Elytra striata, nigra margine exteriori rufo. Pedes nigri tarsis rufis.

*marginatus* 147. C. alatus viridis elytris margine tibiisque testaceis Linn. Fn. Sv. 804.

Carabus marginatus Payk. Monog. 71. 43.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Habitat in Europae sylvis.

*vestitus*. 148. C. alatus viridi æneus nitidus thoracis elytrorumque margine antennis pedibusque pallidis Geoff. Inf. 1. 162. 41.

Carabus vestitus Payk. Monog. 75. 44.

Carabus marginatus Linn. syst. nat. 2. 670. 16.

Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

Nimis affinis praecedenti mihi videtur. Caput viridi æneum, nitidum ore antennisque pallidis. Thorax æneus, nitidus linea dorsali impressa margineque pallido. Elytra striata, viridia, ruso pubescentia margine pallido. Corpus fuscum. Pedes pallidi.

*nigrita*. 149. C. alatus ater nitidus thorace canaliculato, elytris striatis.

Carabus striatus Payk. Monog. 45. 26.

Degeer Inf. 4. 96. 12.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput atrum. Thorax nitidus, canaliculatus maculaque baseos utrinque impressa. Elytra striata, atra, nitida, immaculata. Pedes atri.

*fuscus*. 150. C. alatus fuscus elytris obsolete striatis, antennis thoracis margine pedibusque flavis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput fuscum, obscure nitidulum antennis palpisque flavis. Thorax fuscus itidem obscure

nitidulus, subcanaliculatus margine exteriori tenuissime flavescente. Elytra obsolete striata, mollia, fusca, immaculata. Corpus fuscum. Pedes flavescentes.

151. C. alatus ater thoracis coleoptrorumque limbo *pallipes*.  
pedibusque pallidis

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Antennae nigrae basi pallidae. Caput atrum ore ferrugineo. Coleoptra striata, nigra limbo pallido. Corpus nigrum pedibus pallidis.

152. C. alatus thorace rotundato ater elytris striatis: *quadrum*.  
vitta lata pallida.

Habitat in Senegal Mus. D. Bosc.

Statura parva C. melanocephali. Caput atrum, nitidum antennis pallidis. Thorax canaliculatus, laevis, ater, nitidus. Elytra striata vitta lata, media, pallida, postice dilatata, quae tamen apicem elytrorum haud attingit. Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus nigris.

153. C. alatus niger thorace pedibusque ferrugineis *melanoce-*  
Linn. syst. nat. 2. 671. 22. Fn. Sv. 795. *phalus*.  
Geoff. Inf. 1. 162. 42.

Degeer Inf. 4. 93. 8.

Carabus melanocephalus Payk. Monog. 35. 20.

Habitat in Europae suffocatis.

154. C. alatus thorace pedibusque ferrugineis, capite *cianoce-*  
elytrisque cyaneis Linn. syst. nat. 2. 671. 21. *phalus*.  
Fn. Sv. 794. Geoff. Inf. 140.

Carabus cyanocephalus Payk. Monog. 60. 63.

Degeer Inf. 4. 100. 17. tab. 3. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 14.

Habitat in Europae sylvis.

155. C. alatus niger antennis ore pedibusque rufis. *rufibarbis*.  
Habitat in Germania Dom. Smidt,

Magnitudo praecedentis. Corpus atrum, nitidum. Thorax subcanaliculatus. Elytra striata. Antennae & pedes rufae. Os rufum mandibulis nigris.

*amethystinus.* 156. C. alatus cyaneus capite thoraceque aeneis nitidis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae pilosae, fuscae, basi ferrugineae. Caput & thorax æneo cuprea, nitida. Elytra striata, cyanea. Corpus cyaneum.

*lividus.* 157. C. alatus flavescentis, capite thoraceque nigris, elytris striatis fuscis.

Habitat in Dania Mus. Dom. Lund.

Parvus. Caput nigrum ore antennisque pallidis. Thorax laevis, niger, nitidus, immaculatus. Elytra striata minus nigra, five fusca. Corpus & pedes flavescentes.

*cruxmajor.* 158. C. alatus thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis duabus rufis Linn. syst. nat. 2. 673. 39.

Carabus 2 pustulatus Mant. Ins. 1. 204. 106.

Carabus 2 pustulatus Payk. Monog. 80. 49.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europæ sylvis.

Thorax rotundatus, villosus, ater, coleoptra obtusa, crenato striata, villosa, rubra cruce magna nigra, aut elytra nigra maculis duabus rufis.

*cruxminor.* 159. C. alatus thorace orbiculato rufo, coleoptris truncatis rubris: cruce nigra Linn. syst. nat. 2.

673. 40. Fn. Sv. 809. Geoff. Ins. 1. 150.

Carabus cruxmajor Mant. Ins. 1. 202. 94.

Carabus cruxmajor Payk. Monog. 81. 50.

Schaeff. Icon. tab. 18. fig. 8.

Habitat in Europa.

Antennae nigrae basi rufae.

160. C. alatus thorace orbiculato rufo, elytris atris: *vittatus*.  
vitta alba.

Habitat in America boreali Dom. Yeats.

Antennae nigrae. Caput & thorax rufa, Scutellum parvum, rufum. Elytra glabra, atra, nitida vitta longitudinali alba. Margo rufescens. Corpus ferrugineum pedibus nigris.

161. C. alatus thorace orbiculato rufo, elytris ni- *turcicus*.  
gris: lunula baseos pallida.

Habitat Mus. Dr. Hunter.

Caput nigrum ore antennisque rufescentibus.

Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra striata, subtruncata, nigra lunula magna baseos pallida. Abdomen nigrum. Pedes pallidi.

162. C. alatus thorace suborbiculato rufo, elytris *haemorrhoidalis*.  
nigris apice rufis.

Habitat Dresdae Mus. Dom. Romanus.

Antennae rufae apice nigricantes. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra vix striata, atra, nitida apice rufa. Corpus nigrum.

163. C. alatus thorace orbiculato ater nitidus, ely- *picipes*.  
tris fuscis, pedibus ferrugineis.

Carabus picipes Payk. Monog. 76. 46.

Habitat in Svecia Dom. de Paykull.

Parvus, oblongus, agilis. Corpus atrum, Thorax orbiculatus, laevis, nitidus. Elytra striata.

164. C. alatus thorace orbiculato rufo, coleoptris 2*pustulatus*  
apice nigris: macula rufa.

Carabus cruxminor Mant. Inf. 1. 204. 100.

Carabus cruxminor Payk. Monog. 8. 452.

Sulz. Hist. tab. 7. fig. 6.

Habitat in Anglia Dom. Lee.

Reliquis paullo longior & angustior. Thorax glaber, ruber basi utrinque linea parva im-

- — —
- pressa.* Elytra striata, rufa apice nigra macula magna communi rufa. Abdomen atrum. Pedes toti rufi.
- Andreae.* 165. *C. alatus thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: fascia media nigra.*  
Habitat in Italia D. Allioni.  
Fascia in medio elytrorum ad suturum dilatata.  
Elytra apice fuscescentia. Pedes pallidi.
- elevatus.* 166. *C. rufus elytris holofericis pallidioribus: fascia communi atra.*  
Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.  
Statura & magnitudo omnino *C. crux minor.*  
Antennae rufae. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra holoferica, nitida, pallidiora fascia media lata, nigra. Corpus rufum.
- germanus.* 167. *C. alatus cyaneus, capite elytris pedibusque testaceis Linn. syst. nat. 2. 672. 26.*  
Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 13.  
Habitat in Germaniae sylvis.
- velox.* 168. *C. alatus nigricans antennis pedibusque pallidis, elytris obtusissimis Linn. syst. nat. 2. 672. 233. Fn. Sv. 803.*  
Habitat in Europae arena.  
Elytra striata, obtusissima & fere truncata.
- rufescens.* 169. *C. alatus ferrugineus vertice anoque nigris.*  
*Carabus rufescens Payk. Monog. 58. 35.*  
Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.  
Parvus totus ferrugineus solo vertice capitis anoque nigris.
- praeustus.* 170. *C. alatus testaceus capitis vertice elytrorum apicibus abdomineque nigris.*  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Praecedentibus magis oblongus. Caput atrum ore antennisque testaceis. Thorax rotundatus, testaceus, laevis, immaculatus. Elytra

- striata, testacea apice nigra. Corpus testaceum abdomine atro. Pedes testacei.
171. C. supra niger subtus ferrugineus elytris cre- *apricarius*. nato striatis.
- Carabus *apricarius* Payk. Monog. 125. 77.  
 Carabus fulvus Degeer Inf. 4. 101. 19. Geoff.  
 Inf. 1. 162. 43.  
 Habitat in collibus arenosis Dalekarliae Dom.  
 de Paykull.  
 Antennae ferrugineae.
172. C. alatus thorace orbiculato rufo, elytris flavis: *lunatus*. maculis tribus nigris.
- Carabus eques Schrank Beytr.  
 Habitat in Anglia Dom. Lee.  
 Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput cya-  
 neo nigrum, nitens. Thorax orbiculatus, sub-  
 canaliculatus, laevis, glaber, rufus. Elytra  
 substriata, flava puncto minori orbiculato ad  
 basin & duobus majoribus margini exteriori  
 connatis versus apicem. Abdomen atrum.  
 Pedes rufi femoribus apice nigris.
173. C. alatus niger capite thoraceque æneis, elytris *prasinus*. ferrugineis: macula magna communi apicis nigra.
- Carabus viridanus Payk. Monog. 57. 34.  
 Carabus viridanus Mant. Inf. 1. 204. 105.  
 Carabus *prasinus* Thunb. nov. sp. 4. 74. fig. 87.  
 Schaeff. Icon. tab. 31.  
 Habitat Havniae Dr. Pflug.  
 Antennae nigrae articulo primo ferrugineo.  
 Elytra striata, rufa macula magna communi nigra a medio futurae ad apicem. Corpus nigrum. Pedes rufi.

- Curfor.* 174. *C. alatus thorace viridi æneo, elytris nigris: macula apicis ferruginea.*  
*Habitat in Italia Dr. Allioni.*  
*Minor C. prafino. Antennæ fuscae, basi ferrugineae. Caput atrum, nitidum, immaculatum. Thorax rotundatus, viridi æneus, nitens. Elytra striata, nigra macula magna apicis, absolute ferruginea. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.*
- furcatus.* 175. *C. lividus elytris vitta media abbreviata nigra antice furcata.*  
*Habitat in America Prof. Helwig.*  
*Parvus. Caput obscure rufum macula inter oculos nigra. Thorax lividus. Elytra striata, livida: vitta media nigra, quae nec basin nec apicem attingit, at basi bifida. Corpus lividum.*
- vaporario-* *rum.* 176. *C. alatus thorace elytris antice margineque antennis pedibusque ferrugineis. Linn. syst. nat. 2. 671. 23. Fn. Sv. 796.*  
*Myll. Zool. Dan. 78. 850.*  
*Habitat in Europæ quisquiliis.*
- meridianus.* 177. *C. alatus niger elytris antice pedibusque testaceis Linn. syst. nat. 2. 673. 36.*  
*Carabus meridianus Payk. Monog. 95. 59.*  
*Carabus 2 maculatus Degeer Inf. 4. 102. 20.*  
*Habitat in Europæ arenosis.*  
*Præcedente minor.*
- discus.* 178. *C. alatus thorace rufo, capite atro, elytris testaceis: macula communi dorsali fusca.*  
*Habitat in Germania Dom. Smidt.*  
*Parvus. Caput atrum, nitidum ore antennisque ferrugineis. Thorax rotundatus, rufus. Elytra striata, testacea macula magna communi fusca. Pedes rufi.*

179. C. alatus niger thorace fusco, elytris griseis: *comma.*  
*macula linearis nigra.*

Habitat in America Dom. Drury.

Caput atrum, nitidum. Thorax orbiculatus, ferrugineo fuscus. Elytra striata, grisea macula longa, linearis, nigra versus futuram. Pedes pallidi.

180. C. alatus thorace ferrugineo glabro, elytris 4 *macula* obtusissimis fuscis: *maculis duabus albis Linn.* *tus.*  
*synt. nat. 2. 673. 40. Fn. Sv. 809.*

Geoff. Inf. 1. 152. 24.

Pontop. Atl. Dan. 1. tab. 29.

Carabus 4 *maculatus* Payk. Monog. 83. 51.

Habitat in Europae quisquiliis.

181. C. alatus thorace atro, elytris nigris: *punctis 4 guttatu* duobus albis.

Carabus 4 *guttatus* Payk. Monog. 90. 55.

Habitat in Anglia.

Diffrerit manifeste a praecedente. Elytra haud obtusa. Tibiae pallidae. Magnitudine variat.

182. C. alatus thorace nigro, elytris obscuris pallido *ustulatus.*  
*bifasciatis Linn. synt. nat. 2. 673. 38. Fn.*  
*Sv. 810.*

Carabus *ustulatus* Payk. Monog. 86. 53.

Carabus dentellus Thunb. Mus. Ups. 50.

Elophorus ruprestris Mant. Inf. 1. 188. 3. teste  
 Dom. Paykull.

Habitat in Europae quisquiliis.

Fascia postica undata.

Variat maculis magnis obsoletis rubro pallidis.

183. C. alatus thorace nigro, coleoptris pallidis: *dorsalis.*  
*macula magna dorsali nigra*

Carabus meridianus Paykull Monog. 96. 59.  
 var. 8.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parvus. Caput & thorax atra nitida margine tamen tenuissime pallescente. Elytra subtilissime striata, nitida, pallida macula dorsali nigra fere communi, futura tamen tenuissime pallida. Corpus nigrum. Antennae & pedes ferruginei.

*guttatus.* 184. C. alatus thorace æneo, elytris nigris: macula apicis pallida.

Habitat in Norwegiae sylvis.

Antennae fuscae basi rufescentes. Caput & thorax ænea, nitida. Elytra striata, nigra apice macula magna, transversa, pallida. Corpus nigrum pedibus pallidis.

Variat rarius macula elytrorum apicis rufa.

*guttula.* 185. C. alatus ater elytris puncto postico hyalino albo.

Carabus riparius Payk. Monog. 91. 56.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

A C. 2 guttato differre videtur. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra striata, atra puncto parvo albo hyalino versus apicem. Pedes rufi. Minor C. 2 guttato.

*testaceus.* 186. C. alatus capite thoraceque ferrugineis, elytris testaceis. Linn. syst. nat. 2. 673. 37. Fn. Sv. 812.

Geoff. Inf. 1. 153. 25.

Habitat in Europæ quisquiliis.

*truncatus.* 187. C. alatus thorace ferrugineo, elytris striatis abbreviatis nigris.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Major C. abbreviato. Caput nigrum ore anten- nisque ferrugineis. Thorax marginatus, ro- tundatus, obscure ferrugineus. Elytra striata, nigra, apice truncata, abdomine breviora. Corpus nigrum pedibus testaceis.

188. C. alatus thorace rufo, elytris abbreviatis *abbreviatus*.  
testaceis.

Habitat in Norwegiae rupibus.

Antennae fuscae, basi rufescentes. Caput atrum,  
nitidum. Thorax rotundatus, laevis, obscure  
rufus. Elytra abdomine dimidiobreviora, trun-  
cata, pallide testacea. Corpus pallidum abdo-  
mine nigro.

189. C. alatus æneus antennis pedibusque nigris, 2 *punctatus*.  
elytris punctis duobus impressis. Linn. syst.  
nat. 2. 672. 33. Fn. Sv. 806.

*Carabus bipunctatus* Payk. Monog. 99. 62.

Habitat in Europa.

190. C. alatus æneus nitidus pedibus ferrugineis. *celer*.

Habitat in Europæ Muscis.

Statura & summa affinitas praecedentis. Cor-  
pus totum thorax elytraque ænea nitidula.  
Antennæ nigrae. Pedes ferruginei.

191. C. alatus ater elytris pedibusque piceis. *minutus*.

Habitat in truncis arborum Germaniae D. Smidt.  
Parvus. Caput atrum, nitidum antennis piceis.  
Thorax rotundatus, ater, nitidus, immacula-  
tus. Elytra striata, picea, immaculata. Cor-  
pus atrum pedibus ferrugineis.

192. C. alatus supra æneus nitidus, subtus ater. *pygmaeus*.  
*Carabus rufipes* Payk. Monog. 101. 63.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino C. 2 *punctati*.  
Caput, thorax, elytra glabra, ænea, nitida.  
Corpus atrum, nitidum. Pedes atri tibiis pi-  
ceis. Antennæ nigrae.

193. C. alatus niger pedibus rufis. *trifilis*.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Parvus. Antennae totae nigrae. Caput & thorax glabra, nigra, nitida. Elytra striata, concolora. Pedes fulvi.

Varietatem e Svecia misit Dom. de Paykull,  
elytris piceis.

*truncatell-* 194. C. alatus supra obscure æneus, subtus ater,  
*lus.* elytris obtusis Linn. syst. nat. 2. 672. 43.  
Fn. Sv. 814.

*Carabus truncatellus* Payk. Monog. 98. 61.

Habitat in Europæ quisquiliis.

Parvus. Antennæ & pedes atri.

*minimus.* 195. C. alatus ater elytris striatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Minutus. Caput & thorax atra, immaculata.  
Elytra striata, atra. Antennæ & pedes atri.

20. CICINDELA. *Palpi* sex filiformes  
*postici* pilosi.

*Labium* corneum, tri-  
dentatum.

*Antennæ* setaceæ.

*longicollis.* 1. C. thorace elongato cylindrico cyanea femori-  
bus ferrugineis.

*Cicindela longicollis* Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 17.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Cicindelæ corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile, capite thorace majori, oblongo, mandibulis exsertis, dentatis, oculis globosis, prominulis, antennis ante oculos insertis, thorace brevi, cylindrico plerumque ganaliculato, scutello minuto, rotundato, elytris rigidis haud deflexis longitudine abdominis, pedibus elongatis, tenuibus, femoribus tibiis que rotundatis, pilosis, tarsis quinquearticulatis, colore variegato, nitido.

Corpus magnum, valde elongatum. Antennae griseae, basi cyaneae. Caput grossum, cyaneum oculis valde prominulis. Thorax elongatus tenuis, cylindricus, cyaneus, immaculatus. Elytra punctata, cyanea, immaculata, apice emarginata. Pedes grisei femoribus ferrugineis.

2. C. thorace elongato cylindrico atra femoribus *aptera*. ferrugineis.

Cicindela aptera Lund. Act. Soc. Hist. nat.

Havn. I. tab. 5.

Oliv. Inf. 33. tab. I. fig. I.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Elytra connata in medio rugosa.

3. C. thorace cylindrico cyaneo, elytris testaceis *angustatus* apice nigris.

Carabus angustatus Payk. Monog. 108. 67.

Carabus angustatus Mant. Inf. I. 205. 122.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Parva. Antennae setaceae, nigrae basi, flavae.

Caput magnum, ovatum, atrum, nitidum.

Thorax elongatus, cylindricus, cyaneus.

Elytra vix striata, testacea apice nigra. Corpus nigrum. Pedes testacei geniculis nigris. Tres hae species statura omnino ab hoc genere differunt mihi haud rite notae forte proprii generis.

4. C. thorace cylindrico ater coleoptris maculis 3 *pustulata* abus baseos fasciaque media ferrugineis. *tus*.

Habitat Parisiis Dom. Tigny.

Statura parva praecedentis. Caput magnum, thorace latius, planum, nigrum, immaculatum.

Thorax cylindricus, angustatus, niger. Elytra laevia, nigra macula magna baseos fasciaque communi in medio, quae ad futuram parum extenditur, rufis. Corpus atrum.

- grossa.* 5. *C. nigra* elytris acuminatis: maculis tribus albis, Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 23.  
Hybn. Naturf. 24. 48. 14. tab. 2. fig. 18.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Caput maximum, fuscum pilis cinereis hirtum  
labio flavo. Mandibulae flavae apice nigrae.  
Thorax rotundatus, punctatus, fuscus striga  
autica impressa. Elytra punctata maculis tribus  
flavis anteriore baseos, postica oblonga apicis.
- cyanea.* 6. *C. cyanea* nitida ore testaceo.  
Habitat in India orientali Prof. Vahl.  
Magna tota cyanea supra obscurior, subtus nitidior.  
Antennae fuscae. Maxillae palpique testacei apicibus nigris. Femora antica supra viridia, subtus cyanea & femora secundi paris supra cyanea suptus viridia, postica utrinque cyanea.
- megacephala.* 7. *C. nigro ænea* elytris punctato striatis, ore antennis pedibusque testaceis.  
Cicindela megacephala Oliv. Inf. 33. t. 2. f. 12.  
Habitat Senegaliae Mus. Dom. Geoffroy.  
Magna. Antennae ferrugineae. Caput thorace fere majus mandibulis porrectis, validis, dentatis. Elytra punctato striata, nigro ænea. Pedes ferruginei.
- bicolor.* 8. *C. viridis* nitida elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Antennae fuscae basi virescentes. Caput viride mandibulis albis apice nigris. Palpi testacei apice nigri. Corpus cyaneum abdominis margine testaceo.
- campestris.* 9. *C. viridis* elytris punctis quinque albis Linn.  
syst. nat. 2. 657. 1. Fn. Sv. 746. Geoff. Inf. 1.  
153. 27.

- Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 3.  
 Schaeff. Inf. 33. tab. 1. fig. 3.  
 Sulz. Inf. tab. 5. fig. 37.  
 Habitat in Europae campis arenosis, insectorum  
 larvarumque leo.  
 Larva mollis, alba, capite pedibusque sex ferru-  
 gineis foveam magnitudine corporis in terra  
 excavat, in qua latens insecta arripit.
10. C. subpurpurascens elytris fascia lunulisque dua- *hybrida*.  
 bus albis, corpore aureo nitido. Linn. syst. nat.  
 2. 657. 2. Fn. Sv. 747.  
 Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 7.  
 Degeer Inf. 4. 115. 3. tab. 4. fig. 8.  
 Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 10.  
 Habitat in Europae fabulosis.  
 Simillimum vix distinctum ex America boreali  
 accepi.
11. C. nigra elytris fascia undata punctisque duobus *sylvatica*.  
 albis Linn. syst. nat. 2. 658. 8. Fn. Sv. 748.  
 Geoff. Inf. 1. 155. 28.  
 Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 9.  
 Herbst Arch. tab. 27. fig. 13.  
 Degeer Inf. 4. 114. tab. 4. fig. 7.  
 Pet. Gaz. tab. 50. fig. 5.  
 Habitat in Europae pinetis.
12. C. capite thoraceque obscure cupreis, elytris *arenaria*.  
 atris : lunulis duabus fasciaque media albis,  
 corpore atro.  
 Habitat in Barbaria Dom. Vahl.  
 Paullo minor C. *hybrida*. Antennae nigrae. Caput  
 cupreum labio mandibularumque basi albis.  
 Thorax rotundatus, obscure cupreus, imma-  
 culatus. Elytra laevia, atra lunulis baseos  
 fascia abbreviata sinuata in medio lunulisque  
 apicis albis. Corpus atrum.

- littoralis.* 13. C. obscure ænea elytris nigricantibus: punctis sex albidis baseos lunato, medio transverso.  
Habitat ad Barbariae littora Prof. Vahl.  
Caput obscure æneum labio albido. Maxillæ nigrae basi albae. Elytra obscuriora lunula baseos puncto secundo transverso in medio & quatuor ad apicem. Abdomen æneum, nitidum.  
Macula media transversa interdum in puncta duo divisa & puncta duo apicis connata in lunulam.
- tristis.* 14. C. nigra elytris macula media flava.  
Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 25.  
Habitat — — Dom. Drury.  
Magna tota obscure nigra, elytris macula media flava, lunata.
- interrupta.* 15. C. elytris fuscis: puncto baseos fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis.  
Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 15.  
Habitat in Sierra Leon Mus. Dom. Banks.  
Caput fuscum antennis maxillisque nigris. Thorax fuscus. Elytra laevia, fusca, nitidula puncto baseos flavo. Fascia prima consistit lunula puncto que ad suturam, secunda e striga puncto que ad suturam & tertia denique e maculis duabus parvis. Lineola parva ad apicem. Subtus ænea.
- lunulata.* 16. C. nigra elytris lunulis duabus maculisque duabus albis: anteriore transversa.  
Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 23.  
Habitat — — Forster. Mus. Dom. Banks.  
Caput nigrum labio flavo. Mandibulae nigrae, basi parum flavescentes. Thorax niger. Elytra nigra lunula baseos ad marginem exteriorem, macula transversa in medio, tunc punctorum duo paria, & tandem lunula apicis albis. Subtus cyanec nitida.

17. *C. obscura* elytris punctis duobus lunulisque *lurida*.  
tribus albis: intermedia flexuosa.

Habitat — Dom. Forster Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax obscure cuprea, immaculata. Labium flavum striga antica e punctis nigris impressis. Elytra nigra puncto in medio baseos & altera ante medium versus futuram. Præterea lunulae tres baseos ad marginem exteriorem, secunda in medio fere duplicata & tertia apicis.

18. *C. coeruleo nitens* elytris veridibus: maculis *chinenfis*.  
duabus atris; posteriore albo bimaculata.

*Cicindela Chinensis* Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 30.

*Cicindela Chinensis* capite corporeque subitus coeruleo violaceis nitidis, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. Degeer Inf. 4. tab. 17. fig. 23.

Habitat in China.

*C. campestris* paullo major. Caput coeruleum antennis nigro violaceis. Thorax in medio viridi auratus. Elytra viridi aurata maculis duabus atris, altera baseos, altera majori versus apicem lunula punctaque albis. Femora quatuor antica rufa.

19. *C. obscura* elytris punctis quatuor lunulisque *flexuosa*.  
tribus albis: intermedia flexuosa Oliv. Inf. 33.  
tab. 1. fig. 12.

Habitat ad Hispaniae littora Dom. Vahl.

Affinis praecedenti. Caput obscurum labio dente-to albo margine nigro. Maxillæ nigrae. Thorax obscurus basi apiceque impressus. Elytra obscura punctis duobus baseos ad futuram oblique positis, tunc lunula ad marginem exteriorem, tunc punctum ad futuram, demum lunula in medio marginis flexuosa & fere duplicata. Punctum album ad marginem & denique lunula

elytron terminat. Abdomen æneum. Pedes cuprei.

*capensis.* 20. *C. subaenea* elytris albis: linea fusca triramosa  
Linn. syst. nat. 2. 657. 3.

Mus. Lud. Ulr. 84.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 11.

Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 11.

Naturf. 14. 49. 15. tab. 2.

Wulf Inf. Capens. tab. 1. fig. 10.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

*Cicindela sinuata* Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 19.  
vix differt.

*germanica.* 21. *C. cuprea* elytris viridibus: puncto lunulaque  
apicis albis Linn. syst. nat. 2. 657. 4. Geoff.  
Inf. 1. 155. 29.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 8.

Habitat in Germaniae fabulosis.

Variat colore viridi, nigro & coeruleo.

*tuberculata.* 22. *C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco vi-*  
*ridique variis: margine tridentato albo.*

Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 28.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput fuscum labio albido. Thorax fuscus.

*unipunctata.* 23. *C. subpurpurascens* labio elytrorumque puncto  
albis Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 27.

Habitat in America Dom. Drury.

Labium rotundatum, sinuatum, album. Corpus  
purpurascens elytris puncto unico, lateral, albo.  
Subtus virescens.

*bipunctata.* 24. *C. nigra* elytris puncto albo, pedibus flavis: fe-

moribus nigris.

*Cicindela 2 punctata* Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 2.

Habitat — — Mus. Dom. Olivier.

Affinis certe C. unipunctatæ at longior & tenuior.

Labium nigrum.

25. C. viridi ænea elytrorum disco obscuriore : punctis *sexpunctata*-  
tribus albis Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 6. *ta.*

Herbst Arch. tab. 46. fig. 1.

Habitat ad littora Malabarica Drury.

Caput viride, nitens vertice obscuriore. Thorax  
supra fuscus lateribus pectoreque viridibus,  
coeruleo nitidis. Elytra obliqua disco fusco  
punctis tribus albis. Abdomen & pedes viridia.

Aliam ex India misit Dom. Lund simillimam auro  
variegatam punctis majoribus : medio subreniformi.

26. C. viridiaenea elytris obscuris : margine linea- *quadrilinea*-  
que media albis Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 4. *ata.*

Herbst Arch. tab. 27. fig. 15.

Habitat in India Dr. Schulz.

Mandibulae albae apice nigrae. Labium album.

Caput viridi æneum orbita oculorum aurea.  
Thorax æneo nitens, subtus aureus hirsutus  
alba. Elytra obscura margine albo, qui versus  
apicem denticulum exserit. In medio linea lata  
alba, quae tamen apicem haud attingit. Abdo-  
men subtus aureum, nitidissimum lateribus  
hirtis.

27. C. atra elytris vitta laterali punctisque tribus *cincta*.  
albis.

Cicindela cincta Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 33.

Habitat in Africa Mus. Dr. Hunter.

Magna. Os testaceum. Thorax ater, immacula-  
tus. Elytra atra vitta versus marginem punctis-  
que tribus interioribus albis.

28. C. obscure ænea elytrorum margine biramoso *biramosa*.  
albo.



*Cicindela tridentata* Thunb. nov. Inf. spec. 1. 26.

fig. 40.

Oliv. Inf. 33. tab. 3. fig. 29. tab. 2. fig. 16.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 16.

Habitat in India Dom. de Hattorff.

Corpus supra obscure æneum, subtus aureum, nitidum. Elytrorum margo exterior albus ramos five dentes duos emittens, altero in medio, altero versus apicem.

*sexguttata*. 29. C. viridis nitida elytris punctis tribus marginibus albis Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 21.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 17.

Habitat in Virginia.

Corpus viride, nitidissimum. Antennae apice fuscae. Labium flavum.

*catena*. 30. C. viridi ænea elytris albidis: punctis sex viridibus concatenatis.

Thunb. nov. sp. Inf. 2. tab. 1. fig. 41. 42. 43.

Oliv. Inf. 33. tab. 1. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 11.

Naturf. 24. 52. 16. tab. 2. fig. 20.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 14.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.

Elytra albida punctis tribus in medio & tribus ad futuram omnibus concatenatis & inter se & cum futura. Abdomen æneum lateribus lana albissima.

*marginata*. 31. C. viridis elytris margine fascia undata punctisque duobus albis.

Habitat in Virginia.

Labium flavum. Elytrorum margo albus, quidentes quatuor ad fasciam valde undatam & flexuosa exserit. Puncta duo alba adhuc ad basin.

32. C. obscura elytris punctis quatuor disci lunulis- & guttata.  
que duabus marginalibus albis Oliv. Inf. 33.  
tab. 3. fig. 32.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Antennae maxillaeque nigrae. Labium album.

Corpus obscure fuscum elytris disco punctis  
quatuor albis lunulisque duabus, altera in me-  
dio margine, altera in apice.

33. C. obscura elytris striis tribus albis: secunda trifasciata.  
flexuosa.

Habitat in America, in Italia paullo minor.

Corpus supra obscurum, subtus æneo nitidum.

Labium album. Elytra strigis tribus, prima  
abbreviata, lunata, secunda flexuosa, tertia  
apicis.

34. C. viridis nitida elytrorum apicibus ore anten- Carolina.  
nis pedibusque flavis Linn. syst. nat. 2. 657. 6.

Oliv. Inf. 33. tab. 2. fig. 22.

Degeer Inf. 4. 120. 2. tab. 17. fig. 24.

Hybn. Naturf. 24. 53. 17. tab. 2. fig. 21.

Habitat in America boreali.

35. C. nitida ore antennis pedibusque testaceis Linn. virginica.  
syst. nat. 2. 65. 75.

Olivier Inf. 33. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Carolina.

36. C. supra fusca subtus cyanea ano tibiisque po- cajennenſis  
sticis testaceis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae cyaneae apice fuscae. Caput, thorax,  
elytra fusca lateribus cyaneo nitidis. Subtus  
cyanea ano tibiisque posticis testaceis.

37. C. coerulea ore antennis pedibusque rufis; ely- emarginata  
tris apice emarginatis.

Carabus dentatus Ross. Fn. Etr. 1. 222. 551.

tab. 2. fig. 11.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Parya in hoc genere. Caput cyaneum, nitidum ore toto rufo. Antennae rufae articulo primo elongato apice nigro. Thorax cylindricus, punctatus, cyaneus, parum canaliculatus. Elytra striata, obtusa, emarginata. Corpus cyaneum pedibus omnibus rufis.

*aequinoctia.* 38. C. flava elytris fasciis duabus latis nigris. Linn. lis. syst. nat. 2. 658. 7. Am. acad. 6. 395. 22.

Habitat Surinami.

*maura.* 39. C. nigra elytris punctis sex albis: tertio & quarto parallelo. Linn. syst. nat. 2. 658. 9.

Habitat in Oriente.

*minuta.* 40. C. ænea elytris lunulis quatuor marginalibus flavis.

Cicindela minuta Oliv. Ins. 33. tab. 2. fig. 13.

Habitat in India Mus. Regis Galliae.

Parva. Caput & thorax ænea, immaculata. Elytra punctata lunulis quatuor albis margini exteriori connexis. Pedes rufi femoribus viridibus.

## 21. ELAPHRUS. *Palpi sex filiformes.*

*Labium rotundatum,*  
*acuminatum, integrum.*

*Antennæ setaceæ.*

*uliginosus.* 1. E. viridiaeneus elytris striatis: punctis impressis coeruleis.

Elaphri corpus oblongum, glabrum, immarginatum, agile, parvum, capite magno, ovato, oculis prominentibus, globosis, antennis ante oculos insertis, thorace subcylindrico, marginibus rotundatis, scutello minuto rotundato, elytris rigidis haud deflexis, longitudine abdominis, pedibus longis, tenuibus, rotundatis, tarsis quinquearticulatis, colore plerumque æneo obscuro.

Habitat in Germaniae uliginosis D. Smidt.

Affinis certe E. ripario, at paullo major. Caput & thorax ænea punctis impressa. Elytra ænea, striata & in his striis puncta impressa, rotundata, coerulea. Antennæ & pedes atri.

2. E. viridiaeneus elytris punctis latis excavatis. *riparius.*

Linn. syst. nat. 2. 658. 10. Fn. Sv. 749. Geoff.

Inf. 1. 156. 30.

Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 13.

Habitat in Europæ humentibus.

3. E. æneus elytris striatis, pedibus flavescentibus, *striatus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura E. flavipes at major. Antennæ nigrae primo articulo flavo. Thorax rotundatus dorso canaliculato. Elytra striata, ænea, immaculata. Pedes flavescentes femoribus obscurioribus. Puncta interdum duo impressa ad elytrorum futuram.

4. E. obscure æneus elytris subnebulosis, pedibus *flavipes,*

luteis Linn. syst. nat. 2. 658. 11. Fn. Sv. 750.

Degeer Inf. 4. 119. 6.

Habitat in Europa ad riparum littora.

Elytra punctata.

5. E. æneus nitidus capite striato.

*aquaticus.*

Cicindela aquatica Linn. syst. nat. 2. 658. 14.

Fn. Sv. 752.

Degeer Inf. 4. 118. 5.

Geoff. Inf. 1. 157. 31.

List. mut. tab. 31. fig. 13.

Habitat ad Europæ aquas.

Omnino nigrum minime distinctum misit Dom.

Smidt.



*semipunctata*- 6. E. æneus nitidus elytris punctatis: dorso glaberrimo.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Schaller.

Elytra striato punctata in medio ad suturam polita, glaberrima. Pedes nigri.

*2 guttatus*. 7. E. æneus elytris nitidis apice flavescentibus.

Habitat ad Norwegiae aquas.

Caput & thorax rugosa, obscure ænea. Elytra nitida punto medio impresso & apice late flavescentia.

22. SCOLYTUS. *Palpi* quatuoræquales: articulo ultimo obconico.

*Maxilla* cornea, ciliata, acuta, integra.

*Labium* breve, membranaceum, rotundatum, acuminatum.

*Antennæ* filiformes.

*flexuosus*. 1. S. niger elytris ferrugineis: macula media sinuata punctoque apicis nigris.

*Carabus flexuosus* Mant. Inf. 1. 203. 93.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.

Scolyti corpus subrotundum, depresso-sculptum, immarginatum, agile, parvum, capite ovato, inserto, oculis rotundatis, vix prominulis, lateralibus, antennis ante oculos insertis, thorace transverso, breviori, scutello minuto, rotundato, elytris rigidis, haud deflexis longitudine abdominis, pedibus elongatis, cursoriis, rotundatis, tenuibus, tarsis quinquearticulatis, colore variegato.

Statura parva, depreffsa. Thorax marginatus, niger, antice valde excisus pro receptione capitis. Scutellum nigrum. Elytra ferruginea, basi versus scutellum nigricantia, in medio macula flexuosa & postice puncto parvo nigris.

. S. supra ferrugineus thorace macula elytris *limbatus*.  
fasciis undatis viridi æneis.

*Carabus limbatus* Mant. Inf. 1. 202. 87.

*Carabus dubius* Act. Berolin. 4. tab. 7.  
fig. 4. A. B.

Habitat Kiliae sub lapidibus D. de Sehestedt.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor porrecti, æquales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulo primo brevissimo, reliquis porrectis, ultimo obconico, posteriores triarticulati, articulo ultimo obconico, obtuso adhaerentes labio ante apicem. Mandibula cornea, subarcuata, acuta, integra. Maxilla elongata, cornea, intus ciliata, incurva, acuta, integra. Labium membranaceum, breve, rotundatum, inter palpos parum acuminatum.

Corpus ovatum, depresso. Antennæ pallidae. Caput virescens linea frontali antice bifida, albida. Os testaceum mandibulis apice nigris labioque albo. Thorax latitudine fere elytrorum viridis margine antico & lateralí pallidis. Elytra viridia margine pallido, a quo fasciae duae flexuosae, abbreviatae exeunt. Corpus testaceum pedibus pallidis.

— — —

**23. HYDROPHILUS.** *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium corneum,*  
*subemarginatum.*

*Antennae clava*  
*perfoliata.*

*piceus.*      1. H. niger sterno canaliculato postice spinoso Geoff.  
Inf. 182. 1. tab. 3. fig. 1.

Dytiscus piceus Lin. syst. nat. 2. 669. 1. Fn.  
Sv. 7 S4. Degeer Inf. 4. 371. 1. tab. 14. fig. 12.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 33. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquis piscibus infestus.

*olivaceus.*      2. H. olivaceus sterno canaliculato postice spinoso,  
coleoptris emarginatis.

Dytiscus hastatus Act. Berol. 4. tab. 7. fig. 2.

Habitat in Coromandel.

Corpus totum olivaceum sive obscure virescens,  
laeve, glabrum antennis femoribusque piceis.  
Sternum postice porrectum fere longitudine  
abdominis. Coleoptra emarginata.

Hydrophili corpus oblongum, gibbum, glabrum,  
immarginatum, capite majusculo in emarginatura tho-  
racis inserto, ovato, oculis rotundatis vix prominulis  
baseos, antennis brevibus ante oculos insertis in fo-  
veola sub oculis recondendis, thorace transverso, la-  
titudine elytrorum sterno saepius utrinque prominente,  
scutello majori, triangulo, clytris rigidis, haud deflexis  
longitudine abdominis, pedibus brevibus, femoribus  
compressis, tibiis rotundatis, tarsis compressis utrinque  
ciliatis, quadriarticulatis absque ungue, colore nigro  
aut obscuro.

3. *H. niger elytris striatis rotundatis, sterno postice ater.*  
spinoso.  
Habitat in America merid. Mus. Dom. Lund.  
Statura omnino *H. olivacei*. Corpus totum atrum,  
nitidum elytris punctato striatis. Antennae per-  
foliatae clava ferruginea. Pedes atri.
4. *H. niger nitidus elytris substriatis.* Geoff. Inf. 1. *caraboides*,  
183. 2. Degeer Inf. 4. 376. 2.  
*Dytiscus caraboides* Linn. syst. nat. 2. 664. 2.  
Fn. Sv. 765.  
Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 4. fig. 1. 2.  
Bergstr. Nomencl. 1. tab. 5. fig. 8. 9. tab. 7.  
fig. 8. 9. Lar. Pup.  
Schaeff. Icon. tab. 33. fig. 10.  
Habitat in Europae aquis.
5. *H. niger nitidus thoracis elytrorumque marginibus flavis.*  
*lateralis*.  
Habitat in America meridionali.  
Praecedente duplo minor, totus ater, laevis, ni-  
tidus, solo margine flavo. Subtus niger sterno  
postice porrecto, acutissimo puncto medio flavo.  
Pedes ferruginei.
6. *H. niger nitidus pedibus rufis, sterno postice rufipes,*  
spinoso.  
Habitat in China Mus. Dom. Lund.  
Statura *H. caraboides* at duplo fere minor. Cor-  
pus totum atrum, nitidum, glabrum, immacu-  
latum. Antennae ferrugineae, clava perfoliata,  
fusca. Sternum postice porrectum, spinosum,  
acutissimum. Pedes rufi.
7. *H. fuscus obscurus clypeo emarginato.* *emarginatus*.  
*Dytiscus emarginatus* Schall. Act. Hall. 1.  
Habitat in Europae aquis plantis adhaerens.

- — —
- Paullo major H. scarabaeoides & gibbus, fuscus,  
obscurus, minime nitidus. Capitis clypeus late  
emarginatus.*
- Variat thoracis margine elytrisque griseis.*
- scarabaeoi- 8. H. niger elytris striatis, pedibus piceis.  
des. Dytiscus scarabaeoides Linn. syst. nat. 2. 664. 3.  
Scarabaeus piceus Geoff. Inf. 1. 83.  
Habitat in Europae aquis.*
- picipes. 9. H. niger pedibus piceis, elytris laevibus.  
Habitat in Germaniae aquis.  
Antennae mihi defunt. Corpus laeve, glabrum.  
Forte potius ad Tritomae genus emendandus.*
- orbicularis. 10. H. subrotundus corpore glabro atro.  
Habitat in Germaniae aquis.  
H. scarabeoides minor & fere orbiculatus, totus  
laevissimus, nitens.*
- subrotun- 11. H. subrotundus glaber ater elytris striatis.  
dus. Habitat in Americae aquis Dr. Pflug.  
Statura omnino H. orbicularis at paullo minor.  
Caput & thorax atra, nitida, immaculata, lae-  
via. Elytra striata, nigra, immaculata. Corpus  
& pedes picea.*
- bicolor. 12. H. ovatus supra flavescentia, subtus ater.  
Habitat in Daniae aquis Dom. de Sehestedt.  
Major H. collari. Facies fere Dytisci, at antennae  
omnino perfoliatae hujus generis. Caput, tho-  
rax, elytra glabra, laevia, flavescentia, imma-  
culata. Corpus atrum pedibus flavis. Palpi  
anteriores elongati antennis longiores.*
- collaris. 13. H. niger ore thoracis lateribus lineisque ely-  
trorum ferrugineis.  
Habitat in America meridionali.  
Gibbus, ater, nitidus. Os lateraque thoracis  
ferruginea. Elytra nigra margine lineisque*

aliquot abbreviatis, ferrugineis. Antennae perfoliatae & pedes fusci.

14. H. ovatus niger thorace pallido, elytris striatis *undatus*.  
griseis.

Habitat in Americae meridionalis aquis Dr. Pflug.

Statura omnino H. luridi at paullo major. Caput nigrum, nitidum antennis palpisque flavis. Thorax pallidus linea dorsali duplicata nigra. Elytra striata, grisea, nigro obsolete undata. Corpus nigrum pedibus flavis.

15. H. ovatus niger capite thorace elytrorumque *erythrocephalus*.  
limbo rufis.

Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Statura omnino H. collaris paullo minor. Caput & thorax laevia, rufa, immaculata, nitida. Elytra nigra limbo omni rufo. Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus nigris.

16. H. ater elytris striatis: apice tibiisque ferrugineis. *haemorrhoidalis*.  
Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Statura omnino H. orbicularis at paullo minor & magis oblongus. Caput & thorax laevia, atra, nitida, immaculata. Elytra striata, atra apice obsolete ferruginea. Pedes nigri tibiis ferrugineis.

17. H. ater nitidus thoracis elytrorumque margine *marginellus*.  
rufo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino praecedentis. Caput atrum, immaculatum. Thorax & elytra laevissima, atra margine exteriori ferrugineo. Pedes atri tarvis ferrugineis.

18. H. ater nitidus elytris striatis basi apiceque *obscurus*.  
ferrugineis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

- Statura praecedentium. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra striata, obscuriora, basi apiceque ferruginea. Pedes subferruginei.
- luridus.* 19. H. thorace elytrisque striatis fusco cinereis, corpore nigro Degeer Inf. 4. 378. 4. t. 15. f. 12.  
Dytiscus luridus Linn. syst. nat. 2. 665. 5. Fn. Sv. 767.  
Habitat in Europae aquis frequens.
- minutus.* 20. H. ovatus niger elytris pedibusque griseis.  
Dytiscus dermestoides Forster nov. Inf. spec. Cent. 1. 53.  
Habitat in Europae aquis.  
Vesperi sonorus Goeze.
- griseus.* 21. H. supra cinereus subtus fuscus.  
Habitat in Saxoniae aquis Dom. Hybner.  
Statura & magnitudo H. minuti at supra totus cinereus. Pedes cinerei.
- bipunctatus* 22. H. thorace atro : margine griseo, elytris fuscis : margine puncto que postico albidis Geoff. Inf. 1. 184. 4.  
Dytiscus fusipes Linn. syst. nat. 2. 664. 4.  
Habitat in aquis Upsaliae.  
Parvus. Caput atrum puncto utrinque marginali, griseo. Thorax ater, nitidus margine griseo. Elytra fusca margine pallidiore & puncto distincto griseo versus apicem. Punctum elytrorum interdum obsoletum.
- pygmaeus.* 23. H. griseus capite postice atro, thorace flavescente.  
Habitat in Americae meridionalis aquis Dr. Pflug.  
Minutus. Caput antice griseum, postice atrum, nitidum. Thorax flavesrens. Elytra laevia, grisea, nitida, immaculata. Corpus & pedes obscuriora.

24. DYTISCUS. *Palpi sex filiformes.*

*Labium cornuum, truncatum, integrum.*

*Antennae setaceae.*

1. *D. niger elytrorum marginibus dilatatis : linea latissimus. flava.* Linn. syst. nat. 2. 665. 6. Fn. Sv. 768.

Frish. Inf. 2. tab. 7. fig. 1. 2.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 19.

Schaeff. Icon. tab. 277. fig. 1. 2.

Habitat in Europae aquis piscibus infestus. Mas glaber, faemina sulcata.

In propriam speciem saevit.

2. *D. niger capitis fascia thoracis margine elytrorumque stria costali ferrugineis.*

Habitat Surinami Dom. Yeats.

Caput nigrum fascia supra os puncto utrinque impresso ferruginea. Thorax glaber, niger margine ferrugineo. Elytra glabra striis tribus punctatis remotis, nigra stria costali ferruginea.

Faemina elytris semistriatis coloreque ferrugineo multo obscuriore.

3. *D. niger thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis* Linn. syst. nat. 2. 665. 7.

Fn. Sv. 769. Geoff. Inf. 186. 2.

Dytiscorum corpus oblongum, depresso, planum, immarginatum, agile, capite subrotundo, inserto, oculis rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis ante oculos insertis, thorace transverso, angusto margine parum prominente, scutello brevi, triangulari, elytris rigidis, incumbentibus longitudine abdominis : faeminae saepius semistriatis, pedibus natatoriis, tarsis anticis maris patellatis, posticis ciliatis, muticis, colore plerumque nigro.

Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 1. fig. 9. 10. 11.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 42.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.

Habitat in Europae aquis.

Maribus anteriorum pedum plantae haemisphericae, patelliformes ad arctiorem copulam. Faemina semifistriata.

Agilis in dorso incubatis saltu se restituit. Si diu in sicco detineantur, aegre se immergunt.

*punctulatus* 4. D. niger clypeo thoracis elytrorumque margine albis, elytris striis tribus punctatis Geoff. Inf. 1. 185. 1.

Dytiscus lateralmarginalis Degeer Inf. 4. 396. 3.

Roef. Inf. 2. 2. Aquat. 1. tab. 2.

Frish. Inf. 13. tab. 1. fig. 7.

Habitat in rivulis sylvaticis Kiloniae Dom. Lund.

Caput atrum clypeo albo. Thorax ater margine laterali albo. Elytra nigra, nitida striis tribus punctatis exarata margineque exteriori albo, qui tamen color apicem elytrorum haud attingit. Faemina semifistriata.

*Roefelii.* 5. D. virescens clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori flavis, elytris obsolete striatis.

Dytiscus dispar Ross. Fn. Etr. 1. 199. 489.

Habitat in Galliae aquis Dom. Bosc.

Nimis certe affinis D. punctulato at differt corpore latiori elytrisque haud laevibus sed striis parvis abbreviatis fere rugosis.

*limbatus.* 6. D. niger thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris laevissimis.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Thoracis margo lateralis tantum flavus. Sturnum postice abbreviatum. Pedes nigri femoribus anticis ferrugineis. Abdomen atrum utrinque punctis tribus ferrugineis.

7. D. niger fronte thoraceque fulvis, elytris striga *ruficollis*.  
baseos margineque exteriori testaceis.  
Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.  
Caput fulvum margine nigro punctisque duobus  
impressis. Thorax obscure fulvus. Elytra laevia,  
glabra, atra, striga parva baseos flexuosa mar-  
gineque exteriori denticulos duos exferente  
testaceis. Corpus nigrum pedibus anticis flavis.
8. D. coleoptris sulcis decem longitudinalibus vil- *sulcatus*.  
losis Linn. syst. nat. 2. 666. 13. Fn. Sv. 773.  
Geoff. Inf. 1. 189. 5.  
Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 3. fig. 7.  
Frish. Inf. 13. tab. 7.  
Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 3.  
Habitat in Europae, Americae aquis.  
Mas elytris laevibus, glabris.
9. D. elytris flavis: fasciis duabus punctoque, api- *fasciatus*.  
cis nigris.  
Habitat in Indiae aquis.  
Caput flavum. Thorax flavus linea dorsali nigra,  
quae basi apiceque extenditur. Puncta duo parva,  
dorsalia, rubra. Elytra laevia, flava futura ni-  
gra. Fascia lata nigra in medio, altera angustior,  
dentata versus apicem & punctum distinctum in  
apice. Corpus nigrum.
10. D. fuscus thorace flavo: fascia abbreviata nigra, *striatus*.  
elytris transversim subtilissime striatis Linn.  
syst. nat. 2. 665. 9. Fn. Sv. 770.  
Degeer Inf. 4. 399. 5. tab. 15. fig. 16.  
Habitat in Europae aquis frequens.
11. D. fuscus thoracis margine flavo, elytris trans- *fuscus*.  
versim subtilissime striatis Linn. syst. nat. 2.  
665. 10.  
Habitat in Europae aquis Dom. Smidt.

Nimis affinis D. striato at paullo minor. Caput atrum ore flavo. Thorax niger lateribus flavis. Elytra adhuc subtilius transversim striata striisque duabus e punctis impressis, fusca margine flavo. Corpus atrum. Pedes ferruginei femoribus nigris.

- Lanio.* 12. D. niger ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuscis.

Habitat in Maderae aquis Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum ore punctisque duobus inter oculos rufis. Thorax niger margine rufescente. Elytra fusca lineis duabus punctorum impressorum.

- cicurus.* 13. D. ater laevis ore verticis puncto thoracisque margine rufis, elytris flavo striatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Prof. Vahl.

Caput atrum ore maculaque magna inter oculos rufis. Oculi argentei, fusco punctati. Thorax ater linea dorsali margineque rufis. Elytra fusca flavo striata. Corpus atrum.

- vittatus.* 14. D. ater laevis elytris vitta marginali flava: macula baseos atra.

Habitat in Indiae aquis Mus. Dr. Hunter.

Caput atrum ore flavescente. Thorax ater. Elytra laevia, atra: vitta marginali flava apicem tamen haud attingente basique macula magna, oblonga, atra.

- cinereus.* 15. D. cinereus elytrorum margine thoracisque medietate flavis Linn. syst. nat. 2. 666. 11. Fn.

Sv. 771. Geoff. Inf. 1. 188. 4.

Roef. Inf. 2. Aquat. 1. tab. 3. fig. 6.

Degeer Inf. 4. 397. 14.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 7.

Habitat in Europae aquis, frequens.

16. D. *cinereus elytris fascia dentata nigra*, *griseus.*  
 Habitat in Indiae aquis Mus. Dom. Lund.  
 Caput flavescens macula frontali, transversa, nigra.  
 Thorax griseus maculis duabus dorsalibus transversis, nigris. Elytra grisea lineis tribus punctorum impressorum. In medio macula marginalis & postice fascia dentata nigra. Corpus subitus flavescens.
17. D. *pallens elytris griseis*: puncto oblongo lateral i *sticticus*.  
*nigro impresso* Linn. syst. nat. 2. 666. 12.  
 Habitat in Africæ aquis.  
 Lineae duae elytrorum vix conspicuae e punctis fuscis.
18. D. *ater glaber elytris punctis albis quinque*. *10 punctatus*.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennæ breves, ferrugineæ. Caput atrum fronte pallescente. Thorax glaber, ater macula utrinque marginali pallida. Elytra atra, glaberrima punctis quinque albis. 2. 1. 2. Pedes fusci.
19. D. *ater ore elytrorumque margine ferrugineis, fuliginosus*, capite immaculato.  
 Habitat in Germaniae aquis.  
 Statura & magnitudo omnino D. 2 pustulati. Caput atrum ore ferrugineo. Thorax ater margine vix ferrugineo. Elytra laevia, atra margine ferrugineo. Corpus atrum pedibus ferrugineis.
20. D. *laevis ater capite postice punctis duobus rubris* Linn. syst. nat. 2. 667. 17. *2 pustulatus*.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Puncta duo capitis rubra vix nudo oculo conspicua.
21. D. *capite thoraceque flavis, elytris nigris: margini omni albo*. *cinctus*.  
 Habitat in America Dom. Mauduit.

Caput & thorax flava, immaculata. Elytra nigra  
marginē & sutura albīs.

*2 punctatus.* 22. D. ater thorace flavo: punctis duobus nigris, ely-  
tris flavo fuscoque variis.

Habitat in Germaniae aquis.

Caput nigrum ore subferrugineo. Thorax flavus  
punctis duobus dorsalibus atris. Elytra laevia,  
glabra, fusca, flavo variegata. Corpus atrum  
pedibus ferrugineis.

*feneſtratus.* 23. D. subtus ferrugineus, supra niger, elytris  
punctis duobus feneſtratis.

Habitat Hamburgi Mus. Dom. Schulz.

Caput nigrum ore antennis punctisque duobus  
baseos ferrugineis. Thorax niger margine fer-  
rugineo. Elytra nigra punctis duobus feneſ-  
trato hyalinis, altero in medio, altero versus  
apicem.

*Hybneri.* 24. D. laevis ater ore thoracisque margine ferru-  
gineis, elytris linea marginali flava.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Hybner.

Caput nigrum ore ferrugineo. Thorax niger  
margine in primis antico ferrugineo. Elytra  
laevia, atra linea marginali flava, quae tamen  
apicem haud attingit. Corpus nigrum.

*ſtagnalis.* 25. D. laevis niger thorace antice ferrugineo, ely-  
tris fuscis flavo lineatis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Hybner.

Caput nigrum ore ferrugineo. Thorax niger,  
antice ultra dimidium ferrugineus margine ta-  
men ipso nigro. Elytra laevia, fusca, flavo  
lineata. Margo flavescit. Corpus nigrum pedi-  
bus flavis.

*transverſa-* 26. D. ater thorace antice ferrugineo, elytrorum  
*lis.* margine ſtriaque baseos abbreviata flavis Myll.  
Zool. Dan. 71. 668.

Bergstr. Nomencl. I. tab. 5. fig. 6.

Habitat in Europae aquis.

27. D. ater elytra basi margineque exteriori ferrugineis, sterno porrecto compresso.

Habitat in Americae merid. aquis Dom. Smidt.

Statura & magnitudo D. transversalis. Caput atrum antennis oreque obscure ferrugineis. Thorax ater, nitidus margine exteriori obscure ferrugineo. Elytra nigra atomis flavis minutissimis irrorata, basi flava scutello futuraque tamen omnino atris. Margo exterior obsolete flavescens. Corpus atrum pedibus piceis. Sternum exsertum, compressum.

28. D. gibbus capite thorace elytrorumque basi ferrugineis, elytris truncatis.

Dytiscus tardus Act. Berol. nat. Cur. 4. t. 7. f. 3.

Habitat in aquis stagnantibus Alsatiae Prof. Hermann.

Caput obscure ferrugineum oculorum orbita nigra. Thorax ferrugineus margine antico & postico nigris. Elytra laevia, nigra basi ferruginea, apice truncata. Abdomen ferrugineum apice nigrum.

29. D. niger elytris striga abbreviata baseos punctisque duobus fluorescentibus.

Habitat in Kiliae aquis Dom. Daldorf.

Caput & thorax nigra margine obsolete ferrugineo. Elytra glabra, laevia, nigra striga baseos undata fluorescente, quae tamen futuram haud attingit. In medio versus marginem exteriorem macula et versus apicem punctum ferruginea. Pedes picei.

30. D. gibbus ferrugineus elytris nigris apice acuminatis.

Habitat in Kiliae aquis stagnantibus Mus. Dom.  
de Sehestedt.

Caput ferrugineum basi parum nigricante. Thorax ferrugineus margine postico nigro. Elytra laevia, nigra basi marginaque obsolete ferrugineo maculata. Corpus & pedes ferruginea abdome apice nigro.

Variat capite thoraceque totis ferrugineis.

- uliginosus.* 31. D. ater nitidus antennis pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis Linn. syst. nat. 2. 667. 20. Fn. Sv. 776.

Habitat in Europae aquis.

- irroratus.* 32. D. testaceus nigro irroratus capite pectoreque nigris.

Habitat in Americae aquis.

Caput nigrum ore testaceo. Thorax glaber, laevis, nitens, testaceus punctis duobus dorsalibus nigris. Pectus nigrum. Abdomen & pedes testacea.

- agilis.* 33. D. niger ore thorace elytrorum margine pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino D. haemorrhoidalis. Caput ferrugineum margine postico nigro. Thorax ferrugineus, immaculatus. Elytra laevia, nigra margine exteriori rufa. Corpus nigrum pedibus rufis.

- maculatus.* 34. D. niger thorace fascia pallida, elytris albo nigroque variis Linn. syst. nat. 2. 666. 15. Fn. Sv. 777.

Habitat in Europae aquis.

- erythrocephalus.* 35. D. ovato oblongus capite pedibusque rufis Linn. syst. nat. 2. 660. 14. Fn. Sv. 774.

Degeer Inf. 4. 404. 12.

Habitat in Europae aquis,

36. D. ovato oblongus planus niger tibiis solis rufis. *planus.*  
 Habitat in Daniae aquis Mus. Dom. Lund.  
 Statura omnino præcedentis at caput nigrum.  
 Corpus, planum læve, vix nitidum. Tibiae ferrugineae.
37. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque striatis. *varius.*  
 Habitat in Patagoniae aquis Mus. D. Banks.  
 Caput nigrum ore antennisque rufis. Elytra striis numerosissimis, approximatis nigris cinereisque variegata. Sutura nigra margoque exterior cinereus. Subtus piceus pedibus ferrugineis.
38. D. fuscus thorace flavo : punctis quatuor nigris, *notatus.*  
 elytris stria suturali flava.  
 Dytiscus notatus Bergstr. Nom. 1. tab. 5. fig. 10.  
 Habitat in Germaniae aquis.  
 Thorax colore variat mox rufus, mox punctis, mox fascia abbreviata nigris. Elytrorum margo flavescit.
39. D. supra ater elytris striatis, subtus ferrugineus. *bicolor.*  
 Habitat in Aquapim Guineae Dom. Isert.  
 Statura omnino D. notati, at paullo minor.  
 Caput & thorax atra, nitida ore rufo. Elytra striata, nigra, immaculata. Corpus cum pedibus ferrugineum.
40. D. ater capitis thoracisque antico ferrugineo, *rufipes.*  
 elytris nigro ferrugineoque striatis.  
 Habitat — — Dom. Lund.  
 Parvus. Caput antice rufum, postice nigrum.  
 Antennae rufae. Thorax antice rufus, postice niger. Elytra striis rufis nigrisque alternis.  
 Corpus atrum pedibus rufis.
41. D. thorace ferrugineo : punctis duobus baseos *depressus.*  
 nigris, elytris fuscis ferrugineo maculatis.  
 Habitat in Sveciae aquis.

*Corpus parvum, depresso. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax ferrugineus margine antico maculisque duabus baseos nigris. Elytra fusca maculis tribus marginis & quibusdam disci ferrugineis.*

- dorsalis.* 42. D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inaequali ferrugineis.

Habitat in Kiliae aquis Dom. Daldorf.

Nimis affinis sequenti at major & punctum tantum unicum distinctum baseos. Pedes ferruginei.

- puftulatus* 43. D. ater capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baseos majore.

Habitat in Sveciae aquis.

Minutus. Caput ferrugineum oculorum regione nigra. Thorax niger lateribus ferrugineis. Elytra glabra, laevia, nigra maculis tribus ferrugineis, prima baseos majore, lunata, reliquis duabus versus marginem. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

- palustris.* 44. D. laevis elytris lituris duabus lateralibus albis Linn. syst. nat. 2. 667. 19. Fn. Sv. 775.

Habitat in Europae aquis.

Thorax ferrugineus.

- ovatus.* 45. D. ovatus fuscus capite thoraceque ferrugineis Linn. syst. nat. 2. 667. 18. Fn. Sv. 2282. Geoff. Inf. 1. 191. 10.

Dytiscus sphæricus Degeer Inf. 4. 402. 9. t. 14. fig. 17-19.

Habitat in Europae aquis.

Corpus subtilis ferrugineum.

- picipes.* 46. D. niger thorace antice ferrugineo, elytris flavo lineatis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Hybner.

Caput nigrum ore ferrugineo. Thorax antice ferrugineus postice niger. Elytra lœvia, nigra, lineis plurimis flavescentibus. Corpus nigrum pedibus piceis.

47. D. niger elytris basi lituraque apicis pallidis. *lituratus.*  
 Habitat in Italiae aquis Dom. Allioni.  
 Corpus parvum, depresso, atrum. Basis elytrorum pallida & versus apicem punctum unum alterumue. Pedes picei.
48. D. supra cinereus subtus niger. *chrysome-*  
*linus.*  
 Habitat in Germaniae aquis Dom. Schneider.  
 Parvus. Caput thorax elytra lœvia, obscure cinerea, immaculata. Corpus nigrum. Pedes cinerei femoribus nigris.
49. D. niger capite thoraceque rufis : signaturis *signatus.*  
*nigris.*  
 Habitat in Patagoniae aquis Mus. Dom. Banks.  
 Caput rufum fascia in medio inter oculos nigra. Thorax lœvis, rufus lineola transversali nigra margines haud attingente. Elytra nigra margine subrufescente. Pedes ferruginei.
50. D. testaceus elytris nigris: maculis sex testaceis. *12 pustula-*  
*tus.*  
 Habitat — — Mus. Dom. Bosc.  
 Statura & magnitudo D. chrysomelini. Caput cum antennis testaceum. Thorax testaceus margine antico posticoque nigro margines exteriores tamen haud attingente. Elytra lœvia, nigra maculis sex 2. 2. 2. oblique positis. Corpus & pedes testacea.
51. D. niger fronte thoracis lateribus elytrorumque 8 pustula-  
*punctis marginalibus ferrugineis.* *tus.*  
 Habitat in Sveciae aquis Dom. Com. de Souza.  
 Medius. Antennae ferrugineae. Caput nigrum fronte late ferruginea. Thorax marginatus,

niger lateribus late ferrugineis margine tamen ipso nigro. Elytra laevia, nigra maculis quatuor parvis ferrugineis ad marginem. Corpus nigrum, ferrugineo maculatum. Pedes rufi.

- halensis.* 52. D. ater thorace rufo: baseos medio nigro; puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Hybner.

Parvus, planus. Caput rufum, immaculatum. Thorax rufus, in medio ad basin macula magna nigra & in hac punctum rufum. Elytra cinerea striis plurimis, approximatis, confluentibus imprimis ad futuram, nigris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt. Corpus atrum pedibus rufis.

- rufifrons.* 53. D. niger capite thoracis elytrorumque margine puncto que baseos ferrugineis.

Habitat in Galliae aquis Mus. Dom. Bosc.

Parvus, planus. Antennae ferrugineae apice nigrae. Caput obscure ferrugineum. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra laevia, plana, nigra margine puncto que magno baseos ferrugineis. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.

- granularis.* 54. D. niger elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus rufis. Linn. syst. nat. 2. 667. 22.

Dytiscus minimus Scop. carniol. 2. 97.

Habitat in Europae borealis aquis.

- confluens.* 55. D. niger capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis: lineis quatuor disci nigris.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Caput & thorax obscure ferruginea. Elytra pallida in medio lineolis quatuor postice confluentibus nigris. Pedes flavescentes.

- obliquus.* 56. D. ferrugineus elytris maculis quinque obliquis fuscis.

- Dytiscus laminatus Schulz Act. Hal. 13. 12.  
 Habitat in Kiliae aquis Dom. Daldorf.  
 Caput, thorax, corpus ferruginea, Elytra ferruginea maculis quinque elongatis, obliquis, fuscis exteriore hamata. Pedes ferruginei.
57. D. oblongus flavescens elytris cinereis: punctis *impressus*.  
*impressis striatis.*  
 Dytiscus impressostriatus Act. Hal. 1. 312.  
 Habitat in Europae aquis.  
 Corpus magis oblongum, antice attenuatum.  
 Corpus, caput, thorax flavescentia oculis solis nigris. Elytra cinerea striis plurimis punctorum impressorum.
58. D. oblongus ferrugineus capite basi nigro, elytris *semipunctatis*.  
*obscuris apice punctatis.*  
 Habitat in India orientali Dom. Lund.  
 Corpus parvum, oblongum. Caput ferrugineum basi nigrum. Thorax glaber, laevis, ferrugineus punto medio nigro. Elytra ferrugineo fusca apice punctata. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.
59. D. oblongus ater coleoptris ferrugineis: cruce *crux*.  
*atra.*  
 Habitat in Italiae aquis Dr. Allioni,  
 Corpus parvum, atrum, nitidum. Coleoptra sola ferruginea futura fasciaque lata communis atris.  
 Pedes ferruginei.
60. D. oblongus ater thorace punctis duobus, elytris *geminus*.  
*lineolis duabus baseos punctoque apicis albis.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Minutus. Caput atrum, nitidum, immaculatum.  
 Thorax ater, nitidus utrinque punto magno marginali albo. Elytra laevia, atra lineolis duabus, parvis, fere connatis baseos margine

exteriori puncto que apicis albis. Corpus atrum  
pedibus pallidis.

*lineatus.* 61. D. ferrugineus coleoptris fuscis : lineis flavescentibus.

Bergstr. Nomencl. 1. 32. 8. 9. tab. 6. fig. 8. 9.  
Habitat in aquis Alsaticae Prof. Hermann.

Caput ferrugineum basi nigricans. Coleoptra  
fusco cinereoque mixta vel grisea margine pal-  
liodore. Per medium dorsi lineae distinctae  
albicantes.

*inæqualis.* 62. D. ferrugineus elytris nigris : lateribus inæqua-  
liter ferrugineis.

Habitat in Sveciae aquis.

Caput ferrugineum orbita oculorum nigra. Tho-  
rax ferrugineus postice niger. Elytra lœvia,  
nigra margine ferrugineo ramulos inæquales,  
abbreviatis exserente. Subtus ferrugineus.

Variat interdum linea media elytrorum flava a  
macula baseos ad medium marginis exterioris  
ducta.

*minutus.* 63. D. flavesens elytris fuscis : margine flavo ma-  
culato Linn. syst. nat. 2. 667. 27. Fn. Sv. 778.

Degeer Ins. 4. 404. 18. tab. 16. fig. 9.

Habitat in Europæ aquofis.

*pygmaeus.* 64. D. ferrugineus elytris nigris : margine solo fer-  
rugineo.

Habitat in Daniae aquis Mus. de Sehestedt.

Parvus. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput  
ferrugineum, immaculatum. Thorax ferrugi-  
neus margine antico in medio nigro. Elytra  
glabra, lœvia, nigra margine toto & solo fer-  
rugineo.

*reticulatus.* 65. D. ferrugineus coleoptrorum disco nigro ferru-  
gineo reticulato.

Habitat — — Mus. Dom. de Sehestedt.

Parvus. Caput & thorax ferruginea, immaculata. Elytra lœvia margine ferrugineo reticulata. Corpus ferrugineum.

66. D. fuscus capite thoraceque flavis, antennis medio incrassatis. *crafficornis.*

*Dytiscus crafficornis* Myll. Zool. Dan. 779.

Habitat in Germaniae aquis.

Antennæ singulares, flavae articulo medio incrassato & uti videtur fisso. Caput & thorax flava. Elytra fusca basi flavescentia.

67. D. planus ater elytris basi pedibusque ferrugineis. *flavipes.*

Habitat in India orientali D. Lund.

Parvus planus. Caput atrum puncto utrinque impresso. Antennæ ferrugineae. Thorax ater, immaculatus. Elytra lœvia, atra basi ferruginea. Corpus atrum pedibus ferrugineis.

68. D. ferrugineus thorace nigro, elytris pallidis, *pictus.* futura maculaque laterali nigris.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Hybner.

Caput & corpus ferruginea. Thorax niger margine parum ferrugineo.

69. D. ater immaculatus antennis pedibusque ferrugineis. *nigrita.*

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Minutus, latus, ater, glaber, immaculatus. Antennæ & pedes magis ferrugineae.

70. D. ater thorace elytrisque margine albis. *pustillus.* Habitat in Italiae aquis Dr. Allioni.

Thorax ater margine albo. Elytra nigra margine inprimis antico & apicis albo.

71. D. gibbus niger thoracis fascia antica elytrorumque maculis ferrugineis. *parvulus.*

Habitat in Daniae aquis Mus. Dom. Lund.

Minutus, gibbus. Caput nigrum fronte anten-  
nisque ferrugineis. Thorax niger fascia ante  
inaginem anticum ferruginea. Elytra gibba,  
punctata, nigra maculis plurimis rufis inprimis  
ad marginem exteriorem indistinctis. Corpus  
nigrum pedibus rufis.

25. GYRINUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, uniden-  
tata, acutissima.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* cylindricae.

*natator.* 1. G. substriatus Linn. syst. nat. 2. 567. 1. Fn.  
Sv. 779. Geoff. Inf. 1 194. tab. 3. fig. 3.

Roef. Inf. 3. tab. 3 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 10.

Schaeff. Icon. tab. 134. fig. 5.

Habitat in Europae lacubus.

Velocissime supra aquam per orbes cursitat nitidissimus, foetens, dum vero urinatur bullam æream hydrargiri coloris secum trahit.

*bicolor.* 2. G. niger subtus ferrugineus pedibus posticis compressis.

Habitat in Sveciae aquis Prof. Lefke.

Præcedente major totus supra niger subtus ferrugineus. Pedes postici valde compressi.

---

Gyrini corpus ovatum, marginatum, agile, capite ovato, inserto, oculis rotundatis, subverticalibus, antennis brevibus, obtusis in fovea laterali capitis insertis, thorace transverso, marginato, laevissimo, elytris marginatis laevissimis, abdomine brevioribus, pedibus anticis porrectis, posticis quatuor brevissimis, natatoriis, colore nigro, nitido, splendente.

3. *G. substriatus virescens elytris abbreviatis unidentatis australis.*

Habitat in novae Hollandiae aquis Dom. Banks.

Supra virescens, obscure nitens. Elytra substriata, abdomine breviora, truncata, dente unico laterali armata. Corpus atrum pedibus quatuor posticis ferrugineis.

4. *G. lævis ater opacus pedibus quatuor posticis bre-americanus.*  
vibus testaceis Linn. syft. nat. 2. 568. 2.

Habitat in Americae aquis Mus. Tottianum.

Præcedente major & obscurior.

5. *G. lævis olivaceus nitidus elytris fascia postica micans.*  
nitidiore.

Habitat in Aquapim Guineae Dom. Isert.

Magnus in hoc genere. Corpus totum læve, olivaceum cupro argentoque micans, nitidum, fascia postica elytrorum nitidiore, fere obsoleta. Subtus corpus nigrum pedibus posticis testaceis.

6. *G. niger nitidus thoracis elytrorumque margine spinosus.*  
flavo, elytris spinosis.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Distinctus spinis duabus elytrorum elongatis, acutissimis. Corpus subtus ferrugineum ano nigro.

7. *G. viridis nitens thoracis elytrorumque margine striatus.*  
pallido, elytris striatis.

Gyrinus capensis elytris viridi æneis margine pallido Thunberg nov. sp. 1. 27. huc potius pertinere videtur.

Habitat in Barbariae aquis Mus. D. Desfontaines.

*G. natatore minor.* Antennae breves, crassæ, virides. Caput viridi æneum, nitidum, interdum fronte violacea. Thorax æneus, violaceo nitidus. Elytra viridi violaceoque striata apice rotundata, inermia. Corpus atro æneum pedibus omnibus pallidis.

—

**26. ELOPHORUS.** *Maxilla cornea apice membranacea.*

*Labium corneum,  
quadratum.*

*Antennae clava solida.*

*aquaticus.* 1. E. fuscus thorace rugoso elytrisque fusco æneis.

Silpha aquatica Linn. syst. nat. 2. 563. 25.

Dermestes Geoff. Inf. 1. 105. 15.

Hydrophilus æneus Degeer Inf. 4. 379. 5. tab. 15.  
fig. 5. 6.

Habitat in aquis stagnantibus frequens.

*nubilus.* 2. E. griseus thorace elytrisque sulcato rugosus.

Habitat Hamburgi Mus. Dom. Schulz.

Thorax griseus, quinquesulcatus. Elytra sulcata,  
grisea, obscura. Pedes concolores.

*elongatus.* 3. E. thorace punctato æneo, elytris porcatis fuscis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Helwig.

Paullo minor E. aquatio. Caput fuscum. Thorax inæqualis, punctatus, æneus, nitidus. Elytra striis elevatis & inter strias lineae duae punctorum impressorum, fusca, immaculata. Pedes picei.

Elophori corpus parvum, oblongum, immarginatum, agile, capite parvo, ovato, oculis rotundatis, prominulis, antennis brevibus ante oculos insertis, thorace planiusculo, transverso saepius, inæquali, scutello minuto, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, cursoriis, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro, saepius ænco.

4. E. fuscus thorace lœvi, elytris crenato striatis *humeralis.*  
puncto humerali testaceo.

Habitat in Germania Dom. de Loewenskiold.

Parvus hujus generis videtur. Antennae testaceae  
clava solida. Caput & thorax fusca, immacu-  
lata. Elytra crenato striata, fusca puncto  
magno humerali testaceo. Pedes testacei.

5. E. niger thorace sulcato, elytris striatis pedibus- *flavipes.*  
que testaceis.

Habitat in Sveciae aquis Dom. Com. de Souza.

Magnitudo & Statura omnino E. nubili. Caput,  
thorax, corpus nigra, immaculata. Thorax  
sulcis longitudinalibus impressus. Elytra striata,  
fusca, immaculata. Pedes testacei.

6. E. niger thorace inæquali, elytris crenato striatis. *crenatus.*

Silpha elongata Schall. Act. Hal. I.

Habitat in Kiliae aquis.

Statura & magnitudo omnino præcedentis totus  
fuscus pedibus solis obscure piceis. Thorax  
haud sulcatus, hinc inde subimpressus. Elytra  
crenato striata.

7. E. thorace marginato sublævi niger, elytris stria- *pygmaeus.*  
tis apice pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Minutus. Antennae flavescentes clava solida.

Caput nigrum. Thorax marginatus, niger,  
immaculatus. Elytra striata, nigra apice fer-  
ruginea. Pedes ferruginei.

8. E. thorace lœvi elytris striatis, corpore fusco *minimus.*  
immaculato.

Habitat in Europæ aquis Dom. Helwig.

Minutus. Elytra subtilissime striata, fusca, imma-  
culata.

27. CLERUS. *Palpi quatuor.*  
*antici filiformes.*  
*postici longiores, securi-*  
*formes.*  
*Antennae moniliformes.*

*mutillarius* 1. C. niger elytris fascia triplici alba basi rufis.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 2.

Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.

Major C. formicario. Corpus nigrum fronte hirsutie densa alba tecta. Thorax niger, vix pubescens. Elytra nigra, basi parum rufescentia fasciisque tribus albis, quarum prima interrupta, tertia apicis. Abdomen rufum.

*dubius.* 2. C. rufus elytris nigris: fascia duplici alba basique rufis.

Habitat in America boreali Dom. Yeats.

Caput rufum antennis brevibus. Thorax postice angustatus, rufus. Elytra nigra basi rufa fasciisque duabus undatis albis.

*ichneumo-* 3. C. capite thoraceque rufis, elytris nigris: fascia media rufa, strigaque apicis alba.

Habitat in America boreali Dom. Yeats.

Caput rufum antennis fuscis. Thorax gibbus, rufus, immaculatus, postice angustatus. Elytra basi subferruginea, tunc nigra, in medio fascia

Cleri corpus oblongum, plerumque hirtum, immarginatum, tardum, capite ovato, inserto, palpis exsertis, oculis rotundatis, prominulis, lateralibus, antennis ante oculos insertis, thorace subcylindrico, scutello brevi, rotundato, elytris rigidis, laevibus abdominis longitudine, pedibus brevibus, validis, feinoribus compressis, tibiis rotundatis, tarsis quadriarticulatis, colore minus nitido, elytris plerumque fasciatis aut maculatis.

- lata rufa, apice nigra striga postica alba. Pectus nigrum. Abdomen rufum. Pedes fusci.
4. C. niger fronte elytrorumque fascia cinereis. *Sphegeus.*  
Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.  
Antennae atrae. Caput nigrum fronte villosa, cinerea. Thorax villosus, niger. Elytra nigra, obscure nitida, in medio fascia lata parum sinuata & versus apicem futura cinereis. Abdomen rufum. Pedes cinerei.
5. C. niger thorace rufo, elytris fascia dupli alba *formicabasique rubris* Degeer Inf. 5. 160. 3. t. 5. f. 8. *rius.*  
Attelabus formicarius Linn. syst. nat. 2. 620. 8.  
Fn. Sv. 641.  
Sulz. Inf. tab. 4. fig. 8.  
Habitat in Europa, America, victitans Larvis.
6. C. niger fronte cinereascente, elytris maculis *sex guttatribus albis.* *tus.*  
Habitat in America Dom. Drury.  
Frons cinereascens. Thorax rotundatus, niger fascia postica, obsoleta, cinerea. Elytra laevia, nigra punctis tribus albis, anteriore baseos minore.
7. C. niger thorace rubro, elytris punctis duobus *4 maculatus* albis.  
Attelabus *4 maculatus* Schall. Act. Hall. 1. 288.  
Habitat in Saxoniae Pinetis Dom. Hybner.  
Parvus. Caput atrum antennis piceis. Thorax villosus, rufus. Elytra subvillosa, nigra punctis duobus albis. Pedes nigri.
8. C. niger elytris fascia alba basi rubris. *unifasciatus.*  
Attelabus Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.  
Roff. Fn. Etr. 1. 138. 352.  
Habitat in Europae australioris, Africae Onopordine Prof. Vahl.  
Similis praecedentibus at minor & fascia unica in medio elytrorum,

- Spunctatus.* 9. *C. cyaneus hirtus elytris rufis: punctis quatuor nigris.*  
 Habitat in Hispaniae umbellatis Prof. Vahl.  
 Corpus totum hirtum, cyaneum. Elytra rufa punctis quatuor nigris i. 3. i. Pedes cyanei.
- tricolor.* 10. *C. rufus capite nigro, elytris basi coeruleis medio rufis apice violaceis.*  
 Habitat in Africa æquinoctiali.  
 Caput atrum antennis piceis. Thorax glaber, obscure rufus. Elytra striato punctata. Pedes fusci femoribus basi rufis.
- 2 fasciatus.* 11. *C. pubescens viridiaeneus elytris cyaneis: fasciis duabus coccineis.*  
 Herbst Arch. tab. 25. fig. 3.  
 Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.  
 Caput & thorax pubescentia, virescenti coerulea. Elytra glabra, cyanea, nitida fasciis duabus coccineis, altera in medio, altera ante apicem.
- sipylus.* 12. *C. viridis elytris fascia dupli flava interrupta, thorace hirsuto.*  
 Attelabus sipylus Linn. syst. nat. 2. 620. 9.  
 Mus. Lud. Ulr. 63.  
 Habitat in Africa.
- Ammios.* 13. *C. hirtus viridis elytris cyaneis: maculis tribus flavis; posticis lunatis.*  
 Habitat in Ammi majori Africæ Prof. Vahl.  
 Caput & thorax hirta, obscure viridia. Antennæ flavae. Elytra cyanea maculis tribus, baseos simplici, media lunata quae ad marginem extenditur & tertia versus apicem lunata. Femora postica incrassata.
- apiarius.* 14. *C. subnudus cyaneus elytris rubris: fasciis tribus coeruleofuscis: tertia terminali.* Geoff. Ins. 1. 304. 1. tab. 5. fig. 4.

**Attelabus aparius** Linn. (syst. nat. 2. 620. 10.

Degeer Inf. 5. 157. 1. tab. 5. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. 6.

Habitat Larva frequens in apum alveariis, Imago  
in floribus.

15. C. hirtus cyaneus elytris rufis : macula communi *alvearius*.  
fasciisque tribus nigris ; tertia abbreviata, Geoff.  
Inf. 1. 304. 1. tab. 5. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 11.

Habitat Imago in Europae floribus Dom. Smidt.

Præcedenti affinis. Differt tantum magis hirtus,  
aut pilis densioribus testus & elytris macula  
magna quadrata communi baseos nigra fascia-  
que tertia haud terminali at abbreviata. An,  
præcedentis mera varietas ?

16. C. cyaneus abdomine pedibusque testaceis. *cyaneus*.

Habitat in India Dom. Hybner.

Medius. Antennae nigrae basi testaceae. Caput  
maximum, violaceum mandibulis porrectis,  
unidentatis. Thorax rotundatus & elytra gla-  
bra, nitida, cyanea, immaculata. Abdomen  
testaceum. Pedes testacei femoribus parum  
incrassatis.

17. C. niger hirtus elytris rufis : fasciis tribus nigris ; *crabroni-*  
*tertia terminali.* *formis.*

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forskahl.

Caput & thorax nigra, ferruginea, hirta. Elytra  
rubra fasciis tribus nigris, quarum ultima  
elytron terminat. Corpus nigrum, ferrugi-  
neo hirtum. Pedes nigri femoribus posticis  
clavatis.

—

**28. NOTOXUS.** *Palpi* quatuor securiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Antennae* filiformes, extorsum crassiores.

- porcatus.* 1. N. niger elytris porcatis.  
 Habitat in terra Dieimenii Mus. Dom. Banks.  
 Caput nigrum antennis piceis. Thorax cylindricus, pubescens, niger, immaculatus. Elytra plana, obtusa, porrecta. Pedes picei.
- violaceus.* 2. N. pubescens niger violaceo nitidus elytris laevibus: punctis tribus flavis.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Caput nigrum, obscure nitidum antennis piceis.  
 Thorax rotundatus, pubescens, niger, violaceo nitens. Elytra laevia, subpubescentia, nigra, violaceo colore nitentia punctis tribus flavis, quorum unicum ad basin, duo approximata in medio. Pedes ferruginei femoribus nigris basi ferrugineis.
- 2 fasciatus.* 3. N. thorace rotundato ferrugineus capite elytrorumque punto fascia apiceque nigris.  
 Habitat in Lapponia Dom. de Paykull.  
 De genere hæreo. Corpus parvum, cylindricum.  
 Caput nigrum ore antennisque ferrugineis.

Notoxi corpus elongatum, fere cylindricum, pilosum, immarginatum, tardum, capite ovato, inflexo, palpis exsertis, oculis rotundatis, prominulis, lateribus, thorace cylindrico postice parum angustato, scutello parvo, rotundato, elytris sublaevibus mollioribus longitudine abdominis, pedibus longioribus tenuioribus, femoribus rotundatis apice subclavatis, tarsis quadriarticulatis, colore minus nitente elytris, saepius fasciatis.

Thorax rotundatus, ferrugineus margine antico parum nigricante. Elytra ferruginea litura ante medium fasciisque duabus nigris, altera pone medium, altera apicis. Pedes ferruginei.

4. N. thorace fusco elytris ferrugineis: lineola baseos fascia media puncto que apicis nigris. *dubius.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Hujus generis videtur. Caput fuscum antennis filiformibus, piceis. Thorax obscurus, fuscus. Elytra laevia, ferruginea lineola baseos, fascia lata media puncto que apicis fuscis. Corpus & pedes ferruginea.

5. N. pubescens elytris nigris: fasciis tribus pallidis. *mollis.*

Attelabus mollis Linn. syst. nat. 2. 621. 11. Fn.

Sv. 642.

Clerus fuscus Geoff. Inf. 1. 305. 3.

Clerus fusco fasciatus Degeer Inf. 5. 159. 2.  
tab. 5. fig. 6.

Schaeff. Icon. tab. 60. fig. 2.

Habitat in Europa.

6. N. thorace in cornu supra caput protenso, elytris *monoceros.*  
puncto fascia que nigris.

Notoxus Geoff. Inf. 1. 356. tab. 6. fig. 8.

Meloe Monoceros Linn. syst. nat. 2. 681. 14.

Attelabus Monoceros Linn. Fn. Sv. 638.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 188. fig. 3.

Habitat in Europa.

7. N. thorace in cornu supra caput protenso, elytris *cornutus.*  
fasciis tribus atris.

Ross. Fn. Etr. 1. 139. 354. β: tab. 2. fig. 14.

Habitat in Juglande regia Italiae Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe Not. monocero. Differt tantum paullo minor fasciisque elytrorum tribus distinctis, quarum ultima terminalis.

*2 punctatus.* 8. N. thorace ferrugineo elytris testaceis: puncto nigro.

Habitat in Germania Dom. Lund.

Parvus. Antennae extrorsum parum crassiores, pallidae, apice nigrae. Caput atrum, nitidum, immaculatum. Thorax subcylindricus, rufus. Elytra striata, pallidiora puncto pone medium nigro. Corpus nigrum pedibus pallidis.

De genere hæreo vix Notoxus mihi haud rite notus.

*antherinus.* 9. N. niger elytris fasciis duabus ferrugineis.

*Lagria antherina* Mant. Inf. 1. 94. 24.

*Meloe antherinus* alatus niger elytris fasciis duabus ferrugineis Linn. syst. nat. 2. 681. 16.

Fn. Sy. 829.

Habitat frequens in Europæ floribus agilis, cursorius.

*floralis.* 10. N. niger thorace ferrugineo.

*Lagria floralis* Mant. Inf. 1. 94. 25.

*Meloe floralis* alatus niger, elytris maculis duabus pallidis obsoletis Linn. syst. nat. 2. 681. 15.

Fn. Sy. 829?

Habitat in Europa.

Statura & magnitudo præcedentis.

*minutus.* 11. N. ater nitidus antennis pedibusque pallescentibus.

Habitat in Europæ floribus:

Minutus at staturâ præcedentium. Antennae extrorsum crassiores. Caput atrum, nitidum.

Thorax globosus, ater. Elytra laevissima, nigra.

Pedes pallescentes.

29. CANTHARIS. *Palpi securiformes.**Maxilla bifida.**Labium integrum.**Antennae filiformes.*

1. *C. thorace marginato rubro: macula nigra, elytris *fusca*. fuscis.* Linn. syst. nat. 2. 647. 2. Fn. Sv. 700.

*Telephorus fuscus Oliv. Inf. 26. 6. 1. tab. 1. fig. 1.**Telephorus fuscus Degeer Inf. 4. 60. 1. t. 2. f. 12.**Cicindela elytris nigricantibus Geoff. Inf. 1. 170. 1.**Frish. Inf. 12. tab. 3.**Sulz. Inf. tab. 5. fig. 33.**Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 19. tab. 26. fig. 9-12.**Voet. Coleopt. tab. 46. fig. 2.**Habitat frequens in Europae sepibus.**Sævit in propriam speciem.*

2. *C. thorace marginato tota testacea.* Linn. syst. *livida.*  
nat. 2. 647. 3. Fn. Sv. 701.

*Telephorus lividus Oliv. Inf. 26. 7. 2. tab. 2. fig. 8.**Telephorus flavus Degeer Inf. 4. 70. 2.**Cicindela thorace rubro immaculato. Geoff. Inf. 16. 171. 2.**Voet. Coleopt. tab. 46. fig. 1.**Habitat in Europa, America boreali.**Nimis præcedenti affinis.*

3. *C. fusca thorace marginato rufo immaculato, femoribus anoque rufis.*

*Habitat in Germania Dom. Smidt.*

Cantharidum corpus oblongum, molle - glabrum,  
depressiusculum, agile, capite ovato, deflexo, oculis  
rotundatis, prominulis, lateralibus, antennis approxi-  
matis ante oculos insertis, thorace plano, marginato,  
rotundato, scutello rotundato, elytris laevibus, mol-  
libus, incumbentibus longitudine abdominis, pedibus  
longiusculis, tenuibus, femoribus tibiisque compressis,  
tarvis articulis quinque, colore obscuro.

Nimis affinis C. fuscae. Caput rufum puncto medio fusco. Antennae fuscae, basi rufae. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra omnino fusca. Abdomen fuscum ano ferrugineo. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

Provenit C. fusca senior.

Alter sexus elytris lividis forte mera præcedentis varietas.

- analisis.* 4. C. thorace marginato anoque fulvis, corpore atro. Habitat in Hungaria Dom. Smidt. Statura & magnitudo C. fuscae at omnino distincta. Caput atrum, immaculatum puncto parvo impresso. Thorax marginatus, fulvus, immaculatus. Elytra laevia, atra, immaculata. Corpus atrum ano fulvo. Pedes atri.

- virideſcens.* 5. C. thorace marginato testaceo: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusque testaceis. Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks. Caput nigrum ore antennisque testaceis. Thorax marginatus, testaceus macula palmata nigra in medio & præterea puncta duo parva utrinque in margine. Elytra vix striata, viridia, immaculata. Pectus fuscum. Abdomen & pedes testacea.

- obſcura.* 6. C. thorace marginato: marginibus rubris, corpore nigro. Linn. syst. nat. 2. 648. 5. Fn. Sv. 706. Act. Nicrof. 3. 386. tab. 6. fig. 5. Telephorus obscurus Oliv. Inf. 26. 8. 3. t. 2. f. 10. Schaeff. Ieon. tab. 16. fig. 8. Habitat in Europa. Variat thoracis margine rubro & pallide fusco, pedibus rubris & nigris.

- pellucida.* 7. C. thorace marginato rufo, vertice elytris tibiisque posticis fuscis. Habitat in Germania Dom. Smidt.

- Statura & magnitudo C. obscurae. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput ferrugineum, postice nigrum. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra nigra omnino immaculata. Abdomen nigrum margine anoque rufis. Pedes rufi tibiis quatuor posticis nigris.
8. C. thorace marginato, fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro. *limbata.*  
Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.  
Media, Antennae nigrae. Caput rufum vertice nigro. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, atra margine omni rufo. Corpus atrum.
9. C. thorace marginato rubro, corpore fusco, elytris margine exteriori flavescentibus. Linn.  
Syst. nat. 2. 648. 6. Fn. Sv. 707.  
Telephorus lateralis Oliv. Inf. 26. 15. 15.  
tab. 3. fig. 17.  
Habitat in Europae hortis.  
Affinis praecedentibus.
10. C. thorace marginato flavo: macula viridi, elytris *fmaragdulus.*  
viridibus nitidis.  
Telephorus smaragdulus Oliv. Inf. 26. 9. 6.  
tab. 2. fig. 13.  
Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
Caput flavescentia, basi nigrum. Thorax marginatus, flavus macula magna sinuata media virescente & praeterea punctis utrinque duobus. Elytra laevia, viridia, nitida. Pectus fuscum. Abdomen & pedes flava.
11. C. thorace marginato, corpore toto atro. Linn. *atra.*  
Syst. nat. 2. 649. 16.  
Telephorusater Oliv. Inf. 26. 13. 12. t. 1. fig. 3.  
Habitat in Europa boreali.

*marginata.* 12. C. thorace marginato nigra, thoracis elytrorumque marginibus rubris.

Habitat in America Dom. Aiton.

Antennae nigrae. Caput nigrum margine laterali maculaque antica rufis. Thorax marginatus, niger latere exteriori rufo. Elytra nigra margine omni rufo. Alae nigrae. Pedes nigri femoribus rufis.

Varietatem praecedentis credit Olivier at vix rite.

*maculata.* 13. C. thorace marginato ferrugineo: macula nigra, elytris testaceis: macula apicis nigra.

Telephorus 2 maculatus Oliv. Inf. 26. 11. 8. tab. 2. fig. 11.

Telephorus pensylvanicus Degeer Inf. 4. tab. 17. fig. 15.

Habitat in America septentrionali Mus. D. Banks. Antennae nigrae. Caput nigrum maxillis basi flavis. Thorax marginatus, flavus macula magna in medio nigra. Elytra laevia, testacea macula magna apicis nigra. Corpus nigrum abdominis segmentis apice flavis.

Variat interdum fronte femoribusque rufis.

*pallipes.* 14. C. thorace marginato atra, elytris pallidis apice fuscis.

Telephorus pallipes Oliv. Inf. 26. 14. 13. t. 1. f. 5.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Caput atrum palpis pallidis. Antennae fuscae basi pallidae. Thorax marginatus, ater. Elytra glabra, pallida apice fusca. Pedes pallidi.

*haemorrhoidalis.* 15. C. thorace marginato pallido: fascia abbreviata antica maculaque media atris, elytris pallidis, ano pedibusque rufis.

Habitat in agro Jenensi Dom. Daldorff.

Statura praecedentis. Caput atrum ore antennarumque basi pallidis. Thorax marginatus, palli-

- dus fascia antica, abbreviata, maculaque media, emarginata atris. Abdomen nigrum segmentorum marginibus albidis anoque rufo. Pedes rufi.
- 16. C. thorace marginato atro, elytris pedibusque *pallida*.**  
*pallide testaceis.*  
 Telephorus pallidus Oliv. Inf. 26. 14. 14.  
 tab. 2. fig. 9.  
 Cicindela nigra thorace omnino nigro, elytris pedibusque pallidis. Geoff. Inf. 1. 173. 6.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
 Parva. Caput atrum antennarum basi palpisque pallidis. Thorax marginatus, ater, immaculatus. Corpus atrum pedibus pallidis. Elytra pallide testacea, immaculata.
- 17. C. atra thorace abdomineque rufis.** *ruficollis.*  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 6.  
 Habitat in Anglia.  
 Duplo minor C. fusca. Caput atrum. Pedes nigri.
- 18. C. testacea capite thoracis macula media elytris- *flavipes*.**  
 que dimidiato nigris.  
 Telephorus flavipes. Oliv. Inf. 26. 10. 7.  
 tab. 3. fig. 18.  
 Pall. Icon. tab. F. fig. 23.  
 Habitat in China Mus. Dom. Banks.  
 Caput nigrum macula inter antennas tridentata, testacea. Thorax marginatus, niger margine omni testaceo. Elytra glabra, nitida basi testacea, apice nigra margine tamen testaceo.
- 19. C. testacea capite elytrorum apicibus tibiisque *melanocephala*-**  
 nigris. *phala.*  
 Telephorus melanocephalus. Oliv. Inf. 26. 9. 5.  
 tab. 2. fig. 7,  
 Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
 Caput cum antennis atrum, immaculatum. Thorax marginatus, testaceus. Elytra laevia, testa-



cea, apice nigra. Abdomen testaceum, Pedes nigri femoribus testaceis.

- fasciata.* 20. C. thorace marginato, elytris testaceis: fasciis tribus cyaneis.

Habitat in India orientali Dom. de Sehestedt.

Hujus generis videtur. Palpi antici certe securiformes. Caput viridi aeneum antennis filiformibus, rufis. Thorax marginatus, rufus linea media cyanea. Elytra laevia, glabra, nitida, testacea fasciis tribus cyaneis: baseos lunata, posticis duabus ad marginem exteriorem coeruleis, ultima marginali. Pedes rufi.

- punctata.* 21. C. thorace marginato: punctis duobus nigris, elytris testaceis apice nigris.

Telephorus 2 punctatus Oliv. Inf. 26. 15. 16.  
tab. 3. fig. 16.

Vill. Ent. 1. 297. 26. tab. 1. fig. 30.

Habitat Lipsiae.

Caput & antennae nigra fronte testacea. Thorax marginatus marginibus reflexis, testaceus punctis duobus nigris. Elytra auro holosericea apice nigra. Abdomen nigrum apice ferrugineum. Pedes testacei geniculis posticorum nigris.

- laeta.* 22. C. thorace marginato fulvo, elytris testaceis basi apiceque atris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Magnitudo fere C. 2 punctatae. Caput atrum. Antennae fulvae apice nigrae. Thorax marginatus, fulvus, nitidus. Elytra testacea basi apiceque atra. Corpus atrum pedibus fulvis.

- fulvicollis.* 23. C. thorace marginato pedibusque fulvis, corpore nigro Geoff. Inf. 1. 172. 3.

Telephorus thoracicus Oliv. Inf. 26, 12. 10.  
tab. 1. fig. 2.

**Telephorus niger** Degeer Inf. 4. 72. 5.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Media. Caput nigrum ore fulvo. Antennae nigrae.

Thorax marginatus, fulvus. Elytra laevia, nigra, immaculata. Pedes fulvi.

- 24. C. thorace marginato fulvo: linea media nigra, *lineola*. corpore nigro.**

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Parva. Caput cum antennis nigrum. Thorax marginatus, fulvus linea media, dorsali, nigra. Elytra laevia, nigra, immaculata. Abdomen nigrum. Pedes nigri.

- 25. C. thorace rotundato luteo, ab domine pedibus *nigripes*. elytrorumque apicibus atris.**

Habitat in Europa boreali Mus. Dom. Lund.

Caput & thorax lutea. Antennae fuscae & punctum fuscum inter antennas. Elytra pallide testacea, apice nigra. Abdomen & pedes atra.

- 26. C. thorace rotunda<sup>t</sup>o, corpore luteo, elytris apice *melanura*. nigris Linn. Syst. nat. 2. 651. 27. Fn. Sv. 719.**

*Telephorus melanurus* Oliv. Inf. 26. t. 3. f. 21.

Geoff. Inf. 1. 173. 5.

Schaeff. Icon. tab. 16. fig. 14.

Voet. Coleopt. tab. 46. fig. 2.

Habitat in Europae hortis.

Thorax in medio puncto impresso.

Variat rarius capite nigro.

- 27. C. thorace rotundato flavo: punctis tribus nigris, *vittata*. elytris fuscis: margine vittaque flavis.**

Habitat in Carolina Mus. Britann.

Media. Caput flavum antennis apice fuscis. Thorax rotundatus, laevis, flavus punctis tribus nigris. Elytra laevia, fusca margine exteriori vittaque versus futuram, apicem haud attinente, flavis. Abdomen fuscum pedibus flavis.

- nitidula.* 28. C. thorace rotundato rufo, corpore atro nitidulo.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Affinis C. fulvicollis. Corpus totum atrum, nitidulum. Thorax rufus, immaculatus. Pedes nigri.
- Morio.* 29. C. thorace rotundato atra, elytris cyaneo nigris.  
Habitat in Germania Smidt.  
Magnitudo C. atrae at distincta. Corpus totum atrum, immaculatum elytris solis cyaneo nigris.  
Thorax nullo modo marginatus.
- nigra.* 30. C. thorace marginato pubescens, corpore nigro.  
Dermestes niger Linn. Syst. nat. 2. 564. 28.  
Fn. Sv. 439.  
Cantharis pilosa Scop. Carn. 131.  
Habitat frequens in Europae floribus.
- pulicaria.* 31. C. thorace marginato rufo: macula nigra, elytris atris.  
Telephorus pulicarius Oliv. Inf. 26. 16. 17.  
tab. 3. fig. 20.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
Parva, tota atra exceptis thoracis marginibus tentaculisque abdominalibus.
- minima.* 32. C. thorace marginato rufo: macula nigra, corpore fusco, elytris apice flavis Linn. Syst. nat. 2. 649. 12. Fn. Sv. 713.  
Telephorus minimus Oliv. Inf. 26. 17. 19.  
tab. 1. fig. 6. tab. 3. fig. 15.  
Geoff. Inf. 1. 372. 1. tab. 7. fig. 1.  
Habitat in Europae hortis.
- testacea.* 33. C. thorace marginato flavo: macula nigra, corpore nigro, elytris pedibusque lividis Linn.  
Syst. nat. 2. 649. 15. Fn. Sv. 714.  
Telephorus testaceus Oliv. Inf. 26. 12. 11.  
tab. 3. fig. 19.  
Cicindela Geoff. Inf. 1. 174. 6.

- Degeer Inf. 4. 71. 4.  
 Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.  
 Habitat in Europa.
34. C. thorace marginato: medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis Linn. Syst. nat. 2. 648. 11. Fn. Sv. 712.  
*Telephorus biguttatus* Oliv. Inf. 26. 16. 18. tab. 2. fig. 12.  
*Necydalis* Geoff. Inf. 1. 372. 1. tab. 7. fig. 2.  
 Degeer Inf. 4. 77. 10.  
 Habitat in Europa frequens.
35. C. thorace marginato atra, elytris apice puncto *Cardiacae*. sanguineo, antennis pectinatis.  
*Cantharis Cardiacae* Linn. Fn. Sv. 720.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Parva. Antennae maris valde pectinatae, faeminae ferratae.
30. MALACHIUS. *Palpi* filiformes: articulo ultimo fetaceo.  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* rotundatum,  
 membranaceum.  
*Antennae* filiformes.
1. M. corpore viridiaeneo, elytris extrorsum sanguineis. Oliv. Inf. 27. 4. 2. tab. 2. fig. 6.

---

Malachii corpus parvum, ovatum, molliusculum, laeve, subpubescens, agile, capite thorace latiori, ovato, deflexo, oculis rotundatis, latioribus, antennis approximatis interoculos insertis, thorace plano, rotundato, marginato: margine parvo, deflexo, scutello parvo, rotundato, elytris mollibus, flexilibus, incumbentibus longitudine abdominalis, pedibus elongatis, tenuibus, rotundatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.



*Cantharis aenea* Linn. *syst. nat.* 2. 648. 7.

*Fn. Sv.* 708.

*Cicindela viridiænea* Geoff. *Inf.* 1. 174. 7.

Schaeff. *Monog.* 1754. tab. 2. fig. 10. 11.

*Icon.* tab. 18. fig. 12. 13.

*Sulz.* *Hist. Inf.* tab. 6. fig. 5.

*Degeer* *Inf.* 4. 73. 6. tab. 2. fig. 16. 17.

*Habitat in Europæ plantis.*

*Exserit tentacula duo, basi connata, obtusa, sanguinea utrinque ad basin abdominis & duo alia ad apicem thoracis.*

*2 pustulata.* 2. *M. æneo viridis elytris apice rubris.* Oliv. *Inf.* 27. 5. 3. tab. 1. fig. 1.

*Cantharis 2 pustulata* Linn. *syst. nat.* 648. 8. *Fn. Sv.* 709.

*Cicindela viridis elytris apice rubis* Geoff. *Inf.* 1. 175. 8.

*Telephorus viridi æneus* Degeer *Inf.* 4. 75. 7.

Schaeff. *Icon.* tab. 18. fig. 10. 11. tab. 19. fig. 14. *Habitat in Europæ hortis victitans rapina.*

*rufus.* 3. *M. æneus ore thoracis limbo elytrisque sanguineis* Oliv. *Inf.* 27. 4. 1. tab. 1. fig. 4.

*Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.*

*Differt omnino a. M. sanguinolento. Magnitudo M. aenei. Antennæ nigrae. Caput aeneum, nitidum ore rufo. Thorax aeneus limbo omnī sanguineo. Elytra sanguinea, immaculata. Corpus nigrum abdominis segmentis margine basique subtus sanguineis. Pedes nigri tarsis rufescientibus.*

*marginell-* 4. *M. viridi æneus thoracis margine elytrorumque apicibus rufis.*

*Malachius marginellus* Oliv. *Inf.* 27. 6. 5. tab. 3. fig. 18.

*Cicindela coeruleo viridis* Geoff. *Inf.* 1. 176. 9. 6.

Habitat Parisiis.

Nimis praecedentibus affinis & forte mera ejus varietas.

5. M. aeneo viridis ore flavescente. *viridis.*  
 Malachius viridis Oliv. Inf. 27. 7. 6. t. 3. f. 14.  
 Habitat in Scania Dom. de Paykull.  
 Statura et magnitudo M. 2. pustulati. Supra vi-  
 ridi aeneus solo ore flavescente, subtus obscu-  
 rus tentaculis abdominalibus sanguineis.
6. M. nigro aeneus thoracis margine elytrisque *sanguino-*  
*sanguineis.*  
 Malachius sanguinolentus Oliv. Inf. 27. 7. 7.  
 tab. 3. fig. 13.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
 Praecedentibus duplo minor. Caput & thorax  
 nigro aenea. Thoracis margo sanguineus.  
 Elytra omnino sanguinea, immaculata. Abdo-  
 men & pedes nigra.
7. M. ater thorace elytrorumque apicibus *ruficollis.*  
 sanguineis. Oliv. Inf. 27. 9. 10. tab. 2. fig. 9.  
 Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.  
 Parvus. Antennae nigrae basi rufae primo arti-  
 culo tamen nigro. Caput atrum. Thorax rufus.  
 Elytra glabra apice late rufa. Pedes rufi semo-  
 ribus anticis nigris.
8. M. cyaneus thorace abdomeque rubris. *cyanus.*  
 Habitat in Hispaniae umbellatis Dom. Vahl.  
 Thorax & abdomen sola rufa, nitida.
9. M. ater nitidus thoracis limbo tibiisque anti- *angulatus.*  
 cis rufis.  
 Habitat in Germaniae hortis Dom. Helwig.  
 Parvus. Antennae nigrae basi rufae. Caput atrum  
 faeminae immaculatum, maris macula magna  
 frontali rufa. Thorax niger, nitidus marginis  
 omni rufo, maris multo latiore. Elytra laevia,

atra, nitida, immaculata. Corpus atrum tibiis anticis rufis.

*praeustus.* 10. M. nigricans elytris postice pedibusque flavescentibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parvus. Corpus gibbum, nigricans elytris solis apice late flavescentibus. Pedes flavescentes.

*pedicula-* 11. M. ater elytris apice rubris.

*rius.* Malachius pedicularius. Oliv. Inf. 27. 8. 8. tab. 1. fig. 3.

Cantharis pedicularia Linn. Syst. nat. 2. 648. 9. Fn. Sv. 710.

Habitat in Europae hortis.

Pediculo paullo major.

*pulicarius.* 12. M. niger thoracis margine elytrorumque apicibus rubris.

Malachius pulicarius Oliv. Inf. 27. 8. 9. t. 1. f. 5.

Habitat Kiliae Dom. Lund.

Affinis praecedenti & forte mera ejus varietas. Differt tantum thoracis margine rufo.

*fasciatus.* 13. M. elytris nigris: fasciis duabus rufis.

Malachius fasciatus Oliv. Inf. 27. 10. 12. tab. 1. fig. 2.

Linn. Syst. nat. 2. 6. 48. 10. Fn. Sv. 711.

Cicindela Geoff. Inf. 1. 177. 12.

Schaeff. Icon. tab. 189. fig. 3.

Degeer. Inf. 4. 76. 9.

Habitat in Europae Muscis.

*equestris.* 14. M. viridi aeneus elytris rubris: fascia viridi aenea. Oliv. Inf. 27. 11. 13. tab. 2. fig. 11.

Meloe Govani alatus elytris fascia apiceque sanguineis. Linn. Syst. nat. 2. 1168.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura et magnitudo omnino praecedentis at elytra sanguinea fascia versus apicem viridi aenea.

15. M. niger antennarum basi tibiisque flavis. *flavipes.*

Malachius flavipes Oliv. Inf. 27. 14. 19. tab. 3.

fig. 19.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum nigrum, nitidum, immaculatum.

Antennae nigrae basi flavae. Pedes flavi femoribus nigris.

Variat rarius forte sexu punto elytrorum parvo apicis ferrugineo.

16. M. niger capite thoracis antico elytrorumque *albifrons.*  
apicibus albis.

Malachius albifrons Oliv. Inf. 27. 13. 17. tab. 3.

fig. 16.

Habita Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Antennae albidae apicae fuscae. Caput album, immaculatum. Thorax niger, nitidus margine antico inprimis ad latera albo. Elytra nigra, nitida apice albicantia. Corpus nigrum pedibus pallidis.

17. M. viridi aeneus elytris coeruleis: apice anten- *nitidulus.*  
nis pedibusque flavis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Parvus. Caput & thorax viridi aenea, nitidifima, immaculata. Elytra cyanea apice late flava. Corpus aeneum pedibus flavis.

= = =

31. MELYRIS. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* unidentata, acuta.  
*Labium* clavatum, emarginatum.  
*Antennae* totæ perfoliatæ.

- viridis.* 1. M. viridis elytris lineis elevatis tribus. Panz  
*Naturf.* 24. 11. 15. tab. 1. fig. 15.  
*Melyris viridis* Oliv. *Inf.* 2. 21. tab. 1. fig. 1.  
*Habitat* ad Cap. Bon. Spei.  
*Caput* sub thorace inflexum, viride antennis perfoliatis, nigris. *Thorax* submarginatus margine reflexo, dorsoque canaliculato. *Scutellum* parvum, rotundatum. *Elytra* scabra, viridia nitida lineis elevatis tribus.
- niger.* 2. M. niger elytris lineis elevatis tribus.  
*Habitat* — — Muf. Dom. Banks.  
*Praecedente* triplo minor. *Caput* inflexum, nigrum, antennis totis perfoliatis. *Thorax* submarginatus parum antice prominet. *Elytra* scabra, nigra lineis elevatis tribus.
- lineatus.* 3. M. viridis thorace utrinque linea elytrisque tribus elevatis.  
*Habitat* — — Dom. Lee.  
*Statura* omnino M. viridis, at duplo fere minor.  
*Thorax* canaliculatus utrinque linea elevata.  
*Elytra* lineis tribus elevatis crenatis.

---

Melyris corpus ovatum, depressiusculum, glabrum, tardum, capite ovato, infexo sub thorace recondito, oculis rotundatis, lateralibus, antennis sub oculis insertis, thorace transverso, plano, marginato, scutello brevissimo, rotundato, elytris rigidis, abdomen latioribus longioribusque, pedibus tenuibus, compressis, tarsis quinquearticulatis, colore minus nitido.

32. DERMESTES. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium corneum, obtusum, integrum.*

*Antennae clavato perfoliatae.*

1. *D. niger elytris antice cinereis Linn. syst. nat. lardarius.*

2. 561. Fn. Sv. 408. Geoff. Inf. 1. 101. 5.

*Dermestes lardarius Oliv. Inf. 2. 9. 6. 1. t. 1. f. 1.*

Degeer Inf. 4. tab. 7. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 3.

Habitat in animalibus asservatis, lardo, carnibus, repositoriis culinariis & musaeis infestus.

Larva ovata, hirsuta, fusca scybala inter vorandum ex ano protrudit concatenata.

2. *D. niger elytris antice testaceis, abdomine albo. carnivorus,*

*Dermestes carnivorus Oliv. Inf. 2. 9. 7. 2. t. 2. f. 8.*

Habitat in nova Hollandia & Zelandia Mus. Dom. Banks, in Germania Dom. Smidt.

*Antennae fuscae clava ferruginea. Capit & thorax nigra lateribus griseo villosis. Elytra nigra, antice testacea. Abdomen subtus album. Pedes nigri.*

*Dermestis corpus parvum, tardum, oblongum, immarginatum, capite parvo, ovato, sub thorace infexo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis brevibus, sub oculis insertis, reconditis, thorace transverso marginibus deflexis, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, arcte adhaerentibus, abdominis longitudine, pedibus brevibus, validis, tarsis quinquearticulatis, colore plerumque obscuro.*

- cadaverinus* 3. D. niger ore ferrugineo.  
 Dermestes cadaverinus Olivier Inf. 2. 9. 7. 3.  
 tab. 2. fig. 9.  
 Habitat in Insula St. Helena Dom. Banks.  
 Afinis praecedenti. Antennae fuscae clava ferruginea. Os ferrugineum. Elytra tota nigra. Abdomen subtus cinerascens.
- macellarius* 4. D. niger glaber pedibus piceis.  
 Dermestes macellarius Olivier Inf. 2. 9. 10. 8.  
 tab. 2. fig. 13.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
 Statura praecedentium at totus niger, glaber pedibus foliis piceis.
- pellio.* 5. D. niger elytris puncto albo Linn. syst. nat. 2. 563.  
 Fn. Sv. 411. Geoff. Inf. 1. 105. 4.  
 Dermestes pellio Oliv. 2. 9. 11. 10. tab. 2. fig. 11.  
 Frish. Inf. 5. 22. tab. 8.  
 Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 4.  
 Habitat in pelliis, lardo.  
 Larva oblonga, pilosa, cauda setosa.
- undatus.* 6. D. oblongus niger elytris fascia undata alba dupli Linn. syst. nat. 2. 562. 3. Fn. Sv. 410.  
 Dermestes undatus Oliv. Inf. 2. 9. 12. 11. t. 1. f. 2.  
 Schaeff. Icon. tab. 157. fig. 17. a. b.  
 Habitat in Europae putridis, suffocatis.
- trifasciatus* 7. D. ovatus niger elytris fasciis tribus undatis cinereis.  
 Dermestes trifasciatus Olivier Inf. 2. 9. 13. 13.  
 tab. 1. fig. 7.  
 Byrrhus fuscus Geoff. Inf. 1. 112. 5.  
 Habitat in Europa australiori D. de Sehestedt.  
 Thoracis margo baseos cinereus. Elytra fasciis tribus undatis punctoque apicis cinereis. Corpus nigrum,

8. D. oblongus ater punctis viginti albis Sulz. Hist. 20 gutta-  
Inf. tab. 2. fig. 8. *tus.*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.  
Corpus atrum, glabrum. Punctum e pilis albis  
utrinque ad basin thoracis & novem in singulo  
elytro. Abdomen nigrum certo situ albicans.
9. D. oblongus tomentosus thorace nigro punctato, *tigrinus.*  
elytris cinereis : maculis quatuor fuscis.  
Habitat in Italia Mus. Dom. Schlanbusch.  
Statura & magnitudo praecedentium. Corpus  
nigrum. Thorax cinereo tomentosus punctis  
aliquot nigris. Elytra tomentosa, obscure cinerea  
maculis quatuor magnis fuscis, prima baseos  
puncto cinereo 2. 3. in medio oppositis, 4. in  
ipsa apice.
10. D. oblongus niger subtus testaceus elytris striatis. *bicolor.*  
Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
Thorax glaber margine subtestaceo. Elytra stria-  
ta, nigra, immaculata. Pectus & abdomen  
testacea.
11. D. oblongus laevis niger thoracis lateribus cine- *vulpinus.*  
reo villoso, subtus albidus.  
Dermetestus vulpinus Oliv. Inf. 2. 9. 8. 4. t. 1. f. 3.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Corpus supra nigrum capite thoracisque lateri-  
bus cinereo tomentosis. Scutellum testaceo  
villosum. Elytra glabra, laetitia, nigra, imma-  
culata. Pectus & abdomen alba. Pedes nigri.
12. D. oblongus villosus cinereus immaculatus. *felinus.*  
Habitat in terra Diemenii Mus. D. Banks.  
Adultior & magis glaber & magis fuscus evadit.
13. D. oblongus capite thoraceque ferrugineo villoso, *hirticollis.*  
elytris nigris, pectore albo.  
Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

*Summa affinitas D. murini. Antennae nigrae clava persoliata, rufa. Caput & thorax hirta, rufa, immaculata. Elytra glabra, atra. Pectus niveum. Abdomen nigrum.*

- murinus.* 14. *D. oblongus tomentosus nigro alboque nebulosus, abdomine niveo Linn. syst. nat. 2. 156. 3. 18. Fn. Sv. 426. Geoff. Inf. 1. 102. Dermestes murinus Oliv. Inf. 2. 9. 8. 5. t. 1. f. 3. Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 11. Frish. Inf. 4. 34. tab. 18. Schaeff. Icon. tab. 42. fig. 1. 2. Habitat in Europae cadaveribus. Larva oblonga, brunnea, ore atro.*
- tessellatus.* 15. *D. oblongus tomentosus, fusco cinereoque nebulosus, abdomine cinereo. Dermestes tessellatus Olivier Inf. 2. 9. 9. 7. tab. 2. fig. 10. Habitat in Angliae cadaveribus. Distinctus omnino ab Anobio tessellato & hujus generis. Affinis *D. murino*, a quo tantum colore differt.*
- violaceus.* 16. *D. nigro coerulescens thorace villoso, pedibus nigris Linn. syst. nat. 2. 56. 113. Fn. Sv. 422 Clerus Geoff. Inf. 1. 304. 2. Degeer Inf. 4. tab. 5. fig. 13. Habitat in Europae Cadaveribus frequens.*
- rufipes.* 17. *D. niger coerulescens thorace villoso, pedibus rufis. Anobium rufipes Thunb. nov. sp. 1. 10. Habitat in Africa Mus. Dom. Banks. Nimirum affinis praecedenti.*
- ruficollis.* 18. *D. violaceus thorace elytrorumque basi rufis. Anobium ruficolle Thunb. nov. sp. 1. 8. fig. 7. Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.*

Caput nigrum. Thorax glaber, laevis, rufus, immaculatus. Elytra punctis minutissimis striata, cyanea basi rufa. Pectus rufum. Abdomen violaceum basi rufum.

19. D. elongatus hirtus violaceus thorace abdomine sanguinineo rufis Panz Naturf. 24. 10. tab. 1. f. 13. *collis.*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Statura magis oblonga. Thorax hirtus, rufus, immaculatus. Elytra cyanea, nitida. Abdomen rufum. Pedes nigri.
20. D. subpubescens ferrugineo fuscus antennis nigris: clava ferruginea.  
Habitat in Lycoperdon. Bovista Germaniae Dom. Helwig.  
Parvus. Antennae nigrae clava perfoliata ferruginea. Thorax, elytra, corpus mox ferruginea, mox obscuriora, immaculata. Pedes ferruginei.
21. D. oblongus glaber niger thorace ferrugineo, 2 puncta-elytris testaceis: puncto nigro. *tus.*  
Habitat in Germania Dom. Helwig.  
Corpus parvum. Antennae ferrugineae clava perfoliata, nigra. Caput nigrum vertice ferrugineo. Thorax ovatus, laevis, ferrugineus. Elytra striata, testacea puncto medio fusco. Pectus & pedes ferruginea. Abdomen nigrum.
22. D. oblongus niger nitidus pedibus ferrugineis. *fimetarius.*  
Habitat in Agarico fimetario D. Helwig.  
Parvus. Antennae nigrantes clava perfoliata, ferruginea. Caput & thorax laevia, atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, picea. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.
23. D. oblongus testaceus oculis nigris Linn. syst. *fumatus.*  
nat. 2. 564. 22. Fn. Sv. 432. Geoff. Inf. 1.  
104. 12.

- = = =
- Ips fumatus* Oliv. Inf. 2. 18. 15. 24. t. 3. f. 24.  
Habitat in Europae quisquiliis.
- tomentosus.* 24. D. oblongus villosus griseus capite punctis duobus fuscis.  
*Dermestes tomentosus* Oliv. Inf. 2. 9. 14. 15.  
tab. 3. fig. 17.  
*Dermestes flavescens* Geoff. Inf. 1. 102. 8.  
*Degeer* Inf. 4. 199. 4.  
Habitat in Anglia.  
Statura omnino praecedentis totus supra villis cinereis tectus. Puncta duo fusca, elevata in fronte. Pedes dilutiores.
- fuscus.* 25. D. oblongus fuscus immaculatus.  
*Ips nigra* Mant. Inf. 147. 18. hujus mera varietas.  
Habitat in Kiliae Boletis Dom. Daldorf.  
Magnitudo praecedentis at totus fuscus, immaculatus.
- dentatus.* 26. D. oblongus fuscus thorace sulcato utrinque sex dentato.  
Habitat in Germania Dom. Helwig.  
De genere haereo totus obscurus immaculatus.  
Antennarum clava ferruginea. Distinctus thorace utrinque dentato.
- lunatus.* 27. D. oblongus niger elytris lunula dorsali cinerea.  
Habitat in Svecia Dom. de Paykull.  
Statura parva praecedentium totus niger, obscurus. Coleoptra lunulis duabus communibus, connatis, cinereis in medio dorso.
- unidentatus.* 28. D. oblongus testaceus thorace utrinque unidentato.  
*Ips unidentata* Olivier Inf. 2. 18. 10. 12.  
tab. 1. fig. 4.  
Habitat in Gallia.

Minutus. Antennae perfoliatae. Thorax antice utrinque angulatus sive unidentatus. Elytra punctata.

29. D. oblongus ferrugineus thorace carinato. *2 dentatus.*  
 Habitat in Germania Dom. Helwig.  
 Statura & summa affinitas D. 6 dentati totus ferrugineus.
30. D. oblongus obscurus pedibus piceis. *picipes.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Corpus totum obscure fuscum, immaculatum.  
 Pedes omnes picei.
31. D. oblongus ater pedibus nigris. *nigripes.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Nimis praecedenti affinis, at pedes omnes nigri plantis vix piceis.
32. D. oblongus cylindricus fuscus antennis pedibusque testaceis. *obscurus.*  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Nimis affinis D. picipes, at duplo minor. Antennae perfoliatae, testaceae. Corpus nigrum pedibus testaceis.
33. D. oblongus ferrugineus elytris pedibusque *testaceus,* testaceis.  
 Habitat in Belgio.  
 Triplo minor D. tomentoso.
34. D. griseus thorace elytrisque scabris Oliv. Inf. 2. *scaber.*  
 9. 15. 7. tab. 2. fig. 14.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Parvus, totus griseus punctis elevatis scaber.  
 Thorax marginatus margine crenulato. Antennae perfoliatae.
35. D. oblongus ferrugineus elytris striatis. *chinensis.*  
 Habitat in seminibus e China acceptis.  
 Elytra punctato striata.



- scanicus.* 36. D. ater thorace puncto que elytrorum testaceis  
Linn. syst. nat. 2. 564. 26. Fn. Sv. 437.  
Herbst Arch. tab. 20. fig. 2.  
Habitat in Svecia.  
Caput & thorax testacea. Elytra glabra, atra  
puncto baseos testaceo. Abdomen atrum pedi-  
bus testaceis.
- limbatus.* 37. D. fuscus elytris punctatis: limbo cinereo.  
Dermestes limbatus Oliv. Inf. 2. 9. 16. t. 2. f. 15.  
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
Thorax rotundatus antice parum griseus. Elytra  
punctata, fusca limbo magno cinereo. Pedes  
nigri apice grisei.
- fenebris.* 38. D. castaneus capite nigricante, thorace fusco.  
Linn. syst. nat. 2. 563. 15. Fn. Sv. 423.  
Habitat in Europa boreali.
- variabilis.* 39. D. ovatus pallens elytris laevissimis.  
Habitat in Daniae Agaricis Mus. Dom. Lund.  
Statura parva fere Nitidulae at antennae perfo-  
liatae. Corpus totum pallens capite thoraceque  
paullo obscurioribus. Thorax & elytra laevissima.  
Variat saepius colore nigricante.
- ferra.* 40. D. ovatus niger antennis flavis: clava oblonga  
ferrata.  
Habitat in Svecia Mus. Dom. Lund.  
Insectum singulare. Statura & habitus D. pellio.  
Corpus totum atrum, nitidum, immaculatum.  
Antennae solae flavae clava oblonga haud per-  
foliata, sed altero latere tantum ferrato.
- cellaris.* 41. D. ovatus nigricans antennarum clava testacea,  
thorace crenato.  
Ips cellaris Oliv. Inf. 2. 9. tab. 1. fig. 3.  
Dermestes cellaris Scop. carn. 16. 42.  
Herbst Arch. tab. 20. fig. 5.  
Habitat in quisquiliis Mus. Dom. Lund.

Statura parva D. fenestralis. Antennae nigrae clava perfoliata testacea. Thorax laevis, nitidus. Elytra laevia, immaculata. Variat colore fusco & testaceo.

42. D. ovatus nigricans antennarum basi pedibusque *minutus*.  
flavis.

Habitat in Daniae quisquiliis Mus. D. Lund.

Minutus. Corpus laeve, nigricans pedibus flavescentibus.

43. D. ovatus testaceus abdominis basi nigra, elytris *pedicula-*  
*abbreviatis* Linn. Fn. Sv. 434. *rius*.

Dermetes pedicularius Schrank's Enumerat.  
Austr. 56.

Herbst Arch. tab. 20. fig. 6.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Paullo minor D. testaceo. Antennae perfoliatae, testaceae. Caput testaceum oculis magnis, nigris. Thorax testaceus, immaculatus. Elytra abbreviata, laevia, paullo pallidiora maris immaculata, faeminae ad suturam nigra. Abdomen nigrum. Pedes testacei.

45. D. ovatus ater nitidus antennis pedibusque testaceis, elytris abbreviatis.

Habitat in Urtica Germaniae Dom. Helwig.

Affinis praecedenti at totus ater.

46. D. ovatus ater nitidus pedibus piceis, elytris *brachypteras*  
*dimidiatis*.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Parvus. Antennae clava perfoliata. Caput, thorax, elytra, corpus atra, laevia, obscure nitida. Pedes testacei. Elytra abdome dimidio breviora.

—

33. ANOBIUM. *Palpi quatuor clavati.*  
*Maxilla obtusa, dentata.*  
*Labium integrum.*  
*Antennae filiformes: articulis tribus ultimis elongatis subcrassioribus.*

*tessellatum.* 1. A. fuscum thorace aequali, elytris subtessellatis  
 Oliv. Inf. 2. 16. 6. 1. tab. 1. fig. 1.

Byrrhus nigro fuscus Geoff. Inf. 1. 112. 4.

Degeer Inf. 4. 230. 2.

Habitat in Angliae cadaveribus.

Sequentibus paullo majus.

*striatum.* 2. A. fuscum thorace inaequali: punctis duobus baseos ferrugineis, elytris striatis.  
 Anobium striatum Oliv. Inf. 2. 16. 9. 2. t. 1. f. 4.  
 Habitat Kiliae.  
 Thorax rugis duabus dorsalibus abbreviatis inaequalis utrinque puncto parvo baseos ferrugineo. Elytra striata.

*rufipes.* 3. A. nigrum thorace subrotundo, elytris striatis, pedibus ferrugineis.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Affine A. striato at paullo minus. Thorax rotundatus, immaculatus puncto parvo baseos im-

Anobii corpus parvum, oblongum, subvillosum, immarginatum, tardum, capite ovato, sub thorace infexo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis brevibus, sub oculis insertis, reconditis, thorace transverso: margine antico subclavato, lateralibus deflexis, scutello brevi, rotundato, clytris rigidis, deflexis abdominalis longitudine, pedibus brevibus, validis, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro.

presso. Elytra striata. Pedes ferruginei. Antennae ferrugineae.

4. A. pubescens castaneum elytris striatis. *castaneum.*

Anobium castaneum Oliv. Inf. 2. 16. tab. 1. fig. 2.

Byrrhus fulvus obscurus Geoff. Inf. 1. 112. 3.

Habitat in Gallia.

Distinctum corpore toto pubescente elytrisque striatis.

5. A. fuscum immaculatum thorace compresso Oliv. *pertinax.*

Inf. 2. 16. tab. 2. fig. 7.

Ptinus pertinax Linn. syst. nat. 2. 565. 2.

Dermestes pertinax Linn. Fn. Sv. 414.

Byrrhus Geoff. Inf. 1. 111. 1. tab. 1. fig. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 24. 25.

Habitat in Europa destruens e ligno confecta. Devoratur a Clero formicario. Captum se contrahit immobile.

6. A. fuscum obscurum pedibus testaceis. *Boleti.*

Dermestes Boleti Scop. Carn. 16. 42.

Habitat in Germaniae Boletis.

Statura omnino D. picipes at antennae hujus generis. Corpus totum fuscum pedibus solis testaceis.

Variat rarius corpore testaceo.

7. A. testaceum oculis nigris, elytris laevibus. *molle.*

Ptinus mollis Linn. Fn. Sv. 415. Oliv. Inf. 2. 19.

tab. 2. fig. 8.

Degeer Inf. 4. tab. 8. fig. 29.

Habitat in Europae quisquiliis.

8. A. pubescens ferrugineum elytris striatis Olivier *paniceum.*

Inf. 16. tab. 2. fig. 9.

Dermestes paniceus Mant. I. 35. 22.

Habitat in pane diutius asservato Dom. Helywig.

Minus A. molli & certe distinctum. Corpus totum tomentosum ferrugineum oculis solis fuscis.

- Abietis.* 9. A. fuscum elytris laevibus pedibusque testaceis.  
Habitat in Germaniae Abiete Dom. Helwig.  
Statura & magnitudo omnino A. mollis, at corpus totum fuscum elytris pedibusque testaceis.
- planum.* 10. A. fuscum thorace plano, elytris crenato striatis.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Caput & thorax fusca, immaculata thoracis margine parum reflexo. Elytra crenato striata, subpicea. Corpus fuscum.
- capense.* 11. A. ferrugineum elytris striatis pallidioribus.  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Lund.  
Statura omnino A. pertinax at duplo minus & aliud. Corpus totum obscure ferrugineum solis elytris paullo pallidioribus, striatis.
- minutum.* 12. A. testaceum thorace rotundato, elytris substriatis, pubescentibus.  
Habitat in plantis siccis ex Italia missis Mus. Dom. Lund.  
Corpus parvum. Antennae omnino hujus generis. Thorax rotundatus, laevis. Elytra paullo pallidiora, subtilissime striata, pubescentia. Pedes testacei.
- micans.* 13. A. glabrum fuscum elytris laevibus, pedibus testaceis.  
Habitat in Germania Dom. Helwig.  
Corpus supra magis pallidum, subtus magis obscurum pedibus testaceis.
- nitidum.* 14. A. laeve atrum nitidum pedibus testaceis.  
Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.  
Statura omnino praecedentis at totus ater pedibus solis testaceis.

34. PTINUS. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Labium* bifidum.  
*Antennae* filiformes.

1. Pt. pubescens niger elytris striatis testaceis. *pubescens.*  
Ptinus pubescens Oliv. Inf. 2. 17. 5. t. 1. f. 7.  
Habitat in Gallia.  
Pt. Fur duplo major & distinctus elytris testaceis,  
immaculatis.
2. Pt. fuscus thorace quadridentato, antennis pedi- *germanus.*  
busque ferrugineis Linn. syst. nat. 2. 566. 6.  
Ptinus germanus Oliv. Inf. 2. 17. 7. 5. t. 1. f. 6.  
Habitat in Europae Quercu.  
Elytra villosa fusca cinereo varia. Antennae lon-  
gitudine corporis, ferrugineae.
3. Pt. ater nitidus pedibus flavescentibus. *longicornis.*  
Luperus Geoff. Inf. 1. 231. 2.  
Habitat in Germania, Gallia Dom. de Hattorff.  
Magnitudo Pt. Fur. Statura fere Crioceris at an-  
tennae hujus generis corpore longiores. Cor-  
pus atrum, nitidum, immaculatum. Pedes flavi  
plantis nigris.
4. Pt. testaceus thorace quadridentato, elytris fasciis *Fur.*  
duabus albis Linn. syst. nat. 2. 566. 5.

---

Ptini corpus parvum, oblongum, immarginatum,  
tardum, capite parvo, subrotundo, sub capite inflexo,  
oculis magnis, globosis, lateralibus, antennis longio-  
ribus, approximatis, fronti insertis, thorace gibbo,  
capite angustiore, saepius inaequali: marginibus  
deflexis, scutello parvo, rotundato, interdum nullo,  
elytris rigidis, inflexis, abdominis longitudine, pedi-  
bus elongatis, tenuibus, femoribus subclavatis, tarsis  
quinquearticulatis, colore obscuriore Sp. 11-13.  
Gibbum Scopoli forte proprii generis.

Ptinus Fur Oliv. Inf. 2. 17. 6. 3. tab. 1. fig. 1.  
Bruchus testaceus elytrorum fascia duplice alba.

Geoff. Inf. 1. 164. 4. tab. 2. fig. 6.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 8.

Degeer Inf. 4. tab. 9. fig. 5. 6.

Frish Inf. 13. tab. 15.

Habitat in Musacis, seminibus pessimus, destruens  
herbaria, insecta, aves vix pellendus.

Larva hexapoda; obesa, mollis, pilosa, segmentis  
dorsalibus prominulis.

Puppa intra folliculum glutinosum.

Mas alatus, faemina aptera.

- imperialis.* 5. Pt. fuscus thorace subcarinato, coleoptris macula  
lobata alba Linn. syst. nat. 2. 565. 4.  
Ptinus imperialis Oliv. Inf. 2. 17. 5. 2. t. 1. f. 4.  
Sulz. Inf. tab. 2. fig.  
Petagn. Inf. Calbr. 6. tab. 1. fig. 27.  
Habitat in Europae arboribus.

- crenatus.* 6. Pt. brunneus thorace gibbo, elytris crenato striatis  
immaculatis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Paullo minor Pt. Fur. Antennae filiformes longitudine corporis. Thorax gibbus vix tuberculatus, brunneus. Elytra crenato striata, brunea, immaculata. Corpus brunneum.

- Latro.* 7. Pt. thorace bidentato testaceus immaculatus.  
Ptinus Latro Oliv. Inf. 2. 17. 17. 4. tab. 1. fig. 3.  
Habitat Strasburgi Prof. Hermann.  
Antennae filiformes longitudine corporis. Thorax angustatus, rotundatus dentibus duobus dorsalibus, acutis. Elytra punctato striata, testacea, immaculata. Pedes elongati femoribus clavatis.

- denticornis.* 8. Pt. niger elytris striatis, antennis ferratis.  
Habitat Parisiis Mus, Dom, Bosc,

Antennae ferratae, testaceae. Caput & thorax lævia, nigra, immaculata. Elytra striata, nigra. Pedes testacei.

9. Pt. thorace gibbo deflexo testaceus antennis ferratis. *serricornis.*

Habitat in Americae plantis siccatis Dom. Lund. Parvus totus testaceus, parum villosus. Antennae filiformes, ferratae. Caput testaceum oculis globosis, atris. Thorax gibbus, elevatus lateribus deflexis. Elytra lævia, immaculata.

10. Pt. oblongus antennarum articulis duobus inferioribus longioribus spinosus. *spicornis*

Ptinus spicornis Olivier Inf. 2. 17. 10. 10. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Sandwichii Insulis Mus. Dom. Banks. De genere hæreo. A. Ptinis differe videtur. Antennae longae, filiformes articulis duobus inferioribus majoribus, subtus multispinosis, reliquis brevibus obconicis. Caput canaliculatum, atrum, nitidum. Thorax tenuis, cylindricus, obscure rufus. Elytra oblonga, lævia, pellucida. Pedes nigri.

11. Pt. thorace quadrifalcato villoso albidus elytris fulcatus, connatis fusco testaceis nitidis. *fulcatus.*

Habitat in plantis siccis ex Insulis Canariis missis. Animalculum singulare, at hoc genus monstrant, antennae, palpi, elytra connata, habitus, vinctus. Corpus Pt. Fur duplo minus. Antennae filiformes longitudine corporis albae. Caput parvum sub thorace absconditum, pallidum. Thorax albidus fulcis quatuor profundis exaratus. Elytra gibba, lævissima, nitida, connata, obscure testacea, immaculata. Pedes albi.

12. Pt. thorace lævi piceo, elytris connatis fusco *Scotias.* testaceis nitidis.

Ptinus Scotias Oliv. Inf. 2. 17. 9. 9. t. 1. f. 2.  
Bruchus totus testaceus, elytris coadunatis Geoff.

Inf. 1. 164. 2.

Scotias psylloides Czenpinski Diff. 51. 155.

Scotias psylloides Jaquin Miscell. austr. t. 23. f. 1.

Herbst Arch. tab. 20. fig. 14.

Gibbium Scop. Introd. ad Hist. nat. 505.

Habitat in Europae australioris Betula.

Præcedente paullo major. Antennæ albovillosoe.

Caput parvum reconditum cum thorace glabrum, lœve, piceum. Elytra connata, lœvia, obscure testacea, nitida, immaculata. Pedes villoso albidi.

*striatus.* 13. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino præcedentis. Antennæ porrectae, filiformes. Thorax elevatus, gibbus, griseus tuberculis duobus elevatis, obtusis. Elytra connata, striata, grisea. Pedes grisei.

35. PTILINUS. *Palpi* quatuor subæquales.

*Maxilla* brevis, bifida.

*Labium* membranaceum, subemarginatum.

*Antennæ* flabellatae.

*mystacina.* 1. Pt. testaceus albo punctatus.

Hispa mystacina Mant. Inf. 1. 70. 1.

---

Ptilini corpus parvum, oblongum, villosum, immarginatum, tardum, capite ovato, prominulo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis brevibus, exsertis, approximatis ante oculas insertis, thorace transverso, brevi: marginibus deflexis, scutello minuto, rotundato elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro, minime nitido.

Drury Inf. 3. tab. 48. fig. 7.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum antennis approximatis, pectinatis: radiis compressis, elongatis, maximis. Mandibulae porrectae, acutae, dentatae. Thorax cinereus. Elytra testacea punctis plurimis sparsis, albis. Abdomen subtus cinereum utrinque lineis duabus punctorum nigrorum. Pedes cinerascentes.

2. Pt. fuscus pedibus luteis.

*pectinicorn-*

Ptilinus atro fuscus, thorace convexo, pedibus *nis.*

antennisque pallidis Geoff. Inf. 1. 65. 1.

Ptilinus pectinicornis Oliv. Inf. 2. 17. 4. tab. 1.

Hispa pectinicornis Mant. Inf. 1. 70. 3.

Ptilinus pectinicornis fuscus antennis luteis pectinatis. Linn. syst. nat. 2. 565. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Europae Corylo.

Palpi quatuor subæquales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulis æqualibus; ultimo ovato adhærentes maxillæ dorso; posteriores triarticulati: articulo ultimo ovato, longiori adnati labii medio. Mandibula crassa, cornea acuta, fissa. Maxilla membranacea, bifida: laciniis linearibus, æqualibus. Labium breve, membranaceum, subemarginatum. Antennæ flabellatae.

3. Pt. subpubescens niger elytris flavis.

*flavescens.*

Ptilinus niger subvillosum, thorace plano marginato, elytris flavis mollioribus. Geoff. Inf. 1. 66. 2. tab. 1. fig. 2.

Drilus flavescens Oliv. Inf. 23. tab. 1.

Hispa flavescens Roff. Fn. Etr. 51. 127.

Habitat in Galliae floribus.

Vix genere distinctus videtur, quamvis mandibulis longioribus, tenuioribus, ante medium unidentatis differt. Elytra villosa, flavescentia.

*pectinatus.* 4. Pt. niger antennis pedibusque flavis, elytris striatis.  
Habitat in Germaniae lignis D. Helwig.

Statura cylindrica præcedentium. Antennae porrectae, flabellatae, lamellis paucioribus, flavae. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra striata, nigra. Corpus nigrum tomento flavescente. Pedes flavi.

### 36. MELASIS. *Palpi* quatuor clavati: articulo ultimo ovato.

*Labium membranaceum,*  
*integrum.*

*Antennae flabellatae.*

*flabellicor-* 1. *Melasis.*

*nis.* Melasis buprestoides Oliv. Inf. 30. tab. 1. fig. 1.  
Hispa flabellicornis Mant. Inf. 1. 47. 2.  
Elater buprestoides thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro. Linn.  
syst. nat. 2. 65. 6. 37. Fn. Sv. 742.

Habitat in Anglia Dom. Lee.

Palpi quatuor inæquales, clavati, anteriores longiores quadriarticulati: articulo ultimo crassiori, ovato, obtuso adhaerentes maxillæ dorso, posteriores breviores triarticulati: articulo ultimo crassiori, ovato, obtuso adnati labio ante apicem. Mandibula subarcuata, cornea, acuta, edentula. Maxilla brévis, membranacea, rotunda, unidentata. Labium membranaceum, cylindricum, acutum, integrum. Corpus totum

cylindricum, atrum. Caput globosum antennis - uno latere valde pectinatis. Thorax cylindricus basi utrinque terminatus dente valido, acuto. Elytra scabra, vix distinete striata.

*Serropalpus striatus* Hellenius Act. Holm. 1786.  
tab. fig. omnino hujus generis videtur.

37. PARNUS. *Palpi quatuor clavati: clava orbiculata.*

*Maxilla bifida.*

*Labium emarginatum.*

*Antennae breves, filiformes.*

1. *P. griseus* antennis tentaculatis. *prolifericornis.*

*Elater dermestoides* Mant. Inf. 1. 175. 56. Linn. *nis.*

syft. nat. 2. 656. 37. Fn. Sv. 747.

*Elater olivaceo nitens pilosus* antennis duplicatis.

Ross. Fn. Etr. 1. 103. 11.

*Dermestes tentaculis ante oculos antenniformibus mobiliformibus* Geoff. Inf. 1. 103. 11.

Habitat in Svecia Dom. de Paykull, frequens in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor clavati, antici paullo longiores, quadriarticulati: articulo ultimo crassiori, orbiculato adhaerentes maxillae dorso, postici subbreviores triarticulati: articulo ultimo crassiori, orbiculato adnati labii basi

Parni corpus parvum, tardum, villosum, subcylindricum, immarginatum, capite rotundato, inferto, oculis globosis, marginalibus, antennis brevibus, ante oculos insertis, thorace brevi, transverso, antice parum attenuato, postice utrinque angulis acuminatis, elytris fornicatis, rigidis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, compressis, tarfis quinquearticulatis, colore obscuro, fuscō.

lateralis. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla membranacea, bifida: lacinia exteriori majori, rotundata. Labium membranaceum, rotundatum, emarginatum. Antennae singulares tentaculo flavescente, obtuso fere longitudine antennarum in altero sexu.

Corpus parvum obscurum, griseum.

*acuminatus* 2. P. obscurus elytris acuminatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Hujus generis videtur. Antennae singulares breves: articulo primo majori, incurvo, villoso, secundo crasso, globoso, reliquis brevissimis. Caput nigrum palpis clavatis. Thorax niger macula postica impressa. Elytra striata, nigra apice acuminata. Corpus subtus villis cinereis munitum. Pedes testacei geniculis nigris.

### 38. NICROPHORUS. *Labium cordatum,* *emarginatum, cre-* *natum.*

*Antennae perfolia-*  
*tæ.*

*germanicus* 1. N. ater fronte margineque elytrorum ferrugineis.  
Nicrophorus germanicus Olivier Insect. 20. 10.  
tab. 1. fig. 2.

---

Nicrophori corpus magnum, agile, oblongum, glabrum, capite majusculo, ovato, exerto oculis reniformibus, lateralibus, haud prominulis, antennis articulo primo longiori, incurvo, ante oculos inferis, thorace plano, faepius inaequali, margine laterali posticoque prominente, scutello triangulari, obtuso, elytris incumbentibus margine inflexo, abdome brevioribus, truncatis, pedibus validis, femoribus incrassatis, rotundatis, tibiis compressis, striatis, tarsis quinquearticulatis, colore nitidulo, nigro, faepius rubro maculato.

- Silpha germanica Linn. syst. nat. 2. 569. fig. 1.  
 Schaeff. Icon. tab. 218. fig. 1.  
 Voet. Coleopt. tab. 30. fig. 4. 5.  
 Sulz. Ins. tab. 2. fig. 10.  
 Silpha speciosa Natur. 6. tab. 4.  
 Habitat in Germaniae cadaveribus.  
 Variat puncto uno altero vix elytrorum ferrugineo.
2. N. ater antennis apice rufis. *humator*.  
 Nicrophorus humator Olivier Ins. 2. 10. 8. 4.  
 tab. 1. fig. 2.  
 Gleditsch. Abhandl. 3. 224. 2. tab. 1. fig. B.  
 Dermestes Geoff. Ins. 1. 99. 2.  
 Degeer Ins. 4. 173. 2.. tab. 6. fig. 4.  
 Bergstr. Nom. 1. tab. 10. fig. 8.  
 Habitat in Europae australioris cadaveribus.
3. N. niger elytris maculis duabus fronteque im- *grandis*.  
 preso rufis.  
 Nicrophorus americanus Oliv. Ins. 2. 10. 6. 2.  
 tab. 1. fig. 2.  
 Voet. Coleopt. tab. 30. fig. 11.  
 Habitat in America boreali.  
 Pro varietate N. vulgaris olim habui at differre  
 videtur triplo major. Antennae nigrae clava  
 rufa. Caput nigrum fronte inter antennas im-  
 pressa, rufa, postice piceum. Thorax rotun-  
 datus lateribus piceis margine nigro. Elytra  
 atra maculis duabus rufis : postica sinuata.  
 Corpus nigrum pectore auro villoso.
4. N. ater elytris fascia dupli ferruginea, anten- *vespillo*.  
 narum clava rubra.  
 Nicrophorus Vespillo Oliv. Ins. 2. 10. tab. 1. fig. 1.  
 Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 1. 3.  
 Silpha Vespillo Linn. syst. nat. 2. 569. 2. Fn.  
 Sv. 444.

— — —

Dermestes Geoff. Inf. 1. 98. 1. tab. 1. fig. 5.  
 Degeer Inf. 4. 168. 1. tab. 6. fig. 1.  
 Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 4.  
 Roess. Inf. 4. tab. 1. fig. 1. 2.  
 Habitat in Europae cadaveribus, quae sepelit.  
 Moschum spirat. Ocyssime volitat elytris erectis,  
 approximatis. Acaris valde infestatur. Femora  
 postica unidentata.  
 Variat rarius minor fascia anteriore elytrorum  
 abbreviata, posteriori maculari.

*mortuorum.* 5. N. ater elytris fascia duplici ferruginea, antennarum clava nigra.

Habitat in Germaniae cadaveribus, fungis.  
 N. vulgaris nimis certe affinis & ejus forte mera  
 varietas. Differt tamen paullo minor antennis  
 totis nigris, thorace magis inaequali, pectore  
 toto nigro, nec villis aureis tecto & fascia  
 postica valde abbreviata maculam tantum luna-  
 tam formante. Dens femorum posticorum deest.

### 39. SILPHA. *Maxilla* unidentata.

*Labium* dilatum, bifidum.  
*Antennae* clava perfoliata.

*surinamensis.* 1. S. atra elytris fascia postica flava, femoribus  
 posticis dentatis.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

---

Silphae corpus depresso, ovatum, marginatum,  
 glabrum, tardum, capite parvo, ovato, sub thorace  
 inflexo, oculis marginalibus, rotundatis, antennis  
 brevibus, ante oculos insertis, thorace plano utrinque  
 marginato, scutello subrotundo, acutiusculo, elytris  
 incumbentibus, marginatis, abdomine latioribus, sae-  
 pius striatis, pedibus brevibus, validis, femoribus  
 compressis, tibiis striatis, tarsis quinquearticulatis,  
 colore plerumque nigro minime nitido.

- Summa affinitas sequentis, at elytra postice fascia flava.
2. S. atra elytris lœvibus: lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido Linn. syst. nat. 2. 570.  
11. Fn. Sv. 450.  
Silpha littoralis Oliv. Inf. 2. 11. 6. tab. 1. fig. 8.  
Voet. Coleopt. tab. 32. fig. 1.  
Peltis nigra Geoff. Inf. 1. 120. 3.  
Degeer Inf. 4. 176. 4.  
Schaeff. Icon. tab. 218. fig. 1.  
Frish Inf. 6. 12. tab. 5.  
Habitat in Europæ cadaveribus.  
Larva ovata, fusca, voracissima.  
Femora postica rarius incrassata.  
Silpha clavipes Sulz. Hist. tab. 2. fig. 14.
3. S. fusca thorace elytris pedibusque lividis. *lividus*.  
Silpha livida Oliv. Inf. 2. 11. 7. 3. tab. 1. fig. 8.  
Silpha livida Herbst Arch. 34. 10.  
Habitat in Germania Dom. Hybner.  
Statura omnino S. littoralis at duplo minor.
4. S. nigra elytris fasciis duabus ferrugineis, thorace antice bidentato Linn. syst. nat. 2. 570.  
Mus. Lud. Ulr. 38.  
Habitat in India.
5. S. depressa nigra thorace flavo: centro nigro. *americana*.  
Linn. Syst. nat. 2. 570. 7.  
Silpha americana Oliv. Inf. 2. 11. 8. 4. t. 1. f. 9.  
Blatta Catesb. Carol. 3. tab. 10. fig. 5.  
Seligm. Av. 4. tab. 108. fig. 7.  
Habitat in America.  
Elytra postice submarginata, rugosa, immaculata.
6. S. picea elytris punctatis: lineis elevatis tribus, *grossa*.  
thorace transverso emarginato.  
Silpha grossa Olivier Inf. 2. 11. 11. 8. tab. 1.  
fig. 2.

*Silpha grossa nigra*, elytris confertim punctatis:  
lineis elevatis tribus, thorace emarginato Linn.  
syst. nat. 2. 572. 27. Fn. Sv. 459.

Habitat in Europa.

Omnino distincta magnitudine fere S. americanae.  
Caput & thorax obscure nigra punctis impres-  
sis. Elytra picea confertim punctata lineis  
tribus elevatis laevibus. Corpus piceum.

*thoracica*. 7. *S. nigra* elytris linea elevata mica, thorace testa-  
ceo Linn. syst. nat. 2. 571. 13. Fn. Sv. 452.

*Silpha thoracica* Oliv. Inf. 2. 11. 8. 5. tab. 1. fig. 3.  
Voet. Coleopt. tab. 41. fig. 6.

Peltis Geoff. Inf. 1. 121. 6.

Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 12.

Degeer Inf. 4. 174. 3. tab. 6. fig. 7.

Habitat in Europae cadaveribus.

*laevicollis*. 8. *S. gibba nigra* elytris rugosis: lineis elevatis tri-  
bus, thorace laevi emarginato.

*Silphlaevicollis* Oliv. Inf. 2. 11. 12. t. 2. f. 15.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Magna, gibba, nigra. Clypeus subtruncatus. Thorax  
valde marginatus, niger, laevis antice late  
emarginatus. Elytra rugosa lineis elevatis tri-  
bus & inter has lineae tres minus elevatae.

*marginalis*. 9. *S. atra* thoracis margine pallido, elytris fuscis.

*Silpha marginalis* Olivier Inf. 2. 11. 10. 6.  
tab. 1. fig. 5.

*Silphâ noveboracensis* Forst. Cent. 1. 17. 17.

Habitat in America boreali Dom. Lee.

Magnitudo S. rugosae. Caput atrum, rugosum.  
Thorax ater margine sinuato, pallido. Scutel-  
lum atrum. Elytra fusca striis tribus elevatis,  
laevibus. Pedes nigri.

10. *S. nigricans elytris rugosis: lineis elevatis tribus, thorace rugoso postice sinuato.* Linn. syst. nat. 2. 571. 16. Fn. Sv. 455.  
*rugosa.*  
*Silpha rugosa Oliv. Inf. 2. 11. 17. tab. 2. f. 17.*  
*Voet. Coleopt. tab. 32. fig. a. 1.*  
*Peltis nigra Geoff. Inf. 1. 120. 4.*  
*Bergstr. Nomencl. 1. 233. 4. tab. 3. fig. 4.*  
*Degeer Inf. 4. 182. 7.*  
*Habitat frequentissime in Europa.*  
*Cadavera, pisces, carnes consumit. Capta humorem foetidissimum evomit.*
11. *S. atra elytris punctatis: lineis elevatis tribus atrata. laevibus, thorace integro* Linn. syst. nat. 2. 571. 12.  
*Silpha atrata Oliv. Inf. 2. 11. 16. 15. tab. 1. fig. 4. & tab. 2. fig. 4.*  
*Voet. Coleopt. tab. 40. fig. 1.*  
*Peltis Geoff. Inf. 1. 118. 1.*  
*Degéer Inf. 4. 177. 5. tab. 6. fig. 15.*  
*Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 5.*  
*Elem. tab. 96. fig. 1.*  
*Habitat in Europae agris & viis frequens.*
12. *S. atra elytris laevibus: lineis elevatis tribus, inaequali thorace inaequali emarginato.*  
*Silpha inaequalis Oliv. Inf. 2. 11. 14. 12. tab. 2. fig. 20.*  
*Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.*  
*Thorax antice late emarginatus, haud punctatus at lineis elevatis inaequalis. Elytra valde marginata vix punctata lineis elevatis tribus, quarum exterior abbreviata.*
13. *S. atra elytris scabris: lineis elevatis tribus lae- lunata. vibus, thorace plano emarginato.*  
*Silpha punctulata Oliv. Inf. 2. 11. 13. t. 2. f. 19.*  
*Habitat in Austria Dom. Schulz.*

Major S. atrata. Thorax longitudine fere elytrorum emarginatus, ater punctis duobus parvis dorsalibus, nitidulus. Elytra punctis elevatis scabra striisque tribus: intermedia longiore.

- laevigata.* 14. S. atra elytris laevis subpunctatis.  
     Silpha laevigata Oliv. Inf. 2. 11. 14. 13. t. 1. f. 1.  
     Petagna Inf. Calabr. 7. 28.  
     Peltis Geoff. Inf. 1. 122. 8.  
     Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 6.  
     Habitat in Europae sylvis.  
     Affinis S. atratae at distincta lineis nullis elevatis.
- obscura.* 15. S. nigra elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace antice truncato. Linn. syst. nat. 2. 572. 18. Fn. Sv. 457.  
     Silpha obscura Oliv. Inf. 2. 11. 15. 14. t. 2. f. 18.  
     Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 5.  
     Voet. Coleopt. tab. 41. fig. 3.  
     Habitat in Europa boreali.  
     Variat rarius colore obscure ferrugineo.
- reticulata.* 16. S. nigra thorace laevi, elytris rugosis: lineis elevatis tribus.  
     Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
     Nimis affinis praecedenti at elytra inter striae elevata, rugosa.
- opaca.* 17. S. fusca elytris concoloribus: lineis elevatis subternis, thorace antice truncato Linn. syst. nat. 2. 571. 15. Fn. Sv. 454.  
     Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 4.  
     Habitat in Europa haud infrequens.
- sinuata.* 18. S. thorace emarginato scabro, elytris lineis elevatis tribus apice sinuatis.  
     Silpha sinuata Oliv. Inf. 2. 11. 18. 17. t. 2. f. 12.  
     Voet. Coleopt. tab. 32. fig. a. 2.  
     Peltis Geoff. Inf. 1. 119. 2.  
     Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 15.

Habitat in Anglia, Germania.

Thorax antice emarginatus, fuscus, argento colore splendens, punctis nigris elevatis scaber. Elytra obscuriora apice sinu rotundato excavata. Alter sexus elytris integris.

19. S. nigra elytris pallidis: puncto baseos medioque 4 punctata.  
nigris, thorace emarginato Linn. syst. nat. 2.

571. 14. Geoff. Inf. 122. 7.

Silpha 4 punctata Oliv. Inf. 2. 11. 10. 7. t. 1. f. 7.

Voet. Coleopt. tab. 41. fig. 5.

Schreb. Inf. 2. fig. 5.

Degeer Inf. 4. 181. 6.

Lepech. Itin. 1. 202. tab. 16. fig. 4.

Habitat in Anglia frequens.

20. S. testacea antennis apice nigris. paedemon-

Silpha paedemontana Oliv. Inf. 2. 11. 19. 18. tana.

tab. 1. fig. 6. Geoff. Inf. 1 123. 9.

Habitat Paedemontano in agro Dr. Allioni.

Corpus totum obscure testaceum elytris tamen paullo pallidioribus. Elytra laevissima, punctata lineis tribus elevatis obsoletis. Ultimi tres antennarum articuli nigri.

21. S. ferruginea elytris lineis elevatis senis nigri- ferruginea.  
cantibus: margine ferrugineo Linn. syst. nat.

2. 572. 19.

Silpha ferruginea Olivier Inf. 2. 4. 20. 20.

tab. 2. fig. 13.

Ostoma rubicunda Laichart. 1. 102. 1.

Degeer Inf. 4. 183. 9.

Schaeff. Icon. tab. 40. fig. 7.

Habitat in Europa.

22. S. nigra elytris striato punctatis: lineis elevatis oblonga,  
senis, thorace emarginato Linn. syst. nat. 2.

572. 22. Fn. Sv. 460.

*Silpha oblonga* Oliv. Inf. 2. 11. 20. 19. t. 2. f. 16.

Herbst Arch. tab. 20. fig. 22.

Degeer Inf. 4. 185. 11.

Habitat in Europae arvis.

- dentata.* 23. *S. oblonga nigra thorace antice elytrisque ante apicem bidentatis.*

*Silpha scabra* Linn. syst. nat. 2. 573. 23.

Habitat in Europa Mus. Dom. Prof. Lefke.

*Corpus nigrum. Thorax fuscus, valde marginatus marginibus depresso, rotundatis, subciliatis. Margo anticus emarginatus, in medio bidentatus. Elytra nigra lineis duabus valde elevatis postice bidentatis. Corpus & pedes nigra.*

- limbata.* 24. *S. nigra thoracis elytrorumque margine subferrugineo, elytris lineis plurimis elevatis obsoletis.*

*Silpha limbata* Oliv. Inf. 2. 11. 21. 21. t. 2. f. 14.

Habitat in Africa æquinoctiali Mus. D. Banks.

*Paullo minor S. ferruginea. Thorax marginatus, lœvis, niger margine ferrugineo. Elytra nigra lineis elevatis substriata margine subferrugineo. Pedes nigri.*

- undata.* 25. *S. nigra nitida elytris fasciis duabus undatis punctoque apicis albis.*

Habitat in Saxonia sub arborum corticibus Mus. Dom. Romani.

*Caput & thorax atra, immaculata. Elytra lœvia, nigra fascia ante medium alteraque pone medium punctoque parvo apicis albidis. Corpus & pedes fusca.*

- minuta.* 26. *S. nigra antennarum basi pedibusque flavescentibus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*Statura omnino S. littoralis at vix Pediculo major. Antennæ nigrae, basi flavescentes. Caput &*

thorax glabra, obscura. Elytra abbreviata, obscura, nigra, laevia. Pedes flavescentes.

**40. NITIDULA.** *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cylindrica, membranacea.*

*Labium cylindricum,*

*Antennae clava solida.*

1. *N. ovata nigra elytris puncto rubro.* *2 pustulata.*

*Silpha 2 pustulata Linn. syst. nat. 2. 570. 4.*

*Fn. Sv. 445.*

*Derimestes Geoff. Inf. 1. 100. 3.*

*Nitidula 2 pustulata Olivier Inf. 2. 12. 4. 1.*

*tab. 1. fig. 2.*

*Ostoma 2 pustulata Laichart. 1. 106. 3.*

*Degeer Inf. 4. 186. 13. tab. 6. fig. 22. 23.*

Habitat in Europae cadaveribus.

2. *N. ovata fusca elytris maculis duabus rubris.* *4 pustulata.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*Paullo major N. 2. pustulata. Antennae clavatae, nigrae. Caput & thorax fusca, minime nitida, immaculata. Elytra obtusa, fusca maculis duabus rufis. Interdum praeterea puncta aliquot rufa parva in margine. Pedes ferruginei.*

3. *N. ovata nigra obscura pedibus piceis.* *obscura.*

*Nitidula obscura Oliv. Inf. 2. 12. 5. 3. t. 1. f. 3.*

Nitidulae corpus parvum, ovatum, depresso-  
lum, glabrum, agile, capite ovato, inserto, oculis  
rotundatis, marginalibus, antennis brevibus, ante  
oculos insertis, thorace depresso, marginato, antice  
late emarginato, scutello parvo, rotundato, elytris  
submarginatis, rigidis, longitudine abdominis, pedi-  
bus brevibus, validis, femoribus compressis, tibiis  
rotundatis, tarsis quinquearticulatis, colore obscuro.

*Silpha rufipes* Degeer Inf. 4. 188.  
*Herbst Arch.* 15. tab. 20. fig. 23.  
*Habitat* in Germania Dom. de Hattorff.  
*Statura* N. 2. pustulatae at minor. *Corpus supra*  
*obscure nigrum, minime nitidum. Elytra* lævia,  
*immaculata. Pedes* picei.

*abbreviata.* 4. *N. ovata nigra obscura elytris lævibus obtusis*  
*abbreviatis.*

*Nitidula abbreviata* Oliv. Inf. 2. 12. 5. 4. t. 1. f. 5.  
*Habitat* in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
*Corpus totum nigrum, subtomentosum, minime*  
*nitidum. Elytra valde obtusa & fere truncata,*  
*abdomine valde breviora.*

*Variat pedibus rufis & nigris.*

*marginata.* 5. *N. ovata elytris sulcatis: margine punctisque disci*  
*ferrugineis.*

*Nitidula marginata* Olivier Inf. 2. 12. 11. 13.  
 tab. 2. fig. 15.

*Habitat* in Italia Dr. Allioni.

*Corpus subtus piceum. Thorax niger margine*  
*late ferrugineo. Elytra marginata, nigra mar-*  
*gine ferrugineo punctisque aliquot disci ferru-*  
*gineis.*

*aestiva.* 6. *N. testacea subtomentosa thorace transverso emar-*  
*ginato, oculis nigris.*

*Nitidula aestiva* Oliv. Inf. 2. 12. 16. 23. t. 3. f. 23.

*Herbst Arch.* tab. 22. fig. 24.

*Silpha aestiva* Linn. syst. nat. 2. 574. 32. Fn.  
 Sv. 465.

*Habitat* in Europæ floribus.

*obsoleta.* 7. *N. ovata testacea elytris lævibus, thorace emar-*  
*ginato.*

*Nitidula unicolor* Olivier Inf. 2. 12. 17. 24.  
 tab. 2. fig. 9.

**Silpha depressa** Linn. syst. nat. 2. 514. 33.

Habitat in Europa boreali Mus. Dom. Lund.

Affinis certe N. æstivæ at alia & minor. Thorax emarginatus. Elytra lævia.

Variat interdum colore obscuriore.

8. **N. ovata subtomentosa ferruginea elytris sub-*ferruginea* striatis.**

**Nitidula striata** Oliv. Inf. 2. 12. 14. 19. t. 1. f. 7.

**Dermestes ferrugineus** Linn. syst. nat. 2. 564. 21.

Fn. Sv. 433.

**Ostoma ferruginea** Laichart. 1. 104. 2.

Habitat in Angliae Lycoperdis.

Caput fuscum, immaculatum fronte impressum.

Thorax marginatus, ferrugineus, antice emarginatus. Elytra obsolete punctato striata, ferruginea, postice obscuriora. Abdomen in quibusdam acutum prominet. Subtus nigra pedibus ferrugineis.

9. **N. ovata fusca thorace margine elytris margine *strigata*.**

lineola baseos strigaque apicis fuscis.

**Nitidula strigata** Olivier Inf. 2. 12. 13. 17.

tab. 2. fig. 12.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput fuscum antennarum clava apice ferruginea.

Thorax lævis, fuscus margine pallide fulvo.

Elytra lævia, nitida margine lineola baseos lunata strigaque apicis incurva fulvis. Corpus nigrum pedibus fulvis.

10. **N. ovata nigra elytris maculis connatis acutis *imperialis*.**  
albis margineque rufo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affinis certe N. strigatae at paullo minor. Caput nigrum. Thorax niger, nitidulus margine pallido. Elytra glabra, lævia, pallidiora maculis

vel potius strigis duabus e maculis acutis albis.  
Margo rufescens. Pedes pallidi.

*10 guttata.* 11. N. ovata fusca thoracis margine elytrorumque  
punctis quinque pallidis.

Nitidula 10 guttata Oliv. Inf. 2. 12. 10. 12.  
tab. 3. fig. 24.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo N. colon. Caput fuscum  
ore antennisque ferrugineis. Thorax marginatus,  
fuscus margine ferrugineo. Elytra laevia,  
glabrae margine punctisque quinque pallidis 2.  
1. 2. Corpus fuscum pedibus ferrugineis.

*varia.* 12. N. ovata thorace elytrisque nigro ferrugineo-  
que variis.

Nitidula varia Oliv. Inf. 2. 12. 12. 15. t. 2. f. 10.  
Herbst Arch. tab. 20. fig. 25.

Habitat Kiliae.

Corpus fuscum. Thorax marginatus, variegatus  
margine ferrugineo. Elytra striata, marginata,  
variegata margine ferrugineo. Pedes ferruginei.

*sordida.* 13. M. ovata nigra thorace elytrisque obscure fer-  
ruginosus.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino N. variae & forte  
ejus mera varietas. Caput nigrum. Thorax  
marginatus, obscure ferrugineus macula una  
alterave dorsali pallidiore. Corpus nigrum  
tibiis ferrugineis.

*flexuosa.* 14. N. ovata nigra thoracis margine elytrorumque  
macula flexuosa flavis.

Nitidula flexuosa Oliv. Inf. 2. 12. 7. 6. t. 1. f. 6.  
Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. Olivier.  
Corpus cum antennis nigrum. Thorax niger  
margine late flavo. Elytra laevia, nigra macula

- magna sinuata flava, quae externe ad basin punctum emittit. Pedes flavi.
15. *N. ferruginea elytris nigris: fascia baseos puncto- que apicis ferrugineis. bicolor.*  
 Habitat Kiliae Dom. Lund.  
 Antennae rufae. Caput & thorax ferruginea, immaculata. Elytra glabra, nigra fascia lata baseos punctoque versus apicem ferrugineis. Abdomen fuscum pedibus ferrugineis.
16. *N. nigra elytris ferrugineo variis, thorace emarginato. Colon.*  
 Nitidula Colon Oliv. Inf. 2. 12. 4. 2. tab. 1. fig. 1.  
 Dermetestes nigro fuscoque nebulosus elytris vix striatis. Geoff. Inf. 1. 164. 13.  
 Silpha Colon Linn. syst. nat. 2. 573. 27. Fn.  
 Sv. 462.  
 Degeer Inf. 4. 187. 14. tab. 6. fig. 24.  
 Ostoma Colon Laichart 1. 107. 4.  
 Habitat in Europa haud frequens.
17. *N. nigra thoracis margine elytrorumque limbo limbata. ferrugineis.*  
 Nitidula limbata Oliv. Inf. 212. 20. 31. t. 3. f. 18.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Parva. Caput & thorax nigra thoracis margine ferrugineo. Elytra laevia, nigra limbo omni in primis ad basin ferrugineo. Pedes ferruginei.
18. *N. nigra elytris apice ferrugineis. haemorrhoidalis*  
 Nitidula haemorrhoidalalis Oliv. Inf. 2. 12. 13. 16. *dalis.*  
 tab. 1. fig. 4.  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
*N. Colon duplo minor. Thorax marginatus, niger margine ferrugineo. Elytra nigra apice late ferruginea. Pedes nigri.*
19. *N. thorace marginato nigra coleoptrorum disco discoides. ferrugineo.*

Habitat in Anglia, Germania.

Caput atrum. Thorax inæqualis, marginatus  
marginé obscure ferrugineo. Scutellum nigrum.  
Coleoptra nigra macula magna disci communi  
ferruginea. Pedes nigri.

*pedicularia.* 20. N. nigra elytris lœvibus, thorace marginato.

Silpha pedicularia Linn. syst. nat. 2. 574. 34.  
Fn. Sv. 466.

Nitidula pedicularia Oliv. Ins. 2. 12. 19. 28.  
tab. 3. fig. 21.

Dermestes psyllius Linn. syst. nat. 2. 564. 25.  
Fn. Sv. 436.

Habitat in Europæ hortis.

*6puſtulata.* 21. N. nigra elytris truncatis: punctis tribus ano  
pedibusque rufis.

Habitat in Germaniae floribus Dom. Helwig.  
Parva. Antennarum clava solida. Caput & thorax  
nigra, immaculata. Elytra truncata, abbreviata,  
nigra puncto parvo baseos, majori in medio rufis  
& tertio oblongo approximato ad futuram. Anus  
subtus rufus. Pedes rufi. Puncta elytrorum  
saepius obsoleta.

*litura.* 22. N. testacea elytris litura arcuata nigra.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parva. Caput & thorax testacea, immaculata,  
nitida. Elytra lœvia, nitida, testacea litura una  
alterave arcuata nigra. Abdomen nigrum. Pe-  
des testacei.

*floralis.* 23. N. nigra elytris testaceis: sutura nigra.

Habitat in Americae meridionalis Insulis in flo-  
ribus Zeæ Mus. Dr. Pflug.

Minuta. Caput & thorax nigra, ore parum ru-  
fescente. Elytra lœvia, testacea, nitida sutura  
inprimis baseos atra. Corpus nigrum pedibus  
testaceis.

- 24.** *N. viridi ænea* antennis pedibusque nigris. *aenea.*  
 Nitidula ænea Oliv. Inf. 2. 12. 17. 25. t. 3. f. 20.  
*Scarabaeus nigro coeruleus* Geoff. Inf. 1. 86. 30.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
*N. 2 pustulata* duplo minor. Corpus totum viridiænum, læve, glabrum.
- 25.** *N. viridiæna* pedibus rufis. *viridescens.*  
 Nitidula viridescens Oliv. Inf. 2. 12. 18. 26.  
 tab. 4. fig. 30  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
 Statura & summa affinitas præcedentis at pedes omnino rufi.
- 26.** *N. ferruginea* elytris abbreviatis testaceis im- *hemiptera.*  
 maculatis.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 Smidt.  
 Statura & magnitudo omnino *N. dimidiatae* at differt omnino colore.
- 27.** *N. nigra* elytris abbreviatis fuscis, pedibus fer- *dimidiata.*  
 rugineis.  
 Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.  
 Minuta. Caput & thorax nigra, immaculata.  
 Elytra corpore multo breviora, nigricantia.  
 Corpus nigrum pedibus ferrugineis.
- 28.** *N. testacea* elytris truncatis: macula communi *truncata.*  
 baseos nigra.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Parva. Antennae testaceae clava solida obscuriore. Caput & thorax glabra, lævia, obscure testacea macula futurali baseos communi, nigra. Corpus nigrum pedibus testaceis.
- 29.** *N. nigra* nitida pedibus pallidis. *rufipes.*  
 Nitidula rufipes Olivier Inf. 2. 12. 21. tab. 5.  
 fig. 23.

Silpha rufipes Linn. syst. nat. 2. 573. 24.

Habitat in Anglia.

Totum corpus nigrum, violaceo nitens, glabrum.

Pedes pallidi geniculis nigris.

41. HETERO CERUS. *Palpi breves, filiformes.*

*Maxilla unidentata*  
longitudine palporum.

*Labium late emarginatum.*

*Antennae breves,*  
recurvæ: articulo tertio quartoque cordatis, ultimis ferratis.

*marginatus* 1. Heterocerus.

Heterocerus marginatus Bosc Act. Societ. hist. nat. Parif. 1. tab. fig.

Apate marginatus Mant. Inf. 1. 33.

Habitat Halæ Saxonum Dom. Hybner, in Gallia Dom. Bosc.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor breves, æquales, filiformes, anteriores vix longiores, quadriarticulati: articulis subæqualibus; ultimo ovato parum crassiori adhærentes maxillæ dorso, posteriores triarticulati: articulis subæqualibus adnati labii medio. Mandibula magna, exserta, cornea, apice truncata, tridentata. Maxilla compressa, membranacea, elongata longitudine palporum, apice rotundata, obtusa, in medio unidentata. Labium porrectum, mem-

branaceum, late emarginatum. Antennae breves, recurvae: articulo primo ovato, secundo globoso, 3. 4. cordatis, 5. globoso, reliquis ferratis.

Corpus parvum, villosum, fuscum elytrorum margine punctisque aliquot ferrugineis. Pedes antici palmati.

#### 42. ANTHRENUS. *Palpi inæquales, filiformes.*

*Maxilla membranacea, linearis, bifida.*

*Labium corneum, integrum.*

*Antennae clava solidata.*

I. A. niger elytris fascia alba apice ferrugineis: liture alba. *Pimpinellæ.*

*Anthrenus squamosus niger fascia punctisque coleoptorum albis, futuris fuscis.* Geoff. Inf. I.

114. I.

Oliv. Inf. 2. 14. 7. I. tab. I. fig. 4.

Rosl. Fn. Etr. 140. 96.

Habitat in Pimpinellæ floribus Europæ australioris.

Thorax niger albo ferrugineoque maculatus.

---

*Anthreni corpus parvum, ovatum, villosum, immarginatum, tardum, capite parvo, ovato, sub thorace recondito, oculis rotundatis, marginalibus, antennis brevibus, sub thorace reconditis, ante oculos insertis, thorace anticè angustiore, scutello brevi, rotundato, elytris rigidis, vix striatis, margine inflexo, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, sub corpore recondendis, compressis, tarsis quinquearticulatis, colore saepius variegato, obscuro.*

- hifrio.* 2. A. niger elytris maculis duabus marginalibus stri-  
gaque postica albis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo omnino A. Pimpinellæ.  
Caput & thorax nigra, fere immaculata. Elytra  
nigra maculis duabus transversis albis in mar-  
gine exteriori. Punctum unum alterumve in  
medio elytrorum & apice striga vel potius  
apice cinerea puncto magno nigro. Corpus  
albidum abdome punctis marginalibus atris.  
Pedes nigri.
- Scrophula-* 3. A. niger elytris albo maculatis : sutura sanguinea,  
*ride.* Byrrhus Scrophulariae Linn. syst. nat. 2. 568. 1.  
Fn. Sv. 429.  
Oliv. Inf. 2. 14. 9. 4. tab. 1. fig. 5.  
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 11.  
Schaeff. Elem. tab. 17.  
Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 4.  
Degeer Inf. 4. tab. 7. fig. 20.  
Bergst. Nomencl. 1. tab. 11. fig. 9. 10.  
Habitat in Europæ Scrophulariis.
- Museorum.* 4. A. nebulosus elytris subnebulosis.  
Byrrhus Museorum Linn. syst. nat. 2. 568. 2.  
Fn. Sv. 430.  
Olivier Inf. 2. 14. 8. 3. tab. 1. fig. 1.  
Habitat in Musaeis animalia asservata destruens.  
Simillimus praecedenti, at minor absque futura  
sanguinea.
- Verbasci.* 5. A. niger elytris fasciis tribus undatis albis.  
Byrrhus Verbasco Linn. syst. nat. 2. 568. 3.  
Geoff. Inf. 1. 115. 2.  
Habitat in Galliae Verbasco.  
Affinis A. Scrophulariae at minor.
- varius.* 6. A. thorace elytrisque fusco cinereoque variis, cor-  
pore cinereo.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Statura praecedentium at distinctus & aliis. Corpus supra cinereo fuscoque varium, subtus cinereum, immaculatum.

7. A. thorace elytrisque griseis pubescentibus. *pubescens.*

Nitidula pubescens Mant. Inf. 1. 52. 19.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Antennae clava solida. Corpus parvum supra griseum, nitidum pilis erectis brevibus adspersum.

8. A. ater thorace elytrisque pubescentibus. *hirtus.*

Nitidula hirta Mant. Inf. 1. 52. 20.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Praecedenti affinis at totus ater.

9. A. niger albo maculatus antennis flavis: clava *serraticornis.*  
elongata ferrata.

Habitat in Insula St. Crucis Dr. Pflug.

Statura omnino praecedentium. Antennae flavae

clava valde elongata, ferrata. Caput cinereum.

Thorax niger albo punctatus. Elytra nigra basi  
albo rufoque varia, in medio puncta tria distincta  
alba & apice strigae duae undatae albae. Corpus  
nigrum pedibus piceis.

10. A. niger thoracis margine flavescente, elytris *denticornis.*  
albo punctatis, antennis flavis: clava elongata  
ferrata.

Habitat in Insula St. Crucis Americes Dr. Pflug.

Forte cum praecedente proprii generis mihi haud  
rite notus. Antennae singulares, flavae clava  
valde elongata, ferrata, Caput nigrum. Thorax  
niger lateribus late cinereis. Elytra nigra  
punctis albis irrorata. Corpus nigrum pedi-  
bus flavescentibus. Praecedenti affinis at duplo  
minor.

—

**43. COCCINELLA.** *Palpi* antici securiformes.

*postici* filiformes.

*Labium* cylindricum.

*Antennae* clava solidia.

*marginata.* 1. C. coleoptris rubris : margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo Linn. syst. nat. 2.

579. 1.

Habitat in America meridionali.

*limbata.* 2. C. atra coleoptrorum disco rubro: punctis duobus atris.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Media. Caput & thorax atra margine albido. Elytra atra ad futuram rubra puncto magno atro. Apex elytrorum rufescit.

*marginella.* 3. C. coleoptris obscure testaceis: margine flavo.

Habitat in America Mus. Dom. Romani.

Corpus magnum, obscure testaceum ab domine, margine thoracis elytrorumque pedibusque flavis.

*surinamen-* 4. C. coleoptris rubris immaculatis, capite thorace que nigris Linn. syst. nat. 2. 579. 2. Amoen. Acad. 6. 393: 12.

Coccinellae corpus parvum, subrotundum, glabrum, laeve, nitidum, supra gibbum, subtus planum, capite ovato, inserto, oculis rotundatis, marginalibus, antennis brevibus, ante oculos insertis, thorace marginato: margine deflexo, scutello minimo, rotundato, elytris rigidis: margine subtus canaliculato, pedibus brevibus, validis, femoribus compressis, tibiis rotundatis, tarsis triarticulatis, colore nitido saepius punctato.

Erotylus surinamensis Oliv. Inf. 89. t. 1. f. 9.

Habitat in America meridionali.

Corpus magnitudine C. 7 punctatae.

5. C. coleoptris ferrugineis immaculatis, thorace *immaculato*: margine punctisque duobus dorsalibus *lata*.  
albis.

Habitat in Americae Insulis Dom. Isert.

Media. Caput macula frontali triloba, alba. Thorax ater, nitidus margine late punctisque duobus dorsalibus albis. Elytra obscure brunnnea, omnino immaculata. Corpus nigrum.

6. C. thorace elytrisque testaceis immaculatis. *unicolor*.

Habitat in India orientali Prof. Abildgard.

Difert manifeste a praecedentibus parva tota testacea, immaculata.

7. C. oblonga coleoptris testaceis immaculatis, thorace *M. nigrum*.  
albo *M. nigro notato*.

Habitat Kiliae.

Reliquis longior & tenuior. Caput album, nigro punctatum. Thorax albus *M. magno nigro notatus*, quorum crura elytra spectant. Elytra testacea, immaculata. Corpus nigrum ano elytrisque testaceis.

8. C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis nigris Linn. syst. nat. 2. 579. 3. Amoen. *sanguinea*.

Acad. 6. 393. 4.

Habitat in America meridionali.

Parva, subtus atra.

9. C. coleoptris rubris: puncto nullo, thorace rubro *impunctata*.  
medio fuscescente Linn. syst. nat. 2. 579. 4.

Degeer Inf. 5. 369. 1.

Habitat in Sueciae hortis.

Magnitudo C. 2 punctatae.

- dimidiata.* 10. *C. coleoptris coccineis apice atris.*  
 Habitat in Coromandel Mus. D. Banks.  
*Magna.* Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra sanguinea futura apiceque late atris. Corpus & pedes flavescentes.
- margine-punctata.* 11. *C. coleoptris flavis : margine albido ; punctis duobus nigris.*  
 Act. Hall. I. 260.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
*Magna.* Caput & thorax albida punctis plurimis sparsis nigris. Elytra flava maculis obsoletis, pallidis. Margo pallidus semper punctis duobus distinctis, nigris.  
 Nimis affinis *C. 16 punctatae* & forte mera ejus varietas.
- lineola.* 12. *C. elytris rubris : lineola baseos apicisque nigra.*  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
*Parva.* Caput albidum. Thorax albidus punctis quatuor nigris. Elytra rubra lineolis duabus, altera ad basin, altera versus apicem nigris. Subtus nigra tibiis albis.
- unifasciata* 13. *C. coleoptris rubris : fascia media atra.*  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
*Media.* Caput & thorax atra, immaculata. Elytra rubra fascia media, lata, atra, quae suturam tamen haud attingit, ad marginem punctis duobus parvis terminatur. Lineola parva obliqua nigra ad scutellum. Corpus atrum.
- annulata.* 14. *C. coleoptris rubris : macula subannulari nigra*  
 Linn. syst. nat. 2. 579. 5.  
 Habitat in Germaniae hortis.
- trilineata.* 15. *C. coleoptris flavis : lineis tribus abbreviatis nigris.*  
 Habitat in America Mus. Dom. Zschuck.  
 Corpus parvum, atrum. Thorax ater margine exteriori albido. Elytra flava futura lata nigra,

qui color tamen ad basin apicemque valde attenuatur. In medio praeterea elytrorum linea lata nigra, quae tamen nec basin nec apicem attingit. Margo elytrorum tenuissime niger.

Variat capite albo nigroque.

16. C. coleoptris flavis : margine sutura vittisque *vittata*.  
duabus atris, thorace atro : in margine antico albo.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Media. Caput albidum. Thorax ater margine antico albo. Elytra laevia, nitida, testacea in margine exteriori, sutura vitta media lata, quae tamen basin haud attingit atris. Corpus flavescentia.

17. C. coleoptris flavis : margine sutura vittisque *striata*.  
duabus abbreviatis atris, thorace flavo : punctis  
duobus obscurioribus.

Coccinella lineata Thunb. nov. sp.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Media. Caput flavescentia. Thorax flavescentia  
punctis duobus obscurioribus. Elytra laevia,  
nitida, testacea margine suturaque atris. In  
medio praeterea vitta utrinque abbreviata. Ab-  
domen nigrum. Pedes testacei.

18. C. coleoptris flavis : lineis quatuor abbreviatis *oblongo-*  
punctisque sex atris. *punctata*.

Habitat in Rossia australiori Dom. Boeber.

Magna. Caput nigrum punctis duobus baseos albis.

Thorax niger margine albo puncto nigro. Elytra  
flava lineis duabus exteriori abbreviata, interiori  
basi incrassata atris. Ad futuram puncta tria nigra.

19. C. coleoptris rubris : fascia postica abbreviata *abbreviata*.  
punctisque duobus nigris, thorace atro : lineis  
duabus albis.

Habitat in America boreali Dr. Blagden.

Corpus oblongum, atrum. Frons puncto magno  
albo. Thorax margine antico & laterali lineo-

lisque duabus dorsalibus, obliquis, albis. Elytra rubra fascia pone medium punctoque ante apicem nigris..

- 6 lineata.* 20. C. coleoptris flavis: lineis sex punctisque tribus nigris.

Habitat in imperio Russico Mus. Dom. Banks.  
Magna, nigra. Caput punctis duobus baseos albis.  
Thorax margine exteriori albo puncto nigro punctisque duobus baseos albis. Elytra flava lineis tribus nigris, quae tamen nec basin, nec apicem attingunt, exterioribus ante basin coeuntibus. Punctum praeterea oblongum versus apicem & commune bifidum.

- 2 punctata.* 21. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus Linn.  
syst. nat. 2. 580. 7. Geoff. Inf. 1. 320.

Frish. Inf. 9. 33. tab. 16. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 9.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 3.

Habitat in Europae hortis frequens.

- 3 punctata.* 22. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus Linn.  
syst. nat. 2. 580. 8. Fn. Sv. 472.

Ross. Fn. Etr. 61. 151.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Thoracis margo apice albus.

- hieroglyphica.* 23. C. coleoptris luteis: maculis duabus longitudinalibus sinuatis Linn. syst. nat. 2. 580. 14.  
Fn. Sv. 476.

Degeer Inf. 5. 382. 75.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 4.

Habitat in Europa.

Margo thoracis apice albus. Elytra macula magna, media, sinuata, nigra.

- rivularis.* 24. C. coleoptris luteis: fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thorace atro flavo bipunctato.

Coccinella transversalis Thunb. nov. sp.

Habitat in Svecia Dom. de Paykull.

Caput atrum punctis duobus baseos albis. Thorax ater margine antico punctisque duobus flavis. Elytra flava fasciis duabus marginem exteriorem haud attingentibus, altera baseos, valde sinuata, altera in medio. Puncta praeterea tria submarginalia, postico majori.

25. C. ovata coleoptris rubris: fasciis tribus atris; *tricincta*. anteriore abbreviata tricuspidata.

Habitat in China Dom de Sehestedt.

Media, nigra. Thorax ater, nitidus puncto marginali albo. Elytra rubra fasciis tribus atris, baseos potius macula magna, transversa, tricuspidata. Sutura atra.

Deest rarius fascia anterior aut macula tricuspidata.

26. C. ovata coleoptris rubris: punctis quatuor fasciis *arcuata*. duabus punctoque apicis nigris.

Habitat in China Mus. Dom. de Sehestedt.

Media. Corpus nigrum. Caput albidum. Thorax ater margine antico & laterali albido. Elytra rubra punctis duobus baseos fasciisque duabus, quarum anterior marginem haud attingit in medioque interrupta. Sutura nigra.

27. C. oblonga coleoptris luteis: fascia flexuosa *undata*. punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Corpus magnum, oblongum, atrum. Caput masculis duabus, frontalibus, flavis. Thorax punctis tribus dorsalibus margine ramoque a basi marginis exeunte flavis. Elytra lutea futura, puncto parvo ante medium, fascia flexuosa punctoque majori postico atris. Pedes flavi geniculis atris.

- flexuosa.* 28. C. ovata coleoptris luteis: fascia flexuosa punctis-  
que duobus nigris, thoracis margine albo.  
Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
Corpus atrum. Thorax macula laterali apicis al-  
bida. Elytra lutea puncto baseos orbiculato,  
fascia in medio flexuosa & macula apicis trans-  
versa, elevata nigris.
- cingulata.* 29. C. coleoptris luteis: punctis quatuor baseos  
fascia postica punctoque apicis nigris.  
Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.  
Magna. Caput flavescentes. Thorax flavus macula  
magna baseos nigra punctis flavescentibus.  
Elytra flava punctis duobus baseos, puncto vix  
distincto in medio, fascia magna pone medium  
punctoque terminali nigris. Corpus nigrum.  
Pedes flavi.
- inaequalis.* 30. C. coleoptris flavis: punctis anticis tribus futura  
fasciaque apicis nigris.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Media. Corpus nigrum. Caput flavum. Thorax  
ater, antice flavidus. Elytra flava futura maculis  
tribus anticis fasciaque magna inaequali postica  
nigris.
- trifasciata.* 31. C. coleoptris rubris: fasciis nigris tribus abbre-  
viatis Linn. syst. nat. 2. 580. 13. Fn. Sv. 475.  
Raj. Inf. 87. 9.  
Habitat in Europae hortis.
- interrupta.* 32. C. coleoptris flavis: fasciis duobus undatis inter-  
ruptis punctisque duabus posticis nigris.  
Habitat — — Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo C. 2 punctatae. Caput  
album, nitidulum oculis nigris. Thorax albus  
lineolis duabus transversis, abbreviatis, linea  
media connexis, altera iu medio, altera baseos  
utrinque puncto brunneo, parvo terminata.

Elytra flava fasciis duabus undatis nigris, quae nec marginem nec futuram attingunt, interiore tamen breviore. Punctum distinctum nigrum versus apicem. Corpus & pedes flavescentia.

33. C. coleoptris ferrugineis: fasciis duabus punctis- 2 *fasciata*. que quatuor nigris.

Cocc. flexuosa Thunb. nov. sp. I. 17. t. I. f. 24.

Habitat ad Cap. Bon, spei.

34. C. coleoptris rubris: punctis quatuor baseos nigri, thoracis marginibus albis. 4 *notata*.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Capitis & thoracis margo anticus & lateralis obscure albidus. Elytra rubra basi punctorum duorum pari nigro. Pedes testacei.

35. C. coleoptris rubris : punctis quatuor nigris, 4 *maculata*. thorace atro : macula marginali alba.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput nigrum punctis duobus baseos pallidis.

Thorax niger, nitidus macula magna marginali alba. Elytra rubra punctis duobus l. l. nigris.

Corpus nigrum.

36. C. coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque 5 *punctata*.

Linn. syst. nat. 2. 580. 4. Fn. Sv. 474. Geoff.

Inf. I. 320. 2.

Schaeff. Inf. tab. 9. fig. 8.

Merian. Inf. tab. 69.

Habitat in Europae arboribus.

37. C. oblonga coleoptris flavescentibus : punctis 5 *maculata*. nigris quinque, thorace atro: margine antico triradiato albo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus magis oblongum. Caput antice album punctis duobus nigris. Thorax ater margine antico & laterali albis. Margo anticus ramos

tres exserit. Elytra flava puncto baseos communi duobusque in medio nigris.

*6 punctata.* 38. C. coleoptris rubris: punctis nigris sex. Linn.  
syst. nat. 2. 580. 12.

Habitat in Europae hortis.

Parva. Caput atrum punctis duobus albis. Thorax ater, nitidus margine punctisque duobus dorsalibus albis. Elytra rubra punctis duobus pone medium & unico versus apicem nigris.

*glacialis.* 39. C. coleoptris rubris: punctis sex nigris; intermediis majoribus sinuatiss.

Habitat in America boreali Dom. Drury.

Caput atrum macula frontali alba. Thorax ater, nitidus margine lineolisque duabus obliquis albis. Elytra rubra punctis tribus nigris, quorum baseos parvum, intermedium sinuatum, apicis orbiculatum.

*6 maculata.* 40. C. coleoptris rubris: punctis sex nigris; anticis quatuor transversis sinuatis Act. Hall. 1. 262.

Habitat in India orientali Mus. D. Banks.

Caput albidum. Thorax antice albus macula atra, postice ater. Elytra rubra sutura atra maculisque tribus 1. 1. 1. quarum duae anteriores majores, transversae, sinuatae. Corpus pallide flavescens.

*7 punctata.* 41. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem Linn.

syst. nat. 2. 581. 15. Fn. Sv. 477. Geoff.

Ins. 1. 321. tab. 6. fig. 1.

Frish. Ins. 4. 22. tab. 1. fig. 4.

Roef. Ins. 2. Scarab. 3. tab. 2.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 7.

Habitat in Europae plantis frequentissime.

Puncta elytrorum in triangulum posita. Aliam vidi lineola suturali loco puncti communis, cui & puncta capitis alba desunt. An distincta.

42. C. oblonga coleoptris rubris : punctis nigris *7maculata.*  
septem; communi trilobo.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

Magnitudo & statura oblonga C. 13 punctatae.

Caput atrum. Thorax ater margine antico &  
laterali albo. Elytra rufa punctis nigris tribus,  
primo baseos rotundato, secundo in medio  
transverso, tertio versus apicem rotundato.  
Punctum commune trilobum. Corpus nigrum.

43. C. oblonga coleoptris rubris : punctis septem *7notata.*  
nigris, thoracis margine punctisque duobus  
albis.

Habitat in Germaniae hortis.

Parva, oblonga & distincta. Caput album mar-  
gine postico nigro. Thorax ater nitidus mar-  
gine antico & lateralı albo. Puncta duo in  
medio alba & interdum margo antieus lineo-  
lam medium abbreviatam emittit. Elytra rubra  
puncto communi baseos tribusque in triangu-  
lum positis versus apicem. Corpus atrum.

44. C. coleoptris rubris : punctis nigris octo, thorace *8punctata.*  
albo nigro punctato.

Coccinella 4 punctata Mant. Inf. 1. 56. 28. Linn.

syst. nat. 1. 580. 9. mera varietas.

Habitat in Europa boreali.

Caput albidum punctis duobus frontalibus ni-  
gris. Thorax albicans punctis quinque nigris  
ad basin & unico utrinque ad marginem. Elytra  
rubra punctis quatuor nigris, quorum unicum  
ad basin & tria in medio.

Punctorum numerus in elytris variat. Quaedam  
interdum obsoletæ.

45. C. coleoptris flavis : maculis octo nigris ; anticis *transversa-*  
*quatuor transversis sinuatis.* *lis.*

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum. Thorax ater, nitidus macula utrinque apicis alba. Elytra nitida, flava maculis quatuor 1. 1. 2. quarum anteriores duae majores, sinuatae, transversae. Sutura nigra. Corpus nigrum.

- 8maculata.* 46. C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anticis sex transversis sinuatis.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Corpus obscure luteum oculis nigris. Thorax luteus macula baseos palmata nigra. Elytra flava sutura nigra. Puncta quatuor 1. 1. 1. 1. quorum tria anteriora majora transversalia, sinuata, ultimum apicis. Corpus nigrum.

- 9maculata.* 47. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem; postico communi, thorace bipunctato.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Corpus rufum. Thorax rufus punctis duobus dorsalibus nigris. Elytra punctis quatuor 1. 2. 1. & postico communi.

- 9punctata.* 48. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. Linn. syst. nat. 2. 581. 16. Fn. Sv. 478. Geoff. Inf. 1. 322. 4.

Degeer Inf. 5. 373. 6.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 2. 2. oblique posita & communi majori.

- 10punctata.* 49. C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem, thorace quadrimaculato. Linn. syst. nat. 2. 581. 17. Fn. Sv. 479.

Degeer Inf. 5. 374. 7.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 1. 3. 1.

- 10maculata* 50. C. oblonga coleoptris fulvis: punctis nigris decem; duobus communibus.

**Chrysomela** 10 maculata Mant. Inf. 1. 75. 112.  
mera hujus varietas.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

Caput atrum linea frontali sanguinea. Thorax  
niger margine sanguineo. Elytra sanguinea  
punctis quatuor 1. 1. 1. 1. & duobus commu-  
nibus. Corpus atrum.

**51.** C. oblonga coleoptris testaceis : punctis nigris innuba.  
decem, thorace immaculato.

Habitat in Oriente Mus. Britann.

Major & distincta. Caput & thorax testacea,  
omnino immaculata. Elytra testacea punctis  
quique 2. 2. 1.

**52.** C. subrotunda coleoptris marginatis fulvis : pun- dilatata.  
ctis nigris decem, thorace bipunctato.

Habitat in America Mus. Britann.

Magna, fulva. Thorax antice valde emarginatus  
margine punctisque duobus dorsalibus, nigris.  
Elytrorum margo dilatatus, niger.

E China accepit Dom. de Sehestedt aliam, simillimam  
at margine & thoracis & elytrorum con-  
colore.

**53.** C. coleoptris rubris : punctis nigris undecim, // punctata.  
corpo nigro Linn. syst. nat. 2. 581. 18. Fn.

Sv. 480. Geoff. Inf. 1. 325. 9.

Degeer Inf. 5. 375. 8.

Stroem. Act. Nidros. 3. tab. 6. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

Puncta elytrorum 1. 2. 2. oblique posita & baseos  
communi. Nimis affinis C. 9 punctatae.  
Differt tantum puncto baseos distincto.

**54.** C. coleoptris rubris : punctis nigris undecim, //maculata.  
corpo ferrugineo.

Habitat in Hispania Prof. Vahl.

Differt manifeste a praecedente duplo fere major.

- Corpus ovatum, rufum. Elytra punctis quinque 1. 2. 2. oblique positis & baseos communis.*
- 12punctata.* 55. *C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim; extimus linearibus repandis Linn. syst. nat. 2. 581 19.*  
*Herbst Arch. tab. 22. fig. 8.*  
*Habitat in Europae hortis.*  
*Thorax flavus punctis maculisque duabus nigris.*
- variegata.* 56. *C. coleoptris flavis: punctis duodecim fasciaque media nigris.*  
*Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.*  
*Caput flavum oculis nigris. Thorax flavus punctis quinque baseos nigris. Elytra flava punctis duobus baseos, fascia in medio e maculis tribus orta & versus apicem punctis 3. 1. atris.*
- chrysome-* 57. *C. coleoptris rufis: punctis nigris duodecim, thorace immaculato.*  
*Coccinella capensis Thumb. nov. sp. 1. 16. tab. 1. fig. 21.*  
*Habitat in Cacto Opuntio Africæ.*  
*Caput & thorax rubra margine paullo pallidiore. Elytrorum puncta per paria distributa. Pedes flavescentes.*
- borealis.* 58. *C. coleoptris flavis: punctis nigris duodecim; duobus communibus, ultimis orbiculatis.*  
*Coccinella borealis Thumb. nov. sp. 1. 15. tab. 1. fig. 20.*  
*Habitat in America boreali Dom. Drury.*  
*Caput flavum. Thorax flavus punctis tribus nigris, intermedio majori. Elytra flava punctis septem nigris at duobus ad futuram dimidiatis, ultimo orbiculato majori 3. 3. 1. Subtus flavo pectore nigro.*
- cassidea.* 59. *C. oblonga rubra coleoptris punctis duodecim thorace quatuor nigris.*

Habitat in Marylandia Mus. Britann.

Thorax ruber punctis quatuor nigris, antice emarginatus margine incrassato, postice tridentatus. Elytra punctis sex antico minutissimo.

60. *C. coleoptris* flavis: punctis nigris tredecim, corpore orbiculato.

*Coccinella* 13 maculata Forst. nov. sp. 1. 18.

Habitat in Svecia.

Thorax albus maculis quatuor nigris. Elytra flava punctis nigris 1. 3. 2. & communi. Mera varietas C. 8 punctatae observante Helwigio.

61. *C. coleoptris* luteis: punctis nigris tredecim, 13 punctata. corpore oblongo Linn. syst. nat. 2. 582. 20.

Geoff. Inf. 1. 223. 6.

Degeer Inf. 5. 375. 9.

Reaum. Inf. 3. tab. 31. fig. 79.

Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 6.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 1. 2. 2. 1. & commune baseos.

62. *C. coleoptris* flavis: punctis nigris quatuordecim; versicolor: duobus communibus.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Corpus magnum, orbiculatum. Caput flavum.

Thorax marginatus, flavus macula media atra.

Elytra marginata, flava punctis sex duobusque communibus in medio 1. 3. intimo communi 1. 3. intimo communi & 1. terminali.

Variat saepius corpore toto aut dimidiato nigro aut olivaceo aut casu aut natura.

63. *C. coleoptris* luteis: sutura punctisque quatuor- 14 maculata. decim nigris distinctis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput album. Thorax albus, nigro punctatus.

Elytra lutea punctis 3. 3. 1. anterioribus in

— — —

semicirculo positis. Sutura nigra. Mera varietas  
*C. conglomeratae* observante Helwigio.

- ocellata.* 64. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris quindecim  
 subocellatis Linn. syst. nat. 2. 582. 23. Fn.  
 Sv. 484.  
 Degeer Inf. 5. 376. 10. tab. 11. fig. 1.  
 Merian. Inf. Europ. tab. 48. fig. 5.  
 Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 2.  
 Habitat in Europae hortis.  
 Thorax ater margine albo puncto atro. Puncta  
 duo alba ad basin. Puncta elytrorum 1. 3. 3.  
 posticis fere obsoletis.
- 16 punctata.* 65. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris sedecim,  
 capite quadripunctato.  
 Habitat in Italia D. Allioni.  
 Magna, oblonga. Caput album punctis quatuor  
 nigris. Thorax albidus punctis plurimis, ap-  
 proximatis. Elytrorum puncta 1. 3. 3. 1.  
 distincta, nigra.
- 18 punctata.* 66. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris octodecim;  
 ultimo arcuato Linn. syst. nat. 2. 582. 24.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Media. Thorax lateribus flavis.
- 19 punctata.* 67. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris novendecim.  
 Linn. syst. nat. 2. 582. 25. Geoff. Inf. 1. 325. 10.  
 Myll. Zool. Dan. 67. 632.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Thorax punctis sex. Elytrorum puncta 2. 3. 3. 1.  
 & communi.
- 20 punctata.* 68. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris viginti Geoff.  
 Inf. 1. 329. 17.  
 Herbst Arch. tab. 22. fig. 10.  
 Habitat in Anglia D. Aiton.  
 Parva. Caput nigrum. Thorax flavus punctis  
 quinque baseos nigris. Puncta elytrorum 3. 3.

- & 4. in figura quadrata apicis dispositis. Punctum nigrum subtus in margine.
69. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti duo-<sup>22</sup>*punctata*.  
bus. Linn. syst. nat. 2. 582. 26. Fn. Sv. 486.  
Raj. Inf. 87. 6.  
Habitat in Europae hortis.  
Parva. Thorax ruber puncto parvo medio nigro.  
Puncta elytrorum 3. 4. 3. 1.
70. C. ferruginea coleoptris flavescentibus: punctis <sup>22</sup>*maculata*  
nigris viginti duobus.  
Habitat in Guinea Dom. Isert,  
Magna. Caput & thorax obscure ferruginea,  
glabra, immaculata. Elytra laevia, nitida,  
flavescentia punctis undecim 3. 3. 3. 2. nigris.  
Corpus flavum abdominis medio ferrugineo.
71. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti tri-<sup>23</sup>*punctata*  
bus distinctis Linn. syst. nat. 2. 582. 27.  
Habitat in Germaniae hortis.  
Thorax ruber punctis nigris tribus. Puncta ely-  
trorum 3. 3. 3. 2. & communi baseos.
72. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti qua-<sup>24</sup>*punctata*.  
tuor Linn. syst. nat. 2. 583. 28. Fn. Sv. 487.  
Geoff. Inf. 1. 526. 11. Herbst Arch. tab. 22.  
fig. 11.  
Degeer Inf. 5. 381. 6.  
Habitat in Europae plantis.  
Puncta elytrorum 3. 4. 3. 2. ultimis obliquis.
73. C. ferruginea coleoptris punctis nigris viginti <sup>24</sup>*maculata*  
quatuor.  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.  
Magna, gibba. Caput ferrugineum, immaculatum.  
Thorax ferrugineus punctis quinque nigris  
strigam fere efficientibus. Elytra ferruginea  
punctis nigris duodecim 3. 3. 3. 2. 1. quibus-



dam minoribus. Pedes ferruginei femoribus  
macula nigra.

*28 punctata* 74. *C. coleoptris rubris*: punctis nigris viginti octo.  
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Thorax rufus punctis septem duobus in medio  
fere coalitis. Elytra subuillosa punctis nigris  
3. 4. 3. 2. 2.

*conglome-* 75. *C. coleoptris flavescentibus*: punctis nigris plu-  
*rata.* rimis contiguis apice puncto nigro distincto  
Linn. syst. nat. 2. 583. 31. Fn. Sv. 490. Geoff.  
Inf. 1. 316. 12.

Herbst Arch. tab. 22. fig. 14. 15.

Frisch Inf. 9. 34. tab. 17. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 383. 17.

Schaeff. Icon. tab. 171. fig. 1.

*Coccinella* 14 punctata coleoptris flavis: punctis  
nigris quatuordecim, quibusdam contiguis.  
Mant. Inf. 1. 58. 56. Linn. syst. nat. 2. 582.  
21. Fn. Sv. 482.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 6.

Habitat in Europa frequens.

Jungendae sunt observante Dom. Helwigio etiam  
cum C. 14 maculata.

*conglobata*. 76. *C. coleoptris flavis*: punctis nigris plurimis con-  
tiguis apice immaculatis. Linn. syst. nat. 2.  
583. 30. Fn. Sv. 489. Geoff. Inf. 1. 326. 12.  
Frisch. Inf. 9. tab. 17. fig. 6.

*Coccinella* 16 maculata coleoptris rubris: punctis  
nigris sedecim, capite immaculato Mant. Inf. 1.  
58. 60.

*Coccinella rosea* Degeer Inf. 5. 3. 83.

*Coccinella gemella* Herbst Arch.

Habitat in Europae hortis.

Nimis affinis *C. conglomeratae* at distincta vide-  
tur. Caput flavum margine postico nigro.

Thorax niger margine antico flavo, laterali itidem flavo puncto subdistincto nigro. Elytra glabra, flava punctis plurimis nigris contiguis. Apex omnino flavus. Corpus nigrum tibiis flavescentibus.

77. C. coleoptris flavescentibus : lineolis duabus *lineola*. punctisque subcontiguis fuscis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.

Minuta. Caput album oculis solis nigris. Thorax albus punctis quinque fuscis in semicirculum positis. Elytra flavescentia punctis duobus aut tribus inter se connatis baseos, lineola longitudinali in medio punctisque aliquot versus apicem inter se & lineola connexis fuscis. Corpus & pedes alba.

78. C. coleoptris flavis : punctis decem rubris maculisque decem atris marginalibus.

Habitat in Insula Amsterdam D. Banks.

Caput album inaculis nigris. Thorax albus lineis duabus dorsalibus marginaque laterali atris. Scutellum atrum. Elytra flava punctis quinque magnis rubris, quorum tria ad marginem exteriorem, duo versus suturam. Lineola atra baseos, maculae duae magnae atrae ad marginem exteriorem & duae communes in sutura. Pedes nigri.

79. C. flava coleoptris immaculatis, thorace albo detrita. maculato.

Habitat in nova Hollandia Dom. Banks.

Corpus totum flavescens. Caput punctis duobus orbitaque oculorum albis. Thorax utrinque margine, puncto, lineis duabus flexuosis linea- que dorsali albis. Elytra immaculata.

- 2 guttata.* 80. *C. coleoptris rufis:* punctis duobus flavis  
Habitat in Europa Mus. Dr. Hunter.  
Parva. Thorax glaber, ater, nitidus margine late-  
rali flavo. Elytra rufa macula baseos trans-  
versa, flava.
- 8 guttata.* 81. *C. coleoptris obscure rufis:* punctis octo albis.  
Habitat in Kamtschatka Mus. D. Banks.  
Caput atrum. Thorax ater margine late albo.  
Macula cordiformis alba ad basin. Elytra ob-  
scura puncto baseos ad futuram, duobus in  
medio versus futuram lineolaque apicis albis.  
Corpus atrum.
- 10 guttata.* 82. *C. coleoptris luteis:* punctis albis decem Linn.  
syst. nat. 2. 583. 33.  
Herbst Arch. tab. 22. fig. 16.  
Habitat in Suecia.  
Puncta elytrorum 2. 2. 1.
- bis 6 gut-  
tata.* 83. *C. coleoptris fulvis:* punctis duodecim albis,  
thoracis margine albo.  
Habitat in Norwegia Dom. Lund.  
Parva. Thorax fulvus margine albo. Elytra fulva  
punctis sex 1. 2. 2. 1.
- 12 guttata.* 84. *C. coleoptris fulvis:* punctis duodecim lunulis-  
que utrinque duabus connatis albis.  
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Corpus medium, rufum. Thorax rufus utrinque  
macula magna alba. Elytra rufa puncto ad  
scutellum lunulisque duabus baseos connatis  
& versus apicem puncta quinque 3. 2. alba.
- 14 guttata.* 85. *C. coleoptris rufis:* punctis albis quatuordecim  
Linn. Syst. nat. 2. 583. 34. Fn. Sv. 492.  
Geoff. Inf. 1. 327. 13.  
Herbst Arch. tab. 22. fig. 17.  
Degeer Inf. 5. 385. 20.  
Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 11.

Habitat in Europae salicibus.

Puncta elytrorum. 1. 3. 2. 1.

86. C. coleoptris fulvis: punctis albis quatuordecim, *bis 7 guttata*  
thoracis margine albo.

Coccinella 14 guttata Schall. Act. Hall. 1.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affinis certe C. bis 6 guttatae at duplo major.

Thorax fulvus margine albo. Elytra fulva  
punctis 2. 2. 2. 1. Corpus & pedes fulva.

87. C. coleoptris luteis: punctis albis quindecim; 15 *guttata*.  
communi medio obsoleto Geoff. Inf. 1. 327. 14.

Herbst Arch. tab. 22. fig. 13.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

Thorax luteus margine laterali albo puncto me-  
dio luteo. Macula obsoleta albida ad basin.

Elytra lutea punctis albis & communi fere  
obsoleto in medio dorsi. Puncta rotundata  
2. 2. 2. 1.

88. C. coleoptris rubris: punctis albis sedecim Linn. 16 *guttata*.  
Syst. nat. 2. 584. 35. Fn. Sv. 493.

Degeer Inf. 5. 385. 21.

Habitat in Europae hortis.

Elytrorum puncta 3. 3. 1. 1.

89. C. coleoptris rubris punctis albis octodecim. 18 *guttata*,  
Linn. Syst. nat. 2. 385. 35.

Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 12.

Habitat in Europae hortis.

Parva punctis novem elytrorum 1. 2. 3. 2. 1.

90. C. coleoptris rubris: punctis albis viginti Linn. 20 *guttata*.  
Syst. nat. 2. 584. 37. Fn. Sv. 495.

Herbst Arch. tab. 22. fig. 20.

Degeer Inf. 5. 386. 22.

Habitat in Europae hortis.

Elytrorum puncta 2. 2. 3. 2. 1. anticis obliquis.



- oblongoguttata.* 91. C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis  
Linn. Syst. nat. 2. 584. 38. Fn. Sv. 496.  
Degeer Inf. 5. 384. 19.  
Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 14.  
Schaeff. Icon. tab. 9. fig. 10.  
Habitat in Europae hortis rarius.
- impuustulata* 92. C. coleoptris nigris: puncto nullo Linn. syst.  
nat. 2. 584. 40.  
Habitat in Germaniae nemoribus.  
Os pedesque flava. Thoracis margo flavus interdum puncto nigro.
- nitidula.* 93. C. coleoptris nigro aeneis immaculatis, thoracis margine rufo.  
Habitat in Americae Insulis Dom. Isert.  
Parva. Caput nigrum, immaculatum. Thorax niger margine late rufo. Elytra aenea, nitida, omnino immaculata. Corpus rufum.
- parvula.* 94. C. coleoptris nigris, capite thorace pedibusque rufis.  
Coccinella Geoff. Inf. 1. 333. 44.  
Habitat Parisis Mus. Dom. Bosc.  
Parva, subvillosa. Caput rufum, immaculatum.  
Thorax rufus macula baseos nigra. Corpus nigrum pedibus rufis.
- villosa.* 95. C. villosa nigra coleoptrorum marginibus flavis.  
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Corpus magnum pilis brevibus densis villosum.  
Caput & thorax obscura. Elytra punctato striata, nigra margine & sutura flavis. Pedes flavi.
- analis.* 96. C. coleoptris atris apice rubris immaculatis.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Nimis C. haemorrhoidali affinis, at duplo minor. Caput rubrum, immaculatum. Thorax rufus basi in medio niger. Elytra laevia, atra apice late rufa. Abdomen & pedes rufa.

97. C. coleoptris atris apice rubris: fascia nigra. *haemorrhoidalis.*  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
 Caput obscure rufum. Thorax obscure rufus interdum basi punctis tribus. Fascia nigra in apice elytrorum suturam haud attingit.  
 Variat frequens puncto communi sanguineo in medio dorsi.
98. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris, *oculata.*  
 thorace utrinque macula marginali alba.  
 Habitat in America boreali.  
 Affinis C. Cacti at paullo major. Thorax ater, nitidus utrinque macula magna, rotunda, marginali, albida. Elytra nitida atra macula magna media, simplici, rufa. Abdomen rufum.
99. C. coleoptris atris: maculis duabus rufis, thorace immaculato Linn. Syst. nat. 2. 584. 41.  
 Petiv. Gazoph, tab. 1. fig. 5.  
 Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 31. 33. t. 9. f. 13.  
 Habitat in Americae Cactis, saepius inter Coccos Cacti lecta.  
 Macula elytrorum simplicissima.
100. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus 2 *pustulata.*  
 compositis, abdomine sanguineo Linn. syst. nat. 2. 585. 42. Fn. Sv. 498.  
 Geoff. Inf. 1. 334. 26.  
 Degeer Inf. 5. 387. 23. tab. 10. fig. 25.  
 Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 3.  
 Frish Inf. 9. tab. 16. fig. 6.  
 Habitat in Europae hortis.  
 Punctum elytrorum e tribus compositum.
101. C. coleoptris nigris: punctis duobus lunatis *variabilis.*  
 submarginalibus rubris, corpore oblongo.  
 Coccinella austriaca Schrank Beytr.  
 Herbst Arch. tab. 22. fig. 22.  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Corpus oblongum, immarginatum. Caput album. Thorax ater margine albo.

Variat junior elytris luteis puncto slavecente, at aetate elytra nigra & puncta rubra evadunt.

*frontalis.* 102. C. coleoptris nigris: punctis duobus rubris, fronte pedibusque anticus nigris.

Coccinella Geoff. Inf. 1. 331. 22.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput rufum, immaculatum. Thorax niger margine antico parum rufescens. Elytra nigra puncto medio rufo. Pedes antici rufi, postici nigri tibiis rufis.

*4pustulata.* 103. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor, orbita oculorum thoracisque margine pallidis Linn. Syst. nat. 2. 585. 43. Fn. Sv. 499.

Degeer Inf. 5. 389. 24.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 16, 17.

Bergst. nom. tab. 9. fig. 5.

Habitat in Europae Urtica.

Elytrorum puncta 1. 1.

Hanc saepius cum C. 2 punctata copula connexam vidi.

*4verrucata.* 104. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor, uno rufo.

Coccinella rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rufis Geoff. Inf. 1. 333. 25.

Habitat Kiliae.

Statura fere cum C. 2 pustulata convenit elytrorum margine reflexo. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra glabra, nigra punctis duobus rufis, anteriore lunato. Corpus nigrum uno rufo. Pedes nigri.

*bis 2 pustu-lata.* 105. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor, capite thoraceque nigris obscuris.

Habitat in Europa.

Differt omnino a C. frontali, cuius varietatem olim credidi. Corpus parvum. Caput & thorax nigra, obscura, immaculata. Elytra nigra punctis duobus rotundis, rubris. Pedes rubri femoribus posticis nigris.

106. C. coleoptris atris: punctis rubris sex, capite erythrocephalique margine pallide rufescens. phala.

Habitat Kiliae.

Corpus C. 6 pustulata multo minus. Caput, thoracis margo pedesque pallide rufescens. Elytra atra, nitida punctis tribus rubris 2. 1. Abdomen nigrum.

107. C. coleoptris nigris: punctis rubris sex, corpore atro. Linn. syst. nat. 2. 585. 44. Fn. Sv. 500. Geoff. Inf. 1. 331. 10.

Degeer Inf. 5. 390. 25.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 1. 1. 1.

Variat rarius puncto rubro ad suturam,

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 6.

Bergstr. Nomencl. 1. tab. 9. fig. 4.

108. C. coleoptris nigris: maculis decem rubris; sex lunatae lunatis.

Habitat in Insula St. Helena Mus. D. Banks.

Caput album. Thorax niger margine antico in primis ad latera albo. Elytra atra macula magna lunata baseos, punctis duobus rotundatis in medio, & postice maculis duabus magnis lunatis, altera ad marginem interiore, altera ad exteriorem. Corpus subtus nigrum.

109. C. coleoptris nigris: punctis flavis decem. Linn. 10 pustulata syst. nat. 2. 585. 45. Fn. Sv. 501. Geoff. Inf. 1. 330. 19.

Degeer Inf. 5. 391. 26.

Habitat in Europae hortis.

Puncta elytrorum 2. 2. 1. duo baseos lunata,  
interdum connata.

Variat punctis rubris & flavis.

*10 pustulata* 110. C. coleoptris nigris: punctis duodecim albis;  
exterioribus margine connexis.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Caput albidum puncto frontali nigro. Thorax  
ater margine antico & laterali pallido. Elytro-  
rum puncta 2. 3. 1. tribus exterioribus mar-  
gine connatis, ultimum lunatum.

*14 pustulata* 111. C. coleoptris nigris: punctis albis quatuor-  
decim. Linn. syst. nat. 2. 585. 46. Fn. Sv.  
502. Geoff. Inf. 1. 530. 18.

Degeer Inf. 5. 391. 27.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 10.

Habitat in Europae plantis.

Elytrorum puncta mox flava, mox rubra 2.  
2. 2. 1.

*guttato-* 112. C. coleoptris nigris: punctis duobus flavis qua-  
*pustulata.* tuorque rufis.

Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.

Caput flavescens. Thorax niger lateribus late  
albis. Elytra nigra puncto flavescente ad mar-  
ginem interiorem & denique postice macula  
magna vel potius fascia sinuata rufa, quae ta-  
men futuram haud attingit. Corpus nigrum.

*felina.* 113. C. coleoptris atris: punctis sex albis, corpore  
globoso.

Habitat in America boreali Dom. Drury.

Parva, tota globosa. Caput album, immacula-  
tum! Thorax albus macula baseos nigra. Ely-  
tra atra punctis tribus lineolaque parva ba-  
seos albis.

114. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo. Linn. *pantherina*.  
 syst. nat. 2. 585. 48. Fn. Sv. 504.  
 Degeer Inf. 5. 392. 28.  
 Habitat in Europa.
115. C. coleoptris nigris: punctis decem margineque *pardalina*,  
 sinuato albis.  
 Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
 Caput atrum maculis duabus baseos albis. Thorax ater fascia media valde sinuata margineque laterali albis. Elytra margine sinubus tribus albis. Puncta 1. 2. 1. 1. Corpus atrum.
116. C. coleoptris atris: punctis decem albis, capite *ursina*.  
 thoracisque margine antico albis.  
 Habitat in America boreali Mus. Dr. Hunter.  
 Caput album. Thorax ater margine antico sinuato albo. Elytra atra punctis quinque albis 2. 2. 1. Corpus nigrum pedibus albis.
117. C. coleoptris nigris: punctis albis sedecim. *leonina*.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Caput atrum punctis duobus frontalibus albis.  
 Thorax ater utrinque macula magna, marginali, alba. Elytra atra punctis 2. 3. 2. 1. Corpus atrum.
118. C. coleoptris nigris: punctis albis viginti, thorace maculato. *tigrina*.  
 Linn. syst. nat. 2. 586. 49.  
 Fn. Sv. 505.  
 Herbst Arch. tab. 22. fig. 27.  
 Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 9.  
 Habitat in Europa boreali.  
 Mera varietas C. 20 guttatae. Elytrorum puncta 1. 3. 3. 2. 1.
119. C. coleoptris nigris: punctis albis viginti, capite thoraceque villosis immaculatis. *canina*.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax nigra, cinereo villosa, immaculata. Elytrorum puncta 2. 3. 2. 2. 1. intermedio lunato. Corpus nigrum.

44. CASSIDA. *Palpi antici clavati postici filiformes.*

*Labium elongatum, integrum.*

*Antennae moniliformes.*

*viridis.* 1. C. viridis corpore nigro. Linn. syst. nat. 2. 547.

Fn. Sv. 467. Geoff. Inf. 1. 313. 1.

Cassida viridis Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 29.

Roef. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 6.

Reaum. Inf. 3. tab. 18.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 5.

Merian. Inf. Eur. tab. 115.

Habitat in Europae plantis variis.

Larva hexapoda, depressa, spinis lateralibus acutis, caudabiseta proprio stercore obtecta obambulat.

*equestris.* 2. C. viridis elytrorum basi striga argentea, abdome atro: margine pallido.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Mentha aquatica Saxonjae D. Hybner.

Supra laete viridis elytris striga baseos laete argentea, quae vero cum vita perit. Corpus atrum abdominis margine pallido. Pedes flavescentes.

---

Cassidae corpus rotundatum, supra gibbum, subitus planum, marginatum, glabrum, saepius laeve, nitidum, capite sub thoracis clypeo dilatato recondito, oculis ovatis, approximatis, antennis inter oculos insertis, thorace transverso, margine dilatato, plano, scutello triangulo, parvo, elytris rigidis longitudine abdominis: margine dilatato, plano, pedibus brevibus, validis, femoribus compressis, tibiis rotundatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario, nitido.

3. *C. elytris griseis nigro punctatis, thorace slave- affinis.*  
scente immaculato.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 47.

Herbst Arch. 4. 50. 3.

Habitat in Germaniae Chenopodiis D. de Hattorff.

Corpus atrum. Thoracis clypeus slavecens, immaculatus. Elytra grisea punctis numerosis, nigris. Margo slavecens, antice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.

4. *C. virens futura dorsali sanguinea.* Linn. syst. vibex.  
nat. 2. 575. 5.

*Cassida virens* Linn. syst. nat. 2. 575. 5.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 30.

Habitat in Germaniae plantis.

Praecedentibus valde affinis.

5. *C. slavecens elytris punctatis: vitta media san- cruenta.*  
guinea.

Habitat in India orientali.

Statuta parva praecedentium. Clypeus rotundatus, slavecens linea media maculaque utrinque laterali sanguineis. Elytra slavecentia punctis plurimis impressis vittaque media sanguinea. Sutura etium sanguinea. Corpus nigrum ab domine pedibusque slavecentibus.

6. *C. thorace elytrisque obscuris nigro punctatis: austriaca.*  
marginе rufo immaculato.

Habitat in Austria Dom. Schneider.

Tota supra obscura puuctis, numerosis, impressis nigris marginе omni prominente ferrugineo.

7. *C. pallide nebulosa fuscо punctata* Linn. syst. nat. nebulosa.  
2. 575. 3. Fn. Sv. 468. Geoff. Inf. 1. 313. 2.

Frish. Inf. 4. tab. 15.

Schaeff. Icon. tab. 27. fig. 4.

Habitat in Europae Carduis:

*Corpus nigrum, abdominis margine pedibusque pallescentibus.*

- atrata.* 8. *C. atra clypeo antice sanguineo.*  
Habitat in Austria Dom. Saldoner.  
*Corpus atrum. Clypeus rotundatus margine antico in medio sanguineo. Elytra rugosa.*
- murraea.* 9. *C. supra rubra aut viridis elytris nigro maculatis, corpore nigro.* Linn. syst. nat. 2. 575. 2.  
Geoff. Inf. 1. 314. 5. β.  
Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 7.  
Herbst Arch. 4. 50. 5. tab. 22. fig. 28.  
*Cassida maculata viridis elytris rarius sutura dorsali confertius nigro maculatis* Mant. Inf. 1. 62. 3. Linn. syst. nat. 2. 575. 6. Geoff. Inf. 1. 314. 5. tab. 5. fig. 6.  
Habitat in Germaniae plantis.
- ferruginea.* 10. *C. nigra thorace elytrisque ferrugineis immaculatis.*  
Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 2.  
Herbst Arch. 4. 50. 6. tab. 22. fig. 29.  
Ross. Fn. Etr. 1. 72. 184.  
*Cassida subferruginea Schrank Beytr. 62. 3.*  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Minor C. viridi supra tota ferruginea. Elytra punctata.
- limbata.* 11. *C. capite thorace elytrisque obscuris: margine rufescente* Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 15.  
*Cassida brunnea Thunb. nov. sp.*  
Habitat in Diantho Carthusianorum Saxoniae Dom. Hybner.  
Thorax laevis, obscurus margine rufescente.  
Elytra punctata, obscura margine obscure rufo.  
Corpus rufescens.
- marginella.* 12. *C. viridis thoracis elytrorumque marginibus flavis.*

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Clypeus viridis margine flavo. Elytra punctata,  
viridia margine flavo.

13. C. thorace elytrisque obscuris: margine flave- *cincta*.  
scente, elytris ante marginem macula albo  
hyalina.

Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.

Thorax integer, obscurus margine solo flavescente.  
Elytra obscura margine flavescente & ante mar-  
ginem macula magna albo hyalina.

Variat rarius macula magna marginis ad basin  
& ante apicem.

14. C. pallida coleoptris lineolis numerosissimis dif- *hebraea*.  
formibus nigris. Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 8.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Parva. Corpus flavescentia. Thoracis coleoptro-  
rumque margo pallidus, discus lineolis nume-  
rosis difformibus nigris. Pedes pallidi.

15. C. ferruginea coleoptrorum disco punctis im- *judaica*.  
pressis maculisque nigris. Oliv. Inf. 97. tab. 2.  
fig. 23.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Thorax ferrugineus, immaculatus margine palli-  
diore. Elytra ferruginea margine pallidiore,  
disco maculis nigris punctisque impressis.

16. C. obscure ferruginea immaculata, elytris pun- *obscura*.  
ctatis.

Habitat in India orientali.

Statura & magnitudo praecedentis. Corpus  
totum cum thorace, elytris pedibusque obscure  
ferrugineum, immaculatum. Thorax subscaber  
elytraque punctata.

17. C. elytris pallidis: disco lineis tribus approxima- *tristriata*.  
tis atris; intermedia minore.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo C. viridis. Clypeus rotundatus, pallidus basi parum obscure rufescens. Elytra laevia, pallida disco lineis tribus atris, quarum intermedia minor antice cum exteriore colta. Corpus nigrum.

- annulus.* 18. C. flavescentis coleoptrorum disco atro: annulo fasciaque postica flavescentibus. Oliv. Inf. 97, tab. 1. fig. 14.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Thorax flavescentis, immaculatus. Coleoptra disco atro annulo flavescente.

- 6 punctata.* 19. C. flavescentis coleoptrorum disco ferrugineo: punctis sex nigris.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Margo omnis pallidus. Coleoptrorum discus ferrugineus punctis tribus, duabus ad marginem, tertio ad futuram nigris.

- interrupta.* 20. C. flavescentis thorace immaculato, elytris ante marginem punctisque nigris. Olivier Inf. 97, tab. 3. fig. 34.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae flavae apicem nigrae. Clypeus rotundatus, flavus. Elytra flavescentia linea lata, atra, in medio interrupta, quae ante marginem a basi ad angulum ani excurrit. Margo ipse late flavescentis fasciis duabus atris, altera ad basin, altera ad apicem. In disco obscuriore puncta aliquot nigra, sparsa. Corpus flavescentis.

- 8 punctata.* 21. C. rufescens thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo nigris. Oliv. Inf. 97. t. 3. f. 38.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Antennae rufescentes apice nigrae. Thorax rufescens punctis duobus parvis, nigris. Elytra punctata, rufescientia punctis quatuor majoribus cyaneo nigris 2. 2. Corpus rufescens.

- 22.** *C. rufescens* thorace punctis duobus, elytris numerosis cyaneo nigris, clypeo integro. Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 17.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae apice nigrae. Clypeus integer punctis duobus in medio nigris. Elytra rufa punctis circiter novem lateralibus, majoribus, nigro cyaneis. Margo subtus fasciis tribus. Corpus flavescens.
- 23.** *C. rufescens* thorace punctis quatuor, elytris *cribraria*. numerosis nigris, clypeo emarginato. Olivier Inf. 97. tab. 3. fig. 44.  
 Habitat in America Mus. Dom. Banks.  
 Antennae apice nigrae. Clypeus emarginatus, rufescens punctis quatuor dorsalibus, nigris. Elytra laevia, gibba, rufescentia punctis numerosis sparsis. Corpus nigrum.
- 24.** *C. grisea* elytris linea coerulea nitidissima Linn. *nobilis*. syst. nat. 2. 575. 4. Geoff, Inf. 1. 313. 3.  
 Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 24.  
 Schaeff. Icon. tab. 96. fig. 6.  
 Raj. Inf. 107. 7.  
 Habitat in Europae Carduis, Stellatis.  
 Linea elytrorum perit cum vita.
- 25.** *C. virens* elytris viridi argenteis nitidis, capite margarita-pecloreque nigris. Olivier Inf. 97. tab. 2, *cea*. fig. 19.  
*Cassida margaritacea* Schall. Act. Hall. 1. 259.  
 Habitat Halae sub lapidibus Dom. Hybner.  
 Color perit cum vita.
- 26.** *C. flavescens* coleoptrorum disco nigro: maculis *cruciata*. quatuor fluorescentibus Linn. syst. nat. 2. 576. 9.  
 Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 13.  
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 15.  
 Habitat in Europae plantis.



**Corpus pallide flavescens. Clypeus rotundatus,**  
integer lineolis tribus dimidiatis, nigris inter-  
media breviore, obsoletiore. Elytra punctata,  
vix marginata, pallida disco nigro maculis dua-  
bus magnis, dorsalibus, flavescensibus.

- Crixi.* 27. **C. flava thoracis linea dorsali ferruginea, co-**  
leoptrorum disco ferrugineo: maculis quatuor  
flavis.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Thorax flavus linea media sanguinea. Coleoptera  
disco ferruginea linea baseos & apicis ad mar-  
ginem excurrente maculisque duabus flavis,  
anteriore majore, posteriore margine connexa.

- Ipunctata.* 28. **C. flavescens thoracis punto medio coleoptris**  
undecim nigris Oliv. Inf. 97. tab. fig.

Voet. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 16.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Corpus flavescens marginibus obscurioribus.  
Punctum nigrum in medio thoracis. Coleoptero-  
rum puncta undecim 4. 1. insutura 2. 4. Cor-  
pus dilute ferrugineum.

- sinuata.* 29. **C. flavescens ferruginea thorace postice sinuato,**  
coleoptris punctis undecim nigris.

Habitat in Asia Mus. Britann.

Media. Antennae, caput, thorax aut flava, aut  
ferruginea, immaculata. Thoracis margo posti-  
cus sinuatus. Elytra punctis quinque, primo  
baseos, secundo, ad futuram, tertio in medio,  
quarto & quinto pari, & communi versus  
apicem.

- arcuata.* 30. **C. aeneo flavescens coleoptris maculis quatuor-**  
decim atris: quibusdam arcuatis.

*Cassida arcuata* Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 26.

Habitat in America meridionali D. Olivier.

Corpus medium. Antennae nigrae. Clypeus

- aeneo flavus. Elytra glabra, flavescentia, aeneo nitida maculis duabus baseos arcuatis, majori in medio & duabus versus apicem itidem arcuatis. Præterea unica ante medium communis.
31. C. testacea pallido marginata elytris immaculatis basi unituberculatis. *2 notata:*  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Affinitas summa C. *2* tuberculatae at duplo major. Clypeus rotundatus, integer, testaceus margine pallido. Elytra substriata, testacea, immaculata margine pallido. Corpus nigrum abdominis marginе pedibusque pallidis.
32. C. brunnea albo marginata elytris nigro maculatis basi unituberculatis. *2 tuberculata.*  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Affinis C. tuberculatae at duplo minor. Antennae pallidae apice nigrae. Thorax flavescentia margine pallido. Elytra brunnea punctis duobus nigris: anteriori majori, transverso. Margo pallidus. Corpus nigrum margine pallido. Pedes pallidi.
33. C. testacea flavo marginata coleoptris trituberculatis, Linn. syst. nat. 576. 14.  
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 14.  
 Habitat in Sierra Leon Africae.  
 Supra testacea margine omni flavo. Coleoptera basi tuberculis tribus elevatis: lateralibus minoribus. Corpus subtus pallidum.
34. C. brunnea elytris flavis: futuris brunneis. *futuralis.*  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.  
 Antennae brunneae. Clypeus porrectus, integer, brunneus. Elytra lata, flava sutura dorsali & baseos brunneis. Corpus brunneum.
35. C. thorace flavo, elytris rufescens: margine nigro; maculis duabus flavis Oliv. Inf. 97. t. 3. f. 40. *2 guttata.*

Habitat Cajennae Dr. Mauduit.

Clypeus rotundatus, integer, flavus. Elytra obscure rufescens margin'e atro, & in hoc maculae duae, oblongae, flavae, posteriori minori. Antennae apice fuscae.

- miliaris.* 36. C. flava thorace immaculato, elytris nigro punctatis: margine bifasciato. Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 25.

Habitat in Insula St. Helena Dom. Banks.

Antennae flavae apice nigrae. Clypeus rotundatus, integer, flavus. Elytra flava punctis circiter decem nigris, sparsis. Margo uti in reliquis dilatatus fasciis duabus, altera ad basin, altera versus apicem nigris. Sutura apice nigra. Subtus nigra margine flavescente. Pedes flavi.

- maculata.* 37. C. flava elytrorum margine nigro: macula magna flava.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Media. Clypeus rotundatus, laevis, flavescentia, immaculatus. Antennae flavae apice nigrae. Elytra flava margine omni nigro: laterali latiori macula magna flava. Sutura postice dimidiata, nigra. Corpus flavum.

- punctata.* 38. C. nigra clypeo brunneo, elytris flavis nigro punctatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Corpus nigrum. Clypeus brunneus. Elytra flava, nitida punctis numerosis nigris.

- marginata.* 39. C. cyaneo nigra elytris testaceis: margine nigro Linn. syst. nat. 2. 578. 23.

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 11.

Voet. Coleopt. 2. tab. 42. fig. 5.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 1.

Naturforsch. 9. tab. 2.

Degeer Inf. 5. 185. 10.

Habitat in Indiis.

Clypeus cyaneus, in medio gibbus. Corpus nigrum.

40. C. thorace obscuro, elytris sanguineis: margine 4 pustulata. cyaneo; maculis duabus rubris.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Corpus atrum. Clypeus obscure rufus, Elytra rufa margine exteriori late cyaneo maculis duabus magnis, rufis. Sutura nigra.

41. C. thorace elytrisque obscuris, elytris spina su- *dorsata*. turali margineque albicante: basi obscuro.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 45.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Clypeus rotundatus, obscurus, nitens. Elytra antice ad suturam spinosa, fusca margine late albicante: basi obscuro. Corpus flavescentia.

42. C. luteo aenea elytris immaculatis excavato pun- *Jamaicensis* etatis Linn. syst. nat. 2. 577. 21.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 32.

Sloan. Jamaic. 2. 208. tab. 233. fig. 27. 28.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Thoracis elytrorumque margo testaceus. E spiritu vini extracta colorem aeneum in triste testaceum mutat, naturalem vero recuperat, aqua calida immissa.

43. C. testacea elytris angulo antico spinoso basique *perforata*. *perforatis*.

Cassida perforata Pall. Spicil. fasc. IX. 3. t. 1. f. 1.

Habitat in America meridionali.

Aliam simillimam vidi in Musaeo Dom. Bosc, at angulo elytrorum haud spinoso & basi haud perforatis. An sexus varietas?

44. C. cyanea elytris angulo antico spina truncata. *bicornis*.

Linn. syst. nat. 2. 576. 8. Amoen. acad. 6. 393. 2.

Habitat in Indiis.

- Taurus.* 45. *C. atra elytris angulo antico spina truncata.*  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Praecedente paullo minor. Caput, thorax, corpus atra, aeneo paullo nitida. Elytra atra, punctis impressis reticulata angulo antico spina valida, truncata.
- cyanea.* 46. *C. cyaneo aenea elytris excavato punctatis immaculatis.* Linn. syst. nat. 2. 577. 39. Mus. Lud. Ulr. 39.  
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 9.  
 Petiv. Gazoph. tab. 57. fig. 6.  
 Habitat in Indiis.
- spinifex.* 47. *C. ferruginea elytris angulo antico spina porrecta, thorace utrinque spina transversa.* Linn. syst. nat. 2. 576. 7. Amoen. acad. 6. 392. 7.  
 Oliv. Inf. 97. tab. fig.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 21.  
 Habitat in India.  
 Linea nigra ad basin elytrorum.
- bidens.* 48. *C. atra elytris antice porrectis: spina suturali erecta.*  
 Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 20.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Clypeus rotundatus, subemarginatus dorso carinato, niger maculis duabus ferrugineis, obsoletis. Elytra reticulata, atra basi ultra caput porrecta, carinata spinaque in medio suturae porrecta, acuta, atra, nitida. Corpus atrum femoribus anticis intus pallidis.
- gibbosa.* 49. *C. atra thorace maculis duabus villoso aureis, elytris virescenti reticulatis: spina suturali obtusa.*  
 Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 6.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Corpus atrum. Clypeus rotundatus, emarginata

tus maculis duabus magnis, villoso aureis. Elytra atra, viridi villosa, reticulata margine nigro, Sutura in medio elevata in spinam obtusam. Pedes nigri plantis fuscis.

50. C. rufa elytris subreticulatis nigro maculatis *truncata* dorso gibbis Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 9.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae. Clypeus rufus maculis duabus, dorsalibus, nigris. Elytra basi truncata, gibba, rufa, subreticulata, nigro maculata. Margo rufus maculis simplicibus limbo tamen ipso nigro. Corpus nigrum.

51. C. flava immaculata corpore testaceo: puncto *flava*. scutellari nigro. Linn. syst. nat. 2. 576. II.

Oliv. Inf. 97. tab. fig.

Voet. Coleopt. 2. tab. 44. fig. 28.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 13.

Habitat in America australi.

52. C. testacea margine punctisque flavis. Linn. syst. *leucophaea*, nat. 2. 576. 13. Amoen. acad. 6. 393. 10.

Habitat in America meridionali.

Margo thoracis & elytrorum flavus & praeterea puncta elevata flava in disco.

53. C. flava elytris coeruleo variegatis: lateribus *reticularis*. unifasciatis Linn. syst. nat. 2. 576. 15.

Oliv. Inf. 97. tab. fig.

Cassida ornata Herbst. Arch. 4. 50. 8. tab. 20.

fig. 30.

Voet. Coleopt. 2. tab. 41. fig. 4.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 17.

Habitat in America meridionali.

Thorax emarginatus, testaceus, linea dorsali crassa, nigra.

54. C. rufa elytris coeruleo variegatis: lateribus *variegata*. bifasciatis. Linn. syst. nat. 2. 576. 16.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 22. 28.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 42. fig. 8.  
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 6.  
 Habitat in America meridionali.  
 Thorax fuscus. Margo elytrorum tenuissime  
 cyaneus.

*trifasciata*. 55. C. rufa elytrorum lateribus trifasciatis.

Habitat in America Dom. Daldorff.  
 Clypeus rotundatus, integer, obscure rufus. Ely-  
 tra laevia, glabra margine dilatato fasciis tri-  
 bus nigris. Margo ipse tenuissime nigricat.  
 Abdomen flavescens.

*retiformis*. 56. C. nigra thorace bimaculato, elytris flavis  
 nigro reticulatis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Corpus, antennae, pedes nigra. Clypeus niger  
 maculis duabus magnis flavescientibus. Elytra  
 flavescientia margine omni strigisque inter-  
 ruptis fere reticulatis nigris.

*annulata*. 57. C. coerulea thorace maculis duabus, elytris  
 annulis rufis.

Cassida annulata Naturforsch. 6. tab. 4.  
 Habitat in Indiis Dr. Schulz.

Thorax obscurus, minime nitens maculis dua-  
 bus latis, obscure rufis. Elytra gibba, obscure  
 coerulea annulis sex, partim flexuofisis, rufis.  
 Subtus nigra abdominis segmentis utrinque  
 puncto rufo.

*grossa*. 58. C. sanguinea elytris disco punctis nigris spar-  
 sis margine lineis ramosis nigris Linn. syst.  
 nat. 2. 577. 17.

Cassida grossa Naturforsch. 6. tab. 4. fig. 4.  
 Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 1.  
 Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 5.

*B.* *Cassida decussata nigro coerulescens elytris*  
*flavo maculatis: maculis dorsalibus reticulatis,*  
*lateralibus distinctis* Mant. Inf. 2. 66. 57.  
*mera varietas.*

Habitat in America meridionali.

59. *C. cinerascens elytris lineis quatuor albidis.* *lineata.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dr. Schulz.

Corpus nigrum, immaculatum. Clypeus obscure  
 cinereus. Elytra pallidiora lineis quatuor al-  
 bidis.

60. *C. elytris lineis ternis nigris: intermedia exclama-*  
*signum! referente Linn. syst. nat. 2. 577. 20.* *tionis.*

Oliv. Inf. 97. tab. 1. fig. 16.

Habitat in America meridionali.

Corpus pallide flavescens. Lineae laterales obso-  
 letiores.

61. *C. ferrugineo aenea elytris macula flava sub-* *inaequalis.*  
*ovata disci Linn. syst. nat. 2. 678. 24.*

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 49.

Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 41. fig. 2.

Naturforsch. 9. tab. 2. fig. 5.

Degeer Inf. 5. tab. 16. fig. 10.

Habitat in America meridionali.

62. *C. fusco aenea elytris macula flava lateral i lateralis.*  
*Linn. syst. 2. 578. 26..*

Voet. Inf. 2. tab. 43. fig. 24.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 2.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 12.

Habitat in America meridionali.

Praecedente duplo minor.

63. *C. nigra thorace villoso virescente, elytris vi-* *pallidata.*  
*ridibus: margine lineaque media ferrugineis.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae longitudine corporis nigrae. Clypeus subvillosum, minime nitidus, virescens, immaculatus. Elytra viridia margine exteriori futura dimidiata lineolaque disci ferrugineis. Pedes atri.

*discoides*. 64. C. viridi ænea elytris macula didyma flava disci Linn. syst. nat. 2. 578. 17.

Oliv. Inf. 97. tab. 2. fig. 18.

Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 12.

Degeer Inf. 5. tab. 15. fig. 11.

Habitat in America meridionali.

Corpus subitus nigrum.

*2 pustulata*. 65. C. elytris viridi aeneis: macula inaequali sanguinea. Linn. syst. nat. 2. 578.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 35.

Voet. Coleopt. 2. tab. 42. fig. 6.

Cassida 2 pustulata Naturforsch. 6. tab. 4.

Habitat Cajennae.

Clypeus obscure aeneus, immaculatus. Elytra gibba. Antennae nigrae.

*cuprea*. 66. C. supra cuprea thoracis margine elytrisque maculis duabus marginalibus rufis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Corpus cum antennis pedibusque atrum. Thorax obscure cupreus margine rufescente. Elytra punctata, viridi cuprea maculis duabus marginalibus rufis, apice magis laevia.

*6 pustulata*. 67. C. cyanea elytris maculis tribus rubris.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 36.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Clypeus immaculatus, antice subemarginatus.

Elytra gibba maculis tribus rubris, prima baseos, secunda in margine, tertia versus marginem.

Variat aetate colore obscuriore.

68. *C. nigra thorace punctis duobus, elytris septem, 16 punctata.*  
rubris.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 41.

Voet. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 20.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Medius. Clypeus utrinque depresso, niger pun-  
ctis duobus apicis magnis, rubris. Elytra nigra  
punctis septem, magnis, rubris 1. 2. 3. 1. Cor-  
pus & pedes nigra.

69. *C. flavescens elytris punctis duobus nigris* Linn. 2 punctata.

synt. nat. 2. 578.

Oliv. Inf. 97. tab. 3. fig. 42.

Habitat in India orientali.

Variat elytrorum punctis duobus & tribus.

45. CHYSOMELA. *Palpi sex extror-  
sum crassiores.*

*Labium corneum,  
integrum.*

*Antennae monili-  
formes.*

1. *C. ovata atra elytris flavis: punctis numerosissimis punctatissi-  
atis, sterno cornuto.* ma.

Chrysomela punctatissima Oliv. Inf. tab. fig.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Major *C. pustulata*, gibba. *Antennae moniliformes.* Caput atrum, puncto frontali, oblongo,

---

Chrysomelae corpus ovatum, gibbum, immarginatum, glabrum, saepius laeve, nitidum, capite ovato, inserto, oculis reniformibus, marginalibus, antennis brevibus ante oculos insertis, thorace transverso: margine saepe incrassato, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, margine deflexo, pedibus validis, mediocribus, tarsis quadriarticulatis, colore vario saepius nitido.

impresso. Thorax ater, nitidus margine parum prominulo, obscuriore. Elytra laevissima, flava punctis numerosissimis nigris. Corpus atrum sterno antice exerto, valido, cornuto, acutiusculo. Pedes atri.

*pustulata*. 2. C. atra elytris fasciis quinque punctorum fulvorum. Erotylus pustulatus Mant. Inf. 1. 91. 6.

Chrysomela pustulata Oliv. Inf. tab. fig.

Habitat Cajennae Dr. Schulz.

Corpus totum atrum, nitidum. Elytra punctata, atra fasciis quinque e punctis fulvis 5. 5. 4. 4. 1. Punctum futurale fasciae tertiae & quartae in lunulam connatae. Spina valida inter pedes secundi paris.

*Tenebricosa* 3. C. aptera ovata atra antennis pedibusque violaceis. Geoff. Inf. 1. 195. 19.

Tenebrio laevigatus Linn. syst. nat. 2. 678. 29.

Ross. Fn. Etr. 1. 74. 186.

Schaeff. Icon. tab. 126. fig. 1.

Habitat in Europae australioris plantis.

C. Goettingensi triplo major.

Larva gibba, violacea, ano rufso in plantis herbaceis, polyphaga.

*rugosa*. 4. C. aptera ovata atra elytris rugosis, pedibus violaceis.

Tenebrio rugosus apterus niger, elytris rugosis, abdomine pedibusque coerulecentibus thorace lunato. Linn. syst. nat. 2. 678. 27.

Habitat in Africa Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura & magnitudo omnino C. tenebricosae, at elytra omnino rugosa.

*Morio*. 5. C. ovata atra antennis pedibusque nigris.

Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.

Praecedente paullo minor, tota atra, obscure nitida.

Elytra haud connata, vix striata. Pedes nigri.

6. *C. ovata atra pedibus totis violaceis.* *coriaria.*  
*Chrysomela coriaria* Laichart. Aust. 143. 2.  
 Habitat in Germania.  
*Distincta omnino a C. Goettingensi paullo major.*  
*Antennae nigrae. Caput atrum macula gemina*  
*frontis impressa. Thorax elytraque vase pun-*  
*cata, atra, immaculata. Pedes toti violacei.*
7. *C. ovata cyanea elytris punctatis obscurioribus.* *nigrita.*  
*Chrysomela coerulea thorace violaceo.* Geoff.  
 Inf. 1. 259. 6.  $\alpha$ .  
 Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.  
*Statura omnino C. Goettingensis. Antennae*  
*fuscae. Caput & thorax glabra, laevia, nitida,*  
*cyanea. Elytra vase punctata, multo obscuriora.*  
*Corpus cum pedibus cyaneum spongiis totis*  
*cinereis.*
8. *C. ovata atra pedibus violaceis : plantis rufis.* *Goettingensis.*  
 Linn. syst. nat. 2. 586. 4. Fn. Sv. 506.  
 Degeer Inf. 5. 298. 8.  
 Habitat in Germaniae plantis.  
*Alae nullae, plantae rufae.*  
*Copula connexas vidimus et inter se & cum C.*  
*tenebricosa.*
9. *C. ovata atro coerulea antennis pedibusque hottentotta.*  
*concoloribus, elytris vase punctatis.*  
 Habitat Kiliae.  
*Statura & magnitudo praecedentis. Corpus to-*  
*tum atrum, nitidum pedibus antennisque con-*  
*coloribus. Elytra vase punctata. Caput gla-*  
*brum, laeve.*
10. *C. ovata nigra subtus obscurior, elytris vase aethiops.*  
*punctatis.*  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
*Affinis certe praecedenti at minor. Corpus ni-*  
*grum, obscure nitidum. Thoracis margo parum*

- incrassatus. Elytra subtilissime punctata. Corpus subtus obscurum.
- vittata.* 11. *C. ovata cyanea elytris margine vittaque media flavis.*  
*Hybn. Naturf. 24. 37. 1. tab. 2. fig. 1.*  
*Habitat in America Mus. Dr. Schulz.*  
*Magna, crassa, ovata. Corpus totum cyaneo nitidum. Elytra laevia margine vittaque media lata flavis, quae antice posticeque coeunt.*
- bicolor.* 12. *C. ovata viridi aenea subtus violacea elytris punctato striatis.*  
*Chrysomela viridicoerulea Forsk. desc. 77. 2.*  
*Habitat Alexandriae.*  
*Tota supra obscure aenea, subtus violacea. Elytra punctato striata striis per paria approximatis.*
- affinis.* 13. *C. ovata obscure aenea subtus violacea, elytris laevibus.*  
*Habitat sub lapidibus Barbariae Dom. Vahl.*  
*Corpus supra obscure aeneum, laeve, minime nitidum, subtus violaceum.*
- lusitanica.* 14. *C. ovata thorace cupreо, elytris aeneis: punctis impressis coerulescentibus, subtus violacea.*  
*Habitat in Lusitania Mus. Dom. Banks.*  
*Caput nigrum primo antennarum articulo violaceo. Thorax cupreus, obscure nitidus margine haud incrassato. Elytra vase punctata, aenea. Subtus cum pedibus violacea.*
- ferruginea.* 15. *C. ovata ferruginea subtus nigra.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.*  
*Caput ferrugineum antennis nigris basi ferrugineis. Thorax & elytra laevia, glabra, obscure, ferruginea. Corpus nigrum.*
- Bankii.* 16. *C. ovata supra aenea subtus testacea.*  
*Röss. Fn. Etr. 1. 75. 183.*

Habitat in Lusitaniae plantis polyphaga.

Caput aeneum ore testaceo antennisque fuscis.

Elytra punctata, aenea. Subtus cum pedibus elytrorumque margine inferiori testacea.

17. C. ovata aenea nitida antennis pedibusque testa- *metallica*.  
ceis.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Statura omnino C. Bankii, at alia & distincta.

Caput aeneum macula magna, frontali, nigra.

Antennae testaceae basi nigricantes. Thorax nitidus, aeneus margine nullo modo incrassato.

Elytra vase punctata, aenea. Corpus nigrum pedibus piceis.

18. C. viridi aenea thorace glaberrimo: margine *laminata*.  
incrassato, elytris punctato striatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

C. Bankii paullo minor. Antennae nigrae. Caput & thorax aenea, nitida, glaberrima thoracis margine incrassato. Elytra punctato striata, aenea, subtus nigricans, nitida. Pedes nigri.

19. C. ovata nigra elytris flavis: fasciis duabus pun- *gibbosa*.  
ctisque baseos nigris.

Habitat in America meridionali.

Elytra flavescentia punctis quatuor nigris ad basin, quorum posterius transversum, commune. Fasciae dentatae.

20. C. ovata obscure ferruginea elytris maculis *maculata*.  
quatuor flavis.

Habitat Surinami Dom. Smidt.

Magna, gibba. Caput obscure ferrugineum labio flavo. Thorax laevis, obscure ferrugineus, immaculatus. Elytra nitidiora, punctato striata maculis duabus baseos, altera ad marginem crassiore lunata, postica incrassata, macula tertia in medio ad futuram, quarta apicis maxi-

ma, cordata. Corpus & pedes obscure ferruginea.

*opustulata.* 21. C. ovata nigra elytris punctis quinque rufis.  
Habitat in Insula St. Domingo Americae Mus.  
Dom. Gigot d'Orcy.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae moniliformes, flavae. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra striata, punctata, nigra punctis quinque rubris 2. 2. 1. Pedes ferruginei.

*trimaculata* 22. C. cyanea coleoptris flavis: fascia maculisque duabus nigris. Linn. syst. nat. 2. 592. 45.  
Habitat in America meridionali.

Caput, thorax, scutellum cyanea, nitida. Elytra punctata, flava fascia ad basin communi, quae tamen marginem haud attingit. Macula magna triangularis ad apicem. Pedes cyanei plantis rufis.

*Adonidis.* 23. C. atra thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris flavis: sutura vittaque nigris.

Herbst Arch. tab. 23. fig. 17.

Chrysomela Adonidis Pall. It. 1. 463. 29.

Hybn. Naturf. 24. 88. 2. tab. 2. fig. 2.

β. Chrysomela dorsalis atra thoracis margine testaceo: puncto nigro, elytris testaceis sutura vittaque nigris. Mant. Inf. 1. 67. 13.

Mera varietas sexus observante Hybnero.

Habitat in Austriae plantis Dr. Schulz.

Caput nigrum fronte flava. Sutura nigra basin elytrorum haud attingit.

*clavata.* 24. C. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta flavescente.

Habitat — — Dr. Hunter.

Antennae nigrae. Corpus nigrum. Vitta elytrorum basi apiceque latior. Pedes nigri.

- 25.** C. obscure testacea elytris flavis: fasciis duabus *trifasciata*.  
viridi aeneis.

Habitat Surinami Dom. Prof. Helwig.

Statura gibba & magnitudo omnino C. bifasciatae.  
Caput, thorax, antennae, corpus, pedes obscure testacea, minime nitida. Elytra subtilissime punctato striata, flava fasciis duabus viridi aeneis, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Margo tenuissime & sutura latior viridi aenea.

- 26.** C. testacea elytris aeneis nitidis: punctis duobus *futuralis*.  
fasciisque duabus flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Thoracis margo flavescens. Elytra laevia puncto baseos, fasciis duabus in medio, quae margines haud attingunt punctoque apicis flavis.

- 27.** C. aenea elytris flavis: sutura vittaque aeneis. *pulcra*.

Habitat in America septentrionali D. Banks.

Elytra flava sutura late aenea, quae tamen basin elytrorum haud attingit. Vitta lata aenea in medio, quae nec basin nec apicem attingit.

- 28.** C. atra thorace fascia sinuata, elytris margine *guttata*.  
punctisque sex albis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Statura magna praecedentium. Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput atrum maculis duabus baseos magnis, albis. Thorax ater fascia media, valde sinuata, alba, quae ad marginem exteriorem extenditur. Elytra punctato striata, atra, nitida margine exteriori sinuato albo five potius punctis quatuor margine albo connexis, praeterea puncta sex dorsalia 1. 2. 2. 1. quorum par posticum connexum. Corpus atrum.

- 14punctata.* 29. *C. ovata testacea coleoptris flavis: punctis sedecim nigris; duobus communibus* Linn. syst. nat. 2.  
 599. 94.  
*Habitat in India orientali.*  
*Femora postica crassiora, unidentata.*
- ignita.* 30. *C. cyanea nitida elytris aeneis, antennis planatisque fuscis.*  
*Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.*  
*Antennae fuscae, basi cyaneae. Caput, thorax, scutellum cyanea, nitidissima. Elytra basi gibbosa, aurea margine parum virescente. Corpus cyaneum plantis fuscis.*
- surinamen-* 31. *C. cyanea glaberrima antennis plantisque fuscis.*  
*sis.* *Chrysomela americana Sulz.* Inf. tab. 3. fig. 12.  
*Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.*  
*Magna, tota cyanea, glabra, nitida. Os, antennae & plantae fuscae. Femora subdentata.*
- asiatica.* 32. *C. ovata viridiaenea nitidissima elytris cyaneis.*  
*Chrysomela asiatica Pall. It. 1. 463. 30.*  
*Habitat in imperio Rutheno Mus. D. Banks.*  
*Major C. Surinamensi. Caput, thorax, corpus viridia, glabra, nitidissima. Elytra violacea, nitida.*
- graminis.* 33. *C. ovata viridi coerulea nitida antennis pedibusque concoloribus.* Linn. syst. nat. 2. 587. 7.  
*Fn. Sv. 509. Geoff. Inf. 1. 260. 10.*  
*Degeer Inf. 5. 304. 16.*  
*Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 10.*  
*Habitat in Europae graminibus.*
- bifrons.* 34. *C. ovata viridi aenea nitida corpore cyaneo.*  
*Habitat in Italiae plantis Dr. Allioni.*  
*Statura & magnitudo C. graminis at distincta.*  
*Antennae nigrae. Caput, thorax, elytraque viridi aenea, nitida. Corpus cum pedibus cyanum, nitidum. Thoracis margo incrassatus.*

35. *C. ovata capite thoraceque aeneis, elytris cuprea.*  
 preis, corpore atro. Geoff. Inf. 1 263. 15.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
 Corpus, antennae, pedes nigra. Caput aeneum  
 oculis fuscis. Thorax aeneus margine incrassato,  
 punctato. Elytra omnino cuprea, nitida,  
 basi gibba. Abdominis margo sanguineus.
36. *C. ovata cyanea antennis fuscis.* trifitis.  
 Habitat in Europa australi Dom. de Sehestedt.  
 Distincta videtur. Corpus magis oblongum  
 antennis fuscis. Thorax cyaneus, nitidus margine  
 incrassato. Elytra laevissima, cyanea, obscura.  
 Corpus cyaneum.
37. *C. ovata violacea plantis alisque rubris.* Linn. hemoptera.  
 syst. nat. 2. 587. 11. Fn. Sv. 572. Geoff.  
 Inf. 1. 258. 5.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Primus antennarum articulus rufus.
38. *C. ovata coerulea f. aenea antennis pedibusque varians.*  
 nigris.  
*Chrysomela varians* Act. Hall. 1. 272. 20. tab. 9.  
 fig. 13.  
*Chrysomela Hyperici* Degeer Inf. 5. 312.  
 Habitat in Saxoniae Hyperico.  
 Corpus totum glabrum, immaculatum.
39. *C. subrotunda cyanea antennis pedibusque concoloribus.* violacea.  
*Chrysomela violacea* Act. Hall. 1. 272. 21.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Statura omnino praecedentis at paullo major.  
 Corpus totum cyaneum antennis pedibusque  
 concoloribus. Thorax laevis. Elytra subtilissime  
 punctata.
40. *C. ovata cuprea nitens subtus viridiaenea pedibus cupreis.* Centaurii.

Chrysomela Centaura Herbst Arch. t. 23. f. 15.  
Habitat in Germaniae Centaureo D. Schneider.  
Affinis certe C. varians & forte mera ejus varie-  
tas, quamvis colore distincta.

*tricolor.* 41. C. ovata aenea nitida subtus nigra antennis  
ano pedibusque ferrugineis.

Habitat in Virginia.

Media. Antennae fere longitudine corporis palpi-  
que ferrugineae. Caput, thorax, elytra viridi  
aenea, nitida, immaculata. Corpus nigrum ano  
ferrugineo. Pedes ferrugine..

*luteicornis.* 42. C. ovata nigro aenea antennis flavis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr. Pflug.

Statura omnino & magnitudo C. varians. Cor-  
pus totum nigro aeneum, obscure nitidum  
punctis parvis impressis irroratum. Antennae  
solae flavae.

Variat pedibus nigris & flavis.

*semistriata.* 43. C. ovata nigra elytris flavis : fascia media nigra,  
antice posticeque nigro striatis.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Caput atrum antennis rufis. Thorax ater mar-  
gine antico lateribusque flavis. Elytra laevia,  
flava, basi striis decem abbreviatis nigris, quae  
nec basin, nec fasciam attingunt. In medio  
fascia lata atra & postice striae iterum octo  
abbreviatae, secunda tertiaque brevissimis.  
Subtus atra plantis ferrugineis.

*Populi.* 44. C. ovata thorace coerulescente, elytris rubris  
apice nigris. Linn. syst. nat. 2. 590. 30. Fn.  
Sv. 523. Geoff. Inf. 1. 256. 1

Degeer Inf. 5. 290. 1. tab. 8. fig. 16.

Merian. Europ. 14. tab. 27.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 9.

Albin. Inf. 63. fig. 6.

Habitat in Populo tremula folia saepius devastans.  
Larvae hexapodae albo nigroque variae, duplice  
serie tuberculorum, e quibus humoris lutei  
guttulas fundunt. Odorem spargunt gravem  
& ingratum. Lister.

45. C. ovata coerulescens elytris testaceis Geoff. *tremula*.  
Inf. 1. 25. B. 2.

Habitat in Europae Populo.

Affinis C. populi at duplo minor & elytra apice  
concolora.

46. C. ovata cyanea nitida elytris testaceis imma- *grossa*.  
culatis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Affinis certe C. Populi at major ideoque a C.  
tremula distincta videtur. Antennae nigrae.  
Corpus totum cyaneum, nitidissimum elytris  
foliis testaceis apice concoloribus.

47. C. ovata obscure testacea Linn. syst. nat. 2. *staphylaea*.  
590. 26. Fn. Sv. 518. Geoff. Inf. 1. 263. 15.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 12.

Degeer Inf. 5. 294. 3. tab. 8. fig. 24.

Habitat in Europae plantis.

48. C. ovata testacea elytris æneis: margine testaceo. *ferruida*.  
Habitat in Insula Java Dr. Mauduit.

Caput testaceum oculis albis. Thorax rotunda-  
tus, testaceus, nitidus punctis quatuor dor-  
salibus nigris. Elytra viridia, nitida margine  
testaceo.

49. C. ovata thorace aurato, elytris testaceis Linn. *polita*.  
syst. nat. 2. 590. 27. Fn. Sv. 522. Geoff.

Inf. 1. 257. 2.

Degeer Inf. 5. 294. 2. tab. 8. fig. 23.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 9.

Habitat in Europae Salice, Populo.

- lunata.* 50. C. ovata ferruginea elytris margine vitta lunulaque media flavicantibus.  
Habitat — — — Mus. Dom. Banks.  
Elytra margine exteriori, vitta lata versus futuram, quae postice cum margine exteriori coit lunulaque media inter marginem & vittam flavicantibus.
- glabrata.* 51. C. ovata testacea nitida elytrorum limbo cyaneo.  
Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.  
Corpus medium, gibbum. Caput & thorax laevia, nitida, testacea, immaculata. Elytra glaberrima, punctata, testacea margine omni cyaneo, nitido. Corpus testaceum.
- lurida.* 52. C. ovata nigra elytris striato punctatis castaneis. Linn. syst. nat. 2. 590. 28.  
Geoff. Inf. 1. 258. 3.  
Habitat in Galliae Vite Dr. Mallet.
- vittata.* 53. C. ovata thorace nigro aeneo, coleoptris flavis: vittis novem fuscis.  
Habitat — — — Mus. Dom. Banks.  
Caput & thorax nigro aenea, immaculata. Elytra flava futura vittisque quatuor, quarum 2. 4. longiores apice cœunt. Stria punctorum impressorum utrinque inter vittas. Corpus fuscum.
- stolidia.* 54. C. ovata ferruginea capite thoraceque flavis, elytris variegatis.  
Habitat in America meridionali.  
Antennae nigrae. Elytra flavo ferrugineoque varia margine tamen semper flavo. Corpus ferrugineum.
- nigricornis.* 55. C. ovata nigro aenea capite thoracis lateribus elytrorumque macula dupli baseos ferrugineis.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput ferrugineum puncto frontali antennisque nigris. Thorax æneus lateribus pectoreque rufis. Elytra subtilissime punctata, ænea, basi ad marginem exteriorem macula dupli fulva. Abdomen nigrum basi apiceque ferrugineum. Pedes nigri.

Variat punctis elytrorum ferrugineis.

56. C. ovata violacea thoracis marginibus albis: *collaris*.  
puncto nigro Linn. syst. nat. 2. 591. 37.  
Fn. Sv. 528.

Degeer Ins. 5. 302. 13.

Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 11. 12.

Habitat in Europæ, Americae salicibus.

Thorax punctis duobus dorsalibus impressis.

57. C. ovata coerulea thorace laevi: margine in- *salicis*.  
crassato ferrugineo.

Habitat in Saxoniae Salice Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas præcedentis. Caput coeruleum fronte impressa. Thorax omnino laevis, coeruleus, margine incrassato, rufo puncto parvo impresso, vix conspicuo. Elytra punctata, coerulea. Corpus nigrum.

58. C. ovata obscure ænea thorace elytrisque mar- *senegale-*  
gine ferrugineo, thoracis puncto nigro. *sis*.

Habitat in Senegal Muf. Dom. Olivier.

Statura omnino C. collaris. Antennæ nigrae basi ferrugineae. Caput obscure æneum, immaculatum. Thorax obscure æneus margine incrassato, ferrugineo. puncto parvo nigro. Elytra laetia, viridi ænea, obscura, margine ferrugineo. Corpus obscurum.

59. C. ovata nigra thorace rufo bimaculato, elytris *vininalis*.  
rufis Linn. syst. nat. 2. 590. 31. Fn. Sv. 524.  
Geoff. Ins. 1. 265. 18.

Degeer Inf. 5. 297. 6.

Habitat in Europae Salice.

Hanc cum C. haemorrhoidali copula junctam  
vidit Dom. Degeer.

*cyanipes.* 60. C. ovata rufa elytris punctis posticeque cyaneis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput rufum macula baseos antennisque cya-  
neis. Thorax rufus, nitidus, glaber. Scu-  
tellum cyaneum. Elytra glabra basi ferruginea  
punctis duobus aut tribus apiceque cyaneis,  
qui color ad futuram paullo altius ascensit,  
postice ad marginem crassiorem interdum  
puncto parvo ferrugineo. Abdomen nigrum  
ano rufo. Pedes cyanei.

*cyanicornis* 61. C. ovata rufa thorace macula dorsali punctis-  
que duobus, coleoptris maculis octo cyaneis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Coleoptra rufa maculis  
octo cyaneis 2. 3. media in futura, 3. media  
apicis in futura. Abdomen cyaneum basi apice-  
que ferrugineum.

*opunctata.* 62. C. ovata thorace rubro postice nigro, elytris  
rufis: punctis subquinis nigris Linn. syst. nat. 2.  
590. 32. Fn. Sv. 525. Geoff. Inf. 1. 258. 4.

Degeer Inf. 5. 294. 4. tab. 8. fig. 25.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 10.

Habitat in Europae Populo.

Numerus punctorum in elytris variat, quin abs-  
que punctis vidi.

*Opunctata.* 63. C. nigra thorace rufo: punctis duobus, elytris  
rufis: punctis tribus nigris.

Habitat in Europae Plantis.

Nimis affinis praecedenti & forte ejus mera va-  
rietas. Caput nigrum ore rufo. Elytrorum

- puncta 2. i. Corpus nigrum ano rufo. Pedes rufi.
64. C. ovata flavesiensis oculis nigris. Linn. syst. *pallida*. nat. 2. 590. 25. Fn. Sv. 521. Geoff. Ins. 1. 243.  
Habitat in Sorbo Europae.  
Variat rarius elytris maculis indistinctis nigris corporeque nigro.
65. C. ovata atra nitida elytris striatis testaceis: *striata*. futura atra.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Gibba. Corpus nigrum. Elytra punctato striata striis per paria apice coeuntibus.
66. C. ovata thorace fulvo: punctis quatuor nigris, *notata*. elytris pallidis nigro variis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Caput fulvum basi nigrum. Elytra pallida antice fasciis duabus valde undatis punctoque postico nigris. Corpus pallidum abdomine basi nigro.
67. C. ovata thorace fulvo: punctis quatuor nigris, *Rumicis*. elytris fulvis: futura vitta media nigris.  
Habitat in Rumice spinosa Hispaniae Prof. Vahl.  
Antennae nigrae articulo primo fulvo. Caput fulvum puncto in medio baseos nigro. Scutellum nigrum. Vitta media elytrorum nec basin nec apicem attingit. Corpus nigrum pedibus fulvis.
68. C. ovata atra elytris margine punctis quatuor *vulpina*. apiceque nigro maculato albis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Corpus nigrum, obscure nitidum. Elytra margine punctisque quatuor anticis albis. Apex late albus maculis tribus nigris.
69. C. ovata flavesiensis elytris maculis duabus nigris. *crassicornis*.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.



Antennae nigrae basi pallidae. Elytrorum inacula posterior major, oblonga. Pedes nigri basi flavescentes.

*lapponica*. 70. C. ovata thorace viridi, elytris rubris: fascia inter punctum maculamque lunatum coerulea Linn. syst. nat. 2. 591. 34. Fn. Sv. 526.

Degeer Inf. 5. 302. 12. tab. 9. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 2.

Habitat in Europae Fraxino.

Sutura elytrorum coerulea.

*undulata*. 71. C. ovata rufa elytris fasciis tribus undulatis atro coeruleis Linn. syst. nat. 2. 591. 35. Amoen. acad. 6. 393. 14.

Habitat in India.

Fasciae elytrorum undulatae, in primis secunda.

Antennae pedes & abdominis basis atro coerulea.

*18 guttata*. 72. C. ovata elytris fuscis: punctis octo pallidis quibusdum connexis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput pallidum macula baseos antennisque nigris. Thorax pallidus maculis tribus dorsalibus fuscis. Elytra subtilissime punctato striata, fusca punctis octo pallidis, quibusdam ad basin connexis. Abdomen nigrum margine pallido.

*Polygoni*. 73. C. ovata coerulea thorace femoribus anque rufis Linn. syst. nat. 2. 589. 24. Fn. Sv. 520. Geoff. Inf. 1. 283. 4.

Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 14. 15.

Degeer Inf. 5. 322. 26.

Schaeff. Icon. tab. 51. fig. 5. tab. 161. fig. 4. tab. 173. fig. 4.

Habitat in Europae Polygono aviculari.

Gravida ultra coleoptra ventricosa evadit.

74. C. ovata cyanea antennarum basi thorace ano *rufica*.  
pedibusque rufis.  
Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.  
Paullo praecedente minor. Caput cyaneum utrinque puncto parvo baseos rubro. Elytra vix punctata.
75. C. ovata testacea elytris futura lineolaque media *brunnea*. fuscis.  
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
Thorax laevis, nitidus punctis duobus nigris.  
Elytra punctata.
76. C. ovata aurata thorace lineis tribus coleoptris- *cerealis*. que quinque coeruleis Linn. syst. nat. 2.  
588. 17. Geoff. Inf. 1. 262. 14.  
Schaeff. Icon. tab. 3.  
Habitat in Europae Spartio scopario.  
Variat rarius colore purpureo loco aurei.
77. C. ovata viridi aenea thorace lineisque quatuor, *modesta*: elytris duabus cupreis.  
Habitat in India orientali Prof. Abildgaard.  
Minor C. cereali. Caput viridi aeneum maculis duabus verticalibus cupreis ore antennisque nigris. Thorax punctatus, viridi aeneus lineis quatuor obscure cupreis. Sutura cyanea. Corpus & pedes obscura.
78. C. ovata viridiaenea elytris striis quinque san- *americana*. guineis Linn. syst. nat. 2. 592. 46.  
Habitat in America, in Gallia, Italiae Lavandula Dr. Broussonet.  
Caput aeneum macula verticali coccinea.
79. C. ovata nigro aenea elytris lineis tribus futura- *festiva*, que antica flavis.  
Chrysomela lineata Degeer Inf. 7. tab. 49. fig. 12.  
Habitat in America Mus. Britann.

Elytra punctato striata. Lineae duae exteriores apice coeunt, intermedia vero apicem haud attingit.

- fastuosa.* 80. C. ovata aurea coleoptris lineis tribus coerulis Linn. syst. nat. 2. 588. 19. Geoff. Ins. 1. 261. 11. Scop. carniol 232.  
Habitat in Europae Lamio albo.
- splendida.* 81. C. ovata viridi aenea antennis plantisque nigris.  
Habitat Tranquebariae Dom. Lund.  
Statura & magnitudo omnino praecedentis. Caput aeneum, nitidum palpis antennisque nigris. Thorax aeneus, nitidus. Elytra punctata, aeterea, nitida, immaculata. Pedes aenei plantis foliis nigris.
- gloriosa.* 82. C. ovata viridis nitida elytris linea coerulea.  
Chrysomela Cacaliae Schrank.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.  
Differt manifeste a C. fastuosa magnitudine dupla, colore viridi, elytrorumque linea unica.
- speciosa.* 83. C. ovata viridi sericea elytris lineis duabus aureis Linn. syst. nat. 2. 588. 19. Holl. tab. 6. fig. 2.  
Habitat in Europae sylvis.  
Lineae elytrorum antice posticeque coeunt.
- cyanea.* 84. C. ovata thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris.  
Habitat in America meridionali Mus. Lund.  
Distincta thorace omnino cylindrico nullo modo marginata. Thorax elytraque punctata.
- praetiosa.* 85. C. ovata thorace globoso elytrisque laevissimis, corpore evaneo.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura omnino praecedentis, at distincta & alia, thorace magis globoso elytrisque laevissimis.

86. *C. ovata thorace rotundato viridi aenea, anten- nitida.*  
nis cyaneis.  
Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.  
Antennae cyaneae, nitidae. Corpus aeneum.
87. *C. ovata thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: aurata.*  
marginе cyaneo.  
Habitat in Pennsylvania Mus. Britann.  
Caput & thorax cyanea antennis nigris. Elytra  
basi gibba. Abdomen cyaneum.
88. *C. ovata atra coleoptrorum limbo sanguineo Geoff. limbata.*  
Inf. I. 260. 9.  
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 20.  
Habitat in Anglia Dom. Lee.  
Elytra laevia marginе antico & lateralі sangui-  
neo. Color niger aeneo parum tinctus.
89. *C. ovata nigra elytris laevissimis: margine ex- carnifex.*  
teriori sanguineo.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura omnino praecedentis at paullo minor &  
basis elytrorum nigra.
90. *C. ovata atra elytris punctatis: margine exte- sanguino-*  
*riori flavescente Linn. syst. nat. 2. 591. 38. lenta.*  
Fn. Sv. 529. Geoff. Inf. I. 259. 8. tab. 4.  
fig. 8.  
Degeer Inf. 5. 298. 7. tab. 8. fig. 26.  
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 15.  
Sulz. Inf. tab. 3. fig. 10.  
Habitat in Europae plantis.
91. *C. ovata nigro aenea elytris punctatis: margine marginata.*  
luteis Linn. syst. nat. 2. 591. 39. Fn. Sv. 529.  
Degeer Inf. 5. 303. 14.  
Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 19.  
Habitat in Europae pratis apricis.  
Aiae sanguineae.

- Schach.* 92. *C. ovata* thorace nigro aeneo nitidissimo, elytris obscurioribus laevibus: margine sanguineo.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Nimis affinis praecedenti at paullo minor. Antennae nigrae articulo primo & secundo ferrugineis. Elytra sublaevia, obscuriora margine sanguineo. Alae albae.
- analis.* 93. *C. ovata* atra elytris fuscis: margine exteriori testaceo Linn. syst. nat. 2. 582. 42.  
Habitat ad praedium equitis a Linné Hammarby prope Upsaliam.  
Thorax nitens. Antennae basi pallentes.
- aucta.* 94. *C. ovata* thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis: margine rubro.  
Habitat Dresdae Dom. Zschuck.  
Margo elytrorum late rufus. Antennae pedesque nigri.
- barbara.* 95. *C. ovata* atra nitida elytris punctatis, antennis basi flavescentibus.  
Habitat in Barbaria Mus. D. Desfontaines.  
Minor *C. ovata* & fere orbiculata. Antennae basi flavescentes apice nigrae. Caput & thorax atra, nitida, vix punctata, immaculata. Elytra atra, punctata margine tenuissime ferrugineo, obsoletio. Corpus nigrum tarsis rufis.
- marginella.* 96. *C. ovata* nigro coerulea thorace elytrisque margine luteis. Linn. syst. nat. 2. 591. 40. Fn. Sv. 531.  
Degeer Inf. 5. 304. 15.  
Habitat in Europae Ranunculis.
- hannovera-* 97. *C. ovata* cyanea thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis.  
*na.*

Chrysomela Hannoverana Herbst Arch.

Chrysomela Ranunculi Herbst Arch.

Chrysomela Potentillae Herbst Arch.

Habitat in Europae Sisyimbrio.

Antennae nigrae. Elytra punctato striata vitta media ferruginea, quae postice cum margine coit.

Variat elytrorum vitta abbreviata.

98. C. ovata atra thorace elytrisque laevissimis: *areata*.  
margine rufo.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Statura ovata C. limbatae at duplo minor, tota laevis, atra margine thoracis elytrorumque late ferrugineo. Pedes nigri.

99. C. ovata nigra thorace rufo, coleoptris testaceis: punctis quinque nigris. *5 punctata*.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Elytra laevia, testacea puncto baseos apicisque & communi in medio nigris.

100. C. ovata nigro aenea antennis flavis. *Crotonis*.

Habitat in Crotone glandulofo Americae meridionalis Dr. Pflug.

Parva. Corpus totum nigro aeneum, obscure nitidum. Antennae solae flavae. Elytra vix punctata. Pedes nigri tibiis parum pallidioribus.

101. C. ovata rufa coleoptris maculis quinque nigris. *scutellata*.

Chrysomela scutellata Herbst Arch. 88. 32.  
tab. 23. fig. 24.

Nitidula 5 punctata Mant. Inf. I. 52. 16. e specimine mutilato perperam determinata.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Antennae apice fuscae. Elytra laevia macula baseos communi, duabusque in medio approximatis, fere confluentibus nigris. Abdomen basi nigrum.

*pectoralis.* 102. C. ovata rufa pectore abdominisque basi nigris.

Dermestes rufus Herbst Arch.

Habitat Kiliae.

Magnitudo & statura omnino præcedentis tota laevis, glabra, testacea, nitida solo pectore abdominisque basi atris. Pedes testacei.

*litura.* 103. C. ovata rufescens elytris futura lineaque longitudinali atris.

Herbst Arch. tab. 23. fig. 18.

Habitat in Angliae fabuletis.

Capitis margo posticus niger. Elytra striato punctata. Subtus nigra pedibus pallidis. Mas pallidus, ubi fæmina rufescens. Interdum & linea elytrorum nigra deest.

*flavicans.* 104. C. ovata flavescentis elytris viridi cinereis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Elytra punctato striata margine parum flavescente.

*lineola.* 105. C. ovata flava coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris Linn. syst. nat. 2. 593. 47.

Habitat in America.

Puncta elytrorum tria ad basin, lineola abbreviata in medio, puncta duo ad apicem & unicum commune.

*sacra.* 106. C. ovata supra rufa thoracis linea punctisque duobus elytrorumque futura nigra Linn. syst. nat. 2. 593. 49. Mus. Lud. Ulr. 40.

Habitat in Palæstina.

Alae sanguineae.

107. C. ovata nigra nitida antennis basi slavecenti-*haemorrhoidibus*, ano supra rubro Linn. syst. nat. 2. 587. 6. *dalis.*  
Fn. Sv. 508.  
Degeer Inf. 5. 297. 6.  
Habitat in Betula, Alno.  
Elytra striato punctata.  
Variat viridis & coerulea ano tamen semper  
rubro.
108. C. ovata atra thorace elytrisque viridi æneis. *fucata.*  
Habitat in Italia Dr. Allioni.  
Statura & magnitudo præcedentis. Elytra vage  
punctata.
109. C. ovata viridi aenea ano ferrugineo, antennis *aenea.*  
tibiisque nigris Linn. syst. nat. 2. 587. 8. Fn.  
Sv. 510. Geoff. Inf. 1. 261. 12.  
Chrysomela fuscicornis Mant. Inf. 1. 73. 80.  
Habitat in Europæ plantis.  
Antennæ medio rufae basi apiceque nigrae.
110. C. ovata testacea elytris macula fusca. 2 *punctata.*  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Antennæ fuscae basi testacea. Elytra corpus  
late cingunt testacea macula magna nigra.  
Pedes testacei apice fusi.
111. C. ovata viridis elytris flavis viridi maculatis, *philadel-*  
*antennis pedibusque ferrugineis.* Linn. syst. *phica.*  
nat. 2. 592. 44.  
Degeer Inf. 5. 353. 6. tab. 16. fig. 13.  
Petiv. Gazoph. tab. 26. fig. 11.  
Habitat in Pensilvania.  
Variat sutura flava & viridi.

- Armoraciae* 112. *C. ovata coerulescens nitida subtus nigra* Linn.  
 sylt. nat. 2. 588. 16. Fn. Sv. 815.  
 Degeer Inf. 5. 322. 25.  
 Habitat in Armoracia, Ranunculis, Salice.  
 Elytra punctata.
- Cochleariae*. 113. *C. ovata coerulescens subtus nigra, elytris striatis.*  
 Habitat in Germaniae plantis tetrodynamis  
 Dom. Smidt.  
 Statura & summa affinitas *C. Armoraciae* paullo  
 tamen minor & elytra subtilissime striata. An-  
 tennae & pedes nigrae.  
 Variat saepius virescens.
- pallipes.* 114. *C. ovata nigra elytris pedibusque pallescentibus.*  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
 Parva. Antennae basi pallidae. Elytra laevif-  
 sima. Pedes pallidi.
- Sophiae.* 115. *C. ovata coerulea tibiis plantisque flavis.*  
 Chrysomela Sophiae Schall. Act. Hall. 1. 272.  
 Habitat in Sisymbrio Sophia Saxoniae.  
 Elytra parum acuminata, laetitia, glabra.
- aeruginea.* 116. *C. subrotunda aenea pedibus ferrugineis.*  
 Chrysomela metallica Ross. Fn. Etr. 84. 212.  
 tab. 3. fig. 11.  
 Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.  
 Parva, subrotunda. Antennae fuscae basi fer-  
 rugineae. Thorax glaber, laevis, nitidus,  
 aeneus. Elytra obsolete punctata, aenea,  
 nitida. Pedes ferruginei.
- 

### Kiliæ.

Excudebat Christianus Fridericus Mohr.

ENTOMOLOGIAE  
SYSTEMATICAЕ  
EMENDATAЕ ET AUCTAE.

---

TOM. I. PARS II.



---

46. CRIOCERIS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* filiformes.

1. *C. fulva* elytris pallidis: margine omni fulvo. 2 *tuberculata*.  
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
*Scutellum* fuscum. *Pedes* fulvi plantis fuscis.  
*Variat* tuberculis coleoptrorum duobus versus  
apicem approximatis, elevatis, fulvis. An  
varietas sexus?
2. *C. flava* elytris nigris apice rufescens. 2 *dentata*.  
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
*Tuberculum* parvum elevatum ad futuram uti in  
praecedente. *Plantae* omnes nigrae.
3. *C. rufa* capite nigro, elytris violaceis. melanocephala.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
*Antennae* nigrae. Thorax punctis duobus im-  
pressis, dorsalibus. *Scutellum* rufum. *Pedes* nigri  
femoribus rufis.
4. *C. violacea* capite thorace pedibusque rufis. cantharoides.  
Habitat in Anglia Mus. Britann.  
*Antennae* fuscae basi rufescentes.
- 

Crioceris corpus oblongum, immarginatum, gla-  
brum, tardum, saepius laeviusculum, nitidulum,  
capite rotundato, inserto, oculis lateralibus, rotun-  
datis, prominulis, antennis approximatis, frontalibus,  
inter oculos insertis, thorace brevi, transverso, vix  
marginato, planiusculo, scutello parvo, rotundato,  
elytris molliusculis, fornicatis, longitudine abdominis,  
pedibus validis, mediocribus, tarsis quadriarticulatis,  
colore vario.

*4 maculata.* 5. *C. pallida elytrorum maculis duabus abdomine-que atris.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae. Thorax linea dorsali impressa.

Elytra laevia maculis duabus, altera ad basin, altera pone medium. Subtus pallida abdomine atro.

*6 punctata.* 6. *C. nigricans thorace pallido, elytris albidis: punctis sex nigris.*

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Statura omnino praecedentis. Caput nigrum.

Antennae nigrae basi pallidae. Thorax laevis, pallidus, nitidus. Elytra laevia, albida punctis sex nigris 2. 2. 2. Pectus nigrum. Abdomen pallidum. Pedes nigri femoribus basi pallidis.

*variegata.* 7. *C. nigra thorace elytrorumque lunula margine fasciisque duabus pallidis.*

Habitat Cajennae Mus. D. Bosc.

Statura omnino praecedentium. Antennae pallidae, medio nigrae. Caput atrum, omnino immaculatum. Thorax laevis, glaber, nitidus, pallidus, immaculatus. Elytra laevia, atra lunula baseos ad suturam, margine exteriori toto fasciisque duabus, altera in medio abbreviata, altera versus apicem lunata pallidis. Corpus nigrum abdomine pedibusque pallidis.

*pygmaea.* 8. *C. rufa capite abdomineque atris.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Minuta, tota rufa capite abdomineque atris.

*testacea.* 9. *C. nigra capite thorace elytris pedibusque testaceis.*

Habitat in India orientali Dom. Vahl.

Antennae testaceae.

*ochreata.* 10. *C. testacea pectore tibiisque nigris.*

Habitat in Insula Guadelupe D. de Badier.

Media. Antennae testaceae ultimo articulo nigro. Caput, thorax elytraque laevia, testacea, nitida, immaculata. Scutellum nigrum. Pectus nigrum. Abdomen testaceum. Pedes testacei tibiis nigris.

11. C. nigra elytrorum margine, antennis pedibusque flavis. *Betulae.*

Habitat in Lapponiae Betula Mus. Dom. de Paykull.

Caput, thorax rotundatus elytraque nigra.

Faemina vitta futurali elytrorum ferruginea.

Antennae margo elytrorum & pedes flava.

12. C. capite thoraceque fulvis, elytris pedibusque *fulvicollis.* testaceis.

A&t. hist. nat. Parif. I.

Crioceris pallida oculis nigris Geoff. Inf. I. 242.6.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Paullo major C. Betulae. Antennae fuscae primo articulo rufo. Caput fulvum margine postico nigricante. Thorax glaber, laevis, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, testacea. Corpus obscurum pube cinerascente. Pedes testacei.

13. C. nigra thorace elytrisque pallidis immaculatis. *minuta.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum puncto baseos pallido. Elytra laevia.

14. C. nigra capite thoraceque ferrugineis, elytris *erythrocephala.* viridibus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae. Caput obscure ferrugineum puncto baseos nigro. Thorax laevis puncto medio nigro. Elytra laevia. Pedes nigri.

15. C. nigra elytris maculis duabus testaceis, thorace cylindrico. *4pusillata.*

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

*Major* C. *merdigera*. Thorax puncto utrinque impresso. Elytra laevia punctis duobus altero baseos, altero pone medium.

*impressa*. 16. C. atra elytris rubris, thorace cylindrico utrinque subimpresso.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Elytra striato punctata. Pedes nigri femoribus subclavatis.

*brunnea*. 17. C. ferruginea antennis pectore abdominisque basi nigris, thorace cylindrico utrinque impresso:

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas C. *merdigerae*. Caput rufum antennis oculisque nigris. Thorax cylindricus utrinque impressus, rufus. Elytra vix punctata, rufa, immaculata. Corpus nigrum ano rufo. Pedes rufi.

*retusa*. 18. C. thorace utrinque impresso ferrugineo, elytris testaceis: lineola baseos atra.

Habitat in Insula Guadeloupe Mus. Dom. Bosc.

Statura & magnitudo omnino C. *merdigerae*. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput atrum, immaculatum. Thorax rotundatus, utrinque impressus, ferrugineus, immaculatus. Elytra striato punctata, testacea lineola ante marginem baseos nigra. Sutura etiam basi nigrat. Pectus nigrum. Abdomen & pedes rufa.

*merdigera*. 19. C. supra rubra thorace cylindrico utrinque impresso.

Crioceris rubra Geoff. Inf. 1. 239. 1.

Chrysomela *merdigera* Linn. syst. nat. 2. 599. 97.  
Fn. Sv. 563.

Degeer Inf. 5. 338. 43.

Reaum. Inf. 3. tab. 17. fig. 12.

- Sulz. hist. Inf. tab. 3. fig. 14.  
 Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 4.  
 Habitat in Europae Convallaria.  
 Habitu ab hoc genere differt, vix tamen distinguaenda.
20. C. thorace cylindrico rubra elytris punctis sex *12 punctata*.  
 nigris.  
 Crioceris Geoff. Inf. 1. 241. 2. tab. 4. fig. 5.  
 Chrysomela 12 punctata Linn. syst. nat. 2. 601.  
 110. Fn. Sv. 568.  
 Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 5.  
 Frish. Inf. 13. tab. 28.  
 Habitat in Europae Asparago.
21. C. thorace cylindrico fulvo: punctis quinque ni-*14 punctata*.  
 gris, elytris flavis: punctis septem.  
 Attelabus 14 punctatus Scop. carn. 116.  
 Habitat in Germania Dr. Schulz.  
 Caput fulvum ore, antennis punctoque verticali  
 nigris. Thorax punctis quinque 4. 1. Elytra  
 pallidiora punctis 1. 2. 2. 1. 1. quorum sextum  
 magis transversum, septimum terminale. Ab-  
 domen & femora fulva.
22. C. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: fasciis *ruficollis*.  
 duabus nigris.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Caput atrum antennis apice rufis. Elytra pun-  
 cato striata fasciis duabus, altera baseos, altera  
 pone medium. Pectus nigrum. Abdomen pe-  
 desque flavescentia.
23. C. nigra thorace rufo, coleoptris flavescenti-  
 bus: maculis quinque nigris. 5 *punctata*.  
 Habitat in Germania Dr. Schulz.  
 Antennae nigrae. Thorax gibbus. Elytra glabra,  
 laevia, puncto altero baseos, altero apicis &  
 quinto communi in medio dorfi. Pedes nigri.

- ebacea.* 24. *C. flavescent thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris.*  
*Habitat Cajennae Dr. Schulz.*  
*Caput testaceum ore oculisque nigris. Antennae subferrugineae. Elytra alba maculis tribus baseos, exteriori elongata, linearis & duabus versus apicem nigris. Pedes albi.*
- praeusta.* 25. *C. thorace cylindrico rufa, elytris apice atris.*  
*Habitat — — Mus. Dom. Lund.*  
*Statura omnino praecedentium. Corpus totum rufum, immaculatum solis elytrorum apicibus atris. Thorax cylindricus linea media transversa, impressa. Pedes rufi. Alae obscurae.*
- unifasciata* 26. *C. thorace cylindrico rufa, elytris fascia atra.*  
*Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.*  
*Nimis sequenti affinis. Dissert tantum basi elytrorum haud atra sed rufa.*
- 2fasciata.* 27. *C. thorace cylindrico rufa, elytris fasciis duabus atris.*  
*Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.*  
*Antennae nigrae basi rufae. Fascia altera elytrorum baseos, altera versus apicem. Pedes rufi plantis fuscis.*
- nigripes.* 28. *C. thorace cylindrico flava, antennis pectore pedibusque nigris.*  
*Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.*  
*Antennae nigrae. Thorax utrinque impressus. Pectus pedesque nigra.*
- grisea.* 29. *C. pallida capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris.*  
*Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.*  
*Caput ferrugineum antennis nigris. Elytra laevia. Corpus pallidum nigro varium. Pedes nigri femoribus rufis.*

30. C. thorace cylindrico flava, elytris basi nigris: *oculata*.  
puncto flavo.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Antennae flavae longitudine corporis. Elytra  
vix striata, flava, basi nigra: puncto magno  
flavo. Pectus nigrum. Abdomen flavum. Pedes  
flavi femoribus nigris.
31. C. testacea thorace immaculato, elytris maculis *bioculata*.  
duabus ocellaribus albis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Antennae nigrae basi ferrugineae. Macula ante-  
rior elytrorum puncto antico nigro, posterior  
pone medium annulo nigro cincta. Tibiae  
fuscae.
32. C. thorace subcylindrico pallida antennis nigris. *pallens*.  
Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
Caput magis obscurum antennis elongatis, nigris.  
Pedes pallidi.
33. C. cyanea elytris flavis: maculis duabus cyaneis. *fucata*.  
Habitat in Insula St. Bartholomaei Americae  
meridionalis Dom. de Paykull.  
Caput fuscum antennis flavis. Corpus cyaneum  
abdomine flavo. Pedes obscuri femoribus  
cyaneis.
34. C. viridi aenea nitida elytris testaceis: maculis *aulica*.  
duabus cyaneis.  
Melyris aulicus Oliv. Inf. 2. 21. 7. 6. t. 1. f. 4.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Antennae fuscae. Os testaceum. Macula elytro-  
rum postica major. Pedes testacei femoribus  
aeneis.
35. C. coerulea thorace cylindrico: lateribus gib- *cyanella*.  
bis. Geoff. Inf. 1. 343. 5.  
Chrysomela cyanella Linn. syst. nat. 2. 600. 104.  
Fn. Sv. 572.

- — —
- Herbst Arch. tab. 23. fig. 34.  
 Degeer Inf. 5. 340. 44.  
 Habitat in Europae plantis.
- melanopa.* 36. C. coerulea thorace pedibusque rufis.  
 Chrysomela melanopa Linn. syst. nat. 2. 601. 105.  
 Fn. Sv. 573.  
 Sulz. Inf. 3. tab. 3. fig. 19.  
 Degeer Inf. 5. 342. 46.  
 Habitat in Europa boreali.
- flavipes.* 37. C. nigra thorace pedibusque flavis.  
 Chrysomela flavipes Linn. syst. nat. 2. 601. 106.  
 Habitat in Germania.  
 Affinis C. melanopae.
- subspinosa.* 38. C. oblonga nigra capite thorace pedibusque rufis, thorace spinoso.  
 Habitat in Europae Betula Mus. Dom. Banks.  
 Antennae nigrae, basi rufae. Thorax subpunctatus. Elytra punctata. Abdomen nigrum. Pedes rufi.
- rufipes.* 39. C. atra nitida antennarum basi pedibusque flavis.  
 Habitat in Saxoniae fruticibus D. Romanus.  
 Antennae nigrae basi flavescentes. Corpus totum atrum pedibus solis flavis.  
 Mera varietas C. flavipedis observante Helwigio.
- cyanoce-phala.* 40. C. cyanea thorace rufo, antennis pedibusque fuscis.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Thorax planus, glaber.
- Asparagi.* 41. C. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris Geoff. Inf. 1. 241. 3.  
 Chrysomela Asparagi Linn. syst. nat. 2. 601. 112.  
 Fn. Sv. 567.  
 Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.  
 Roessl. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 4.

- Frish. Inf. 1. 27. tab. 6.  
 Habitat in Europa Asparagos devastans.
42. C. nigro violacea elytris striatis. *violacea.*  
 Galleruca nigro violacea Geoff. Inf. 1. 254. 6.  
 Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.  
 Statura omnino C. Phellandrii corpore oblongo  
 plano toto nigro violaceo. Antennae apice  
 crassiores. Forte proprii generis.
43. C. nigra thoracis margine elytrorumque lineis *Phellandrii.*  
 duabus flavis Naturf. 24. tab. 1. fig. 24.  
 Chrysomela Phellandrii Linn. syst. nat. 2. 601.  
 111. Fn. Sv. 569. Geoff. Inf. 1. 266. 20.  
 Degeer Inf. 5. 324. 25. tab. 9. fig. 34.  
 Habitat ad Phellandrii aquatici radices.
44. C. nigro coerulescens thoracis limbo rufo, ely- *campestris.*  
 tris punctis tribus: posticis margine flavo con-  
 nексis.  
 Chrysomela campestris Linn. syst. nat. 2. 602. 113.  
 Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 9. 10.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 107. 273.  
 Habitat in Europa australiori D. de Schlanbusch.  
 Caput cum antennis nigrum. Thoracis limbus  
 rufus. Elytra punctato striata.  
 Variat thorace toto rufo.
45. C. elongata nigra elytris vitta flava. *elongata.*  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Reliquis longior, nigra, viridi colore parum nitens.
46. C. pallida thorace maculis tribus, elytris striis *trilineata.*  
 tribus abbreviatis nigris.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei.  
 Os antennarumque basis pallida. Maculae tho-  
 racis fere coeuntes. Corpus pallidum pectore  
 plantisque nigris.
47. C. capite thoraceque testaceis, elytris brunneis: *equestris.*  
 margine lineola baseos fasciaque media flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Antennae flavescentes. Corpus nigrum pedibus  
flavescientibus.

- vittata.* 48. C. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra.  
Cistela melanocephala Mant. Inf. 1. 86. 22.  
Petiv. Gazoph. tab. 17. fig. 11.  
Habitat in Carolina Mus. Dom. Monson.  
Caput nigrum antennis basi pallidis. Thorax ro-  
tundatus, glaber. Abdomen nigrum. Pedes  
flavescentes geniculis nigris.
- innuba.* 49. C. atra thorace ferrugineo, elytris margine  
vittaque futurali flavis.  
Cistela innuba Mant. Inf. 1. 86. 23.  
Habitat in Americae Insulis.  
Caput atrum antennis ferrugineis. Thorax mar-  
ginatus. Elytra striata. Corpus atrum pedibus  
ferrugineis.
- 4 maculata.* 50. C. thorace rufo, elytris testaceis: maculis dua-  
bus atris.  
Chrysomela 4 maculata Mant. Inf. 1. 75. 111.  
Chrysomela 4 maculata Herbst Arch.  
Habitat in Germania australiori.  
Media. Caput nigrum antennis testaceis. Pectus  
testaceum. Abdomen nigrum pedibus testaceis.

47. GALLERUCA. *Palpi sex: articulo  
ultimo acuto.*

*Labium bifidum.*

*Antennae filiformes.*

- 2 maculata.* 1. G. atra elytris testaceis: macula atra.  
Chrysomela bimaculata Mant. Inf. 1. 73. 87.  
Habitat in America Dom. Drury.  
Abdomen atrum ano testaceo. Pedes atri.

2. *G. testacea subtus nigra.* *testacea.*  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Banks.  
 Distincta omnino a reliquis speciebus. Antennae fuscae basi testaceae. Corpus supra testaceum, immaculatum, laeve, nitidum, subtus nigrum segmentorum abdominis marginibus testaceis.
3. *G. atra elytris fasciis tribus flavis.* *fasciata.*  
*Chrysomela fasciata* Mant. Inf. 1. 73. 88.  
 Habitat in America Dom. Drury.  
 Antennae nigrae basi pallidae. Caput atrum margine postico pallido. Elytra laevia, atra fascia baseos, altera in medio & tertia ante apicem latis flavis. Abdomen atrum ano flavo. Pedes atri femoribus apice tibiisque flavis.
4. *G. viridi aenea thorace pedibusque rufis* Geoff. *ruficollis.*  
 Inf. 1. 263. 16.  
*Chrysomela ruficollis* Mant. Inf. 1. 73. 89.  
 Habitat in Anglia Dom. Lee.  
 Antennae rufae apice fuscae. Caput aeneum ore rufo. Corpus viride pedibus rufis.
5. *G. punctata viridi aenea antennis pedibusque flavicornis.*  
 flavis.  
*Chrysomela flavicornis* Mant. Inf. 1. 73. 90.  
*Erotylus flavipes* Mant. Inf. 1. 92. 22.

Gallerucae corpus oblongum, glabrum, depresso-culum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inserto, oculis rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis approximatis, ante oculos insertis, thorace rotundato, brevi, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, planiusculis, longitudine abdominis, pedibus mediocribus, validis, femoribus posticis saepe incrassatis, saltatoriis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae flavae. Caput & thorax punctata. Elytra striato punctata & fere crenata. Corpus viridi aeneum pedibus flavis.

- crenata.* 6. G. subitus aenea supra cuprea, antennis flavis: articulo quinto ultimoque fuscis.

*Chrysomela crenata* Mant. Inf. I. 73. 91.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput & thorax obscure cuprea. Elytra striata striis punctatis. Corpus aeneum pedibus concoloribus.

- littoralis.* 7. G. atra elytris porcatis.

*Gallerucā atro fusca.* Geoff. Inf. I. 252. I. tab. 4. fig. 6.

*Chrysomela littoralis* Mant. Inf. I. 73. 92.

Habitat ad Europae australioris littora.

G. Tanaceti major, atra, immaculata. Elytra lineis quatuor elevatis postice coeuntibus interjectis punctis impressis, numerosis.

- Cajennenfis* 8. G. atra capite thorace femoribusque quatuor anticis obscure rufis.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput rufum ore antennisque nigris. Thorax in medio impressus, rufus. Elytra laevia, atra. Corpus atrum pectoris margine rufo.

- nigripennis.* 9. G. pallida capite elytrisque cyaneo nigris.

Habitat Surinami Mus. D. Bosc.

Statura et magnitudo G. cajennenfis. Antennae nigrae articulo primo pallido, apice nigro. Caput canaliculatum, nigrum, parum cyaneo nitidum. Thorax transversus, brevis, obscure pallidus, immaculatus. Elytra laevia, obscura, nigra margine in primis cyaneo, nitido. Corpus obscure pallidum. Pedes nigri femoribus subtus pallidis.

10. *G. nigra punctata elytris coriaceis.* Linn. syst. *Tanaceti.*

nat. 2. 587. 5. Fn. Sv. 507.

Degeer Inf. 5. 299. 4. tab. 8. fig. 27.

*Chrysomela Tanaceti* Mant. Inf. 1. 74. 94.

Roesl. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 5.

Schaeff. Icon. tab. 21. fig. 14.

Merian Inf. Europ. tab. 68.

Habitat in Europae Tanaceto.

Os maxillis palpisque. Palpi sex breves, subaequales, filiformes: articulo ultimo acuminato, anteriores crassii, biarculati: articulis aequalibus, ultimo acutiusculo adhaerentes maxillae dorso, intermedii paullo longiores, quadriarticulati: articulo secundo longiori, ultimo acuto ad basin exteriorem anteriorum adnati, posteriores triarticulati, incurvi: articulo ultimo acuto adnati labii medio inferiori. Mandibula brevis, crassa, incurva, cornea, apice tridentata. Maxilla brevis, membranea, obtusa, integra. Labium brevissimum membranaceum, bifidum, laciniis aequalibus, conniventibus.

11. *G. oblonga nigra thorace elytrisque griseis. rusticæ.*

Galleruca fusca. Geoff. Inf. 1. 253. 1. β.

*Chrysomela rustica* Act. Hallens. 1. 274. Mant.

Inf. 1. 74. 95.

Habitat in Germaniae fruticibus.

Affinis certe C. *Tanaceti.* Elytra punctata lineis tribus elevatis multo distinctioribus.

12. *G. oblonga thorace flavescente, elytris viridi-12 punctata.*  
bus: punctis sex nigris.

*Chrysomela 12 punctata* Mant. Inf. 1. 74. 96.

Habitat — —

Caput nigrum antennarum articulo secundo tertioque virescentibus. Thorax flavescens puncto utrinque impresso. Elytra vitescentia punctis

- sex nigris per paria dispositis. Pectus nigrum.  
Abdomen & pedes flavescentia.
- Alni.*      13. *G. oblonga violacea elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris* Geoff. Inf. 1. 132. 1.  
*Chrysomela Alni* Mant. Inf. 174. 97.  
*Linn. syst. nat. 2. 587. 9.* Fn. Sv. 511.  
*Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 6.*  
*Ross. Fn. Etr. 1. 79. 199.*  
*Degeer Inf. 5. 314. 21. tab. 9. fig. 18.*  
*Sulz. hist. Inf. tab. 3. fig. 13.*  
*Frish. Inf. 7. 13. tab. 8.*  
*Habitat in Europae Betula Alno.*
- Jamaicensis.* 14. *G. oblonga cyanea antennis pedibusque nigris.*  
*Habitat in Jamaica Mus. Dom. Lund.*  
*Affinis C. Alni at alia & minor. Antennae nigrae.* Thorax & elytra cyanea, nitida, immaculata. Abdomen obscurum. Pedes nigri.
- Absinthii.* 15. *G. oblonga pallida thorace macula, elytris lineis tribus nigris.*  
*Chrysomela Absinthii Mant. Inf. 1. 74. 98.*  
*Chrysomela Absinthii Pall. Icon. 2. 725. 70.*  
*Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.*  
*Caput pallidum basi nigrum. Thorax pallidus macula media nigra. Elytra pallida lineis tribus atris, quae tamen nec basin nec apicem attingunt, exteriores apice coeunt. Pedes ferruginei geniculis nigris.*
- concolor.* 16. *G. flavescentis nitida oculis fuscis.*  
*Chrysomela concolor Mant. Inf. 104. 99.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.*  
*Corpus totum pallide flavescentis, omnino concolor, nitidum.*
- guadelupen-* 17. *G. atra elytris fuscis: limbo flavescente.*  
*Habitat in Insula Guadeloupe de Badier.*  
*Media. Caput & thorax atra, nitida, immaculata.*

Thorax postice utrinque macula impressa. Elytra laevia, punctato striata, fusca margine omnive limbo flavescente. Corpus & pedes nigra. Abdomen rufescens.

- 18. G. picea** pedibus testaceis. *picea.*

Chrysomela picea Mant. Inf. 1. 74. 100.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.

Corpus glabrum, obscure ferrugineum, nitidum.

Thorax puncto utrinque impresso. Pedes pallide testacei.

- 19. G. violacea** elytris punctato striatis Geoff. Inf. 1. *Betulae.*

264. 17.

Chrysomela Betulae Mant. Inf. 1. 74. 101. Linn.

syst. nat. 2. 587. 10. Fn. Sv. 514.

Degeer Inf. 5. 318. 24. tab. 9. fig. a. b.

Roeff. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 1.

Habitat in Betulae albae foliis paginam inferiorem exedens.

- 20. G. thorace fulvo viridi punctato,** elytris viridi- *tricolor.*  
bus nitidis, ab domine nigro.

Chrysomela tricolor Mant. Inf. 1. 74. 102.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Caput viride ore fulvo antennisque fuscis. Thorax laevis, nitens, fulvus punctis quinque baseos viridibus 4. 1. Elytra laevia. Pectus fulvum. Abdomen nigrum cinereo subtomentosum. Pedes fulvi.

- 21. G. nigra** elytris pedibusque testaceis. *livida.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino Crioceris lividae. Caput nigrum ore livido. Thorax niger, immaculatus. Elytra laevia, subvillosa, testacea. Corpus nigrum pedibus testaceis.

Variat colore obscuriore.

*Vitellinae.* 22. *G. coerulea* aut *viridis* *elytris punctato striatis*,  
ano rufo.

*Chrysomela Vitellinae* Mant. I. 74. 103. Linn.

syst. nat. 2. 589. 23. Fn. Sv. 519.

Degeer Inf. 5. 323. 27.

Roel. Inf. 2. Scarab. 3. tab. 1.

*G. Chrysomela vulgatissima* Mant. Inf. I. 75. 104.

Linn. syst. nat 2. 589. 22. Fn. Sv. 517.

Degeer Inf. 5. 317. 23.

Habitat in Europae Salicibus frequens.

Larvae foetentes, flavae, nigro punctatae capite caudaque nigris in turmis paralelis foliorum pulpam exedunt.

*ruficauda.* 23. *G. nigra* *elytris viridibus*, ano rufo.

*Chrysomela ruficauda* Thunb. Diff.

Habitat — — Mus. Dom. Boſc.

Media. Antennae, caput & thorax nigra, obscura thoracis margine incrassato. Elytra obsolete punctata, obscure viridia, nitidula. Corpus subtus nigro aeneum abdominis margine apice rubro.

*Avicenniae.* 24. *G. ferruginea* *elytris cyaneis*.

Habitat in Americae meridionalis Avicenniis Dr. Isert.

Parva. Antennae nigrae basi ferrugineae. Caput & thorax laevia, ferruginea, nitida, immaculata. Elytra laevia, cyanea, nitida. Corpus & pedes ferruginea.

*Laetuciae.* 25. *G. capite thoraceque obscure ferruginea*, *elytris nigro aeneis*.

*Chrysomela Laetucae* Mant. Inf. I. 75. 105.

Habitat Dresdae Mus. Dom. Romani.

Elytra punctato striata. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.

26. *G. viridis nitida elytris aeneis.* *Raphani.*  
*Chrysomela aenea* Mant. Inf. 1. 75. 106.  
*Herbst Arch. tab. 23. fig. 21.*  
*Habitat in Betula, Alno, Raphano.*
27. *G. atra elytris striato punctatis, tibiis apice unidentatis calearata.*  
*Habitat in Germania Mus. D. de Loewenskiold.*  
*Statura & magnitudo omnino C. coccineae. Antennae nigrae basi pallidae. Thorax transversus, laevis, ater margine punctato. Elytra punctato striata, atra, immaculata. Pedes nigri tibiis omnibus apice unidentatis.*
28. *G. atra elytris punctato striatis, antennis pedibus punctulata.*  
*busque flavis.*  
*Habitat in Germania Mus. D. de Loewenskiold.*  
*Statura & magnitudo omnino praecedentis. Antennae flavescentes, apice fuscae. Caput atrum ore flavescente. Thorax punctatus, ater. Elytra striato punctata, atra, immaculata. Corpus nigrum pedibus flavescentibus.*
29. *G. nigra antennis thorace abdome pedibus morbillosa.*  
*que flavescentibus.*  
*Habitat in Germania Mus. D. de Loewenskiold.*  
*Statura praecedentium. Caput nigrum. Antennae flavescentes apice nigrae. Thorax punctatus, rufus, immaculatus. Elytra punctato striata, nigra margine hinc inde rufo. Abdomen & pedes flavescentes.*
30. *G. sanguinea thorace immaculato, elytris punctis cruenta.*  
*tribus nigris.*  
*Chrysomela cruenta* Mant. Inf. 1. 75. 108.  
*Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.*  
*Elytra laevia, sanguinea punto unico baseos parique in medio nigris. Corpus pallidius sanguineum.*

- coccinea.* 31. *G. thorace marginato sanguineo: macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris*  
*Naturf. 24. 14. 20. tab. 1. fig. 20.*  
*Chrysomela coccinea Mant. Inf. 1. 75. 109. Linn.*  
*syst. nat. 2. 592. 43. Fn. Sv. 532.*  
*Degeer Inf. 5. 301. 10. tab. 9. fig. 1.*  
*Habitat in Europae borealis Corylo.*
- cruciata.* 32. *G. rubra coleoptris cruce nigra.*  
*Chrysomela cruciata Schall. Act. Hall. 1. 273.*  
*Habitat Halae Saxonum.*  
*Caput obscurum antennis nigris. Coleoptra lae-  
via futura fasciaque lata media atris. Corpus  
rufum abdominis basi nigra. Pedes nigri.*
- 4pustulata.* 33. *G. nigra thoracis margine elytrorum maculis  
duabus pedibusque rufis.*  
*Habitat in Germaniae Lycoperdis Dom. Hybner,  
in Italia Dr. Allioni.*  
*Paullo minor C. coccinea. Caput cum antennis  
nigrum. Thorax laevis, niger, nitidus mar-  
gine subreflexo, obscure rufo. Elytra laevia;  
nigra maculis duabus magnis rufis, altera ba-  
seos, altera apicis. Corpus nigrum pedibus rufis.*
- Bovistae.* 34. *G. atra nitida antennis pedibusque ferrugineis,*  
*Habitat in Germaniae Lycoperdo Bovista Dom.  
Helwig.*  
*Statura & magnitudo omnino praecedentis. An-  
tennae moniliformes hujus generis, rufae. Caput  
atrum, nitidum. Thorax ater, nitidus margine  
subreflexo. Elytra atra, laevia, nitida. Pedes  
ferruginei.*
- 4maculata.* 35. *G. thorace testaceo immaculata, elytris testaceis:  
maculis duabus nigris.*  
*Chrysomela 4 maculata Mant. 1. 75. 111.*  
*Habitat in nemoribus Kiloniensibus Dom. Lund.*  
*Caput testaceum basi inter oculos nigrum. Tho-*

- rax rotundatus. Elytra laevia maculis duabus magnis, altera baseos rotundata, altera pone medium transversali fere fasciam constitente. Abdomen atrum. Pedes testacei.
36. G. viridiaenea thoracis marginibus albis, elytris *20 punctata*-  
albis: maculis decem aeneis. *ta.*  
 Chrysomela *20 punctata* Mant. Inf. i. 75. 112.  
 Bergstr. Nom. i. 87. tab. 13. fig.  
 Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 4. tab. 51. fig. 7.  
 Habitat in Anglia, Italia.  
 Sutura elytrorum aenea. Maculae oblongae.
37. G. capite thoraceque flavescētibus nigro macu- *triloba*.  
 latis, elytris griseis, corpore nigro.  
 Crioceris *triloba* Mant. Inf. i. 86. i.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Caput flavescens macula baseos antennisque ni-  
 gris. Thorax flavescens maculis tribus nigris  
 intermedia *triloba*.
38. G. grisea thorace linea dorsali, elytris punto *lineola*.  
 baseos nigris.  
 Crioceris *lineola* Mant. Inf. i. 86. 2.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Caput griseum antennis nigris. Thoracis latera  
 subangulata. Corpus fuscum, cinereo pubescens.
39. G. fusca elytrorum margine prominulo fla- *Nymphaeae*.  
 vescente.  
 Crioceris *Nymphaeae* Mant. Inf. i. 86. 3.  
 Chrysomela *Nymphaeae* Linn. syst. nat. 2.600.99.  
 Fn. Sv. 565.  
 Galleruca Geoff. Inf. 254. 4.  
 Degeer Inf. 4. 326. 31. tab. 20, fig. 1. 2.  
 Habitat in Europae Nymphaeis.
40. G. thorace nigro maculato elytrisque griseis, *Capreae*.  
 antennis nigris.  
 Crioceris *capreae* Mant. Inf. i. 86. 4.

Chrysomela Capreae Linn. syst. nat. 2. 600. 100.

Fn. Sv. 516.

Galleruca Geoff. Inf. 1. 254. 5.

Degeer Inf. 5. 325. 30.

Habitat in Europae Salicibus.

Abdomen nigrum.

*cincta.*

41. G. pallida elytrorum margine omni atro.

Crioceris cincta Mant. Inf. 1. 86. 5.

Hybn. Naturf. 24. 42. 7. tab. 1. fig. 6-8.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Antennae singulares articulo secundo minuto,  
globoso, tertio utrinque spinoso, quarto &  
quinto impresso, extrorsum emarginato. Elytra  
sutura omni lineaque marginali postice inter-  
rupta nigra.

*palliata.*

42. G. lutea elytris nigris.

Crioceris palliata Mant. Inf. 1. 87: 6.

Chrysomela palliata oblonga lutea, oculis elytris-  
que nigris Act. Hall. 1. 279.

Hybn. Naturf. 24. 44. 9. tab. 2. fig. 10.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

*Cerasi.*

43. G. nigra thorace rufo, elytris pallidis: mar-  
gine nigro.

Chrysomela Cerasi Linn. syst. nat. 2. 600. 101.

Habitat in Sueciae Ceraso Dom. de Paykull.

Caput atrum puncto frontali ferrugineo, obso-  
leto. Antennae cinereae. Thorax glaber, rufus.  
Elytra pallida margine nigra. Pedes ferruginei.

*livida.*

44. G. livida antennis fuscis.

Habitat in Selandia Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Corpus totum laeve,  
glabrum, obscure lividum, immaculatum an-  
tennis solis fuscis.

*melanura.*

45. G. subtestacea elytris apice abdomeque fuscis.

Habitat in Suecia Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentis at paullo minor. Antennae testaceae apice nigrae. Caput, thorax, pedes laevia, glabra, nitida, testacea Elytra magis livida apice nigra.

46. *G. ovata* cinerea elytris vitta lineolaque baseos *calmarien-nigris.*

*Chrysomela calmariensis* Mant. Inf. 1. 87. 7.

Linn. syst. nat. 2. 600. 101. Geoff. Inf. 1. 253. 3.

Habitat in Europae Salice.

Thorax nigro variegatus.

47. *G. flava* antennis abdomineque fuscis: ano flavo *abdominalis.*

Hybn. Naturf. 24. 43. 8. tab. 2. fig. 9.

*lis.*

*Chrysomela abdominalis* Mant. Inf. 1. 87. 8.

Habitat in India & Cap. Bon. spei.

Maxillae nigrae.

48. *G. nigra* obscura pedibus ferrugineis. *Morio.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennarum basis pedesque ferruginei.

49. *G. rufa* antennis oculisque nigris. *sanguinea.*

*Crioceris sanguinea* Mant. Inf. 1. 87. 10.

Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.

Abdomen nigrum pedibus cinereis.

50. *G. ferruginea* thorace elytrorumque margine *tenella.*

flavis.

*Chrysomela tenella* Linn. syst. nat. 2. 600. 102.

Fn. Sv. 564.

*Crioceris tenella* Mant. Inf. 1. 87. 11.

Habitat in Europae Salice.

Affinis *G. cupreae* at minor.

51. *G. fusca* capite thoraceque flavis nigro macula- *picta.*

latis.

*Crioceris picta* Mant. Inf. 1. 87. 12.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter.

Antennae pallidae nigro lineatae. Caput flavum linea dorsali nigra. Thorax flavus linea dorsali

puncto parvo utrinque ad lineam dorsalem & alio ad marginem exteriorem nigris. Elytra & corpus fusca.

- denticornis.* 52. G. nigra thorace elytrorum margine punctis duobus fasciaque ferrugineis.

Habitat in Dolicho Sinensi Americae meridionalis  
Dr. Pflug.

Media. Antennae singulares, rufae articulo tertio majori, late emarginato. Caput nigrum. Thorax laevis, rufus, nictus, immaculatus. Elytra laevia, nigra margine anteriori puncto magno baseos, fascia media, punctoque apicis ferrugineis. Corpus nigrum. Pedes rufi femoribus posticis apice nigris.

- nigricornis.* 53. G. flavescens capitis basi elytrisque aeneis, antennis nigris.

Crioceris nigricornis Mant. Inf. 1. 87. 13.

Chrysomela Halensis Linn. syst. nat. 2. 589. 20.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 5.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Caput flavescens basi aeneum antennis nigris.

Thorax puncto utrinque impresso. Pectus utrinque puncto nigro. Elytra aenea, glabra, nitida. Abdomen flavescens.

- thoracica.* 54. G. saltatoria flava thorace nigro punctato, elytris violaceis.

Chrysomela thoracica Mant. Inf. 1. 75. 113.

Habitat in America Dom. Lee.

Thorax flavus punctis sex nigris. Elytra laevia, violacea margine imprimis baseos flavo. Pedes nigri femoribus flavis, posticis incrassatis obscurioribus.

- caroliniana* 55. G. saltatoria flavescens thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque nigris.

Chrysomela Caroliniana Mant. Inf. 1. 75. 114.

Habitat in Carolina Dom. Drury.

Caput flavum antennis oculisque nigris. Elytra flava vitta nigra ad marginem exteriorem, altera in medio elytri & tertia communi per suturam. Femora postica incrassata, ferruginea.

56. G. saltatoria ferruginea coleoptrorum disco atro. *discoidea.*

Habitat in America boreali.

Magna in hac familia. Antennae nigrae. Corpus glabrum, laeve, nitidum, pallide ferrugineum coleoptrorum disco atro, immaculato. Pedes nigri femoribus pallide ferrugineis.

57. G. saltatoria thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *glabrata.*

Chrysomela glabrata Mant. Inf. I. 76. 115.

Habitat in Jamaicæ Myrto Pimenta Dr. Schwarz.

Caput nigrum fronte alba. Elytra glabra, nitida vittis duabus albis, quae apice coeunt. Margo elytrorum omnis niger. Abdomen fuscescens lateribus albis. Femora postica incrassata, fusca margine interiori pallido.

58. G. saltatoria pallida antennis tibiisque nigris. *pallens.*

Habitat in Insula Guadeloupe Dom. de Badier.

Statura praecedentium. Caput pallidum antennis nigris basi pallidis. Thorax & elytra glabra, laevia, nitida, pallida, immaculata. Corpus pallidum. Pedes nigri femoribus pallidis.

59. G. saltatoria ferruginea thorace elytrorumque maculis duabus albis. *2guttata.*

Chrysomela biguttata Mant. Inf. I. 76. 116.

Habitat in America boreali D. Drury.

Antennae nigrae. Caput ferrugineum fronte alba. Pedes ferruginei.

60. G. saltatoria ferruginea thorace albo, elytris 4guttata. atris: punctis quatuor albis. *4guttata.*

Chrysomela 4guttata Mant. Inf. I. 76. 117.

- Habitat Cajennae Dr. Schulz.  
 Affinis praecedenti at puncta elytrorum quatuor magna distincta.
- equestris.* 61. *G. saltatoria* thorace elytrisque albis: margine baseos fasciaque media ferrugineis.  
*Chrysomela equestris* Mant. Inf. 1. 76. 118.  
 Habitat in America Mus. Dr. Hunter.  
 Caput cum antennis nigrum puncto albo inter antennas. Elytra alba, nitida margine baseos fasciaque lata media ferrugineis cupro nitidis.  
 Corpus fuscum.
- cincta.* 62. *G. saltatoria* nigra elytris viridi aeneis: margine punctisque duobus albis.  
*Chrysomela cincta* Mant. Inf. 1. 76. 119.  
 Habitat in Lusitania Dr. Gray.  
 Caput nigrum. Thorax obscure aeneus margine albo. Margo & anticus & posticus in medio albus.
- picta.* 63. *G. saltatoria* flava elytris nigro maculatis.  
 Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Magna. Corpus flavescens. Antennae subferrugineae. Caput & thorax laevia, immaculata. Elytra laevia, flava basi punctis duobus parvis, tunc macula transversa, denique punctis duabus parvis & tandem quinque majoribus 2. 2. 1. Pedes ferruginei.
- nobilitata.* 64. *G. saltatoria* ferruginea elytrorum margine fasciaque albis.  
*Chrysomela nobilitata* Mant. Inf. 1. 76. 120.  
*Hybn. Naturf.* 24. 411. 5. tab. 2. fig. 4.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Thoracis limbus albus.
- quadri-  
fasciata.* 65. *G. saltatoria* ferruginea elytris strigis quatuor albis.  
*Chrysomela 4 fasciata* Mant. Inf. 1. 76. 121.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Caput puncto verticali antennisque nigris. Thorax obsolete albo varius. Elytra glabra, nitida striga prima in ipsa basi, quarta undata.

66. G. saltatoria nigra thorace albo, elytris obscure *albicollis*. violaceis : punctis quatuor albis; interiori linearie.

*Chrysomela albicollis* Mant. Inf. I. 76. 122.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Caput macula magna frontali alba. Elytra obscure violacea puncto interiori ad futuram linearie, obliquo.

67. G. saltatoria flavescentia elytris fasciis duabus *2fasciata*. nigris.

Habitat in Guineae Aquapim Dr. Isert.

Parva. Caput ferrugineum antennis flavescentibus. Thorax flavescentia margine antico parum ferrugineo. Elytra laevia, flavescentia fasciis duabus nigris, altera baseos, altera pone medium. Corpus flavescentia.

68. G. saltatoria flavescentia elytris viridibus: margini *famelica*.

pallido.

*Chrysomela famelica* Mant. Inf. I. 76. 123.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae nigrae. Caput & thorax mox maculata, mox immaculata. Tibiae fuscae.

69. G. saltatoria rufa elytris femoribusque posticis *bicolor* coeruleis.

*Chrysomela bicolor* Mant. Inf. 176. 124. Linn.

syft. nat. 2. 593. 52.

Degeer Inf. 5. 357. 12. tab. 16. fig. 20.

Habitat in Cytiso Cajan Americes Dr. Isert.

70. G. saltatoria viridi aenea elytris violaceis, pedibus *aestuans*.

flavis.

Habitat in Americae merid. Insulis D. Smidt.

Media. Antennae nigrae basi flavae. Caput & thorax aenea, nitida ore flavo. Elytra laevia, violacea, nitida. Pedes omnes flavi.

- Volkameria* 71. G. saltatoria rufa elytris coeruleis.  
Habitat in Volkameria aculeata Americae merid.  
Dr. Pflug.  
Parva. Caput, thorax, corpus, pedes rufa, immaculata. Elytra vix striata, coerulea, immaculata. Antennae fuscae.
- calida.* 72. G. saltatoria nigra thorace viridiaeno, elytris violaceis.  
Habitat in Americae merid. Insulis Dr. Pflug.  
Corpus magnum, nigrum. Caput cum antennis nigrum. Thorax laevis, viridi aeneus, nitidus. Elytra laevia, violacea, nitida, immaculata. Pedes nigri.
- aequinoctialis.* 73. G. saltatoria thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor albis alternis.  
Chrysomela aequinoctialis Mant. Inf. 1. 775.  
125. Linn. syst. nat. 2. 596. 71.  
Degeer Inf. 5. 356. 11. tab. 16. fig. 19.  
Habitat in America meridionali.
- oleracea.* 74. G. saltatoria viridi aenea.  
Chrysomela oleracea Mant. Inf. 77. 126. Linn.  
syst. nat. 2. 593. 51. Fn. Sv. 534.  
Degeer Inf. 5. 344. 49.  
Habitat in Cotyledonibus plantarum in primis Tetrodynamistarum.  
Pellitur cineribus vegetabilium in primis Tabaci.
- Erucae.* 75. G. saltatoria coerulea nitida antennis nigris.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Affinis certe C. oleraceae at alia, & distincta, tota glabra, cyanea, nitida, immaculata antennis solis nigris. Femora postica incrassata.

76. G. saltatoria thorace pallido, elytris aeneis: ma- *albicollis*.  
culis duabus fasciaque aureis.

Chrysomela albicollis Mant. Inf. 1. 77. 127.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum antennis basi pallidis. Elytra  
glabra, nitida, aenea punctis duobus fasciaque  
media aureis. Abdomen nigrum. Pedes pallidi  
femoribus posticis nigris.

77. G. saltatoria thorace rufescente, elytris pallidis: *fulvicollis*.  
futura maculisque duabus nigris.

Chrysomela fulvicollis Mant. Inf. 1. 77. 128.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput atrum, nitidum. Thorax rufescens mar-  
gine pallidiore. Elytra laevia, nitida, pallida  
futura, quae postice puncto majori terminatur  
maculisque duabus altera baseos, altera medii  
magnis, atris. Subtus pallida geniculis pedum  
nigris. Femora postica rufa.

78. G. saltatoria coeruleo nigra antennarum basi *Napi*.  
pedibusque testaceis: femoribus posticis nigris.

Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.

Statura & magnitudo C. oleraceae. Antennae  
nigrae, basi rufae. Caput & thorax nigra, ob-  
scure nitida; laevia. Elytra punctato striata,  
concolora, nigra, immaculata. Pedes testacei  
femoribus posticis valde incrassatis, nigris.

79. G. saltatoria viridis nitida pedibus testaceis: fe- *Hyoscyami*  
moribus posticis violaceis Geoff. Inf. 1. 248. 11.

Chrysomela Hyoscyami Mant. Inf. 1. 77. 129.

Linn. syst. nat. 2. 594. 54. Fn. Sv. 536.

Degeer Inf. 5. 345. 51.

Habitat in Hyoscyamo, Brassica.

80. G. saltatoria viridiaenea pedibus nigris. *nigripes*.

Chrysomela nigripes Mant. Inf. 1. 77. 130.

Altica nigro aenea ovata. Geoff. Inf. 1. 246. 5.

- Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.  
 Distincta a. C. Hyoscyami pedibus nigris.
- nitidula.* 81. G. saltatoria viridis nitens capite thoraceque aureis, pedibus ferrugineis.  
 Chrysomela nitidula Mant. Inf. 1. 77. 131.  
 Linn. syst. nat. 2. 594. 60. Fn. Sv. 542.  
 Altica nigro aurata. Geoff. Inf. 1. 249. 13.  
 Degeer Inf. 5. 346. 54.  
 Habitat in Europae salice.
- Helxines.* 82. G. saltatoria viridiaenea antennis fuscis, pedibus testaceis.  
 Chrysomela Helxines Mant. Inf. 1. 77. 132. Linn.  
 syst. nat. 2. 594. 58. Fn. Sv. 543.  
 Altica aurea Geoff. Inf. 1. 249. 14.  
 Degeer Inf. 5. 345. 52.  
 Sulz. Inf. tab. 3. fig. 12.  
 Habitat in Polygono Fagopyro.
- fulvicornis.* 83. G. saltatoria atrea antennis pedibusque flavis.  
 Habitat in Suecia Dom. de Sehestedt.  
 Statura parva G. nitidulae. Corpus totum aureum,  
 nitidum antennis pedibusque flavis. Femora  
 postica macula apicis nigra.
- trifasciata.* 84. G. saltatoria supra albida: fasciis tribus fuscis.  
 Chrysomela trifasciata Mant. Inf. 1. 77. 133.  
 Linn. syst. nat. 2. 594. 61.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Fascia unica capitis, duae elytrorum. Femora rufa.
- Modeeri.* 85. G. saltatoria viridiaenea elytris macula postica  
 pedibusque anticis flavis.  
 Chrysomela Modeeri Mant. Inf. 1. 77. 134. Linn.  
 syst. nat. 2. 594. 57. Fn. Sv. 539.  
 Habitat in Europae plantis.
- semiaenea.* 86. G. saltatoria thorace aeneo, elytris punctatis  
 nigris apice rufis.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.

**Affinis** G. Modeeri at magis oblonga. Antennae breviores, nigrae primo articulo rufo. Caput & thorax aenea, nitida, immaculata. Elytra punctata, nigra apice late rufa. Pedes rufi femoribus posticis nigris.

87. G. saltatoria atro coerulea capite geniculisque erythrocephalo pedum rufis.

Chrysomela erythrocephala Mant. Inf. I. 77. *phala.*

I35. 56. Fn. Sv. 538.

Altica Geoff. Inf. I. 246. 4.

Habitat in Europae plantis.

88. G. saltatoria atra thorace fulvo, elytris pallidis: margine omni atro. *Sisymbrii.*

Habitat Kiliae.

Statura & summa affinitas G. atricillae, at duplo fere major. Antennae basi pallidae apice nigrae. Caput & corpus atra. Thorax pallide fulvus. Elytra glabra, laevia, pallidiora, futura margineque nigris, qui tamen color apicem haud attingit. Pedes antici pallidi, postici nigri.

89. G. saltatoria nigra thorace elytrisque cinereis. *atricilla.*

Chrysomela atricilla Mant. Inf. I. 77. 136.

Linn. syst. nat. 2. 594. 55. Fn. Sv. 537.

Altica Geoff. Inf. I. 251. 19.

Habitat in Europae plantis.

90. G. saltatoria atra elytris testaceis: margine omni *Nasturtii.* nigro.

Habitat in Holsatiae oleribus.

Diffrerit manifeste a G. nemorum & magis affinis G. atricillae ejusdemque magnitudinis, tota atra elytris foliis testaceis: margine omni nigro.

91. G. saltatoria nigra thorace elytrorumque margini pallidis. *dorsalis.*

- Chrysomela dorsalis Mant. Inf. I. 77. 137.  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
Mera forte varietas G. atricillae. Differt tan-  
tum dorso elytrorum nigro.
- anglica.* 92. G. saltatoria atra elytris tibiisque pallidis.  
Chrysomela anglica. Mant. Inf. I. 77. 138.  
Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.  
Affinis G. atricillae, at thorax ater. Tibiae  
pallidae.
- 4 pustulata.* 93. G. saltatoria nigra coleoptris lineolis quatuor  
flavescensibus.  
Chrysomela 4 pustulata Mant. Inf. I. 77. 139.  
Altica Geoff. Inf. I. 250. 15.  
Habitat in Angliae, Galliae hortis.  
Lineola elytrorum altera ad basin, altera ad  
apicem.
- rufipes.* 94. G. saltatoria coerulea capite thorace pedibus  
antennarumque basi rufis.  
Chrysomela rufipes Mant. Inf. I. 77. 140. Linn.  
syst. nat. 2. 595. 65. Fn. Sv. 545.  
Altica nigra Geoff. Inf. I. 245. 2.  
Degeer Inf. 5. 343. 47. tab. 10. fig. 11.  
Schaeff. Icon. tab. 166. fig. 5.  
Habitat in Europae Malva parvi flora.
- fuscipes.* 95. G. saltatoria violacea capite thoraceque rufis,  
pedibus nigris.  
Chrysomela fuscipes Mant. Inf. I. 77. 141.  
Habitat in Angliae Malvis.  
Affinis praecedenti. Differt tantum pedibus  
nigris.
- ruficornis.* 96. G. saltatoria coerulea capite thorace antennis  
pedibusque rufis, elytris crenato striatis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo omnino G. rufipes at  
alia. Antennae totae rufae. Thorax rufus,

- nitidus linea transversa postica, impressa. Elytra crenato striata, coerulea. Pedes rufi.
97. G. saltatoria subrotunda atra nitida antennis *Mercurialis* pedibusque nigris.  
 Habitat in Germaniae Mercuriali Prof. Helwig.  
 Corpus medium, reliquis magis rotundatum.  
 Antennae nigrae. Caput, thorax, elytra laevissima, atra, nitida, immaculata. Pedes nigri femoribus posticis incrassatis.
98. G. saltatoria gibba cyanea nitida, antennis fuscis. *advena*.  
 Habitat in America Dom. Smidt.  
 Media. Antennae totae fuscae. Caput obscure cyaneum ore ferrugineo. Thorax & elytra cyanea, nitida, immaculata. Pedes cyanei.
99. G. saltatoria testacea gibba elytris laevissimis. *testacea*.  
 Chrysomela testacea Mant. Inf. 77. 142.  
 Altica Geoff. Inf. 1. 250. 17.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
 Differt sane at G. exoleta. Major est & magis gibba, thorace elytrisque laevissimis. Antennae plantaeque fuscae.
100. G. saltatoria ferruginea elytris striatis. *exoleta*.  
 Chrysomela exoleta Mant. Inf. 1. 78. 143.  
 Linn. syst. nat. 2. 594. 59. Fn. Sv. 541.  
 Altica Geoff. Inf. 1. 250. 16.  
 Degeer Inf. 5. 338. 42.  
 Habitat in Echii floribus.
101. G. saltatoria nigra nitida elytris apice puncto *holistica*. rubro.  
 Chrysomela holistica Mant. Inf. 1. 78. 144.  
 Linn. syst. nat. 2. 595. 67. Fn. Sv. 544.  
 Habitat apud nos frequens olera depascens.
102. G. saltatoria pallida oculis nigris. *tabida*.  
 Chrysomela tabida Mant. Inf. 1. 78. 145.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.



*Paullo minor C. exoleta pallida oculis nigris.*  
*Antennae apice fuscae. Elytra laevia.*

*Brassicae.* 103. *G. saltatoria atra elytris pallide testaceis: mar-*  
*gine omni fasciaque media atris.*  
*Habitat in Germaniae oleribus.*  
*Antennae basi pallidae. Pedes atri.*

*nemorum.* 104. *G. saltatoria atra elytris vitta longitudinali flava.*  
*Chrysomela nemorum Mant. Inf. I. 78. 147.*  
*Linn. syst. nat. 2. 595. 62. Fn. Sv. 543.*  
*Altica Geoff. Inf. I. 247. 9.*  
*Degeer Inf. 5. 347. 55.*  
*Sulz. hist. Inf. tab. 3. fig. 11.*  
*Habitat in Pulmonaria, Dentaria aliisque.*

*atra.* 105. *G. saltatoria atra nitida antennarum basi pedi-*  
*busque piceis.*  
*Chrysomela atra Mant. Inf. I. 78. 148.*  
*Altica nigra Geoff. Inf. I. 247. 8.*  
*Habitat Hafniae.*  
*Parva tota atra solis pedibus piceis.*

*Euphorbiae* 106. *G. saltatoria atra pedibus pallidis: femoribus*  
*posticis nigris.*  
*Altica Euphorbiae Schrank.*  
*Habitat in Germaniae Euphorbia Dom. Smidt.*  
*Statura & magnitudo C. atrae at magis nitida,*  
*parum aenea. Antennae nigrae basi pallidae.*  
*Pedes pallidi femoribus posticis valde incras-*  
*satis, nigris.*

*haemisphae.* 107. *G. saltatoria suborbiculata depreßa nigra.*  
*rica.* *Chrysomela haemisphaerica Mant. Inf. I. 78.*  
*I 49. Linn. syst. nat. 2. 595. 68.*  
*Degeer Inf. 5. 348. 56.*  
*Habitat in Europae Corylo.*

*surinamen-* 108. *G. saltatoria flavescens elytris margine fascia-*  
*sis.* *que sanguineis.*

*Chrysomela surinamensis* Mant. Inf. 1. 78. 150.

Linn. syst. nat. 2. 595. 69.

Degeer Inf. 5. 355. 10. tab. 16. fig. 17.

Habitat Surinami.

Antennae & pedes pallidae.

109. *G. saltatoria pallida elytris nigris linea longitudinali flexuosa alba.* *S. littera.*

*Chrysomela S. littera* Mant. Inf. 1. 78. 151.

Linn. syst. nat. 2. 595. 70.

Degeer Inf. 5. 357. 13. tab. 16. fig. 21.

Habitat Surinami.

110. *G. saltatoria viridi coerulea antennis nigris: St. Crucis.*  
primo articulo ferrugineo.

Habitat in Insula St. Crucis Americae D. Smidt.

Distincta omnino a *G. Erucae* triplo minor, tota  
viridi coerulea, nitida, laevis antennis solis  
nigris primo articulo ferrugineo.

111. *G. saltatoria pallide testacea antennis nigris: hortorum.*  
Habitat in America meridionali Dom. Smidt.  
Corpus minutum pallide testaceum, nitidum  
antennis solis nigris.

48. *EROTYLUS.* *Palpi* quatuor inaequales:  
*antici* securiformes.

*postici* clavati.

*Labium* corneum, apice  
dilatatum, emarginatum.

*Antennae* perfoliatae.

1. *E. ovatus niger coleoptris punctis fulvis numerosissimis.* *giganteus.*

*Chrysomela gigantea* Linn. syst. nat. 586. 1.

Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 6.

Degeer Ins. 5. 349. 1<sup>a</sup> tab. 16. fig. 8.

Habitat in India.

Dorsum gibbum.

*reticulatus*. 2. E. ater elytris flavis nigro reticulatis.

Habitat in Brasilia Mus. Dr. Hunter.

Corpus magnum, fere globosum, atrum.

*fasciatus*, 3. E. ovatus ater elytris fasciis sex undatis fulvis : antica interrupta.

Habitat in America meridionali.

Corpus magnum, atrum, nitidum, immaculatum,

Thorax planus maculis duabus dorsalibus impressis. Elytra fasciis sex fulvis, quarum anterior interrupta, reliquae valde undatae.

*histrio*. 4. E. ater elytris nigro flavoque fasciatis : macula baseos apicisque coccinea.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Magnus, ater. Elytra punctata, atra fasciis tribus flavis nigro maculatis. Praeterea punctum flavum ad scutellum & macula coccinea ad marginem exteriorem baseos & altera ad apicem.

*testaceus*. 5. E. testaceus antennis tibiisque nigris.

Habitat in America Dom. Drury.

Corpus gibbum, testaceum.

*gibbosus*. 6. E. niger elytris flavescentibus nigro punctatis : fascia media posticaque nigris.

Chrysomela gibbosa Linn. syst. nat. 2. 586. 2.

Olivier Ins. 89. tab. 1. fig. 4. at fascia anterior interrupta.

Erotyli corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inserto, oculis rotundatis, lateralibus, vix prominulis, antennis sub oculis insertis, thorace planiusculo, transverso, scutello minuto, rotundato, elytris rigidis, gibbis, fornicatis, abdomine longioribus, pedibus longiusculis, tenuibus, femoribus compressis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

- Herbst Arch. tab. 23. fig. 3.  
 Amoenit. acad. 6. 393. 13.  
 Gronov. Zooph. 606. tab. 14. fig. 5.  
 Habitat in America meridionali.  
 Magnus. Thorax puncto utrinque impresso.  
 Coleoptera valde gibba.
7. E. ater elytris fascia media flava nigro maculatus.  
 lata basi rubro notatis.  
 Erotylus notatus Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 11.  
 Habitat Cajennae Mus. D. Olivier.  
 Praecedentibus minor. Caput & thorax laevia,  
 atra, immaculata. Elytra nigra punctis duobus  
 approximatis baseos rubris. In medio fascia lata  
 flava & in hac strigae dua e punctis quadratis  
 nigris anteriore quatuor, posteriore tribus.  
 Margo fasciae serratus.
8. E. ater elytris flavo nigroque reticulatis: fasciis concatenatus.  
 duabus atris.  
 Habitat — — Dr. Schulz.  
 Corpus magnum atrum.
9. E. ovatus elytris nigris: punctis quinque rubris 5punctatus  
 Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 5.  
 Chrysomela 5 punctata Linn. syst. nat. 2. 586. 3.  
 Petiv. Gazoph. 613. tab. 16. fig. 7.  
 Habitat in America meridionali.  
 Variat rarius punctis albis loco rubrorum.
10. E. niger elytris flavis: punctis numerosissimis punctatissimus.  
 nigris.  
 Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
 Elytra gibba. Corpus subtus piceum.
11. E. ater elytris punctatis medio fulvo maculatus.  
 variegatus.  
 tis. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 7.  
 Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.  
 Corpus totum atrum, haud gibbosum. Thorax  
 punctis cicatrificantibus. Elytra punctata.

- gemmatus.* 12. E. ater elytris punctis fulvis numerosissimis, thorace varioloso.  
 Habitat Cajennae Mus. D. Bosc.
- Medius: Caput atrum. Thorax ater punctis variolosis, cicatrisantibus, impressis. Elytra medio gibba, punctis fulvis in strigas dispositis. Corpus atrum.
- longimanus* 13. E. ater elytris fasciis atris flavisque alternis, pedibus anticis elongatis.  
 Habitat in India Dom. Daldorff.  
 Thorax punctis duobus impressis. Elytra fasciis valde undatis nigris quinque, flaviis quatuor. Corpus atrum.
- abdominalis.* 14. E. ater elytris flavis: fasciis quatuor undatis punctoque distincto nigris.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Statura & magnitudo omnino E. fasciati. Caput & thorax glabra, laevia, atra, immaculata. Elytra flava fasciis quatuor valde undatis, atris, ultima terminali. Inter fasciam 2. 3. punctum distinctum, atrum. Corpus atrum abdomine flavo lineis duabus punctorum atrorum. Pedes atri.
- fasciatus.* 15. E. ater elytris fasciis tribus flavescentibus.  
 Habitat — — — Dom. Drury.  
 Elytra fasciis tribus flavis nigrisque alternis, e quibus flava baseos, nigra apicis. Alius minor e Brasilia in Museo Dom. Banks pedibus flavis vix distinctus.
- Zebra.* 16. E. flavescentis capite thoracis basi fasciis tribus elytrorum pedibusque atris.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Scutellum atrum. Elytra fasciis tribus flavis nigrisque alternis, e quibus flava baseos, nigra apicis.

17. E. niger coleoptris fasciis duabus flavis: ante- *alternans*,  
riore nigro punctata.  
Erotylus alternans Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 10.  
Chrysomela Gronovii. Herbst Arch. tab. 23.  
fig. 4.  
Habitat — — Mus. Britannicum.  
Statura praecedentium. Caput, thorax, corpus  
glabra, atra, nitida. Elytra atra fasciis dua-  
bus dentatis, flavis, altera baseos puncto uno  
alterove nigro, altera versus apicem immacu-  
lata. Macula praeterea magna marginalis, flava  
pone fasciam posticam.
18. E. niger elytris rubris immaculatis. *Surinamen-*  
Coccinella surinamensis Ent. System. 1. 266. 4. *sis.*  
deleatur.  
Coccinella surinamensis Linn, syst. nat. 2. 579. 2.  
Amoen. acad. 6. 393. 12.  
Erotylus surinamensis Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 9.  
Habitat in America meridionali certe hujus ge-  
neris.
19. E. oblongus ater immaculatus. *Morio.*  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Elytra punctato striata, viridi nitentia.
20. E. oblongus ater thoracis margine elytrorum- *limbatus*,  
que limbo flavo.  
Erotylus limbatus Oliv. Inf. 89. tab. 2. fig.  
Habitat Cajennae Mus. D. Olivier.  
Statura oblonga praecedentium. Antennae per-  
foliatae, nigrae. Caput flavescentia macula fron-  
tali nigra. Thorax laevis, ater margine late-  
terali lato, sinuato, flavo. Elytra laevia, atra  
limbo omni lato flavo margine tamen futu-  
raque tenuissime atris. Scutellum & cor-  
pus atra.

- cupreus.* 21. E. oblongus ater thorace elytrisque cupreis.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Antennae nigrae. Elytra punctato striata.
- nubilosus.* 22. E. ater, thorace elytrisque ferrugineo varüs.  
Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.  
Caput cum antennis nigrum. Thorax glaber,  
rufus margine tenuissimo maculisque tribus  
dorsalibus, dissimilibus, connexis nigris. Elytra  
laevia, atra fasciis tribus undatis puncto-  
que apicis ferrugineis. Fascia baseos nigro  
punctata.
- dilatatus.* 23. E. oblongus ater thorace elytrisque ferru-  
gineis.  
Habitat ad Cap Bon. spei Dom. Lee.  
Antennae fuscae basi ferrugineae. Elytra cor-  
pore multo latiora, laevia.
- smaragdu-*  
*lus.* 24. E. oblongus ater elytris striatis viridibus.  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Elytra punctato striata.
- amethysti-*  
*nus.* 25. E. oblongus ater thorace elytrisque cyaneis.  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Praecedenti affinis. Frons retusa. Elytra striato  
punctata. Corpus atrum femoribus inter-  
dum rufis.
- bicolor.* 26. E. oblongus ater supra aeneus.  
Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.  
Caput aeneum antennis nigris. Elytra punctato  
striata, obscure aenea.
- rufipes.* 27. E. oblongus niger pedibus piceis.  
Habitat Kiliae Dom. Lund.  
Praecedentibus minor. Antennarum primus ar-  
ticulus ferrugineus. Elytra striata. Pedes picei  
geniculis nigris.

**49. CEBRIO.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla membranacea, vix unidentata.*

*Labium apice palpigerum.*

*Antennae filiformes.*

**1. C. villosus fuscus elytris abdomine femoribusque *gigas*. testaceis.**

Cebrio gigas Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 1.

Cistela gigas Mant. Inf. 1. 84. 1.

Ross. Fn. Etr. 1. 100. 256. tab. 7. fig. 9.

Habitat in Gallia australiori Dr. Broussonet.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, filiformes, anteriores longiores, quadriarticulati: articulis subaequalibus, obconicis; ultimo obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores paullo breviores, triarticulati: articulis obconicis; ultimo obtuso adnati labii apice. Mandibula elongata, tenuis, cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, membranacea, apice rotundata vix unidentata. Labium breve, membranaceum, integrum, apice palpigerum. Antennae ferratae.

Thorax dente postico utrinque prominet.

Variat elytris testaceis & fuscis.

**2. C. fuscus elytris striatis.**

*fuscus.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Cebrio corpus elongatum, immarginatum, pubescens, agile, capite ovato, exerto, oculis lateralibus, rotundatis, prominulis, antennis sub oculis insertis, thorace transverso, postice latiori angulo utrinque porrecto, acuto, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis, pedibus validis, femoribus crassiusculis, tarsis anticis quinque pollicis quadriarticulatis, colore obscuro.

Statura & summa affinitas praecedentis & forte  
mera ejus varietas paullo minor. Caput et tho-  
rax angustiora & color totius corporis fuscus,  
immaculatus.

50. CISTELA. *Palpi* quatuor filiformes,  
*Maxilla* unidentata.  
*Labium* membranaceum,  
bifidum.  
*Antennae* filiformes.

- cervina.* 1. C. livida pedibus fuscis.  
Chrysomela cervina Linn. syst. nat. 2. 602. 115.  
Fn. Sv. 575.  
Habitat in Europae plantis.  
*cinerea.* 2. C. livida elytris pedibusque fuscis.  
Habitat in Germania, Italia.  
Mera praecedentis varietas, observante Helwigio.  
*livida.* 3. C. livida antennis fuscis.  
Habitat in Terra del Fuego Mus. D. Banks.  
Antennae fuscae articulis superne lividis. Thorax  
& elytra laevia.  
*ceramoides* 4. C. atra thorace antice angustato, elytris striatis  
testaceis.  
Chrysomela ceramoides Linn. syst. nat. 2. 602.  
117. Fn. Sv. 576.  
Herbst Arch. tab. 23. fig. 27.

---

Cistelae corpus oblongum, subpubescens, immar-  
ginatum, agile, capite ovato, exerto, oculis ro-  
tundatis, lateralibus, antennis sub oculis insertis,  
thorace vix marginato, saepe antice parum angustato,  
scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis,  
longitudine abdominis, pedibus longiusculis, tenui-  
bus, femoribus compressis, tarsis anticis quinque  
posticis quadriarticulatis, colore saepius obscuro,  
rarius variegato aut nitido.

- Mordella Geoff. Inf. I. 354.
- Habitat in Europa boreali.
- Variat rarius thorace testaceo.
5. C. atra thorace quadrato, elytris striatis testaceis. *lepturoides*.
- Cistela rufitarsis Lefk Reif. I. 15. 5. tab. A. f. 4.
- Habitat in Europae australioris spicis fecalinis
- Dom. de Sehestedt.
- Thorax omnino diversus a praecedente trans-
- versus, quadratus, paullo marginatus.
6. C. nigra thorace elytris abdomineque testaceis. *testacea*.
- Habitat in Chrysanthemo, Sambuco aliisque
- Barbariae plantis Dom. Vahl.
- Thorax punctis duobus dorsalibus impresis.
7. C. nigra thorace quadrato, elytris testaceis, *picipes*.
- antennarum basi tibiisque piceis.
- Habitat in Daniae plantis Dom. de Sehestedt.
- Statura & summa affinitas C. lepturoides, at
- duplo minor. Antennae nigrae basi piceae.
- Caput & thorax quadratus, vix pubescens,
- nigra, immaculata. Elytra vix striata, testacea,
- pedes nigri tibiisque piceis.
8. C. flava elytris sulphureis. *sulphurea*.
- Chrysomela sulphurea Linn. syst. nat. 2.
602. 114.
- Tenebrio lutea Geoff. Inf. I. 351. II.
- Herbst Arch. tab. 23. fig. 28.
- Habitat in Europae floribus umbellatis.
- Antennae fuscae.
9. C. atra thorace ferrugineo, elytris striatis. *ruficollis*.
- Habitat in Europae australioris Santolina.
- Antennae nigrae.
10. C. atra elytris striatis coerulescentibus. *coerulea*.
- Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.
- Dissert a praecedente thorace atro & elytris
- coerulescentibus.

- nigripennis.* 11. *C. ferruginea capite elytrisque striatis nigris.*  
Habitat in Gallia meridionali.  
Statura omnino *C. ruficollis* at corpus *rufum*  
pectore nigricante.
- analis.* 12. *C. rufescens antennis macula elytrorum ano-*  
*que nigris.*  
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
Antennae nigrae. Elytra rufa macula magna  
baseos nigra.  
Abdomen *rufum* ano *nigro*.  
Variat elytris maculis duabus *nigris*, altera  
baseos, altera versus apicem.
- rufipes.* 13. *C. nigra elytris laevibus, antennis pedibusque*  
*ferrugineis.*  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Nimis affinis *C. varians*, at paullo major, ob-  
scure nigra antennis pedibusque solis ferrugi-  
neis. Thorax latior. Elytra vix striata.
- fulvipes.* 14. *C. nigra, elytris striatis, pedibus ferrugineis.*  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Paullo minor praecedente. Antennae fuscae  
primo articulo rufo. Caput & thorax laevia,  
nigra, immaculata. Elytra striata nigra. Ab-  
domen ferrugineum ano obscuriore. Pedes  
ferruginei.  
Variat ab domine nigro.
- varians.* 15. *C. grisea oculis nigris, elytris substriatis.*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
*C. murina* paullo major.
- murina.* 16. *C. nigra elytris striatis pedibusque testaceis.*  
Chrysomela murina Linn. syst. nat. 2. 602.  
118. Fn. Sv. 577.  
Herbst: Arch. tab. 23. fig. 29.  
Mordella Geoff. Inf. 1. 355. 4.  
Habitat in Europae plantis.

- 17. C. testacea capite thoraceque fuscis, elytris *ferruginea*.**  
striatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Nimis affinis C. murinae at distincta & alia.  
Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput &  
thorax fusca interdum litura dorsali thoracis  
ferruginea, obsoleta. Elytra striata, testacea.  
Abdomen & pedes ferruginea.

- 18. C. fusca thorace pedibusque ferrugineis, ely- *thoracica*.**  
tris laevibus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Magnitudo & statura C. murinae. Antennae  
fuscae, basi rufescentes. Caput nigrum. Tho-  
rax laevis, ferrugineus. Elytra laevia, fusca.  
Corpus fuscum pedibus ferrugineis.

- 19. C. atra elytris nigris: macula baseos flava, *flavipes*.**  
abdominis basi pedibusque flavis.

Habitat Mus. Dom. Banks.

Nimis affinis C. humerali & forte mera ejus  
varietas. Caput & thorax laevia, atra, nitida,  
antennis obscure ferrugineis. Elytra sub-  
striata, nigra macula magna baseos flava.  
Pectus abdominis basis pedesque flava.

- 20. C. testacea ab domine griseo, elytris laevibus. *Evonymi*.**

Habitat in Germaniae Evonymo Dom.  
Schneider.

Magnitudo & statura omnino C. murinae. An-  
tennae testaceae, apice fuscae. Abdomen  
fuscum.

- 21. C. nigra elytris puncto baseos ferrugineo. *humeralis*.**

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus nigrum, minime nitidum, subvillosum.  
Tibiae testaceae.

- 22. C. atra elytris substriatis, antennarum basi *maura*.**  
pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Minor C. fulvipes. Antennae breviores, nigrae, basi ferrugineae. Caput nigrum ore ferrugineo. Thorax pubescens, niger, immaculatus. Elytra vix striata, nigra, immaculata. Corpus nigrum pedibus rufis.

*paltipes.* 23. C. nigra nitidula antennarum basi pedibusque pallidis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Duplo minor C. fulvipes. Antennae nigrae, basi pallidae. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra vix punctata, nigra, nitidula. Abdomen mox nigrum, mox ferrugineum. Pedes pallidi.

*Morio.* 24. C. nigra obscura pedibus testaceis.

Cistela gibbosa Thunberg. Diff.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Statura parva, angustata, oblonga. Pedes omnes testacei.

*angustata.* 25. C. thorace elytrisque obscure rufis medio nigris.  
Habitat in Anglia Mus. D. Banks.

C. murina angustior. Caput nigrum antennis fuscis. Elytra ferruginea futura nigra. Abdomen ferrugineum linea media & laterali fuscis. Pedes ferruginei.

*pallida.* 26. C. pallida capite elytrorumque apicibus fuscis.  
Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.

Antennae fuscae. Pedes pallidi.

*aeruginosa.* 27. C. flava capite pectoreque nigris, elytris viridibus.  
Habitat in Aeschynomene floribus Africæ, quos destruit.

Antennae basi virescentes, medio nigrae, apice flavae, ultimo tamen articulo nigro. Thorax & abdomen flava.

- 28. C. ferruginea elytris cyaneo viridibus : margine *festiva*. ferrugineo.**  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Antennae fuscae, basi ferrugineae. Caput rufum, basi nigrum. Thorax glaber, nitidus, subpunctatus. Pedes apice nigri.
- 29. C. atra thorace rufo, elytris cyaneis. *aulica*.**  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Abdomen atrum segmentorum marginibus rufis.
- 30. C. testacea elytrorum marginibus vitta media *svittata*. nigris.**  
 Habitat in Carolina Mus. D. Monson.  
 Corpus testaceum antennis serratis, nigris. Femora postica valde incrassata, infus canaliculata. Ad Chrysomelas saltatorias forte emendanda.
- 31. C. hirta capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *hirta*.**  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Antennae ferratae, ferrugineae, apice fuscae. Thorax hirtus, ferrugineus punctis duobus, dorsibus, nigris. Corpus cyaneum pedibus rufis.
- 32. C. pubescens grisea capite abdomeque fuscis. *pubescens*.**  
 Habitat in Dania Mus. Dom. Lund.  
 Caput fuscum antennis basi ferrugineis. Thorax pubescens, griseus, obscurior. Elytra grisea, futura parum nigricante. Corpus nigrum pedibus griseis.
- 33. C. ferruginea elytris flavis : lineolis tribus nigris. *sexlineata*.**  
 Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
 Antennae nigrae articulo primo basi ultimisque tribus ferrugineis. Caput ferrugineum. Thorax pallidior, nitidus. Elytra laevia, nitida, flava lineolis tribus nigris, exterioribus duabus basi coeuntibus, intermedia breviori. Subtus ferruginea pectore pedumque geniculis nigris.

**51. ZYGIA.** *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* elongatum, membranaceum.

*Antennae* moniliformes.

*oblonga.*

**i. Zygia.**

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Media, oblonga, rufa, capite elytrisque obscure cyaneis. Thorax rotundatus, immarginatus, punctatus, carinatus. Scutellum rotundatum. Elytra rugosa, obtusa lineis elevatis tribus laevibus. Pedes inermes, rufi.

**52. ZONITIS.** *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* palpis longior, integra.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* setaceae.

*praeusta.* **i. Z.** thorace mutico testacea antennis elytrorumque apicibus nigris.

Mylabris testacea Mant. Inf. i. 217. 8.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*Antennae* nigrae primo articulo testaceo. Caput inflexum, testaceum oculis nigris. Thorax pla-

Zonitis corpus oblongum, glabrum, laeve, immarginatum, agile, capite ovato, inflexo, exerto, oculis lateralibus, reniformibus, vix prominulis, antennis sub oculis insertis longitudine corporis, thorace quadrato, plano, scutello triangulari, elytris molliusculis, longitudine abdominalis, pedibus tenuibus, longiusculis, tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis, colore nigro testaceoque, nitido.

nus, laevis, testaceus, immaculatus. Elytra laevia, testacea, apice nigra. Corpus testaceum pectore tarsisque nigris. Mas minor elytris totis nigris, abdome nigro: ano rufo.

2. *Z. thorace angulato spinoso testacea elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris.*

*Cantharis angulata* Mant. Inf. 1. 168. 7.

Hybn. Naturf. 24. 45. 11. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Insula Amsterd. Mus. Dom. Banks.

Caput testaceum ore antennisque nigris, Thorax utrinque angulato spinosus, testaceus. Elytra laevia, nitida, testacea, apice cyanea. Corpus testaceum, subtus parum fuscescens. Pedes nigri.

3. *Z. thorace mutico nigra thorace elytrisque testaceis.*

*Zonitis mutica* Hybn. Naturf. 24. 44. 10. t. 2. f. 11.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput cum antennis atrum. Thorax planus, laevis, rotundatus, muticus, rufus. Elytra flexilia, laevia, testacea, immaculata. Corpus nigrum.

4. *Z. thorace mutico atra elytris testaceis.*

*fulvipennis*

Habitat — —

Magnitudo omnino praecedentium tota atra elytris solis testaceis, immaculatis.

5. *Z. flava elytris puncto medio apiceque nigris.*

*chrysomelina.*

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Caput flavum ore, antennis oculisque nigris. Thorax glaber, nitens, flavus puncto medio nigro. Elytra laevia, flava puncto apiceque nigris. Subtus atra ano rufescente.

6. *Z. rufescens elytris flavis apice nigris.*

*flava.*

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Affinis praecedenti at minor. Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput & thorax rufescens.

Elytra laevia, flava, apice fusca. Abdomen basi nigricans. Pedes flavi.  
*rostrata.* 7. Z. testacea pectore elytrorumque punctis tribus nigris.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.  
 Statura omnino praecedentium. Caput testaceum antennis setaceis. Maxilla exserta, rostriformis, capite longior. Thorax testaceus. Elytra laevia, testacea punto parvo baseos, majori ante medium & tertio versus apicem nigris. Corpus testaceum pectore abdominalisque basi atris.

### 53. APALUS. Palpi aequales, filiformes.

*Maxilla* cornea, unidentata.

*Labium* membranaceum, truncatum, integrum.

*Antennae* filiformes.

2 *maculatus* 1. A. niger elytris testaceis: puncto nigro.

Meloe bimaculatus Linn. syst. nat. 2. 680. 9.  
 Fn. Sv. 828. Udm. Diff. 82.

Degeer Inf. 5. tab. 1. fig. 18.

Habitat primo vere in Europae borealis arenosis.

4 *maculatus* 2. A. rufus capite elytrorumque maculis duabus nigris.

Habitat in America boreali.

Apali corpus oblongum, depresso- sculum, immarginatum, glabrum, laeve, agile, capite ovato, exerto, oculis lateralibus, rotundatis, prominulis, anten- nis sub oculis insertis, corpore demidio brevioribus, thorace brevi, angustato, rotundato, scutello rotun- dato, elytris flexilibus, planis, pedibus brevibus, validis, tarsis anticis quinque, posticis quadriarticu- latis, colore nigro testaceo-que obscuro.

Hujus generis videtur. Paullo major A. 2 maculato. Antennae breves, filiformes, nigrae. Caput nigrum palpis filiformibus, rufis. Thorax laevis, ovatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, flexilia, rufa macula magna baseos apiceque late nigris. Corpus rufum ano obtuso nigro. Pedes nigri femoribus rufis.

**54. ALURNUS.** *Palpi* sex brevissimi.

*Maxilla* cornea, fornicata.

*Antennae* filiformes.

i. A. thorace coccineo, elytris flavis.

*grossus.*

Habitat Cajennæ.

Antennæ cylindricaæ, nigrae, corpore dimidio breviores. Thorax subrugosus, basi utrinque acuminatus, coccineus margine postico nigro. Scutellum rotundatum, nigrum. Elytra corpore majora longioraque, basi gibbosa, subpunctata, flava. Pedes nigri tarsis subtus valdo spongiosis.

**55. SAGRA.** *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*Maxilla* cornea, unidentata.

*Labium* breve, corneum, rotundatum, ciliatum, fissum.

i. S. viridi aenea femoribus tibialisque posticis dentatis: *femorata*.

Tenebrio femoratus Drury Ins. 2. tab. 34. fig. 5.

Tenebrio viridis Sulz. Hist. Ins. tab. 7. fig. 8.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Os maxillæ palpisque. Palpi quatuor, inaequales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulo secundo longiori, ultimo ovato adhaerentes maxillæ dorso, posteriores triarticulati: arti-

culis subaequalibus; ultimo obtuso adnati labii medio. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, cornea, rotundata, in medio unidentata. Labium breve, rotundatum, corneum, ciliatum, fissum. Corpus magnum, laeve, vi-ridi aeneum, nitidum antennis corpore dimidio brevioribus, articulis ultimis nigris. Femora postica incrassata, bidentata: dente anteriori majori. Tibiae elongatae, obscuriores apice sinuatae, unidentatae.

- dentipes.* 2. *S. nigra* femoribus tibiisque posticis dentatis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Schulz.  
Praecedenti nimis affinis at tota nigra. Femora postica incrassata, apice bidentata. Tibiae incurvae, tridentatae.

## 56. CRYPTOCEPHALUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* corneum, integrum.

*Antennae* filiformes.

- longipes.* 1. *C. niger* obscurus elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anticis elongatis.  
Clytra longipes Laichart. 1. 166. 1.  
Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 3.  
Habitat in Germaniae Corylo.  
Antennae breves, ferratae, nigrae. Elytrorum punctum ad basin, duaque in medio. Pedes nigri, antici in omni sexu elongati.

2. C. nigro cyaneus elytris testaceis punctis: tribus 3 punctatus  
nigris, pedibus anticis elongatis.

Habitat in Italia D. Allioni.

An a praecedente satis distinctus at minor. Caput,  
corpus, thorax obscure cyanea, immaculata.  
Elytra testacea punctis tribus nigris 1. 2. Pe-  
des antici in altero sexu elongati.

3. C. ater nitidus elytris rubris: punctis tribus salicis.  
nigris.

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Distinctus omnino a C. longipede. Magnitudo  
C. 2. punctati. Antennae breves, nigrae. Ca-  
put & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra  
rubra, interdum testacea: punctis tribus 1. 2.  
Corpus nigrum.

4. C. ater elytris testaceis: punctis duobus lineolaque 6 notatus.  
postica nigris.

Habitat in Barbaria Mus. D. Desfontaines.

Parva. Antennae elongatae. Thorax ater, nitidus, immaculatus. Elytra laevia, testacea punctis  
duobus baseos exteriori, majori linearie linea-  
que postica atris. Sutura tenuissime atra. Cor-  
pus atrum.

Variat puncta tantum baseos.

5. C. niger thorace rubro immaculato, elytris rubris: 6 macula-  
punctis tribus nigris.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Cryptocephali corpus cylindricum, antice postice-  
que obtusum, glabrum, immarginatum, capite plano,  
inferto, oculis lateralibus, rotundatis, antennis sub  
oculis insertis, corpore brevioribus, thorace brevi,  
transverso, rotundato, scutello parvo, rotundo, ely-  
tris rigidis, fornicateis, abdomine fere longioribus, pe-  
dibus validis, longiusculis, tarsis quadriarticulatis,  
colore vario, saepius nitido.

Antennae breves, serratae, nigrae. Elytra glabra,  
puncto unico ad basin & duobus in medio.

*4 punctatus* 6. C. niger elytris rubris; punctis duobus nigris,  
antennis brevibus serratis.

*Chrysomela 4 punctata* Linn. syst. nat. 2. 596.

76. Fn. Sv. 547.

*Melolontha* Geoff. Ins. 1, 195. tab. 3. fig. 4.

*Degeer* Ins. 5. 329. 32. tab. 10. fig. 7.

*Schaeff.* Icon. tab. 6. fig. 1. 2.

Habitat in Europae Corylo frequens.

Larva saecata: sacco ovato scabro antice oblique  
truncato *Ast.* Hall. 1.

*4 notatus.* 7. C. cyaneo niger elytris rubris; maculis duabus  
cyaneis, antennis brevibus.

Habitat in Barbaria Prof. Vahl,

Macula elytrorum posterior major, Pedes nigri.

*laetus.* 8. C. viridi aeneus elytris testaceis; maculis dua-  
bus nigris.

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Caput viridi aeneum, nitidum antennis testa-  
ceis apice fuscis. Thorax aeneus, nitidus mar-  
gine testaceo. Elytra laevia, testacea maculis  
duabus cyaneo nigris, posteriore majore. Cor-  
pus nigricans ano aeneo, Pedes aenei tibiis  
testaceis.

*atraphaxi-  
dis.* 9. C. niger thorace rubro trimaculato, elytris  
testaceis; maculis tribus nigris, tibiis rufis.

*Chrysomela Atraphaxidis* Pall. Iter. 2. 725. 65.

Habitat in Sibiriae Atraphaxide Mus. Dom. Banks.

Antennae serratae, cinereae. Thorax rufus ma-  
culis tribus fere contiguis ad basin. Elytra  
pallidiora macula postica majori transversa.  
Pedes rufi femoribus nigris. Abdomen nigrum,  
cinereo villosum.

10. C. ater nitidus elytris flavis: lunula fascia *lunulatus*.  
puncto que apicis nigris.  
Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
Antennae breves, ferratae. Corpus atrum.
11. C. niger thorace elytrisque rubris: punctis qua- *12 macu-*  
*tuor nigris.* *latus.*  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Antennae breves, ferratae, basi rufescentes.  
Thorax rotundatus, laevis, rufus punctis qua-  
tuor nigris, intermediis, majoribus. Elytra  
glabra, rufa, pari punctorum ad basin, in  
medio macula magna fere fasciam constitente  
& puncto parvo ad apicem.
12. C. testaceus antennis elytrorumque margine *obscitus*.  
nigris.  
Habitat in America Dom. Drury.  
Antennae ferratae, nigrae. Elytra margine  
omni nigro in primis futura. Abdomen ci-  
nereo fuscum.
13. C. rufescens thorace maculis, elytris lineis *lineatus*:  
duabus nigris.  
Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
Caput nigrum fronte rufescente. Antennae tho-  
race longiores, filiformes, nigrae, basi ru-  
fescentes. Thorax maculis duabus magnis,  
dorsalibus, nigris. Scutellum nigrum. Pedes  
nigri femoribus basi rufis.
14. C. coerulecens elytris testaceis: puncto hume- *tridentatus*  
rali nigro.  
Chrysomela tridentata Linn. syst. nat. 2. 596.  
73. Fn. Sv. 546.  
Melontha Geoff. Ins. 1. 196. 3.  
Degeer Ins. 5. 333. 36. tab. 10. fig. 10.  
Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 5.  
Habitat in Lonicera Xylosteo.

Punctum parvum, cyaneum ad basin elytrorum.

Pedes antici in altero sexu elongati.

*taxicornis.* 15. C. cyaneus elytris testaceis immaculatis, antennis feratis.

Habitat in Italia D. Allioni.

Affinis certe C. tridentato. Antennae valde compressae, ferratae. Caput & thorax caynea, immaculata. Elytra testacea. Pedes antici valde elongati.

*venustus.* 16. C. griseo fuscus thorace margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris.

Habitat in America Mus. D. Hunter.

Antennae basi rufae, apice nigrae. Caput rufescens orbita oculorum flava. Thorax margine omni lineolisque duabus margine postico connexis flavis. Elytra striato punctata margine omni tenuissime nigro. Vitta lata nigra in medio nec basin nec apicem attingens, & altera futura postice junctis.

*Gorteriae.* 17. C. ater glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flavescensibus.

*Chrysomela Gorteriae* Linn. syst. nat. 2. 596.

74. Amoen. acad. 6. 394. 16.

Habitat in Gorteria Cap. Bon. spei.

*8 punctatus.* 18. C. niger thorace rufo, elytris testaceis: punctis quatuor nigris. Naturf. 24. 17. 22. tab. 1. fig. 22.

Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.

Antennae breves, ferratae, nigrae. Puncta elytrorum 2. 2. oblique posita. Scutellum nigrum. Pedes nigri tibiis testaceis.

*maxillosus.* 19. C. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: puncto baseos scutelloque nigris.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae serratae, nigrae, basi fulvae. Abdomen cinereo villosum. Pedes fulvi geniculis nigris.

- 20.** *C. ater thorace utrinque macula lutea, tibiis auritus. flavis.* Herbst Arch. tab. 44. fig. 5.

*Chrysomela aurita* Linn. syst. nat. 2. 256. 75.

Habitat in Saxoniae Corylo.

- 21.** *C. coeruleus elytris sanguineis: maculis coeruleis cicatrisantibus.* *Lentisci.*

*Chrysomela variolosa* Mant. Inf. 1. 70. 50. Linn.

syst. nat. 20. 591. 33.

Habitat in Africæ Lentisco Mus. Dom. Desfontaines,

Statura praecedentium. Antennae serratae, nigrae. Caput & thorax coerulea, cinereo villosa. Elytra rubra maculis plurimis cicatrisantibus coeruleis. Corpus coeruleum.

- 22.** *C. rufus elytris maculis tribus nigris: anteriore didymus. postice didyma.*

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae thorace longiores, filiformes, nigrae, basi rufescentes. Elytra striato punctata, glabra, futura dimidiaque parte postica marginis exterioris maculisque tribus disci nigris. Macula anterior oblonga, postice didyma, media subrotunda, tertia versus apicem linearis. Subtus rufus pectore pedumque geniculis nigris.

- 23.** *C. rufus capitis basi elytrorumque maculis duabus cyaneis.* *4 maculatus.*

*Chrysomela 4 maculata* Linn. syst. nat. 2.

596. 77.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 67.

Habitat in Saxoniae Corylo.

Puncta elytrorum remota, alterum ad basin, alterum ad apicem. Abdomen cinereum.

*flavicollis.* 24. C. niger thorace fulvo: punctis sex nigris,  
elytris pallidis: punctis duobus.

Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.

Caput lineola inter antennas punctisque utrinque duobus fulvis. Antennae nigrae basi fulvae. Puncta thoracis sex nigra in strigam disposita. Puncta elytrorum duo, alterum apicis. Pedes rufi geniculis nigris.

*longimanus* 25. C. obscure aeneus, elytris testaceis: puncto baseos nigro.

*Chrysomela longimana* Linn. syst. nat. 2.

599. 95.

Habitat in Trifolio montano, Euphorbia cyparissias Sueciae.

Punctum parvum aeneum ad basin elytrorum. Pedes in altero sexu elongati.

Larva glabra, faccata: sacco pyriformi, piloso, fusco.

*Lar.* 26. C. rufus elytris fuscis cyaneo nitidis, pedibus anticis elongatis.

Habitat in America meridionali Mus. Hunter.

Antennae obscure pallidae. Elytra punctato striata. Corpus cum pedibus rufum.

*marginatus* 27. C. nigro aeneus elytris flavis: margine nigro.

*Cryptocephalus phaleratus* Act. Hall. I. 216.

Habitat in Germaniae plantis.

Punctum flavum ad os. Elytra flava margine omni nigro.

*pubescens.* 28. C. thorace elytrisque obscure aeneis pubescens tibus.

Habitat in America boreali.

Antennae porrectae, cinereae. Corpus totum pube cinerea tectum. Scutellum nigrum.

29. C. niger nitidus elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis Geoff. Inf. 1. 234.
- Chrysomela 2 punctata Linn. syst. nat. 2. 597.  
78. Sv. 548.
- Degeer Inf. 5. 332. 35.
- Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 8.
- Pet. Gazoph. tab. 31. fig. 4.
- Habitat in Europae Corylo.
30. C. ater nitidus elytris rubris: linea media lineola.  
atra, antennis longitudine corporis.
- Chrysomela bipunctata Fn. Sv. 548. β.
- Habitat in Europae Corylo.
- Nimis affinis C. 2 punctato, cuius forte mera varietas. Differt tantum punctis duobus elytrorum connatis in lineolam latam longitudinali nem basin nec apicem attingentem.
31. C. niger obscurus thorace fulvo, elytris testaceis: punctis duobus nigris. 2 macula-
- Chrysomela melanocephala Act. Hall. 1. 272.
- Habitat in Italia D. Allioni.
- Nimis C. 2 punctato affinis. Differt tantum thorace haud nigro sed fulvo.
32. C. thorace variegato, elytris rubris: punctis cordiger. duobus nigris. Geoff. Inf. 1. 235. 2.
- Chrysomela cordigera Linn. syst. nat. 2. 598.  
Fn. Sv. 588.
- Degeer Inf. 5. 330. 33.
- Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 1.
- Habitat in Europae Corylo, Salice.
- Macula thoracis intermedia interdum cordata.
33. C. ater thorace linea longitudinali rubra. bothnicus.
- Chrysomela bothnica, Linn. syst. nat. 2. 598.  
90. Fn. Sv. 557.
- Herbst Arch. tab. 44. fig. 8.

- — —
- Dégeer Inf. 5. 335. 39.  
Habitat in Suecia.  
Frons inacula quadrata rufa. Pedes flavi.
- frenatus.* 34. C. ater capite thorace pedibusque rufis, thorace punctis duobus nigris.  
Habitat in Austria D. Schneider.  
Affinis praecedenti. Caput rufum margine postico nigro. Thorax rufus maculis duabus posticis nigris. Elytra vix striata, nigra. Pedes rufi femoribus annulo nigro.
- obscurus.* 35. C. niger obscurus pedibus posticis elongatis.  
Chrysomela obscura Mant. Inf. 1. 73. 81. Linn.  
syst. nat. 2. 599. 96.  
Degeer Inf. 5. 336. 40.  
Habitat in Europae plantis.
- Vitis.* 36. C. niger glaber : thorace globose, elytris rufis.  
Geoff. Inf. 1. 232. 2.  
Schaeff. Icon. tab. 86. fig. 6.  
Habitat in Vite vinifera Europae australioris,  
quam misere saepius depascit.
- plagiocephalus.* 37. C. niger thorace elytrisque testaceis, capite crassiuscula.  
Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. Sehestedt.  
Affinis certe C. Coryli, at distinctus. Antennae breves, ferratae, nigrae. Caput crassum, prominens, atrum. Thorax rubro testaceus. Scutellum nigrum. Elytra testacea sutura concolore. Corpus & pedes nigra.  
Variat interdum uti C. Coryli punto parvo humerali, nigro.
- Coryli.* 38. C. niger thorace elytrisque testaceis : sutura nigra.  
Chrysomela Coryli Linn. syst. nat. 2. 598. 88.  
Fn. Sv. 555.

Habitat in Europae Corylo.

Mas thorace nigro, at distinctus a praecedente.

39. C. niger cinereo villosum thorace elytrisque *pallens*, pallidis.

Habitat in China D. Pflug.

Caput atrum fronte cinereo villosa. Thorax & elytra pallida, nitida. Abdomen pube cinerea. Pedes nigri tibiis pallidis & concoloribus.

40. C. niger thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris testaceis. *variegatus*

Habitat in Italia D. Allioni.

Caput nigrum puncto flavo inter antennas. Pedes nigri.

Variat elytris immaculatis & puncto uno altero nigro.

41. C. supra testaceus thorace fascia, elytris tribus *trifasciatus* nigris.

Habitat in China D. Pflug.

Caput nigrum macula magna frontali testacea. Fascia thoracis margines haud attingit & margo posticus niger. Elytra punctato striata fasciis tribus, quarum anteriores margines haud attingunt, tertia apicis. Corpus nigrum.

42. C. niger thorace rufo, elytris testaceis, pedibus anticis elongatis: femoribus apice unidentatis. *ruficollis*.

Habitat in Insula St. Helena Dom. Banks, in Italia Pr. Helwig.

Antennae crassae, valde serratae. Pedes testacei, antici valde elongati femoribus linea dorsali nigra, apice acute dentatis.

Variat elytris immaculatis & nigris bipunctatis.

43. C. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *nigripes*.

Habitat in America.

Antennae nigrae basi rufae. Scutellum nigrum.  
Elytra pallida sutura margineque nigricanti-  
bus. Abdomen pallidum.

*6 punctatus* 44. C. niger thorace variegato, elytris rubris: ma-  
culis tribus nigris.

Chrysomela 6 punctata Linn. syst. nat. 2. 599.  
92. Fn. Sv. 559.

Degeer Ins. 5. 331. 34. tab. 10. fig. 9.

Sulz. Ins. fig. 3. tab. 18.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 3.

Habitat in Europae plantis.

Genicula tibiarum puncto albo notata.

*coeruleus*. 45. C. cyaneus nitidus antennis fuscis.

Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.

Antennae breves, ferratae.

*violaceus*. 46. C. nigro cyaneus antennis pedibusque nigris,  
elytris substriatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino praecedentium. Antennae nullo  
modo ferratae, nigrae. Caput & thorax cya-  
nea, laevia, nitida. Elytra vix striata, ob-  
scurens, immaculata. Pedes nigri.

*cupreus*. 47. C. rubro cupreus nitidus subtus cyaneus.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Corpus supra nitidum, subtus magis obscurum.

*rubrifrons*. 48. C. cyaneus nitidus fronte thoracis fascia femo-  
ribusque rubris.

Habitat — — Prof. Lefke.

Antennae fuscae basi rufae.

*calcaratus*. 49. C. violaceus capite thorace femoribusque den-  
tatis rufis.

Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.

Caput rufum ore antennisque nigris. Thorax  
valde globosus. Elytra striata. Pedes violacei

- femoribus dente acuto notatis, rufis basi apice-  
que nigris.
50. C. obscure cyaneus tibiis posticis apice lobatis. *lobatus.*  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Medius. Antennae nigrae basi testaceae. Caput  
& thorax cyanea, obscure nitida. Elytra ob-  
scuriora. Tibiae posticae apice lamina parva,  
quadrata auctae.
51. C. cyaneus aut viridis nitidus pedibus rufis. *rufipes.*  
Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.  
Statura omnino sequentis, ut supra cyaneus aut  
viridis, immaculatus pedibus solis rufis.
52. C. cyaneus thorace pedibusque rufis. *cyaneus.*  
Melolontha Geoff. Inf. I. 197. 4.  
Habitat in Gallia Dom. Mallet.
53. C. capite thoraceque rufis, elytris nigris: mar- *cinctus.*  
gine rufo.  
Habitat in America meridionali D. Hunter.  
Antennae fuscae basi rufae. Elytra striato  
punctata, nigra margine exteriori late rufo.  
Pedes rufi geniculis nigris.
54. C. cyaneus ore thoracis marginibus pedibus *bucephalus*  
que rubris.  
Chrysomela bucephala Act. Hall. I. 276.  
Habitat in Anthylli vulneraria Saxoniae.  
Maxillae in altero sexu incrassatae, forcipatae,  
rufae, apice nigrae.
55. C. cyaneus nitidus thoracis lateribus elytro- *collaris.*  
rum apicibus femoribusque rubris.  
Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.  
Antennae basi rufae. Corpus nigrum. Pedes  
nigri femoribus rufis.
56. C. viridi coeruleus antennis nigris Geoff. Inf. I. *sericeus.*  
233. Oliv. Inf. 96. tab. I. fig. 5.

*Chrysomela sericea* Linn. syst. nat. 2. 598 86.

Fn. Sv. 554.

Degeer Inf. 5. 334. 37.

Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 2. 3. 5.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 13.

Habitat in Europae Salicibus.

Variat corpore toto aureo.

*Chrysomela Hypochaeridis* Linn. vix differt,  
quamvis duplo fere major.

*nitens.* 57. *C. viridis nitens* ore pedibusque testaceis.

*Chrysomela nitens* Linn. syst. nat. 2. 598. 84.

Fn. Sv. 551.

Degeer Inf. 5. 334. 38.

Habitat in Europae Corylo.

*glabratus.* 58. *C. violaceus thorace elytrisque aeneis, anten-*  
*nis fuscis.*

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Caput aeneum fronte canaliculata. Antennae  
fuscæ basi ferrugineæ. Elytra laevissima.

Subtus totus violaceus.

*vittatus.* 59. *C. niger elytris margine striaque abbreviata*  
*flavis.* Geoff. Inf. 1. 233. 4. Schaeff. Icon.  
tab. 77. fig. 8.

Herbst. Arch. tab. 23. fig. 23.

*Cryptocephalus quadrum ater elytris flavis:*  
*vitta media abbreviata atra,* Mant. Inf. 1. 82.  
46. mera hujus varietas.

Habitat in Europae australioris graminosis.

*limbatus.* 60. *C. ferrugineus thorace rufo, elytrorum satu-*  
*ris cyaneo nitidis.*

Habitat Cajennæ D. Schulz.

Elytrorum margines omnes cyanei, nitidi.

*nitidulus.* 61. *C. thorace aeneo nitido, elytris cyaneis, capite*  
*antennarum basi pedibusque flavis.*

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

**Caput basi parum aeneum.** Antennae nigrae basi flavescentes. Elytra subpunctata. Corpus nigrum. Pedes flavi femoribus linea nigra.

62. C. ater nitidus ore pedibus basique antennarum *labiatus*, lutescentibus..

Chrysomela labiata Linn. syst. nat. 2. 598. 87.

Fn. Sv. 553.

Habitat in Europae Rosis.

63. C. violaceus nitidus ore pubescente, anten- *flavilabris*. nis pedibusque nigris.

Cryptocephalus parvulus Myll. Prod. 519.

Habitat in Saxoniae Betula Dom. Schaller.

Elytra striato punctata. Antennae nigrae basi lutescentes.

Larva saccata: facco antice oblique truncato. *flavipes*.

64. C. ater nitidus capite pedibusque luteis,

Cryptocephalus paracenthesis Schrank.

Habitat in Italia D. Allioni.

Margo elytrorum basi flavus. Pedes omnes flavi.

65. C. coeruleo ater nitidus fronte pedibusque *flavifrons*, flavis.

Habitat Kiliae.

Affinis certe praecedenti at distinctus & paullo minor. Antennae corporis longitudine, nigrae, basi flavae. Caput coeruleo atrum fronte inter antennas flava. Thorax laevis, nitidus, coeruleo ater. Elytra coeruleo atra, immaculata, vix striata. Pedes flavi, interdum nigri anticis tantum flavis.

66. C. niger capite elytrorum apicibus pedibusque *Hübneri*, flavis.

Habitat in Germania Dom. Hübner.

Statura praecedentium. Antennae nigrae, basi flavae. Caput flavum margine postico nigro, in medio dentem emittente. Thorax laevis,

ater, nitidus. Elytra crenato striata, nigra, apice late flava. Corpus nigrum pedibus omnibus flavis.

*Moraei.* 67. C. ater elytris maculis duabus flavis marginatis Geoff. Inf. 1. 234. 5.

Chrysomela Moraei Linn. syst. nat. 2. 597. 82.

Fn. Sv. 550.

Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 7. tab. 238. fig. 5.

Habitat in Europae Hypericis.

*guttatus.* 68. C. ater elytris maculis quatuor flavis.

Habitat in Saxoniae Fraxino D. Hybner.

Caput atrum fronte flavo maculata. Thorax margine antico flavo. Elytra punctata macula prima baseos, duabus in medio & quarta ad apicem. Pedes nigri anticis flavis.

*15 guttatus.* 69. C. rufus thorace maculis tribus, elytris sex flavis.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae, basi flavescentes. Caput rufum fronte flava. Maculae thoracis laterales majores, sublunares, elytrorum per paria dispositae. Femora antica puncto flavo.

*10 punctatus* 70. C. thorace testaceo: vitta marginali atra, co-leoptris flavis: punctis decem nigris.

Cryptcephalus hieroglyphicus. Herbst Arch. tab. 23. fig. 26.

Chrysomela 10 maculata Linn. syst. nat. 2. 599. 93. Fn. Sv. 560.

Habitat in Europa.

Puncta elytrorum 2. 2. 1. omnino distincta.

Caput testaceum margine postico atro. Margo thoracis ipse testaceus at vitta lata atra. Pedes flavi femoribus posticis nigris.

*hieroglyphicus.* 71. C. thorace flavo: punctis nigris quinque, co-leoptris flavis: punctis nigris decem.

**Cryptocephalus hieroglyphicus** Laich Tyrol.

Habitat in Italia D. Allioni.

Affinis praecedenti at distinctus. Caput flavum linea frontali margineque postico nigris. Thorax flavus punctis quinque subcontiguis nigris. Elytra substriata punctis quinque 2. 2. 1. postico fere interiori connato. Corpus nigrum. Pedes flavi tibiis posticis nigris.

72. C. thorace fulvo: punctis duobus, elytris testaceis: punctis quinque nigris. *12 punctatus.*

Habitat in Germania Dom. de Loewenskiold.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae nigrae basi fulvae. Caput fulvum oculis magnis nigris. Thorax fulvus punctis duobus dorsibus nigris. Elytra, vix striata pallide testacea punctis quinque nigris 2. 2. 1. Pedes flavescentes plantis nigris.

73. C. cyaneus elytris apice pedibusque fulvis. *haemorrhoidalis.*

Schaeff. Icon. tab. 77. fig. 7.

Ross. Fn. Etr. 1. 97. 247.  $\beta$ .

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe C. 2. pustulato at distinctus videatur. Differt colore cyaneo, antennarum basi pedibusque fulvis.

74. C. ater elytris macula apicis rufa. *2 pustulatus.*

**Cryptocephalus Podae** Laich. Tyrol. 197. 7.

Herbst Arch. tab. 44. fig. 6.

Habitat in Chrysanthemo coronario.

Elytra striata.

75. C. rufus thorace maculis duabus, elytris fasciis 2 *fasciatus* duabus nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.

Caput rufum oculis reniformibus, fuscis. Elytra punctato striata fascia baseos alteraque pone medium nigris.

- 4pustulatus* 76. *C. niger* elytris laevibus rufo biñmaculatis.  
*Chrysomela 4 pustulata* Linn. syst. nat. 2. 597.  
 80. Fn. Sv. 549.  
 Habitat in Suecia.  
 Maculae elytrorum remotae, altera major ad basin, altera minor ad apicem.
- notatus.* 77. *C. niger* elytris punctato striatis: fascia puncto-que apicis testaceis.  
 Habitat in America Mus. D. Hunter.  
 Fascia elytrorum ad basin lata ad marginem exteriorem extenditur.
- hifrio* 78. *C. niger*, thorace elytrisque ferrugineo variis, pedibus ferrugineis: geniculis nigris.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 98. 249.  
 Habitat in Italia D. Allioni.  
 Caput nigrum orbita oculorum rufa. Thorax niger margine lineolisque tribus abbreviatis ferrugineis. Elytra punctata, nigra maculis apiceque ferrugineis. Pedes ferruginei geniculis femorumque posticorum fascia fuscis.
- scopolinus.* 79. *C. niger* thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus cyaneis, pedibus nigris.  
*Chrysomela Scopolina* Linn. syst. nat. 2. 597. 81.  
 Panz Naturf. 24. 17. 23. tab. 1. fig. 23.  
 Habitat in America, Europa australi.  
 Fasciae elytrorum nec suturam nec marginem attingunt.
- Koenigii.* 80. *C. rufus* elytris punctis duobus coerulescentibus.  
 Habitat Tranquebariae D. Koenig.  
 Statuta & magnitudo omnino praecedentis. Pedes rufi femoribus nigris.
- paracenthe-* 81. *C. elytris flavis*: lineola punctisque tribus nigris.  
*sis.* *Chrysomela paracenthesis* Linn. syst. nat. 2. 1966. 1.  
 Habitat in Europae Salice, Betula.

Supra flavus thorace nigro variegato. Pedes antici elongati.

82. C. aeneus nitidus fronte cuprea. *Hordei.*  
 Habitat in Barbariae Hordeo murino Prof. Vahl.  
 Antennae ferratae, nigrae. Caput grande fronte late cuprea. Pedes antici elongati.
83. C. viridi aeneus nitidus antennis basi flavescentibus, fronte impressa. *concolor.*  
 Habitat in Europa.  
 Corpus parvum, viridi aeneum, nitidulum, antennis solis basi flavescentibus. Frons impressa. Pedes concolores.
84. C. testaceus elytris vage punctatis pallidis, antennis fuscis. *Pini.*  
 Chrysomela Pini Linn. sylt. nat. 2. 598. 89.  
 Fn. Sv. 556.  
 Habitat in Sueciae Pino.
85. C. thorace elytrisque albis testaceo reticulatis. *reticulatus.*  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Caput testaceum orbita oculorum alba. Thorax albus lineolis quatuor testaceis, quarum laterales antice intermediae postice coeunt. Laterales praeterea postice dilatatae puncto albo. Elytra alba, testaceo reticulata. Pectus nigrum. Abdomen & pedes flavescentes.
86. C. thorace fulvo, elytris striatis testaceis nigro *pusillus.*  
 maculatis.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 100. 255.  
 Habitat Hamburgi D. Schulz.  
 Duplo minor C. Pini. Caput fulvum antennis pallidis oculisque nigris. Thorax fuscus, immaculatus. Elytra substriata, testacea punctis duobus baseos fasciaque postica nigris. Corpus nigrum. Pedes pallidi.

- — —
- Variant maculae elytrorum, interdum confluunt,  
interdum omnino desunt.
- minutus.* 87. C. thorace fulvo, elytris striatis testaceis im-  
maculatis.  
Habitat Kiliae.  
Statura & summa affinitas C. pusilli. Antennae  
testaceae, apice fuscae. Caput fulvum margine  
postico tenuissime nigro. Thorax fulvus, nitidus,  
immaculatus. Elytra striata, testacea,  
immaculata. Corpus nigrum pedibus testaceis.
- gracilis.* 88. C. ater capite thoraceque fulvis, elytris linea  
marginali baseos alba.  
Cryptocephalus Geoff. Inf. 1. 237. 11.  
Habitat Parisis Mus. Dom. Bosc.  
Parvus. Antennae nigrae basi rufae. Caput &  
thorax rufa, immaculata. Elytra striata, atra  
lineola baseos marginali alba. Pedes rufi.
- pygmaeus.* 89. C. ater nitidus elytris testaceis: sutura nigra.  
Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
Minutus. Antennae nigrae basi flavae. Caput  
nigrum fronte flava. Thorax margine antico  
& laterali flavo. Elytra striata, testacea puncto  
calloso baseos suturaque atris. Corpus atrum  
pedibus flavis.
57. HISPA. *Palpi* aequales, medio cras-  
fiores, filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Labium* corneum, integrum.  
*Antennae* cylindricae.
- atra.* 1. H. antennis fusiformibus, thorace elytrisque spi-  
nosis. Linn. syst. nat. 2. 603. 1.  
Crioceris tota atra Geoff. Inf. 1. 243. 7.  
Act. Societ. Berol. nat. Cur. 4. tab. 7. fig. 6.

Ross. Fn. Etr. 52. 129.

Habitat in Europa australiori ad radices graminum.

2. H. antennis fusiformibus, corpore testaceo, antennis oculisque nigris. Linn. syst. nat. 2.

603. 2.

Ross. Fn. Etr. 52. 128.

Habitat in Africa.

Thorax spinis lateralibus, elytra spinis sparsis, omnia nigris.

3. H. antennis serratis hirta atra, elytris macula baseos rufa, pustulata.

Habitat in Italia D. Allioni.

Corpus minus atrum, nitidum pilis erectis nigris.

Macula magna rufa, marginalis ad basin elytrorum.

4. H. antennis pilosis nigra elytris striatis. Linn. mucicæ syst. nat. 2. 604. 4.

Dermestes clavicornis Linn. Fn. Sv. 413.

Degeer Ins. 5. 47. tab. 3. fig. 1.

Habitat in Europæ quisquiliis, Muscis.

5. H. antennis fusiformibus, thorace elytrorumque basi sanguineis, elytris ferratis. Linn. Mant. collis.

I. 530.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Hispaæ corpus oblongum, immarginatum, tardum, parvum, capite ovato, inserto, antennis, approximatis & fere connatis, inter oculos insertis longitudine thoracis, oculis oblongis, magnis, lateralibus, thorace brevi, rorundato, scutello triangulo, elytris rigidis longitudine abdominis, saepius aculeatis aut apice dentatis, pedibus brevibus, validis, rotundatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario, minus nitido.

Elytra apice ferrata striis tribus elevatis spatio interjecto punctato nigra basi rufa.

Variat rarius elytris basi nigris.

- ferrata.* 6. H. antennis fusiformibus nigra elytris rufescen-tibus apice ferratis, nigris.

Habitat Surinami Mus. D. Hunter.

Thorax niger lateribus rufis. Elytra striata, rufa apice nigra, valde ferrata.

- dentata.* 7. H. antennis fusiformibus nigra thoracis margine elytrorum ferratorum macula baseos fasciaque media flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Caput cum antennis nigrum. Thorax niger late-ribus late flavis. Elytra ferrata denticulis duobus porrectis longioribus, sulcata, nigra macula baseos suturam haud attingente fasciaque media flavis. Pectus & abdominis basis flava.

- angulata.* 8. H. antennis fusiformibus flava capite thoracis linea dorsali elytrorumque margine sinuato nigris.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput cum antennis nigrum. Thorax flavus linea dorsali nigra. Elytra sulcata, flava margine sinuato, nigro & in hoc margine pone medium punctum flavum, apice truncata, dentata, dente exteriori majori, validiori angulata. Corpus subtus ferrugineum.

- emarginata.* 9. H. antennis fusiformibus nigra elytris basi ma-cula rufa apice bidentatis.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Statura & magnitudo omniq[ue] praecedentium. Caput rufum oculis globosis, prominulis antep-

nisque nigris. Thorax niger. Elytra striis tribus elevatis postice coeuntibus: fulcis transverse striatis, nigra basi macula oblonga ferruginea, apice obtusa, bidentata. Corpus subitus pallescens. Pedes nigri femoribus basi pallidis.

10. H. antennis basi compressis ferratis nigra *serraticornis* thoracis margine elytrisque macula baseos *nis.*  
flavis.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Affinis certe H. emarginatae. Antennae nigrae articulis quinque baseos compressis, ferratis, reliquis fusiformibus. Caput albidum vertice nigro. Thorax niger lateribus flavis, antice unidentatus. Elytra sulcata lineaque elevata unica in medio, macula baseos rufa, apice tridentata dente intermedio majori, rotundato, ferrato. Pectus femorumque basis alba.

11. H. antennis — — — ferruginea thoracis *bidens.*  
linea laterali nigra, elytris apice unidentatis.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Statura praecedentum. Antennae desunt. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax ferrugineus linea laterali nigra. Elytra sulcata: fulcis duplii serie punctatis, ferruginea linea laterali nigra terminantur dente valido, acuto, marginali, incurvo, atro. Corpus ferrugineum.

12. H. glabra coccinea antennis nigris. *nigricornisi.*

Habitat ad Cap. Bon. spei D. Paykull.

Statura praecedentium at tota glabra, laevis, coccinea antennis solis cylindricis, nigris.

58. DRYOPS. *Palpi* quatuor inaequales.*antici* securiformes.*postici* filiformes.*Labium* membranaceum,  
late emarginatum.*Antennae* filiformes.*femorata.* 1. D. livida fronte maculisque duabus thoraciis atris,  
femoribus posticis incrassatis.

Dryops femorata Oliv. Inf. 2. tab. fig.

Habitat in Helvetia Mus. Dom. Olivier.

Statura & magnitudo omnino D. lividae, at  
distincta. Caput lividum macula magna inter  
antennas atra. Thorax lividus maculis duabus  
magnis fere totum dorsum occupantibus atris.  
Elytra laevia, livida, immaculata. Corpus fuscum  
ano livido. Pedes lividi femoribus posticis in-  
crassatis macula magna fusca.Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales,  
antici longiores, quadriarticulati: articulo primo  
brevi, rotundato, secundo tertioque obconicis,  
ultimo subsecuriformi adhaerentes maxillae  
dorso. Postici triarticulati: articulo primo &  
secundo obconicis, ultimo truncato, obtuso ad-  
nati labii inferioris medio. Mandibula cornea  
arcuata, apice fissa. Maxilla membranacea, cy-

Dryops corpus elongatum, cylindricum, laeve,  
vix tomentosum, immarginatum, agile, capite ovato,  
inserto, ore palpique prominulis, oculis magnis,  
globosis, lateralibus, antennis distantibus, sub ocu-  
lis insertis, corpore brevioribus, thorace subcylin-  
drico, scutello brevi, rotundato, elytris rigidiuscu-  
lis, longitudine abdominis, pedibus longiusculis, te-  
nuibus, curvioribus, tarsis quadriarticulatis, colore  
vario, subnitidulo.

*lindrica*, unidentata. Labium elongatum, membranaceum, apice late emarginatum. Antennae filiformes articulis cylindricis. In reliquis speciebus palpi antici magis securiformes.

2. D. obscure aenea immaculata. *aenea.*  
*Lagria aenea* Mant. Inf. I. 93. 1.  
*Dryops aenea* Oliv. Inf. 2. tab. fig.  
 Habitat in Americae Insulis Mus. Dom. Banks.  
 Corpus magnum, oblongum. Antennae filiformes, nigrae articulis obconicis. Thorax & elytra obscure aenea, minime nitida.
3. D. livida oculis nigris. *livida.*  
*Dryops livida* Oliv. Inf. 2. tab. fig.  
*Lagria livida* Mant. Inf. I. 93. 2.  
 Habitat in Otaheite maris australis Mus. Dom. Banks.  
 Statura & magnitudo praecedentis. Antennae filiformes, lividae longitudine corporis. Thorax & elytra laevia, glabra, livida, immaculata. Pedes lividi.
4. D. livida thorace lineis, elytris vitta fusca. *lineata.*  
*Dryops lineata* Oliv. Inf. 2. tab. fig.  
*Lagria lineata* Mant. Inf. I. 93. 3.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae filiformes, lividae. Caput macula frontali fusca. Thorax subcylindricus lineis tribus fuscis. Elytra laevia, glabra, livida vitta lata fusca, quae tamen apicem haud attingit. Subtus livida.
5. D. coerulea antennis fuscis. *cyanea.*  
*Dryops cyanea* Oliv. Inf. 2. tab. fig.  
*Lagria cyanea* Mant. Inf. I. 93. 4.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Duplo minor D. livida. Antennae longae, filiformes, fuscae. Corpus glabrum, obscure cyanum. Anus stylis duobus, validis, acutis. Femora postica crassiora, incurva.

*marginata.* 6. D. rufa elytris fuscis : marginibus lineaque media rufis.

Dryops marginata Oliv. Inf. 2. tab. fig.

Lagria marginata Mant. Inf. 1. 93. 5.

Habitat in America meridionali Mus. D. Hunter.

Duplo major L. vittata. Caput rufum antennis nigris oculisque globosis, coerulecentibus. Thorax glaber, rufus, immaculatus. Scutellum rufum. Elytra laevia, fusca margine omni lineaque media nec basin, nec apicem attingente rufis. Pedes nigri femoribus rufis.

*vittata.* 7. D. rufa elytris vitta abdominalisque apice fuscis.

Lagria vittata. Mant. Inf. 1. 93. 6.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Caput cum antennis rufum oculis nigris. Thorax rotundatus, rufus, immaculatus. Elytra rufescens vitta lata fusca vel potius fusca margine omni rufescente. Abdomen rufum apice fuscum. Pedes rufi.

*rufifrons.* 8. D. cyanea capite thoraceque rufis.

Lagria rufifrons Mant. Inf. 1. 93. 7.

Habitat in America boreali.

Antennae longitudine fere corporis fuscae, apice rufescentes. Caput rufum oculis magnis nigris. Palpi exserti, securiformes, fusci clava rufa. Thorax cylindricus, rufus. Elytra striata, cyanea. Pedes cyanei femoribus anticis rufis.

**59. TILLUS.** *Palpi* quatuor inaequales.  
*antici* filiformes.  
*postici* securiformes.  
*Labium* membranaceum, in-  
ter palpos porrectum, in-  
tegrum.  
*Antennae* ferratae.

**T.** ater thorace villoso rufo. *elongatus.*

*Tillus elongatus* Oliv. Inf. 2. 22. 4. 1. t. 1. f. 1.

*Lagria elongata* Mant. Inf. 1. 93. 8.

*Chrysomela elongata* atra thorace rubro subvil-  
loso. Linn. syst. nat. 2. 603. 1. 22.

Habitat in Europa, Anglia.

Genus Notoxo affine videtur. Os palpis maxillis-  
que. Palpi quatuor inaequales, antici breves,  
quadriarticulati: articulo ultimo paulo longiori,  
obtuso adhaerentes maxillae dorso. Postici bre-  
ves, triarticulati: articulo primo secundoque  
rotundatis, tertio majori clava securiformi, trun-  
cata adnati labii medio. Mandibula brevis, cor-  
nea, arcuata, acuta, edentula. Maxilla brevis,  
membranacea, bifida: laciniis rotundatis, sub-  
aequalibus. Labium breve, membranaceum, inter  
palpos prominens, rotundatum, integrum, An-  
tennae ferratae.

Tilli corpus cylindricum, hirtum, immarginatum,  
tardum, capite thoracis latitudine, globosum, inser-  
tum, oculis reniformibus, lateralibus, antennis distan-  
tiibus, sub oculis insertis, longitudine thoracis, tho-  
race cylindrico, angusto, scutello brevissimo, rotun-  
dato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdomi-  
nis, pedibus longiusculis, tenuibus, tarsis quinque-  
articulatis, colore nitidiusculo.

- ambulans.* 2. *T. glaber ater elytris punctatis.*  
*Lagria ambulans* Mant. Inf. 1. 93. 9.  
*Habitat in Germania Dom. Schneider.*  
*Summa affinitas praecedentis at thorax corpore*  
*concolor, ater. Elytra glabra, nitida, punctata.*  
*Antennae ferratae.*
- serraticorn-* 3. *T. ater elytris testaceis.*  
*Tillus serraticornis ater, elytris, testaceis, an-*  
*tennarum articulis ultimis tribus serratis.* Oliv.  
*Inf. 2. 22. 4. 2. tab. 1. fig. 2.*  
*Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.*  
*Minor T. elongato. Antennae porrectae ulti-*  
*mis tribus articulis majoribus valde ferratis.*  
*Caput & thorax villosa, rotundata, atra, im-*  
*maculata. Elytra villosa, testacea. Corpus*  
*atrum.*

## 60. LAGRIA. *Palpi quatuor inaequales.*

*antici securiformes.*

*postici extorsum crassiores.*

*Labium membranaceum,*  
*integrum.*

*Antennae filiformes.*

- tuberculata.* 1. *L. ovata glabra atra elytris tuberculatis.*

*Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.*

*Omnino distincta tuberculis elytrorum numero-*  
*sis, elevatis, obtusis.*

Lagriae corpus oblongum, hirtum, immarginatum,  
tardum, capite ovato, inserto, oculis oblongis, late-  
ralibus, antennis distantibus, sub oculis insertis,  
longitudine thoracis, thorace rotundato, scutello  
parvo orbiculato, elytris fornicatis, interdum mol-  
liusculis, longitudine abdominis, pedibus tenuibus,  
cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

- 2.** L. *villosa* *atra* thorace elytrisque viridibus. *villosa*.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Affinis certe L. *pubescens* at thorax & elytra  
 viridia. Abdomen & pedes atra.
- 3.** L. *nigra* *villosa* thorace tereti: puncto medio *pubescens*.  
 impresso, elytris testaceis.  
 Chrysomela *pubescens* Linn. syst. nat. 2.  
 603. 122.  
 Habitat in Europa.
- 4.** L. *villosa nigra* thorace tereti, elytris pallidis. *hirta*.  
 Chrysomela *hirta* Linn. syst. nat. 2. 602. 119.  
 Fn. Sv. 578.  
 Tenebrio alatus. Degeer Inf. 5. 44. 6. tab. 2.  
 fig. 23. 24.  
 Habitat in Europae Soponariis Dom. Lund.
- 5.** L. *villosa cyanea* elytris lineis elevatis tribus, *abdomina*  
*abdomine rufo*. *lis*,  
 Melyris *abdominalis* Oliv. Inf. 21. 4. 2. tab. 1.  
 fig. 7.  
 Habitat in India Dom. Daldorff.  
 Caput & thorax *villosa*, obscure *cyanea*. Elytra  
*villosa*, magis nitida. Abdomen rufum. Femora  
*cyanea*.
- 6.** L. *villosa cyanea* *abdomine* femoribusque rufis. *tomentosa*.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae rufescentes, apice fuscae. Caput &  
 thorax obscure *cyanea*. Elytra paullo dilutiora.  
 Abdomen rufum. Pedes nigri femoribus rufis.  
 Variat elytris fuscis.
- 7.** L. *villosa cuprea* elytris nigris. *obscura*.  
 Habitat in Guinea D. Isert.  
 Statura praecedentium. Antennae nigrae. Caput  
 & thorax *villosa*, obscure *cuprea*. Elytra nigra.  
 Corpus nigro *cyaneum*, nitidum pedibus nigris.

- lugubris.*      8. L. glabra ferruginea capite thoraceque obscurioribus, antennis apice nigris.  
 Habitat in Guinea D. Isert.  
 Statura omnino praecedentium. Antennae ferrugineae apice nigrae. Caput & thorax fusca, obscura, minime nitida. Elytra glabra, laevia, ferruginea. Corpus ferrugineum.
- scutellaris.*    9. L. nigra cinereo hirta scutello albo.  
 Habitat in Hispania Dom. Prof. Vahl.  
 Corpus totum pilis densis cinereis hirtum & scutellum omnino album.
- atra.*            10. L. antennis serratis hirta atra.  
 Dermestes hirtus Linn. syst. nat. 2. 563. 14.  
 Melyris atra Oliv. Inf. 21. tab. 2. fig. 8.  
 Habitat in Europae australioris Tritico.  
 Alter sexus tibiis posticis unco valido, incurvo, acuto.
- nigra.*           11. L. pilosa nigra elytris laeviusculis.  
 Melyris villosus Oliv. Inf. 21. tab. 2. fig. 10.  
 Habitat in Europae floribus.
- lineata.*        12. L. pilosa nigra elytris lineis sesquitertiis rufis.  
 Melyris lineata Oliv. Inf. 21. tab. 1. fig. 6.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Caput & thorax pilosa, nigra aeneo paullo mixta.  
 Elytra mollia, nigra margine exteriori, linea basi flexuosa, ad futuram, quae apicem haud attingit & lineola in disco abbreviata rufis.  
 Pedes nigri.
- flavipes.*       13. L. villosa nigricans antennarum basi pedibusque testaceis.  
 Habitat Hamburgi D. Schulz.  
 Antennae nigrae basi testaceae. Caput inflexum.  
 Elytra villosa, nigra, parum virescentia, Pedes omnes testacei.

14. *L. subvillosa cyanea antennis nigris.* *coerulea.*  
*Melyris cyanea Oliv.* Inf. 21. 8. 8. tab. 2. fig. 9.  
*Cicindela viridi coerulea Geoff.* Inf. 1. 177. 14.  
 Habitat in Europa australiori.  
 Statura & magnitudo omnino *L. nigrae.*
15. *L. antennis ferratis hirta obscure aenea.* *metallica.*  
 Habitat in *Barbariae floribus compositis frequens*  
 Dom. Prof. Vahl.  
*Affinis L. atrae at minor, tota hirta, obscure*  
*aenea, nitida. Pedes & antennae atrae.*
16. *L. antennis ferratis hirta aenea nitida antennis nigricornis*  
*nigris, tibiis testaceis.*  
 Habitat in *Suecia Dom. de Paykull.*  
*Statura omnino praecedentis, at tamen distincta*  
*videtur tota laete aenea, nitida. Antennae*  
*nigrae. Pedes testacei femoribus nigris.*
17. *L. subvillosa nigra thorace elytrisque cyaneis.* *minuta.*  
*Anobium minutum Sp.* Inf. 1. 72. 8.  
 Habitat in *nova Zelandia Mus. Dom. Banks.*  
*Statura omnino *L. cyaneae* at duplo minor &*  
*corpus nigrum.*  
 Variat interdum *elytris virescentibus.*

61. CEROCOMA. *Palpi* aequales, filiformes.

*Maxilla linearis, integrata.*

*Labium membranaceum, bifidum.*

*Antennae moniliformes, irregulares.*

1. *C. viridis* *antennis pedibusque luteis.* *Schaefferi.*  
*Meloe Schaefferi Linn. syst. nat. 2. 681. 12.*

- Cerocoma Geoff. Inf. 1. 358. 1.  
 Schaeff. Elem. tab. 37.  
 Icon. tab. 53. fig. 8. 9.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 13.  
 Habitat in Europa australi.  
 Maris tibiae tarsique dilatatae, appendiculatae.
- Vahlii.* 2. C. viridis antennis pedibusque nigris.  
 Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Vahl.  
 Nimis praecedenti affinis & forte mera ejus varietas. Abdominis basis rufescens.
- Schreberi.* 3. C. viridis antennis pedibus abdominisque segmentis tribus flavis.  
 Habitat in Europa australi Dom. Schreber.  
 Nimis praecedentibus affinis at duplo fere major.  
 Antennae irregulares, flavae.
- microcephala.* 4. C. antennis biarticulatis: clava irregulari dentata maxima, corpore fusco.  
 Paussus microcephalus. Linn. Diss. Big. Inf. tab. 1. fig. 6. 10.  
 Paussus microcephalus. Thunb. Act. Sv. 1781. 170. 1.  
 Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.  
 Ad ulteriore examinationem hic in sero insectum singulare, proprium genus ut videtur constitutus, mihi haud rite notum.
- lineata.* 5. C. antennis biarticulatis: clava elongata integra, fusca elytris linea nigra.

---

Cerocomae corpus oblongum, laeve, pubescens immarginatum, tardum, capite ovato, prominulo, infexo, oculis lateralibus, ovatis, antennis approximatis, thorace brevioribus, thorace brevi, ovato, supra plano, scutello brevissimo, rotundato, elytris incumbentibus, molliusculis, longitudine abdominalis, pedibus longiusculis, tenuibus, cursoriis, tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis, colore aeneo, nitido.

*Paussus lineatus.* Thunb. Act. Sv. 1781. 170. 3.

tab. I. fig. 4. 5.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Eiusdem generis videtur mihi haud rite nota.

6. *C. antennis biarticulatis: clava elongata integra, ruficollis,*  
nigra thorace elytrorumque striga ferrugineis.

Habitat — — Dom. Lund.

Parva statura praecedentium & ejusdem generis  
videtur. Antennae magnae, clavatae, irregu-  
lares, ferrugineae. Caput nigrum. Thorax  
laevis, ferrugineus, immaculatus. Elytra nigra  
striga media margineque omni a striga ad api-  
cem ferrugineis. Pedes nigri.

62. *LYTTA:* *Palpi quatuor inaequales,*  
*postici clavati.*

*Maxilla bifida.*

*Labium truncatum.*

*Antennae filiformes.*

1. *L. viridis antennis nigris.*

*ruficollis.*

Meloe vesicatorius. Linn. syst. nat. 2. 679. 3.

Fn. Sv. 827.

Cantharis vesicatoria Oliv. Inf. 46. tab. I. fig. I.

Geoff. Inf. I. 341. I. tab. 6. fig. 5.

Degeer Inf. 4. 12. 2. tab. I. fig. 9.

Lyttae corpus oblongum, laeve, glabriuscum,  
immarginatum, tardum, capite magno, exerto, ovato;  
thorace latiore, oculis lateralibus, rotundatis, anten-  
nis distantibus, in oculorum cantho interiori insertis,  
thorace longioribus, thorace subcylindrico, scutello  
minuto, elytris molliusculis, fornicatis, longitudine  
abdominis, pedibus elongatis, tenuibus, curvoriis,  
tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis, co-  
lore vario, nitidulo.



Schaeff. Icon. tab. 47. fig. 1.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 55.  
 Habitat in Europae Ligistro, Fraxino, Sambuco.  
 Officinalis pro vesicatoriis.

*segetum.*

2. L. aurea elytris viridibus.

Habitat in Barbariae Segete Mus. D. Desfontaines.  
 Statura omnino & summa affinitas praecedentis  
 at duplo minor & distincta. Antennae nigrae.  
 Caput & thorax mox aurea, mox viridi aenea,  
 auro nitentia. Elytra viridia. Corpus semper  
 aureum pedibus obscurioribus.  
 Variat corpore toto cyaneo.  
 Odorem nullum spargit.

*nitidula.*

3. L. viridi aenea elytris testaceis.

Habitat ad Cap. Bon. spei.  
 Minor L. vesicatoria. Antennae nigrae.

*collaris.*

4. L. atra vertice thorace pedibusque ferrugineis,  
 elytris cyaneis.

Habitat in Rossia meridionali Dom. Boeber.  
 Magna. Antennae ferrugineae. Caput nigrum  
 fronte margineque ferrugineis. Thorax ferru-  
 gineus margine omni parum nigro. Elytra cya-  
 nea, obscure nitida. Corpus atrum pedibus fer-  
 rugineis.

Mas faemina duplo minor.

*gigas.*

5. L. cyanea pectore ferrugineo.

Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 9.

Habitat in Guinea D. Isert.

Corpus statura & magnitudine L. vesicatoriae  
 totum obscure cyaneum pectore solo ferrugi-  
 neo. Alter sexus elytris substriatis, alter lae-  
 vibus.

*syriaca.*

6. L. villosa viridi coerulea thorace rotundato fer-  
 rugineo.

- Meloe syriacus. Linn. syst. nat. 2. 680. 4. Mus.  
Lud. Ulr. 102.
- Cantharis syriaca. Oliv. Inf. 46. tab. I. fig. 5.  
Herbst Arch. tab. 30. fig. 1.  
Habitat in Europa australiori frequens.
7. L. glabra viridi aurea thorace antice attenuato *ruficollis*.  
rufo.
- Cantharis ruficollis. Oliv. Inf. 46. tab. I. fig. 6.  
Pallas Inf. 3. tab. E. fig. 35.  
Herbst Arch. tab. 48. fig. 4.  
Habitat in India orientali Mus. D. Olivier.  
Distincta a praecedente minor, mox aurea, mox  
viridi aenea, nitida, thorace semper antice at-  
tenuato, rufo.
8. L. supra testacea elytris macula magna oblonga *testacea*.  
apicis nigra.  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.  
Caput testaceum ore antennisque nigris. Tho-  
rax punctatus, testaceus. Elytra laevia, testa-  
cea macula magna oblonga, nigra. Corpus  
atrum.
9. L. viridi aenea nitida elytris testaceis: maculis *festiva*.  
viridi aeneis.  
Meloe festiva. Pall. Iter. 2. 721. 54.  
Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.  
Corpus totum viridi aeneum, immaculatum.  
Maculae elytrorum aeneae variant.
10. L. atra elytrorum marginibus cinerascentibus. *marginata*.  
Meloe cinereus Forst. nov. sp. Cent. I. 62. 62.  
Cantharis marginata. Oliv. Inf. 46. tab. I. f. 2.  
Habitat ad Cap. Bon. spei.  
L. vesicatoria minor, supra tota atra, opaca.  
Subtus & margo exterior elytrorum pubescens,  
cinereus.

- vittata.*      11. *L. elytris nigris : vitta marginibusque flavis.*  
                   Cantharis vittata. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 3.  
                   Pall. Inf. tab. E. fig. 53.  
                   Habitat in America Mus. D. Hunter.  
                   Affinis praecedenti. Caput flavescens vertice  
                   maculis duabus nigris. Thorax niger lineis  
                   tribus flavis. Elytra nigra margine omni vitta-  
                   que media flavis. Abdomen & pedes nigra.
- atrata.*      12. *L. corpore atro immaculato.*  
                   Meloe pensylvanica. Degeer Inf. 5. 16. 1.  
                   tab. 13. fig. 1.  
                   Habitat in Barbaria Dom. Prof. Vahl.  
                   Praecedente duplo minor & tota atra.
- erythroce-  
phala.*      13. *L. atra capite testaceo, thorace elytrisque ci-  
                   nereo lineatis.*  
                   Meloe erythrocephala. Pall. Iter. 1. 466. 46.  
                   Herbst Arch. tab. 30. fig. 2.  
                   Scop. Ann. Hist. nat. 5. 103. 81.  
                   Habitat in Austria Mus. D. Schulz.  
                   Affinis *L. atratae* at caput testaceum ore linea-  
                   que media nigra. Thorax canaliculatus.
- oculata.*      14. *L. nigra puncto calloso flavo pone oculos.*  
                   Habitat in Guinea D. Isert.  
                   Praecedentibus minor, tota nigra, immaculata  
                   puncto magno elevato flavo utrinque pone  
                   oculos. Pedes nigri.  
                   Faeminam majorem, apteram, elytris abbre-  
                   viatis misit Dom. de Paykull.
- dubia.*      15. *L. atra capitis vertice fulvo, thorace elytris-  
                   que immaculatis.*  
                   Meloe algiricus. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 12.  
                   Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.  
                   Affinis praecedenti, a quo tamen differt vertice  
                   capitis rufo, immaculato, thorax elytrisque  
                   atris immaculatis.

## 16. L. nigra thorace rufo.

*afræ.*

Meloe afer. Linn. syst. nat. 2. 680. 10.

Cantharis afræ. Oliv. Inf. 46. tab. 1. fig. 4.

Ross. Fn. Etr. 240. 594. tab. 3. fig. 1. t. 3. f. 3.

Habitat in Africa.

Forte ad Zonitis genus emendanda mihi haud  
rite nota.17. L. coeruleo nigricans abdomine postice rufo. *haemorrhoi-*Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull. *dalis.*Parva. Antennæ nigrae. Caput & thorax vil-  
losa, nigra, coeruleo parum nitentia. Elytra  
magis coerulecentia. Corpus caerulescens, ni-  
tidulum ano late rufo.18. MYLABRIS. *Palpi* quatuor filiformes.*Maxilla* cornea, com-  
pressa, bifida.*Labium* membrana-  
ceum, subemargina-  
tum.*Antennæ* monilifor-  
mes.

## 1. M. nigra elytris fascia media flava.

*fasciata.*

Habitat in Indiis D. Torstenson.

Mylabris corpus oblongum, laeve, subpubescens,  
immarginatum, tardum, capite magno, exerto, ovato,  
inflexo, oculis rotundatis, lateralibus, antennis distan-  
tibus, ante oculos insertis, thorace rotundato, scutello  
parvo, quadrato, elytris rigidiusculis, fornicatis, ab-  
domine longioribus, pedibus longiusculis, cursoriis,  
tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis, colore  
nigro, obscuro, elytris testaceis nigro maculatis.

- M. Cichorei major. Caput nigrum oculis testaceis. Thorax niger utrinque macula ferruginea. Elytra nigra fascia media, lata, lutea. Alae hyalinae costa venisque ferrugineis.
- Cichorei.* 2. M. nigra elytris flavis: fasciis tribus nigris.  
Linn. syst. nat. 2. 680. 5. Mus. Lud. Ulr. 103.  
Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 1. 2. 3. 8. 9. 10.  
Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 11.  
Degeer Inf. 5. 17. 2. tab. 13. fig. 2.  
Habitat in totius Orientis Cichoreis in China officinalis.  
Variat elytrorum fasciis & colore.
- praeusta.* 3. M. atra elytris apice testaceis: macula atra.  
Habitat in Barbariae Segete Mus. D. Desfontaines.  
Statura omnino M. Cichorei at paullo minor.  
Corpus totum atrum elytris solis apice testaceis macula magna, transversa, atra.
- marginata.* 4. M. atra elytrorum margine sanguineo.  
Habitat in Barbariae Segete Mus. D. Desfontaines.  
Statura omnino & magnitudo M. Algiricae at elytra atra margine exteriori sanguineo.
- algirica.* 5. M. atra elytris testaceis immaculatis Linn. syst. nat. 2. 651. 11. Oliv. Inf. 47. tab. 1. fig. 5.  
Lytta indica. Herbst Arch. tab. 30. fig. 3.  
Wulf Inf. cap. tab. 1. fig. 8.  
Cyrill. Ent. Neapolit. 1. tab. 2. fig. 10.  
Habitat in India.
- capensis.* 6. M. nigra elytris maculis sex flavis: prima arcuata. Linn. syst. nat. 2. 180. 7. Mus. Lud. 104.  
Wulf Inf. Capens. tab. 1. fig. 5.  
Habitat ad Cap. Bon. spei.  
Duplo minor M. Cichorei.

7. *M. villosa nigra elytris macula baseos fasciisque* *Herman-*  
*duabus dentatis flavis.*

*niae.*

Habitat in Guineae Hermanniis D. Isert.

Affinis certe *M. Cichorei* at triplo minor. Antennae nigrae apice ferrugineae. Caput & thorax nigra villis cinereis sparsis hirta. Elytra nigra basi macula magna margineque exteriori flavis. Fasciae duae pone medium dentatae, flavae. Corpus atrum, nitidum.

8. *M. villosa atra elytris fasciis duabus: anteriore punctum.*  
*flava; puncto nigro, posteriore rufa.*

Habitat Tranquebariae Dom. Lund.

Minor *M. Cichorei*. Caput & thorax villosa, atra, immaculata. Elytra atra fascia antica lata, flava: puncto medio distincto atro, postica lata ferruginea, immaculata.

9. *M. atra elytris testaceis: punctis quinque nigris.* *1opunctata.*  
*Meloe 4 punctata.* Linn. syst. nat. 2. 680. 6.

Oliv. Ins. 47. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Italia D. Allioni.

Triplo minor *M. Cichorei*. Antennae nigrae. Corpus nigrum. Elytra testacea punctis quinque nigris 2. 2. 1.

10. *M. atra elytris testaceis: punctis duobus nigris.* *4punctata.*

Habitat in Rossia Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Differt tantum elytris testaceis: maculis duabus dorsalibus nigris.

11. *M. nigra coleoptris flavis: fascia puncto que 3maculata.*  
*communi fuscis.* Cyrilli Ent. Neapolit. 1. tab. 3.

fig. 7.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

*M. capensi quadruplo minor, tota laevis, atra.*

Coleoptra flava macula communi in medio dorso & fascia postica fuscis, quae tamen marginem exteriorem haud attingit.

*argentata.* 12. M. villoso argentea elytris maculis flavescentibus: plerisque margine connexis.

Habitat in Senegalia Mus. Dom. de Paykull.

Parva. Antennae ferrugineae. Thorax tomento argenteo, immaculato. Elytra argento tomentosa macula parva baseos, tribus marginalibus, unica versus apicem flavis annulo nigro cinctis. Praeterea punctum atrum in medio & apex flavescentes. Corpus argento tomentosum ano albido. Pedes ferruginei.

#### 64. HORIA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* bifidum: laciniis linearibus, distantibus.

*Antennae* moniliformes.

*maculata.* 1. H. flavescentis elytris maculis septem nigris.

Horia maculata. Oliv. Inf. tab. fig.

Cucujus maculatus. Swed. Act. Holm.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Statura omnino H. testaceae at paullo major. Corpus totum flavum mandibulis pedibusque nigris. Elytra maculis septem 2. 2. 2. & ultimo terminali.

Character generis emendandus. Os maxillis palpique. Palpi quatuor aequales, filiformes, anteriores quadriarticulati: articulis subaequalibus, ultimo cylindrico adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati adnati labii medio. Mandibula magna, crassa, fornicata, exserta, obtusa, ante apicem unidentata. Maxilla recta, cornea, unidentata. Labium membranaceum, bifidum: laciniis linearibus, distantibus sub palpis reconditum.

**2.** *H. rufa antennis pedibusque nigris* Mant. Inf. 1. *testacea.*  
164. 1.

*Cucujus clavipes* Mant. Inf. 1. 166. 4.

Hybn. Naturf. 24. 47. 13. tab. 2. fig. 14-17.

Habitat Tranquebariae.

Corpus magnum, cylindricum, rufo testaceum pe-  
dibus solis nigris femoribus basi ferrugineo  
testaceis.

Mas femoribus posticis incrassatis, subtus canali-  
culatis dentatis.

**65. LYMEXYLON.** *Palpi* antici por-  
recti: articulo pe-  
nultimo magno; ap-  
pendiculo ovato,  
fisso, ultimo ovato,  
acuto.

*Antennae* filifor-  
mes.

**1.** *L. testaceum oculis alis pectoreque nigris.* *dermestoides.*  
Horia dermestoides. Mant. Inf. 1. 164. 2.  
Cantharis dermestoides. Linn. syst. nat. 2. 650.  
25. Fn. Sv. 702.  
Lytta Francofurtana. Herbst Arch. tab. 30 fig. 4.

Lymexylon corpus elongatum, cylindricum, gla-  
brum, immarginatum, agile, capite rotundato, supra  
plano, inserto, oculis rotundatis, prominulis, late-  
ralibus, antennis distantibus, brevibus, ante oculos  
insertis, thorace brevi, transverso, vix marginato,  
scutello rotundato, elytris incumbentibus, flexilibus,  
longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, fe-  
moribus compressis, tarsis quinquearticulatis, colore  
obscuro.

- — —
- Lymexylon dermestoides.* Oliv. Inf. 25. t. 1. f. 1.  
Habitat in Europa.
- abbrevia-* 2. *A. nigrum thoracis linea dorsali flava, elytris*  
*tum.* *brevissimis fornicatis.*  
Habitat in Sierra Leon Africae D. Pflug.  
Caput planum, nigrum linea frontali flava. Antennae breves, in medio crassiores. Thorax niger linea dorsali lata, flava. Elytra brevissima, fornicata, obscura. Alae albidae venis fuscis, abdomine breviores. Abdomen elongatum, planum, nigrum ultimo segmento margine ferrugineo. Pedes nigri apice testacei.
- probosci-* 3. *L. nigrum elytris testaceis apice nigris.*  
*deum.* *Lymexylon proboscideum.* Oliv. Inf. 25. 6. 5.  
tab. 1. fig. 5.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Caput & thorax plana, depressa, nigra, immaculata. Elytra laevia, testacea apice nigra. Abdomen nigrum apice testaceum.
- barbatum.* 4. *L. fuscum antennis tibiisque piceis.*  
*Lymexylon barbatum.* Oliv. Inf. 25. 5. 3.  
tab. 1, fig. 3.  
Mordella barbata fusca palpis ensiformibus trilobis: lobis lateralibus latissimis Schall. Act. Hallens. 1. 322. tab. 1. fig. 7.  
Schaeff. Icon. tab. 279. fig. 7.  
Habitat in Germaniae lignis.  
Praeccdenti affinis. Corpus fuscum tomento aureo fugaci nitidum. Antennae & pedes pallidiores.
- Mas L. dermestoides observante Helvio.*
- navale.* 5. *L. luteum capite elytrorumque margine apiceque nigris.*  
*Lymexylon navale.* Oliv. Inf. 25. 5. 4. tab. 1.  
fig. 4.

*Cantharis navalis.* Linn. syst. nat. 2. 650. 26.

Fn. Sv. 718. Iter. Wgoth. 155. tab. 2. fig.

Frish Ins. 13. 24. tab. 20.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 1.

Habitat in Quercus lignum, quod destruit.

Variat rarius elytris totis nigris.

6. *L. nigrum elytris basi, abdomine apice pedibus- *flavipes*. que flavis.*

Habitat in Saxoniae ligno Dom. Hybner.

Caput, thorax, antennae nigrae, immaculatae.

Elytra nigra basi ad suturam flava. Corpus ni- grum. Abdomen apice flavum. Pedes flavi.

Faemina mare triplo major.

7. *L. nigrum pedibus anticis flavis.* *morio.*

Habitat in Saxoniae lignis Dom. Hybner.

Corpus totum nigrum pedibus quatuor anterio- ribus solis flavis.

Mas faemina triplo minor. Magnitudine pree- cedentis.

66. *CUCUJUS.* *Palpi* quatuor aequales: articulo ultimo trun- cato, crassiori.

*Labium* breve, bifidum: laciniis linearibus, di- stantibus.

*Antennae* moniliformes & filiformes.

1. *C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus *depressus*. simplicibus nigris.*

*Cantharis sanguinolenta.* Linn. syst. nat. 2.

646. 19.

Frish Ins. 12. tab. 7. fig. 1.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Antennae nigrae, pilosae articulis undecim: ultimo acuto. Caput depresso, planum, rufum ore oculisque nigris, postice utrinque angulo obtuso globose auctum. Thorax planus, sub-sulcatus, rufus margine denticulato tentissime nigro. Elytra plana, rigida, rufa. Corpus subtus & pedes nigra.

*sulcatus.* 2. C. thorace sulcato niger elytris crenato striatis.

Habitat in Croatiae ligno putrescente Dom. Sal-doner.

Antennae breves, subfiliformes. Caput trisulcatum fulco intermedio longiore. Thorax trisulcatus sulcis lateralibus apicem haud attingentibus.

*rufipes.* 3. C. thorace sulcato, elytris punctatis ater anten-nis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Barbariae ligno Mus. D. Desfontaines. Magnus in hoc genere, depresso. Antennae ci-nerascentes articulo primo majori, incurvo, atro. Caput punctatum, atrum, immaculatum. Thorax postice angustatus sulcis tribus fere ob-soletis exaratus. Elytra connata, plana, de-pressa punctis numerosis sparsis impressa. Ab-domem piceum pedibus ferrugineis.

*coeruleus.* 4. C. thorace sulcato niger elytris striatis coer-uleis, abdome rufo.

Cucujus corpus oblongum, depresso, planum, glabrum, agile, capite ovato, exerto, ad angulum posticum producto, oculis parvis, rotundatis, late-ralibus, prominulis, antennis elongatis, distantibus, sub oculis insertis, thorace plano, submarginato, ro-tundato, margine saepius dentato, scutello brevi, rotundato, elytris planis, rigidis, includentibus, lon-gitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, fe-moribus subclavatis, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

**Tenebrio depresso.** Linn. syst. nat. 2. 677. 24.  
Habitat in Germania Dom. Schneider.

Major C. depresso at statura eadem. Caput nigrum ore piceo. Thorax depresso, canaliculatus sulcoque utrinque profundo, abbreviato exaratus. Elytra coerulea, nitida, striata. Abdomen rufum pedibus nigris.

5. **C. thorace sulcato niger elytris striatis coeruleis, abdominis margine tibiisque rufis.**

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino C. coerulei at duplo minor. Corpus nigrum. Thorax bisulcatus aut potius utrinque impressus, niger. Elytra striata, coerulea, nitida. Abdomen nigrum margine rufo. Pedes rufi femoribus nigris.

6. **C. thorace sulcato niger elytris striatis abdominis margine pedibusque testaceis.**

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affinis certe praecedenti & forte mera ejus varietas. Differt tantum elytris testaceis: margine postico parum nigro.

7. **C. thorace denticulato rufus elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis.**

Habitat in America boreali.

Ab hoc genere differt antennis longioribus flexuosis articulo ultimo acuto. Caput rufum. Thorax denticulatus, rufus. Elytra striata, nigra, obtusa. Corpus cum pedibus rufum.

8. **C. thorace denticulato nigro, pedibus flavescens, tibus, antennis filiformibus longitudine corporis.**

**Cerambyx planatus.** Linn. syst. nat. 2. 625. 15.  
Habitat in Europae borealis truncis decorticatis.

Antennae elongatae, filiformes, fuscae. Caput nigrum ore flavescente. Thorax denticulatus, fulcatus, niger. Elytra laevia, fusca.

*pallens*

9. C. thorace serrato obscuro, elytris striatis, ab domine pedibusque testaceis.

Habitat in Germania Dom. Daldorff.

Nimis affinis C. flavipes. Antennae filiformes longitudine corporis, obscurae. Caput obscurum. Thorax planus, serratus, obscurus. Elytra striata, testacea. Abdomen & pedes testacea.

*dermestoides* 10. C. thorace sulcato fuscus elytris laevibus testaceis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Parvus. Antennae breves. Corpus fuscum. Thorax fuscus, bisulcatus. Elytra laevia, bisulcata.

*testaceus.* 11. C. thorace subquadrato mutico testaceus femoribus compressis.

Habitat sub Betulae corticibus Mus. D. Romani. Triplo minor C. flavipes. Antennae filiformes, testaceae longitudine fere corporis. Corpus elongatum, testaceum, immaculatum. Pedes breves, testacei femoribus compressis.

*muticus.* 12. C. thorace mutico nigro: puncto utrinque impresso, elytris striatis fuscis.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Statura depressa praecedentium. Antennae filiformes corpore breviore. Caput & thorax atra, immaculata thorace punctis duobus basos impressis. Elytra filiformia, striata, obscura sive fusca. Pedes simplices, nigri.

*monilis.* 13. E. thorace mutico niger thoracis margine elytrorumque macula ferrugineis.

Habitat in Germania.

Antennae breves, moniliformes. Corpus sub-  
tus obscure ferrugineum.

67. COSSYPHUS. *Palpi* quatuor in-  
aequales.

*antici* securiformes.

*Maxilla* bifida.

*Antennae* clava per-  
foliata.

1. Cossyphus. *depressus.*

Cossyphus depressus Oliv. Inf. tab. fig.

Lampyris depressa fusca clypei elytrorumque  
margin'e dilatato plano. Mant. Inf. 1. 162. 19.

Herbst Arch. tab. 46. fig. 7.

Habitat in India orientali, Mauritania.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales,  
anteriores longiores, quadriarticulati : articulo secundo longiori, ultimo ovato, securiformi adhaerentes maxillae dorso, posteriores  
breves, triarticulati : articulo ultimo ovato,  
subaequalibus adnati labii basi exteriori. Mandibula  
cornea, arcuata, apice fissa. Maxilla brevis,  
cylindrica, membranacea, bifida: laciniis sub-  
aequalibus, filiformibus. Labium breve, cor-  
neum, rotundatum : margine parum reflexo,  
integro. Antennae articulis undecim: ultimis  
quatuor crassioribus, perfoliatis. Corpus totum  
fuscum, minime nitidum. Margo clypei & ely-  
trorum valde dilatatus, planus, vix reflexus.  
Elytra stria in medio unica elevata.

—

68. LAMPYRIS. *Palpi quatuor subclavati.*

*Maxilla bifida.*

*Labium corneum, integrum.*

*Antennae filiformes.*

*noctiluca.* 1. L. oblonga fusca clypeo cinereo. Linn. syst. nat. 2. 643. 1. Fn. Sv. 699.

Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 2.

Degeer Inf. 4. 31. 1. tab. 1. fig. 19. 20.

Habitat in Europae borealis Juniperetis.

*splendidula* 2. L. oblonga fusca clypeo apice hyalino. Linn. syst. nat. 2. 644. 3.

Oliv. Inf. 28. 11. 1. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 166. 1.

Mouff. Inf. 109. fig. 1. 2.

Brad. nat. tab. 26. fig. 3. A. B.

Habitat in Europae sylvaticis tempestate pluviosa in primis lucem spargens.

*corrusca.* 3. L. obscure nigra clypeo utrinque lunula rosea.

Linn. syst. nat. 2. 644. 2.

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 14.

Habitat in America boreali D. Blackburn.

Lampyris corpus oblongum, glabrum, marginatum, capite parvo, rotundato, sub thoracis clypeo recondito, oculis maximis, globosis, approximatis, antennis brevibus, approximatis, supra oculos insertis, thoracis clypeo marginato, dilatato, caput tegente, scutello parvo, rotundato, elytis molliusculis, incumbentibus, longitudine abdominalis, (faemina aptera) ab domine saepius phosphorescente, pedibus brevibus, compressis, validis, tarsis quinquearticulatis, colore saepius obscuro.

Corpus totum obscure nigrum, minime nitidum.

Clypeus utrinque linea lunata rosea ab apice ad basin ducta.

Duplo major ex America Mus. D. Banks.

4. L. nigra clypeo utrinque macula rufa. *obscura.*

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 13.

Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.

Clypeus integer, niger lateribus depresso-  
macula magna rufa. Elytra fusca, immaculata.  
Abdomen & pedes nigra.

5. L. ovata atra clypei margine rufo, antennis com- *laticornis.*  
pressis.

Lampyris laticornis. Oliv. Inf. 28. tab. fig.

Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Media. Antennae singulares, compresiae, crassi-  
ores, atrae. Clypeus rotundatus, ater mar-  
gine utrinque rufo. Elytra substriata, atra,  
immaculata. Corpus atrum abdomine punctis  
duobus aut tribus ultimi segmenti albo pellu-  
cidis.

6. L. clypeo rufo: medio nigro, elytris nigris: *pyralis.*

marginibus abdomineque albis. Linn. syst.

nat. 2. 644. 4. Mus. Lud. 78.

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 11.

Degeer Inf. 4. 52. 7. tab. 17. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

Margo clypei ipse uti margo elytrorum rufescens.

7. L. fusca thorace elytrorum margine abdominis- *cincta.*  
que apice fulvis.

Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 22.

Habitat in Poulicandor Mus. Dom. Banks.

Caput fuscum. Abdomen nigrum segmento pe-  
nultimo albo, ultimo fulvo. Pedes nigri femo-  
ribus fulvis.

- marginata.* 8. L. oblonga nigra thoracis elytrorumque marginie omni scutello abdominisque postico flavis. Linn. syst. nat. 2. 644. 5.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 16.  
 Panz. Naturf. 24. 31. 43. tab. 1. fig. 43.  
 Habitat in America.  
 Antennae fuscae basi flavae. Pedes variegati.
- pectinata.* 9. L. atra clypei lateribus basi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis.  
 Degeer Inf. 4. 51. 11. tab. 17. fig. 13.  
 Linn. syst. nat. 2. 649. 17.  
 Habitat in America.  
 Antennae pectinatae longitudine fere corporis.
- flabellicornis.* 10. L. nigra clypeo ante marginem elytris lineola marginali baseos abdomineque apice albis.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 26.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae maximae, flabellatae. Clypeus niger ante marginem exteriorem & anticum pallidus. Elytra vix striata, nigra lineola pallida ante marginem exteriorem baseos. Corpus nigrum ano albo.
- Hespera.* 11. L. ovata elytris fuscis: macula marginali triangulari flava.  
 Linn. syst. nat. 2. 644. 6.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 6.  
 Degeer Inf. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 1.  
 Habitat in America.  
 Clypeus flavus macula antica fusca.
- ignita.* 12. L. ovata elytris fuscis: macula marginali ovata lutea. Linn. syst. nat. 2. 645. 7.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 7.  
 Degeer Inf. 4. 49. 2. tab. 17. fig. 2.  
 Habitat in America meridionali.

- Clypeus maculis duabus anticis fuscis. Abdomen flavum.
- 13.** L. oblonga elytris fuscis: margine exteriori *lucida*, luteo, abdomine flavo. Linn. syst. nat. 2. 645. 8.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 19.  
 Degeer Inf. 4. 51. 5. tab. 17. fig. 5.  
 Sulz. Inf. tab. 5. fig. 22.  
 Habitat in America meridionali.  
 Nimis L. noctilucae affinis videtur.
- 14.** L. oblonga fusca thorace flavescente: macula *nitidula*. media nigra, abdominis apice maculis duabus flavis.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 15.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.  
 Caput atrum. Elytra vix striata, fusca, immaculata. Abdomen fuscum apice five ultimo segmento subtus maculis duabus flavis.
- 15.** L. oblonga subtestacea abdomine atro postice *phosphorea* flavidissimo. Linn. syst. nat. 2. 645. 9.  
 Degeer Inf. 4. 51. 6. tab. 17. fig. 6.  
 Habitat in America meridionali.  
 Antennae nigrae.
- 16.** L. flava segmento abdominis antepenultimo *Japonica*. nigro.  
 Thunb. nov. sp. 4. 79.  
 Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 18.  
 Habitat in Japonia mense Maii & Junii copiofissima vesperi lumine phosphoreo e vesiculis binis caudalibus aera replens. Thunb.  
 Tota flava antennis, oculis, alis segmentoque abdominis antepenultimo nigris.
- 17.** L. atra thoracis margine rufo. *atra*.  
 Lampyris atra. Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 28.  
 Habitat in America boreali.



Antennae serratae. Corpus atrum solo margine thoracis ruso.

*capensis.* 18. L. livida thorace flavescente, abdomine postice flavissimo.

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 17.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae. Caput nigrum ore livido.

Scutellum flavescentes. Elytra livida macula baseos fusca margineque flavescente. Alae nigrae. Pedes lividi plantis fuscis.

Variat thorace maculis duabus fuscis.

*australis.* 19. L. flavicans capite elytrisque fuscis, abdomine apice albissimo.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Varietatem L. italicæ credit Olivier at vix rite. Thorax & scutellum ferruginea. Subtus tota flavicans abdominis ultimis segmentis albissimis. Pedes flavescentes plantis nigris.

*italicæ.* 20. L. nigra thorace transverso pedibusque rufis, abdomine apice albissimo. Linn. syst. nat. 2. 645. 11.

Oliv. Inf. 28. tab. 2. fig. 12.

Degeer Inf. 4. 53. 9. tab. 17. fig. 9. 10.

Sulz. Hist. tab. 6. fig. 3.

Habitat in Italiae arboribus.

Antennæ nigrae. Thorax immaculatus.

*vittata.* 21. L. rufa elytris nigris: margine omni vitta que media abbreviata flavis.

Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 20.

Habitat in Insula Guadeloupe Dom. de Badier.

Paullo major L. italicæ. Caput rufum antennis nigris: articulis basi ferrugineis. Thorax orbiculatus, rufus, immaculatus. Elytra laevia, nigra, margine futura vitta que media flavis,

quae tamen apicem haud attingit. Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei geniculis nigris.

- 22.** *L.* elytris lividis, corpore flavo. Linn. syst. *mauritanica.*  
nat. 2. 645. 10.  
Oliv. Inf. 28. tab. 1. fig. 5.  
Habitat in Africa.

- 23.** *L.* nigra elytris brevissimis. *hemiptera.*  
Lampyris hemiptera Geoff. Inf. 1. 168. 2.  
Oliv. Inf. 28. tab. 3. fig. 25.  
Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
Parva. Antennae compressae. Clypeus rotundatus, integer, niger, immaculatus. Elytra ovata, brevissima, nigra. Abdomen planum, nigrum. Pedes nigri.

**69. OMALYSUS.** *Palpi* quatuor aequales, extrorsum crassiores.

*Maxilla membranacea, bifida.*

*Labium emarginatum.*

*Antennae filiformes.*

**1.** *Omalyfus.* *futuralis.*

*Omalyfus.* Geoff. Inf. 1. 180. 1. tab. 2. fig. 9.

*Omalyfus futuralis.* Oliv. Inf. 24. 14. 1. tab. 1. fig. 1.

Fourcroy Ent. 1. 64. 1.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Olivier.

Genus Pyrochrois valde affine, attamen distinctum videtur. Palpi quatuor, aequales, extrorsum crassiores, anteriores quadriarticulati: articulo ultimo majori, obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores vix breviores, triar-

ticulati: articulo ultimo parum crassiori, obtuso adnati labio. Mandibula elongata, tenuis, cornea, arcuata, acuta, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: lacinis aequalibus. Labium breve membranaceum, emarginatum. Antennae filiformes, undecim articulatae fere longitudine corporis.

Corpus statura fere Pyrochroae planum. Elytra punctato striata, rufa, ad futuram late nigra.

70. PYROCHROA. *Palpi* quatuor subfiliformes.

*Maxilla* integra.

*Labium* cornuum, lineare, integrum.

*Antennae* filiformes.

*coccinea.* I. P. nigra thorace elytrisque sanguineis immaculatis.

Lampyris coccinea. Linn. syst. nat. 2. 646. 18.  
Fn. Sv. 705.

Pyrochroa. Geoff. Ins. 1. 338. n. tab. 6. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 90. fig. 4.

Degeer Ins. 4. 47. 4.

Habitat in Europae sepibus.

Pyrochroae corpus oblongum, planum, depresso-  
sculum, immarginatum, tardum, capite ovato,  
exerto, plano, oculis rotundatis, prominulis, lateralibus,  
antennis thorace longioribus, ferratis, sub-  
oculis insertis, thorace rotundato, plano, scutello  
minuto, rotundato, elytris rigidiusculis, fornicatis,  
longitudine abdominis, pedibus longiusculis, tenui-  
bus, cursoriis, tarsis anticis quinque posticis quadri-  
articulatis, colore rubro nigroque nitidiusculo.

2. *P. nigra capite thorace elytrisque sanguineis im- rubens.*  
maculatis.

*Lampyris rubens.* A&t. Hallens. I. 301.

Habitat in truncis putrescentibus Salicis inventa  
Parisiis frequens & nuper exclusa.

Vix a praecedente distincta, forte varietas tan-  
tum sexus. Differt tantum capite rufo.

3. *P. coccinea antennis elytrisque nigris.* flabellata.

Habitat in America Mus. D. Hunter.

Antennae valde ferratae, nigrae articulo primo  
rufo. Caput, thorax, abdomen, pedes rufa,  
immaculata. Elytra laevia, nigra, immaculata.

4. *P. atra thorace elytrisque testaceis, antennis pectinico-  
nis.*

*Cantharis pectinicornis* thorace orbiculato, ely-  
tris rufo testaceis, antennis pectinatis. Linn.  
syst. nat. 2. 650. 20. Fn. Sv. 715.

Habitat in Germania Dom. Hübner.

Antennae nigrae, valde pectinatae aut potius  
flabellatae. Caput atrum. Thorax testaceus ma-  
cula media atra. Elytra glabra, testacea, im-  
maculata. Corpus atrum.

5. *P. rufa elytris striatis nigris: maculis quinque 10 maculata  
rubris, thorace utrinque trituberculato.*

*Trachys 10 maculatus.* Oliv. Inf. tab. fig.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Gigot d'Orcy.

Magna, mihi haud rite nota at hujus generis vi-  
detur. Antennae flabellatae, rufae. Caput ru-  
fum, immaculatum. Thorax punctatus, ob-  
scure rufus linea media elevata tuberculisque  
utrinque tribus elevatis: duobus marginalibus,  
obtusis, validis. Elytra punctata striisque ele-  
vatis tribus, nigra maculis quinque rubris, tri-  
bus ad basin duabusque pone medium.

## 71. LYCUS. Os rostro cylindrico, incurvo.

*Palpi* quatuor: articulo ultimo crassiori, truncato.

*Antennae* filiformes.

*latissimus.* 1. L. flavus elytris macula marginali posticeque nigra: margine laterali maximo dilatato.

Lycus latissimus. Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 2.

Lampyris latissima. Linn. syst. nat. 2. 646. 14.

Habitat in Sierra Leon. Africae Dom. Drury.

Macula nigra in medio margine elytrorum. Os cylindricum, prominens, rostrum simulans.

*palliatus.* 2. L. elytris coriaceis latissimis testaceis apice nigris.

Lycus palliatus. Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 3.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Corpus nigrum. Thorax niger antice macula utrinque testacea. Elytra latissima, striata, coriacea, testacea, apice nigra. Alae apice fuscae.

*rostratus.* 3. L. niger thoracis lateribus elytrisque dilatatis flavis antice posticeque nigris.

Lycus rostratus. Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 4.

Lampyris rostrata. Linn. syst. nat. 2. 646. 15.

Mus. Lud. 10. 78.

Degeer Inf. 7. 622. 19. tab. 46. fig. 11.

Habitat in Africa.

Margo thoracis flavus.

Lycus corpus oblongum, glabrum, tardum, capite parvo, rotundato, sub thoracis clypeo recondito, ore porrecto, cylindrico, rostrato, oculis parvis, globosis, lateralibus, antennis approximatis, ferratis, thorace longioribus, ante oculos insertis, thoracis clypeo plano, marginato, dilatato, caput tegente, scutello minuto, rotundato, elytris flexilibus, dilatatis, ab domine latioribus, pedibus brevibus, compressis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

4. L. niger thoracis lateribus elytrisque flavis postice *proboscideus.*  
nigris.  
Lycus proboscideus Oliv. Inf. 29. tab. I. fig. 6.  
Habitat in Africa aequinoctiali.  
Affinis certe L. rostrato, a quo tamen differt elytris angustioribus aut minus dilatatis apice tantum nigris.
5. L. niger thorace elytrisque rufescentibus, elytris *serraticornis.*  
apice nigris.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Praecedente triplo minor. Antennae compressae; serratae, nigrae. Thorax rufescens marginibus subreflexis. Elytra fulcata fulcis rugosis, rufescentia apice nigra. Corpus nigrum. Femora basi testacea.
6. L. ferrugineus elytris apice nigris. *praeustus.*  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.  
Statura & magnitudo omnino L. ferraticornis.  
Antennae ferrugineae apice nigrae. Corpus totum ferrugineum elytris solis apice nigris.
7. L. ater thoracis margine flavescente, elytris fascia *fasciatus.*  
lata alba.  
Lycus fasciatus. Oliv. Inf. 29. tab. I. fig. 8.  
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Totus ater solo thoracis margine flavo elytrorumque fascia media alba. Femora basi parum flava.
8. L. ater thoracis margine flavo, elytris flavis: *reticulatus.*  
fascia apiceque nigris.  
Lycus reticulatus. Oliv. Inf. 29. tab. I. fig. 7.  
Habitat in America boreali.  
Antennae serratae, compressae, atrae. Clypeus rotundatus, planus, niger margine lato flavo. Elytra plana, postice latiora nervis elevatis

quatuor strigisque numerosis transversis reticulata, flava fascia media apiceque late nigris.  
Subtus ater sterno flavo.

*bicolor.*

9. L. sanguineus elytris postice violaceis.

*Lycus bicolor.* Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 9.

*Lampyris bicolor.* Linn. syst. nat. 2. 646. 16.  
*Cantharis bicolor.* Linn. Amoen. acad. 6.

395. 21.

Habitat in Africa.

*sanguineus.* 10. L. niger thoracis lateribus elytrisque glabris sanguineis.

*Lycus sanguineus.* Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 1.

*Lampyris sanguinea.* Linn. syst. nat. 2. 646. 17. Fn. Sv. 704.

*Lampyris elytris rubris, thorace rubro nigra macula.* Geoff. Inf. 1. 168. 3.

Frish Inf. 12. tab. 3.

Schaeff. Icon. tab. 24. fig. 1.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 4.

Degeer Inf. 4. 45. 2. tab. 2. fig. 1.

Habitat in Europae lapidosis.

*Aurora.*

11. L. niger thoracis lateribus elytrisque reticulato striatis rufis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas praecedentis at elytra reticulato striata. Antennae & pedes nigri.

Thoracis margo anticus itidem rufus.

*nigripes.*

12. L. sanguineus antennis pedibusque nigris.

*Lycus nigripes.* Oliv. Inf. 29. tab. 1. fig. 12.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentis at corpus & thorax tota sanguinea. Elytra substriata. Antennae & pedes nigrae basi rufae.

*minutus.*

13. L. ater antennarum apicibus elytrisque sanguineis.

*Lycus minutus.* Oliv. Inf. 19. tab. 1. fig. 13.

Panz Naturf. 24. 31. 45. tab. 1. fig. 44.

Habitat in Norvegia Mus. Dom. Lund.

Praecedente duplo minor & thorax uti totum  
corpus ater. Antennae apice rufae.

14. *L. niger* thoracis margine testaceo, antennis *flabellicornis.*  
ferratis.

Habitat Cajennae Dom. de Paykull.

Parvus. Antennae valde ferratae, nigrae. Tho-  
racis clypeus niger margine elevato, testaceo.  
Elytra striata striis punctatis nigra puncto  
parvo humerali, flavescente. Corpus atrum.

15. *L. ater* thorace rufo. *ruficollis.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.

Statura & magnitudo praecedentis. Antennae  
simplices, nigrae. Thorax rufus margine  
lineaque media excavata elevatis. Elytra striata  
striis punctatis.

72. RIPIPHORUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* brevissima,  
ovata.

*Labium* acutum.

*Antennae* flabelliformes.

1. *R. elytris* brevissimis ovatis fornicatis pallescen- *subdipterus*  
tibus.

Habitat in Gallo provincia Mus. Dom. Bosc.

Genus omnino distinctum. Palpi quatuor in-  
aequales, filiformes, anteriores paullo longio-  
res, quadriarticulati: articulo primo brevissimo,  
secundo longissimo, ultimo ovato adhaerentes

maxillae dorso, posteriores paullo breviores triarticulati: articulis subaequalibus adnati labii basi. Clypeus porrectus, ovatus, membranaceus, bifidus: laciniis aequalibus. Mandibula exserta, cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevissima, vix ultra basin palporum prominens, membranacea, ovata, obtusa. Labium breve, membranaceum, inter palpos acutum. Antennae breves maris utroque latere lamellis elongatis, tenuibus 7-8 omnino flabelliformibus, flavis, faeminae altero latere tantum lamellis minus elongatis, nigris. Caput inflexum nigrum. Thorax elevatus, gibbus, niger, immaculatus. Abdomen maris nigrum, faeminae pallidum ano nigro. Elytra brevissima, ovata, fornicata, palefcentia. Alae exsertae, corpore longiores, albidae macula media fusca. Pedes obscuri, apice rufescentes.

*ferrugineus* 2. R. rufus pectore ano pedibusque nigris.

Mordella ferruginea. Mant. Inf. I. 217. I.

Habitat in India orientali D. Koenig.

Antennae nigrae, flabellatae. Elytra acuminata.

Alae fuscae.

*nasutus*. 3. R. corpore atro immaculato.

Mordella nasuta. Mant. Inf. I. 217. 2.

Mordella nasuta. Thunb. nov. sp. 3. 66. fig. 77.

---

Ripiphori corpus oblongum, compressum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, ascendente, exerto, oculis ovatis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, in cantho oculorum insertis, thorace gibbo, antice attenuato, postice trilobo, scutello nullo, clytris rigidis, attenuatis, abdomine brevi, obtuso sublongioribus, pedibus tenuibus, compressis, tarsis anticis quinque posticis quadriarticulatis, colore minus nitido.

Habitat in Japonia.

Diffr. omnino a reliquis corpore toto atro im-  
maculato.

4. R. rufus elytris nigris. *pectinatus.*

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae flabellatae, nigrae. Caput rufum ocu-  
lis nigris. Thorax antice angustatus, glaber,  
rufus, postice loco scutelli acuminatus. Elytra  
attenuata, nigra a basi ad medium litura cine-  
rea. Alae nigrae. Abdomen breve, gibbum  
rufum, tectum utrinque squama baseos ovata.  
Pedes rufi geniculis nigris.

5. R. niger thoracis lateribus elytrisque testaceis. *paradoxus.*

Linn. syst. nat. 2. 1. Fn. Sv. 831.

Ross. Fn. Etrusc. 1. 244. 603.

Habitat in Europae floribus.

6. R. testaceus ore pectore abdominisque dorso atris. *flabellatus.*

Cyrilli Ent. Neapol. 1. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Italia D. Allioni.

R. ferrugineo duplo major. Antennae nigrae ar-  
ticulo primo ferrugineo. Caput testaceum ore  
nigro. Pectus atrum. Abdomen obtusissimum,  
testaceum dorso nigro.

7. R. thorace testaceo nigro punctato, elytris ni- *punctatus.*  
gris: margine testaceo.

Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Caput testaceum antennis nigris. Thorax testa-  
ceus punctis nigris 4. 1. 2. Elytra nigra mar-  
gine & futura testaceis apice punto nigro. Ca-  
put atrum. Pedes nigri tibiis basi testaceis.

8. R. ater thorace ferrugineo, elytris testaceis: ma- *6 macula-*  
*tus.*  
cula nigra.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.



Caput nigrum fronte elevata, ferruginea. Thorax obscure ferrugineus. Elytra testacea maculis tribus nigris, altera baseos, altera in medio & tertia apicis. Abdomen & pedes atra tibiis piceis.

*maculatus* 9. R. ferrugineus pectore atro, elytris testaceis: macula nigra.

Habitat in Hungaria Dom. Saldoner.

Caput magnum, transversum, ferrugineum ore atro. Thorax gibbus, ferrugineus. Elytra testacea macula magna ante apicem nigra. Pectus atrum. Abdomen brevissimum, gibbum, ferrugineum ano obtuso, fere truncato: margine prominulo. Pedes ferruginei geniculatis nigris.

Color maris obscurior.

*dimidiatus*. 10. R. ater elytris basi flavis.

Habitat — — Mus. Dom. Yeats.

Corpus totum atrum, nitidum elytris solis a basi ad medium flavis. Abdomen valde obtusum & fere truficatum.

*limbatus*. 11. R. ferrugineus vertice thoracis disco elytrisque atris.

Habitat — — Mus. Dom. Yeats.

Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum, nitidum. Thorax in medio ater limbo omni ferrugineo. Scutellum ferrugineum. Pectus ferrugineum macula laterali atra. Elytra laevia, atra, immaculata. Abdomen breve, obtusum, ferrugineum basi utrinque macula magna, atra. Pedes nigri femoribus ferrugineis.

*populneus*. 12. R. niger elytris testaceis; fasciis tribus nigris; prima annulari.

Habitat in Germaniae Populo Dom. Smidt.

Caput obscurum antennis ferrugineis apice nigris. Thorax niger, obscurus. Elytra testacea fascia baseos annulari, inaequali, media dentata, tertia apicis. Corpus nigrum.

73. MORDELLA. *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* clavati.

*postici* filiformes.

*Maxilla* bifida.

*Labium* membranaceum, bifidum.

*Antennae* moniliformes.

1. M. ano aculeato, corpore atro immaculato. Linn. *aculeata*, syst. nat. 2. 682. 2. Fn. Sv. 532.

Geoff. Inf. 1. 353. 1.

Schaeff. Elem. tab. 84.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 46.

Schaeff. Icon. tab. 127. fig. 7.

Habitat in floribus semiflosculosis, umbellatis.

2. M. ano aculeato nigra elytris fasciis duabus cinctis *fasciata*. reis. Geoff. Inf. 1. 354. 2.

Habitat in Europae australioris floribus.

Mordellae corpus oblongum, compressum, glabrum, gibbum, immarginatum, agile, parvum, capite rotundato, inflexo, vix exerto, oculis ovatis, lateribus, insertis, antennis longitudine thoracis, sub oculis insertis, thorace gibbo, transverso, scutello minuto, elytris rigidis, attenuatis, longitudine abdominis faeminae saepius aculeati, pedibus curforiis, compressis, tarsis anticis quinque-posticis quadriarticulatis, colore minus nitido.

Dissert a praecedente elytris basi fasciaque media  
villoso cinereis, nitentibus.

- S punctata.* 3. M. ano aculeato, elytris nigris: punctis quatuor  
flavis; primo lunato.

Habitat in America septentrionali Mus. D. Banks.  
Caput fuscum. Thorax villoso flavescentis, antice  
punctis quatuor, postice strigis undatis, fuscis,  
Elytra atra, truncata punctis quatuor flavis,  
quorum primum baseos lunatum. Corpus gri-  
feum ano aculeo atro.

- testacea.* 4. M. atra elytris testaceis: marginibus nigris.

Habitat in Africæ Dauco D. Prof. Vahl.

Corpus atrum elytris solis testaceis margine omni  
tenuissime nigro. Anus aculeatus.

- ventralis.* 5. M. atra abdomine fulvo, ano aculeato.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas M. abdominalis at tho-  
rax niger. Abdomen totum fulvum aculeo elon-  
gato, nigro.

- abdominalis.* 6. M. ano aculeato nigra thorace abdomeisque fulvis,  
Mordella bicolor. Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 15.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Caput, pectus, elytra, spina analis, pedes atra.  
Thorax & abdomen fulva, immaculata, nitida.

- humeralis.* 7. M. atra elytris basi flavescentibus. Linn. syst.  
nat. 2. 682. 3. Fn. Sv. 833.

Anaspis. Geoff. Inf. 1. 356. 2.

Habitat in Europæ floribus.

- lateralis.* 8. M. atra ore thoracis lateribus pedibusque testaceis.  
Habitat in Holstiae floribus.

Statura parva praecedentium.

- frontalis.* 9. M. atra fronte pedibusque flavescentibus. Linn.  
syst. nat. 2. 682. 4. Fn. Sv. 834.

Habitat in Europæ floribus.

10. *M. atra* immaculata ano inermi. *atra.*  
 Habitat in Dania Dom. de Sehestedt.  
 Statura & magnitudo omnino *M. frontalis*, at  
 corpus totum atrum, immaculatum.
11. *M. atra* capite thoraceque flavis. Linn. syst. *thoracica*.  
 nat. 2. 682. 8. Fn. Sv. 835.  
 Habitat in Europa.
12. *M. atra* ore thorace pedibusque flavis. *ruficollis.*  
*Anaspis.* Geoff. Ins. 1. 356. 3.  
 Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
 Nimis affinis *M. thoracicae*. Differt tantum ca-  
 pite nigro ore flavo. Forte mera ejus varietas.
13. *M. flava* elytrorum apicibus nigris. Linn. syst. *flava*.  
 nat. 2. 682. 6. Fn. Sv. 836.  
 Habitat in floribus Europae umbellatis.

#### 74. DONACIA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium membranaceum,*  
*integrum.*

*Antennae* setaceae.

1. *D. plana* obscura elytris striatis viridi vel coe- *crassipes*.  
 ruleo nitidulis, abdome argenteo villoso, fe-  
 moribus posticis dentatis.

Donaciae corpus depresso-seculum, planum, gla-  
 brum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotun-  
 dato, inserto, oculis globosis, prominulis, laterali-  
 bus, antennis thorace longioribus, approximatis,  
 inter oculos insertis, thorace angusto, cylindrico, scut-  
 tello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicateis, lon-  
 gitudine abdominis saepius sericei, pedibus longiuscu-  
 lis, tenuibus, rotundatis, saepius femoribus clava-  
 tis, tarsis quadriarticulatis, colore saepius aurato,  
 nitidulo, subitus sericeo.



*Leptura aquatica.* Linn. syst. nat. 2. 637. 1.

Fn. Sv. 671.

Degeer Inf. 5. 140. 18. tab. 4. fig. 14. 15.

Geoff. Inf. 1. 229. 12.

Frish Inf. 12. tab. 6. fig. 2.

Habitat in plantis aquaticis, Nymphaeis.

Corpus planiusculum. Caput & thorax obscura.

Thoracis margo prominet & sere subspinofus.

Elytra crenato striata, nitidula. Abdomen argento villosum. Pedes mox obscuri, mox rufi femoribus posticis clavatis dentatis in utroque sexu.

*Festucae.* 2. D. coeruleo nigra femoribus posticis incrassatis dentatis.

Habitat in Germaniae *Festuca aquatica* Dom. Smidt.

Differre videtur, quamvis reliquis affinis. Corpus totum obscure coeruleo nigrum. Elytra punctato striata. Femora postica brevia, incrassata, dentata.

*dentipes.* 3. D. aenea elytris cupreis: margine omni viridi, femoribus posticis dentatis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Affinis reliquis. Caput & thorax aenea. Elytra cuprea margine omni viridi. Corpus subtus auro holosericum. Pedes obscure rufi femoribus posticis haud incrassatis at dentatis.

*Nymphaeae.* 4. D. thorace elytrisque cupreis, corpore cinereo villoso, femoribus posticis dentatis.

Habitat in *Nymphaeae* foliis frequens.

Reliquis paullo minor. Caput cupreum antennis oreque nigris. Thorax cylindricus, canaliculatus, antice utrinque puncto gibbo, prominulo, cupreus, immaculatus. Elytra crenato striata, cuprea. Corpus totum subtus cum pe-

dibus villis argenteis nitidulum. Femora postica vix incrassata at unidentata.

5. D. supra aenea elytris submicantibus, subtus villoso aurea, femoribus posticis dentatis. *Sagittariae*

Habitat in plantis aquaticis Germaniae Dom. Smidt.

Inter majores numeranda. Caput canaliculatum, aeneum, antennis nigricantibus. Thorax cylindricus, canaliculatus, scaber, aeneus. Elytra punctato striata, aenea, subinaequalia & micantia. Subtus villis aureis nitidula. Pedes concolores femoribus posticis dentatis.

6. D. nigra elytris substriatis, abdomine pedibus- *nigra*. que rufis.

Habitat in Germaniae aquis Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas D. *Festucae*. Antennae nigrae: primo articulo rufo. Caput & thorax nigra, immaculata, nitidula. Elytra minus striata minusque depressa. Abdomen rufum. Pedes rufi femoribus posticis in altero sexu simplicibus in altero dentatis.

7. D. aenea abdome argenteo villoso, femoribus *clavipes*. posticis clavatis inermibus.

Habitat in Germaniae plantis aquaticis D. Smidt.

Reliquis paullo major. Antennae nigrae apice rufae. Thorax & elytra punctato striata, aenea, nitidula. Abdomen argenteo villosum, nitidulum. Pedes rufi femoribus posticis clavatis, inermibus.

8. D. nigra pedibus posticis elongatis: tibiis apice *fasciculata* fasciculatis.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Boe.

Statura tenuis fere Cimicis lacustris. Corpus totum supra nigrum, subtus argenteo nitens. Pedes omnes nigri femoribus clavatis. Postici

valde elongati tibiis apice fasciculo magno  
pilorum elongatorum, nigrorum.

- simplex.* 9. D. aenea nitidula pedibus omnibus simplicibus.  
Habitat in Europae plantis aquaticis.  
Distincta omnino a praecedentibus. Corpus inter  
minores, cinereum, nitidulum antennis pedi-  
busque paullo obscurioribus. Elytra striato  
punctata. Pedes in omni sexu simplices.

- Hydrocha-* 10. D. cinerascens subtus argenteo villoso pedibus  
*ris.* simplicibus.  
Habitat in plantis aquaticis.  
Praecedentibus paullo minor. Caput cum an-  
tennis cinereum. Thorax rotundatus, utrinque  
tuberculo obtuso. Elytra punctato striata,  
cinerea. Corpus argenteo villosum. Pedes  
simplices.

75. TRICHIUS. *Palpi* quatuor filiformes.  
*Maxilla* bifida.  
*Antennae* elevato lamel-  
latae.

- Eremita.* 1. T. aeneo ater thorace inaequali, scutello sulco  
longitudinali.  
Cetonia Eremita. Mant. Inf. 1. 28. 23.  
Scarabaeus Eremita. Linn. syst. nat. 2. 556. 74.  
Oliv. Inf. 1. 6. 53. 71. tab. 3. fig. 17.  
Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 6.

---

Trichii corpus ovatum, depresso-  
scutellum, hirtum,  
immarginatum, tardum, capite ovato, inserto, labio  
prominulo, oculis ovatis, lateralibus, vix prominu-  
lis, antennis brevibus, distantibus, suboculis insertis,  
thorace antice angustato, hirto, scutello parvo, trian-  
gulari, elytris rigidis, inclientibus, abdome bre-  
vioribus, pedibus brevibus, validis, tibiis anticis  
dentatis, tarfis quinquearticulatis, colore variegato.

- Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 1.  
 Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 22.  
 Voet. Scarab. tab. 3. fig. 21.  
 Habitat in truncis putrescentibus Pyri, Salicis.  
 Triplo major T. nobilis. Recens odorem spar-  
 git corii Russici.
2. T. auratus abdomen postice albo punctato, ely- *nobilis*.  
 tris rugosis.  
 Cetonia nobilis. Mant. Inf. 1. 27. 8.  
 Scarabaeus nobilis. Linn. syst. nat. 2. 558. 81.  
 Fn. Sv. 401.  
 Scarabaeus viridis nitens, thorace infra aequali  
 non prominente Geoff. Inf. 1. 73. 6.  
 Oliv. Inf. 1. 6. 59. 72. tab. 3. fig. 10.  
 Roes. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 3. fig. 1-5.  
 Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 5.  
 Voet. Scarab. tab. 4. fig. 28.  
 Habitat Larva in ligno putrescente, imago in flo-  
 ribus praesertim umbellatis.  
 Larva grisea pedibus flavescentibus, capite fer-  
 rugineo.
3. T. niger thorace utrinque puncto baseos elytris *punctatus*  
 que duobus flavis.  
 Cetonia cordata. Mant. Inf. 1. 27. 10.  
 Scarabaeus variabilis. Linn. syst. nat. 2. 358. 79.  
 Oliv. Inf. 1. 6. 60. 73. tab. 4. fig. 27.  
 Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 41. 42.  
 Habitat in Germaniae ligno putrescente.  
 Statura & magnitudo praecedentis. Corpus atrum  
 puncto flavo utrinque ad basin thoracis. Puncta  
 duo in elytris, interiore minutissimo. Punctum  
 oblongum utrinque in ultimo abdominis seg-  
 mento.
4. T. niger tomentoso flavus elytris fasciis tribus *fasciatus*.  
 abbreviatis nigris.

*Scarabaeus fasciatus.* Linn. syst. nat. 2. 556. 70.

Fn. Sv. 395. Geoff. Inf. 1. 80. 16.

Oliv. Inf. 1. 6. 1. 74. tab. 9. fig. 84.

Drury Inf. 1. tab. 36. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 4.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 19.

Act. Nidrol. 4. tab. 16. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 5. fig. 43.

Habitat in Europae borealis floribus umbellatis.

*succinctus.* 5. T. niger tomentoso cinereus elytris nigris: fasciis duabus flavis.

*Scarabaeus succinctus.* Pall. Icon. tab. A. fig. 19.

Habitat in Germania Dom. Hübner.

Duplo minor praecedente. Clypeus integer, niger. Elytra nigra in medio fasciis duabus approximatis, flavis.

*indus.* 6. T. thorace hirsuto, elytris lividis fusco maculatis.

*Scarabaeus Indus.* Linn. syst. nat. 2. 556. 61.

Muf. Lud. Ulr. 27.

Oliv. Inf. 1. 6. 40. 46. tab. 6. fig. 40.

Habitat Indiis.

*bipunctatus.* 7. T. capite thoraceque glabris viridi aeneis, elytris testaceis, abdominis ultimo segmento prominente bipunctato.

*Melolontha bipunctata.* Oliv. Inf. 1. 5. 57. 44. tab. 6. fig. 69.

Habitat — — Muf. Dom. Banks.

Caput & thorax aenea, obscura nitida. Scutellum breve, triangulare, aeneum. Elytra glabra, laevia, testacea, immaculata. Corpus atrum segmentis abdominis utrinque strigis albis, ultimum segmentum prominent punctis duobus magnis albis.

8. T. capite thoraceque viridi aeneis pilosis, ely- *bibens.*  
 tris testaceis viridi nitentibus.  
 Oliv. Inf. 1. 6. 62. 75. tab. 10. fig. 87.  
 Habitat in America Mus. Dom. Tunstal.  
 Caput viridi aeneum, pilosum clypeo emarginato. Thorax viridi aeneus, nitens, pilosus. Elytra abbreviata, testacea, viridi colore nitida. Abdomen & pedes viridia, pilosa.
9. T. thorace tomentoso: rugis duabus longitudinali- *hemipterus.*  
 nalibus, elytris abbreviatis.  
 Scarabaeus hemipterus scutellatus muticus thorace tomentoso rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. Linn. syst. nat. 2. 555. 63.  
 Scarabaeus ater depresso & squamosus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, faemina aculeo ani. Geoff. Inf. 1. 78. 12.  
 Oliv. Inf. 1. 6. 65. 80. tab. 9. fig. 83. tab. II,  
 fig. 103.  
 Schaeff. Icon. tab. 46. fig. 10. 11.  
 Voet. Coleopt. tab. 10. fig. 88 - 90.  
 Habitat in Europaë ligno putrescente.  
 Faemina aculeo ani elongato, nigro.
10. T. fusco testaceus cinereo maculatus thorace *canalicu-*  
*canaliculato.*  
 Oliv. Inf. 1. 6. 69. 84. tab. 10. fig. 89.  
 Habitat in America septentrionali D. Lee.  
 Affinis praecedenti at minor & elytra fusco testacea maculis aliquot cinereis sparsis. Thorax valde canaliculatus. Pedes testacei.
11. T. glaber cyaneus elytris lunulis duabus albis. *lunulatus.*  
 Oliv. Inf. 1. 6. 63. 77. tab. 10. fig. 88.  
 Habitat in Carolina.  
 Capitis clypeus emarginatus. Corpus cyaneum maculis duabus lunatis albis ad marginem ex-

teriorem elytrorum. Elytra abdomine multo breviora.

*viridulus.* 12. *T. viridis pubescens* ano albo bimaculato. Oliv. Inf. 1. 6. 63. 76. tab. 9. fig. 86.

Habitat in India Mus. D. Hunter.

Corpus totum viride, nitens pilisque cinereis pubescens. Puncta alba minutissima in elytris. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus majoribus albis. Abdomen subtus utrinque lineola transversa alba.

*piger.* 13. *T. capite thoraceque aeneis villosis, elytris testaceis albo maculatis.*

Oliv. Inf. 6. 64. 78. tab. 7. fig. 54.

Habitat in Marylandia Mus. Brit.

Clypeus emarginatus. Segmentum ultimum abdominis prominens, testaceum macula utrinque oblonga, alba.

*Delta.* 14. *T. thorace nigro; triangulo albo, elytris testaceis: puncto fusco.*

Oliv. Inf. 1. 6. 64. 79. tab. 11. fig. 107.

Forster Cent. Inf. 1. 7. 7.

Drury Inf. 2. tab. 30. fig. 1. 2.

Habitat in America.

Antennae ferrugineaæ clava nigra. Caput porrectum, atrum lineola transversa punctisque duobus verticis albis. Thorax holofericeus, niger margine omni trianguloque dorsali albis. Apex trianguli postica respicit. Scutellum nigrum punctis duobus albis. Elytra abbreviata, laevissima, testacea puncto medio fusco. Sutura fusca basi albicat. Abdominis ultimum segmentum majus prominet niveum. Femora postica crassiora, incurva.

*lineatus.* 15. *T. pubescens thorace fulvo nigro lineato, elytris testaceis: sutura fulva.*

*Scarabaeus quadratus.* Degeer Inf. 7. 645. 48.

tab. 48. fig. 10. 11.

Oliv. Inf. 1. 6. 67. 81. tab. 7. fig. 63.

Voet. Coleopt. tab. 10. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae piceae fasciculo medio pilorum nigrorum. Thorax fulvus lineis tribus postice fere coeuntibus, nigris. Scutellum triangulum, nigrum puncto medio fulvo. Elytra testacea futura lata fulva. Anus fulvus. Pedes subtestacei.

16. *T. hirtus fuscus elytris testaceis; margine apicis cinerascente; nigripes.*

Oliv. Inf. 1. 6. 67. 82. tab. 9. fig. 85.

Degeer Inf. 1. tab. 48. fig. 9.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax nigra, hirta. Elytra testacea margine apicis saepius cinereo. Abdomen albidum. Pedes nigri.

17. *T. supra glaber cinereo maculatus capite thoraceque nigris, elytris piceis; maculatus:*

*Cetonia crassipes.* Oliv. Inf. 1. 6. 68. 83.

tab. 7. fig. 62.

*Scarabaeus obscure purpureus scutellatus villosus, thorace nigro, elytris obscure purpureis: maculis albis sparsis, abdomine subtus albo* Degeer. Inf. 7. tab. 48. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Caput nigrum, immaculatum clypeo emarginato. Thorax glaber, ater margine tenuissimo punctisque utrinque duobus cinereis. Elytra picea, cinereo maculata. Subtus cinereo pubescens abdominis apice flavescente. Pedes nigri tibiis posticis brevibus, truncatis.

76. CETONIA. *Maxilla apice setosa.*

*Labium coriaceum, emarginatum palpos tegens.  
Antennae lamellatae.*

- goliata.* 1. C. thorace piceo albo lineato, elytris glaucis, clypeo porrecto bifido.  
*Scarabaeus goliatus.* Mant. I. 7. 54.  
*Scarabaeus goliatus.* Linn. Mant. 5. 30.  
*Cetonia goliata.* Oliv. Inf. I. 6. 7. I. tab. 5.  
 fig. 33. tab. 9. fig. 33.  
*Drury* Inf. I. tab. 31. 3. tab. 40. fig. I.  
*Jablonsk* Coleopt. I. tab. 10. fig. 4.  
*Sulz.* Hist. Inf. tab. I. fig. 2.  
 Habitat in Africa Mus. D. Hunter.
- Cacicus.* 2. C. thorace flavescente nigro lineato, elytris albidis nigro maculatis, clypeo porrecto bifido.  
*Cetonia Cacicus.* Oliv. Inf. I. 6. 8. 2. tab. 3.  
 fig. 22.  
*Scarabaeus goliatus.* Jabl. Coleopt. I. t. II. f. 2.  
*Voet.* Coleopt. tab. 21. fig. 51.  
 Habitat in America meridionali.  
 Elytra apice subemarginata. Clypeus apice bifurcus laciniis arcuatis.
- bifrons.* 3. C. obscure aenea elytris fuscis albo irroratis, clypeo porrecto bifido, vertice hastato.
- 

Cetoniae corpus oblongum, glabrum, immarginatum, laeve, tardum, capite ovato, inserto, labio prominente: margine incrassato, oculis globosis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace antice angustato, elevato, scutello longiori, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, vix ab domine brevioribus, pedibus brevibus, validis, tibiis dentatis, tarsis quinquearticulatis, colore saepius nitido.

Cetonia bifrons. Oliv. Inf. 6. tab. fig.

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Gigot d'Orcy.

Minor C. cacico. Caput depresso, obscure aeneum, clypeo porrecto, bifido: laciniis recurvis, truncatis, obtusis. Vertex spina incubente, acuta. Antennae nigrae. Thorax glaber, obscure aeneus puncto utrinque magno impresso. Scutellum triangulum, obscure aeneum. Elytra nigra, albo irrorata strigaque media, valde angulata, alba. Corpus obscure aeneum. Tibiae anticae bidentatae.

4. C. viridis albo lineata capite tricorni: cornu *Polyphemus.*  
medio porrecto bifido.

*mus.*

Scarabaeus Polyphemus. Mant. 1. 7. 53.

Oliv. Inf. 1. 6. 9. 3. tab. 8. fig. 61.

Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.

C. goliata duplo minor. Caput depresso albo villosum antennis nigris. Cornua tria, atra, nitida anteriori porrecto longiori, recurvo, apice bifido: laciniis arcuatis, lateralibus minoribus, subarcuatis. Thorax viridis lineis quinque albis: intermedia abbreviata. Scutellum triangulare, viride, immaculatum. Elytra viridia lineis tribus e maculis albis, intermedia abbreviata. Subtus albida sterno prominulo obtuso abdomineque viridibus, nitidis. Pedes virides femoribus utrinque linea alba. Tibiae anticae utrinque dentatae, posticae intus ciliatae.

5. C. viridis nitens clypeo porrecto recurvo bifido, *micans.*  
tibiis anticis ferratis.

Cetonia micans. Oliv. Inf. 1. 6. 10. 4. tab. 1,  
fig. 2.

Scarabaeus micans Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 3.

Habitat in Africa.

Caput carinatum spina parva utrinque inter oculos. Denticuli duo parvi, elevati in medio & duo alii ad apicem clypei. Carina ipsa excurrit in dentem elongatum, fere longitudine capitis, compressum, recurvum, bifidum: laciis divergentibus. Elytra abdomine paullo breviora, acuminata, nitentia. Sternum antice porrectum, latum, obtusum linea longitudinali tenuissima, ferruginea. Pedes antici elongati tibiis ferratis & tarsis sub unguibus fasciculo pilorum. Ultimum abdominis segmentum prominet puncto parvo utrinque impresso.

*chinensis.* 6. C. aenea clypeo emarginato subspinosa, thorace postice lobato, elytris acuminatis.

Oliv. Ins. 1. 6. 11. 5. tab. 2. fig. 5.

Forster Cent. Ins. 1. 2.

Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 40.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Clypeus cylindricus, late emarginatus apicibus subspinosis. Thorax & elytra viridi aenea, immaculata. Elytra acuminata. Sternum prominens, obtusum. Corpus castaneum, parum nigro maculatum. Femora postica nigra puncto rubro. Tarsi omnes nigri.

*nigrita.* 7. E. glabra atra clypeo emarginato subspinosa, thorace postice lobato.

Oliv. Ins. 1. 6. 11. tab. 10. fig. 92.

Pet. Gazoph. tab. 28. fig. 3.

Hermann. Mus. 17. 257.

Habitat Ceylonae Mus. Britann.

Statuta praecedentis at tota atra, nitida. Clypeus quadratus, late emarginatus: apicibus porrectis acutis. Thorax laevis, glaber, ater macula laterali brunnea, obsoleta. Pedes nigri.

8. C. aurata segmento abdominis primo lateribus *aurata*.  
unidentato, elytris lineolis transversis albis.

*Scarabaeus auratus*. Linn. syst. nat. 2. 557. 78.

Fn. Sv. 400.

*Scarabaeus viridi aeneus*. Geoff. Inf. 1. 73.

Frish Inf. 12. 25. tab. 3. fig. 1.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 2.

Oliv. Inf. 1. 6. 12. 7. tab. 1. fig. 1.

Voet. Scarab. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 26. fig. 2. 3. 7.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 11. fig. 1.

Habitat in Europae ligno putrefacente, Formicarum acervis Larva. Imago in floribus.

Imago tacta per anum ejicit liquorem foetidissimum.

9. C. aenea nitidissima immaculata. *fastuosa*.

*Cetonia speciosissima*. Ross. Fn. Etr. 1. 25. 57.

Scopol. Del. Inf. 1. tab. 21. fig. A.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 2. fig. 6.

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 66. fig. 4.

Habitat in Europa australiori.

Varietatem C. auratae olim credidi at distincta  
videtur major, nitidissima, supra & subtus  
absque maculis albis. Pedes virides. Punctum  
parvum ad basin elytrorum impressum.

10. C. aenea thorace elytrisque atomis numerosis *marmorata*.  
albis sparsis.

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 3.

Habitat in Germaniae Quercu Dom. Smidt.

C. aurata major. Caput aeneum, immaculatum  
clypeo apice incrassato. Thorax aeneus, niti-  
diusculus lateribus albo maculatis. Elytra  
aenea, obscure nitida atomis plurimis sparsis

albis. Subtus aenea utrinque linea punctorum alborum.

- viridis.* 11. C. viridis opaca subtus nitidior elytris albo maculatis.

Cetonia Hungarica. Herbst Archiv. t. 29. f. 7.  
Habitat in Italia D. Allioni.

Affinis omnino C. auratae. Caput, thorax & scutellum viridia, opaca, omnino immaculata. Elytra viridia, opaca maculis lateralibus unaque dorsali versus apicem albis. Subtus nitidior ano prominulo, albo bipunctato.

- metallica.* 12. C. aenea opaca immaculata subtus cuprea.

Habitat in Italia D. Allioni.

Caput aeneum clypeo margine incrassato. Thorax aeneus, obscure nitidus, immaculatus. Elytra aenea, opaca, immaculata. Subtus tota cuprea, immaculata.

- pubescens.* 13. C. obscure aenea thoracis segmentorumque margine albo, ano bipunctato.

Cetonia pubescens. Oliv. Inf. 1. 6. 21. 18. tab. 11. fig. 100.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Olivier.

Paullo major C. aurata. Caput obscure aeneum fronte cinereo pubescente. Thorax obscure aeneus margine albo. Elytra obscure aenea, immaculata. Abdomen magis nitidum, aeneum segmentorum marginibus utrinque albis. Anus maculis duabus albis. Femora supra macula magna alba.

- opaca.* 14. C. viridis opaca capitis clypeo reflexo.

Habitat in Africae floribus compositis Mus. Dom. Prof. Vahl.

Magnitudo C. auratae supra viridis obscura, subtus atra nitidior. Capitis clypeus reflexus.

- 15.** *C. nigra obscura corpore subtus nitidiore.* *morio.*  
*Cetonia morio.* Oliv. Inf. 1. 6. 27. 27. tab. 2.  
 fig. 3.  
*Scarabaeus lugubris.* Voet. Coleopt. tab. 2.  
 fig. 14.  
 Habitat in Europa australiori D. Allioni.  
 Affinis *C. auratae* at tota nigra.
- 16.** *C. nigra capitis clypeo porrecto basi utrinque cuspidata.*  
 sinuato, thoracis limbo elytrorumque margine  
 cinereis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.  
 Capitis clypeus valde porrectus, niger, margine  
 subreflexo, vix emarginato, basi utrinque sinu  
 magno, rotundato. Puncta duo cinerea inter-  
 dum inter antennas. Antennae lamellis tri-  
 bus elongatis. Thorax glaber, niger limbo  
 saepius toto cinereo, interdum tamen margo  
 anticus concolor. Elytra glabra, obscure ni-  
 gra margine cinereo. Corpus nigrum ultimo  
 abdominis segmento prominente punctis duo-  
 bus cinereis.
- 17.** *C. atra nitida capitis clypeo cordato.* *cordata.*  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.  
 Capitis clypeus omnino cordatus, glaber, laevis,  
 ater. Antennae lamellis tribus brevibus. Tho-  
 rax glaber, ater, nitidus, immaculatus. Ely-  
 tra vix striata, atra. Tibiae anticae valde den-  
 tatae.
- 18.** *C. nigra thorace punctis quatuor albis.* *4 punctata.*  
 Habitat in agro Paedemontano D. Allioni.  
 Statura & magnitudo omnino *C. Morio* at  
 puncta quatuor minutissima alba in thorace.  
 Mera varietas *C. morio* teste Rossi.
- 19.** *C. nigra ano bipunctato, pedibus rufis, tibiis rufipes.*  
 posticis spinis annulatis.

*Cetonia 4 punctata.* Oliv. Inf. 1. 6. 80. 101.  
tab. 10. fig. 93.

Habitat in India Mus. D. Hunter.

Caput nigrum antennis ferrugineis. Caput & thorax laevia, glabra, atra, obscure nitida, immaculata. Abdomen nigrum segmento ultimo punctis duobus albis. Pedes ferruginei digitis nigris, unguis arcuatis, validis, acutis. Tibiae posticae annulis tribus elevatis e spinis brevibus, radiatis.

*nitida.* 20. *C. thorace postice lobato, capite spina incumbente, sterno cornuto.*

*Scarabaeus nitidus scutellatus muticus,* thorace postice lobato, capite spina recumbente, sterno porrecto. Linn. syst. nat. 2. 552. 52.

20. M. Lud. Ulr. 20.

Oliv. Inf. 1. 6. 18. 14. tab. 3. fig. 16. tab. 7. fig. 56.

Roes. Inf. 2. *Scarab.* 1. tab. B, fig. 4.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 5. 6.

Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 2. 3.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 8. 9.

Habitat in America, Carolina.

*lobata.* 21. *C. nigra nitida thorace postice lobato, clypeo emarginato, sterno cornuto.*

*Cetonia lobata.* Oliv. Inf. 1. 6. 23. 21. tab. 4. fig. 26.

Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 20.

Habitat in America meridionali Mus. D. Olivier. Statura & affinitas *C. nitidae.* Clypeus late emarginatus. Thorax punctatus, postice productus. Elytra lineis duabus elevatis, ante apicem coeuntibus. Sturnum breve, cornutum, obtusum.

22. C. nigro viridis, thorace elytrisque testaceis, *Carmelita.*  
ano albo bipunctato.

Habitat in Africa Dom. Saldoner.

Statura praecedentis. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax rotundatus, testaceus disco obscuriore. Elytra testacea, immaculata. Corpus nigro viride. Abdomen segmentorum marginibus utrinque albis. Anus prominet punctis duobus albis. Tibiae posticae in medio unidentatae.

23. C. viridi aenea nitida elytris sulcatis. *fulcata.*

Cetonia sulcata. Oliv. Inf. 1. 6. 36. 39. tab. 5.

fig. 32.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Caput & thorax viridi aenea, nitida, immaculata. Scutellum porrectum, aeneum. Elytra viridi aenea, nitida, sulcata. Corpus viridi aeneum sterno abbreviato.

24. C. scutello elytris dimidio breviore, sterno porrecto, corpore viridi subtus cupreo. *Chrysis.*

Scarabaeus Chrysis scutellatus muticus sterno porrecto, scutello elytris dimidio breviore.

Linn. syst. nat. 2. 591. 49. Mus. Lud. Ulr. 21.

Gronov. Zoophyl. 423. tab. 15. fig. 1.

Oliv. Inf. 1. 6. 76. 96. tab. 4. fig. 19.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 10.

Voet. Coleopt. tab. 8. fig. 63.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 4.

Habitat in America australi.

25. C. scutello elytris dimidio breviore, sterno porrecto, corpore aeneo nitido. *lucida.*

Cetonia lucida. Oliv. Inf. 1. 6. 75. 94. tab. 7.  
fig. 64.

Habitat in Insula Guadeloupe Dom. Olivier.

Distincta a C. Chrysis in primis corpore toto  
aeneo, nitido.

- capucina.* 26. C. picea thoracis margine flavescente, sterno  
porrecto.

Habitat in India Dom. Daldorff.

Statura omnino C. Chrysis tota picea, supra  
glabra margine thoracis flavescente, subitus  
nitida, hirta, sterno antice porrecto, recurvo.  
Femora postica valde compressa.

- Lanius.* 27. C. exscutellata livida thorace punctis duobus,  
elytris maculis plurimis nigris, sterno antice  
cornuto.

Cetonia Lanius. Oliv. Inf. 1. 6. 19. 15. tab. 2.  
fig. 4.

Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 44.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 8.

Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 7. 8.

Habitat in America meridionali.

- graculus.* 28. C. exscutellata obscure livida thorace elytris-  
que nigro maculatis.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Nimis affinis C. Lanius at minor multoque ob-  
scurior. Thorax haud punctis, sed maculis  
plurimis nigris. Liturae aliquot albae ad mar-  
ginem exteriorem elytrorum. Elytra postice  
gibba futuraque parum acuminata. Sternum  
porrectum, minus cornutum.

- Carnifex.* 29. C. scutellata rubra elytris nigro maculatis.

Scarabaeus Lanius exscutellatus muticus ruber,  
adspersis punctis nigris. Linn. syst. nat. 2.  
557. 77.

Oliv. Inf. 1. 6. 29. 16. tab. 6. fig. 43.

Roeßl. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 16.

Habitat in America meridionali.

Differt manifeste a C. Lanio. Caput rufum ore nigro. Thorax punctatus, rufus, vix maculatus margine baseos subemarginato. Scutellum distinctum, triangulum, nigrum. Elytra substriata, rufa, nigromaculata. Subtus atra sterno vix porrecto, obtuso, rufo. Abdomen lineis tribus punctorum rubrorum intermediis majoribus. Femora quatuor postica rufa, nigro marginata. Tibiae nigrae, apice rufae.

30. C. testacea nitida sterno antice porrecto obtuso. *glabrata*.  
 Cetonia glabrata. Oliv. Inf. 1. 6. 70. 86.  
 tab. 9. fig. 80.
- Melolontha glabrata. Mant. Inf. 1. 20. 17.  
 Habitat in Indiis Mus. Britt.  
 Supra glaberrima, testacea at viridi aeneo colore tincta, nitidissima. Clypeus late emarginatus. In capite & thorace maculae duae obscuriores. Subtus aenea.
31. C. nigra obscura elytris obsolete rufo maculatis. *ravea*.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Vahl.  
 Corpus obscure nigrum, minime nitidum. Thorax laevis, immaculatus. Elytra maculis plurimis rufis, obsoletis. Sturnum abbreviatum.
32. C. nigra obscura immaculata thoracis margine *cornuta*.  
 antico subcornuto.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Vahl.  
 Corpus nigrum, obscurum, supra glabrum, subtus rufo hirtum. Thorax rotundatus margine antico in medio elevato, subcornuto. Elytra vix striata. Femora postica incrassata.
33. C. nigra albo maculata abdominis segmentis *trifidis*.  
 margine albis, clypeo emarginato, sterno cornuto.

*Cetonia tristis.* Oliv. Inf. 1. 6. 22. 20. tab. 18.  
fig. 91.

Habitat in America Mus. D. Hunter.

Clypeus porrectus, emarginatus. Thorax niger,  
postice productus. Elytra picea linea una  
alterave elevata. Sternum breve, cornutum.  
Abdomen piceum segmentorum marginibus  
albis, qui tamen color haud usque ad medium  
extenditur.

*smaragdula* 34. *C. ferrugineo flavescens elytris virescentibus,*  
*sterno cornuto.*

*Cetonia smaragdula.* Oliv. Inf. 1. 6. 73. 91.  
tab. 10. fig. 90.

Drury Inf. 2. tab. 3. fig. 3.

Habitat in America Mus. D. Hunter.

Caput & thorax obscure flavescens. Elytra  
virescentia. Corpus flavescens abdomine ob-  
scurore. Tibiae posticae punctis impressis.

*fascicularis* 35. *C. thorace lineis quatuor albis, elytris viridi-  
bus, abdominis incisuris barbatis.*

*Cetonia fascicularis.* Oliv. Inf. 1. 6. 16. 12.  
tab. 11. fig. 108.

*Scarabaeus fascicularis.* Linn. syst. nat. 2. 557.  
75. Mus. Lud. Ulr. 26.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 2.

Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 17.

Wulf Inf. Cap. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Africa.

Subtus tota lana heluola fasciculatim tecta.

*aulica.* 36. *C. viridis nitida thoracis margine elytrorum-  
que maculis albis.*

*Cetonia aulica.* Oliv. Inf. 1. 6. 16. 11. tab. 2.  
fig. 7. 6.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput viride punctis duobus parvis ante oculos albis. Clypeus emarginatus. Thorax viridis, nitidus margine exteriori albo. Elytra obtusa, viridia, nitida, macula baseos, quinque marginalibus, duobus dorsalibus & unica apicis albis. Subtus viridis pectore albo villoso. Abdomen lineis quatuor macularum albarum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus albis. Pedes virides femoribus posticis macula alba.

37. *C. glabra nigra thorace elytrisque purpureo-purpurascens.*

Habitat in India orientali Prof. Abilgaard.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput nigrum oculis testaceis clypeo que subemarginato. Thorax & elytra laevia, purpure scens, immaculata. Scutellum fere nigrum. Sternum haud porrectum.

38. *C. hirta rufa albo punctata. capensis.*

*Cetonia capensis.* Oliv. Inf. 1. 6. 27. 28.  
tab. 6. fig. 38.

*Scarabaeus capensis.* Linn. syst. nat. 2. 556.

73. Mus. Lud. Ulr. 30.

Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 11.

Roel. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 6.

Degeer Inf. 7. 640. 40. tab. 48. fig. 2.

Wulf Inf. cap. tab. 1. fig. 2.

Habitat in Africa.

39. *C. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis: futura marginaque nigris. signata,*

*Cetonia signata.* Oliv. Inf. 1. 6. 28. 29.

tab. 5. fig. 35.

Voet. Coleopt. tab. 2. fig. 13.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

**Caput atrum clypeo subemarginato.** Thorax glaber, laevis, ater sutura dorsali basi ferruginea margineque laterali albo. Scutellum atrum. Elytra testacea sutura, margine exteriori, lineola baseos calloque apicis nigris. Margo posticus parum albicat. Subtus hirta sterno brevi obtuso.

**marginata.** 40. C. glabra atra thoracis elytrorumque marginibus rufis.

Cetonia marginata. Oliv. Inf. 1. 6. 26. 26. tab. 5. fig. 34.

Scarabaeus marginatus. Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 10.

Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 1.

Voet. Coleopt. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Guinea frequens in Jatropha Gorcas. Clypeus emarginatus, omnino inermis. Thorax niger margine antico & laterali rufis. Elytra glabra, atra margine laterali & postica lateo rufis.

**ornata.** 41. C. glabra obscure purpurascens thorace elytrorumque margine sinuato testaceo.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Statura & magnitudo omnino C. marginatae. Caput nigrum macula magna, frontali, testacea. Thorax obscure purpurascens margine late testaceo puncto medio nigro. Elytra laevia, obscura, purpurascens margine lato & valde sinuato, testaceo. In medio strigam abbreviatam flexuosam, emittit. Anus prominet testaceus margine atro. Subtus flava abdomine, segmentorum marginibus atris. Pedes nigri femoribus posticis testaceis.

**marginella.** 42. C. viridis thoracis elytrorumque margine ferrugineo.

Habitat in Sierra Leon. Dom. Tunstall.

Color supra viridis margine thoracis & elytrorum ferrugineo. Subtus viridis, nitens abdomine utrinque lineis duabus macularum albidarum. Sternum breve, obtusissimum, capitatum. Ultimum abdominis segmentum prominet maculis quatuor albidis.

43. *C. nigra lineola flava a capite ad scutellum lineola.*  
ducta.

*Cetonia lineola.* Oliv. Inf. 1. 6. 77. 98. tab. 5.  
fig. 28.

*Scarabaeus lineola.* Linn. syst. nat. 2. 552. 53.

Roes. Inf. 2. Scarab. 1. tab. B. fig. 7.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 5.

*Cetonia ephippium nigra thoracis margine lineaque dorsali, elytris macula difformi ferrugineis.* Mant. Inf. 1. 29. 31.

Oliv. Inf. 1. 6. 78. 98. tab. 11. fig. 106.

Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 81.

Drury Inf. 3. tab. 44. fig. 3.

Habitat in America meridionali.

Conf. *Scarabaeus surinamensis.* Linn. syst.  
nat. 2. 552. 54.

Oliv. Inf. 1. 6. 79. 99. tab. 11. fig. 104. vix  
differt.

44. *C. glabra atra nitida thoracis margine testaceo: striata:*  
puncto nigro, clypeo emarginato.

*Cetonia striata.* Oliv. Inf. 1. 6. 79. 100. tab. 11.  
fig. 102.

Habitat in Guadeloupe Americae Dom. Isert.

Statura & magnitudo C. lineolae. Clypeus niger,  
late emarginatus. Thorax glaber, laevis, nitidus  
margine testaceo puncto medio nigro.

Elytra striata, brunnea, nitida, immaculata.

Corpus subtus variegatum sterno porrecto,  
testaceo. Pedes testacei.

Variat capitinis scutellique linea dorsali alba.

- sinuata.* 45. C. fusca thorace elytrisque margine punctisque  
duobus flavis.

Cetonia sinuata. Oliv. Inf. 1. 6. 25. 24. tab. 8.  
fig. 28.

Scarabaeus punctato marginatus. Degeer Inf. 7.  
639. 38. tab. 47. fig. 20

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax niger  
margini late flavo puncto medio nigro. Puncta  
duo flava in medio dorso. Scutellum utrinque  
puncto baseos flavo. Elytra margine sinuato  
flavo punctaque apicis nigro. Puncta pree-  
terea duo flava in singulo elytro. Subtus atra  
sterno rotundato.

- fasciata.* 46. C. nigra thoracis margine elytrisque testaceis;  
elytris sutura fasciaque dentata nigris.

Habitat Alexandriae Dom. Prof. Forskahl.

Corpus nigrum statura C. thoracicae. Thorax  
niger margine antico & laterali testaceis. Ely-  
tra testacea sutura fasciaque postica dentata  
nigris.

- thoracica.* 47. C. nigra thorace ferrugineo, elytris nigris sub-  
purpurascentibus.

Habitat Alexandriae Dom. Prof. Forskahl.

Major C. aurata atra. Thorax ferrugineus, basi  
niger. Elytra obscura purpureo colore inpri-  
mis ad margines tincta.

- olivacea.* 48. C. testacea thorace lineis punctisque duobus,  
elytris maculis quatuor transversis nigris.

Cetonia olivacea. Oliv. Inf. 1. 6. 37. 41.  
tab. 8. fig. 69.

Scarabaeus cordatus. Drury Inf. 2. tab. 32.

Voet. Coleopt. I. tab. I. fig. 7.

Habitat in Sierra Leon. Africæ Mus. Dom.  
Tunstall.

Caput nigrum, immaculatum. Thorax testaceus lineis duabus, latis, dorsalibus & puncto utrinque parvo laterali nigris. Scutellum testaceum margine nigro. Elytra obtusa, testacea maculis quatuor magnis, transversalibus, nigris, quae tamen marginem exteriorem haud attingunt. Subtus olivacea abdominis segmentis apice nigris. Sternum breve, obtusum.

49. C. thoracis margine lineaque dorsali, elytrorum *interrupta*.  
fasciis interruptis testaceis.

Cetonia interrupta. Oliv. Inf. I. 6. 35. 42.  
tab. 8. fig. 70.

Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Statura C. olivaceae at duplo minor. Caput atrum clypeo emarginato. Thorax ater vittis tribus latis testaceis, marginalibus puncto medio atro. Scutellum testaceum. Elytra margine fasciisque tribus interruptis, testaceis. Sternum exsertum, breve, obtusum.

50. C. nigra thorace quinque lineato, elytris acuminatis albo maculatis. *picta*.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Caput nigrum lineolis duabus maculaque utrinque oculari albis. Thorax niger lineis quinque albis. Scutellum triangulum, nigrum linea alba, quae basin haud attingit. Elytra acuminata, antice punctis albis substriata, postice maculata. Ultimum abdominis segmentum prominens album linea nigra. Subtus alba linea media atra.

51. C. nigra thorace lineis tribus, elytris fascia *trilineata*.  
flexuosa scutelloque albis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Caput nigrum linea longitudinali flava. Clypeus emarginatus. Thorax niger linea dorsali lateralibusque flavis. Punctum nigrum in margine. Scutellum triangulum, flavidum. Elytra substriata nigra linea flexuosa abbreviata, flava. Abdomen nigrum ano fascia flexuosa flava. Pedes nigri flavo variegati.

- elata.* 52. C. atra thorace lineis tribus albis, elytris olivaceis: margine atro albo punctato.

Habitat in Guinea Dom. von Rohr.

Media. Clypeus porrectus, tridentatus dente intermedio minuto, lateralibus porrectis. Caput atrum, nitidum punctis duobus albis. Thorax ater, nitidus lineis tribus albis: intermedia abbreviata. Scutellum atrum linea alba. Elytra vix punctata, olivacea sutura atra, immaculata, margineque atro albo punctato, in primis macula magna alba elytron terminat. Corpus atrum lateribus albo maculatis, sterno porrecto. Pedes atri femoribus linea alba.

- semipunctata.* 53. C. viridis nitida thorace quadrilineato, elytris basi lineatis apice punctatis.

Habitat — — Dom. Boeber.

Clypeus subemarginatus, viridis lineis duabus abbreviatis, albis. Thorax lineis utrinque duabus albis. Scutellum immaculatum. Elytra laevia, viridia basi lineis duabus, apice punctis plurimis albis. Corpus subtus albo villosum linea media glabra, aenea. Pedes virides femoribus albo villosis.

- 5 lineata.* 54. C. nigra thorace quinque lineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo spinaque incumbente.

**Cetonia 5 lineata.** Oliv. Inf. 1. 6. 56. 36.  
tab. 8. fig. 76.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum, immaculatum clypeo apice elevato, acuto, in medio spina incumbente, acuta. Thorax niger lineis impressis albis. Scutellum triangulum margine lineola baseos alba. Elytra fusca, albo maculata futura lineisque duabus elevatis rubris interiore abbreviata. Abdomen atrum utrinque lineis duabus punctorum alborum. Anus prominent fuscus maculis duabus albis.

55. *C. nigra nitida elytris atro maculatis macula-* *atromacu-*  
*que postica alba.* *lata.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt.

Media. Capitis clypeus reflexus, vix emarginatus, niger. Thorax laevis, niger, nitidus, immaculatus. Elytra striata, nigra maculis plurimis holofericeis atris at postice macula transversa, alba. Corpus atrum abdomine punctis lateralibus albis.

56. *C. nigra thoracis margine ferrugineo.* *limbata.*

Habitat in Aegypto Dom. Prof. Forskahl.

Obscure nigra, haud nitida. Thorax margine antico & laterali ferrugineis. Linea parva purpurascens in dorso elytrorum ad futuram.

57. *C. cyanea thoracis margine elytrisque testaceis.* *splendida.*

*Cetonia splendida.* Oliv. Inf. 1. 6. 75. 95.

tab. 4. fig. 21.

Voet. Coleopt. tab. 8. fig. 62.

Habitat in India.

Corpus totum glabrum, nitens. Caput, thorax, scutellum & abdomen cyanea. Thoracis margo & elytra testacea. Scutellum longitudine fere dimidi elytri.

- elegans.* 58. *C. viridis nitidissima elytrorum sutura puncto-*  
*que apicis atris.*  
*Cetonia elegans.* Oliv. Inf. 1. 6. 29. 30. tab. 4.  
 fig. 25.  
 Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
 Magnitudo omnino *C. auratae*. Clypeus apice  
 subreflexus spinaque incumbente minutissima.  
 Thorax viridis, nitidissimus, immaculatus.  
 Scutellum concolor. Elytra viridia, nitidissima,  
 sutura puncto que apicis gibbo atris ob coloris  
 nitorem vix conspicuis. Subtus concolor primo  
 abdominis segmento margine testaceo. Ster-  
 num prominens, subrecurvum, obtusum.  
 Variat rarius puncto adhuc baseos nigro.
- 4 maculata.* 59. *C. viridis fulvo micans elytris maculis duabus*  
*nigris, sterno obtuso.*  
*Cetonia 4 maculata.* Oliv. Inf. 1. 6. 30. 31.  
 tab. 8. fig. 73.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
 Capitis clypeus obtusus, subemarginatus, ful-  
 vus. Thorax, elytra, scutellum viridia, laevia,  
 fulvo colore micantia. Punctum nigrum ad  
 basin & alterum ad apicem elytrorum; subtus  
 viridis nitens ano obscuro. Femora utrinque  
 linea fulva.
- cuprea.* 60. *C. cuprea nitida thorace scutello elytrisque*  
*viridibus.*  
 Habitat Surinami Mus. Dom. Tunstall.  
 Caput cupreum clypeo truncato, integro. Tho-  
 rax viridis, nitidus, postice emarginatus. Elytra  
 laevia, viridia, immaculata. Subtus tota co-  
 lore cupri vivacissimi. Sturnum breve, ob-  
 tusum.
- africana.* 61. *C. aenea nitens capitis spina incumbente, sterno*  
*porrecto, elytris punctis nigris striatis.*

**Cetonia africana.** Oliv. Inf. 1. 6. 31. 32.  
tab. 8. fig. 70.

**Scarabaeus africanus.** Drury Inf. 2. tab. 30.  
fig. 3.

Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 25.

Habitat in Africa, Sierra Leon.

Clypeus apice reflexus in medio spina parva in-  
cumbente armatus. Thorax aeneus, nitidus,  
laevissimus. Elytra aenea, nitida, punctis ni-  
gris impressis striata, apice obtusa. Sternum  
valde porrectum. Subtus concolor atomis mi-  
nutissimis fuscis irrorata. Alae coerulescen-  
tes. Pedes aenei plantis nigris.

**62. C. thorace nigro: margine rufo, elytris aeneo *futuralis*.  
nitidis: futura nigra.**

**Cetonia futuralis.** Oliv. Inf. 1. 6. 32. 34.  
tab. 8. fig. 74.

Habitat in Africa Dom. Drury.

Clypeus apice reflexus spinaque parva incum-  
bente. Thorax elevatus, laevis, ater, nitens  
marginē obscure rufo. Scutellum nigrum.  
Elytra laevissima, aenea futura, apicē callo-  
que baseos nigris. Sternum porrectum. Ab-  
domen piceum. Pedes picei, apice nigri.

**63. C. hirta viridi aenea elytris testaceis : vitta *vittata*.  
media nigra futuraque aenea.**

**Melolontha Zebra.** Oliv. Inf. 1. 6. 5. 54. 73.  
tab. 7. fig. 75.

Voet. Coleopt. tab. 7. fig. 60.

Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.

Caput viridi aeneum, cinereo villosum clypeo  
emarginato. Thorax villosus, aeneus. Ely-  
tra glabra, laevia, testacea vitta media margine-  
que exteriori nigris. Sutura aenea. Subtus  
hirta, aenea.

*fulgida.*

**64.** C. aenea nitidissima abdominis ultimo segmento prominente quadripunctato.

Cetonia fulgida. Oliv. Inf. I. 6. 33. 35.  
tab. 8. fig. 75.

Voet. Coleopt. tab. 3. fig. 24.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Capitis clypeus integer. Thorax aeneus, ferrugineo parum micans, nitidissimus. Elytra viridia, nitidissima, ferrugineo parum micantia, postice gibba. Sternum breve, rotundatum. Abdomen aeneum utrinque lineis duabus macularum albidarum. Anus prominent punctis quatuor albis. Pedes rufi geniculis nigris.

*Iris.*

**65.** C. viridis nitidissima fusco micans.

Cetonia Iris. Oliv. Inf. I. 6. 31. 33. tab. 8.  
fig. 77.

Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 25.

Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.

Corpus viride, nitidissimum at fusco colore micans. Capitis clypeus emarginatus at absque ulla spina. Thorax elytraque subtilissime punctata. Sternum porrectum, breve, orbiculatum.

*gagates.*

**66.** C. atra nitida clypeo truncato reflexo, sterno obtuso.

Cetonia gagates. Oliv. Inf. 16. 25. 25. tab. 4.  
fig. 20. tab. 11. fig. 20.

Scarabaeus carbonarius. Degeer Inf. 4. 824. 18.

Scarabaeus gagates. Forster Cent. Inf. 6. 6.

Habitat in Sierra Leon. Mus. Dom. Banks.

Clypeus truncatus, obtusus, reflexus. Thorax ater, nitens, postice emarginatus. Elytra obtusa, nitida, postice gibba. Sternum obtusum.

*tetradactyla* **67.** C. atra scutello elytris dimidio breviore, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.

- Cetonia tetradactyla. Oliv. Inf. 1. 6. 74. 93.  
tab. 2. fig. 8. tab. 7. fig. 53.
- Scarabaeus tetradactylus. Linn. Mant. 530.
- Drury Inf. 1. tab. 33. fig. 7.
- Sloan. Jam. 2. 237. fig. 2.
- Habitat in America meridionali.
- Statura & magnitudo C. Chrysis at tota atra.
68. C. viridi cuprea nitida elytris testaceis, sterno *clavata*.  
antice cornuto.
- Oliv. Inf. 1. 6. 72. 89. tab. 8. fig. 68.
- Habitat in America meridionali Dom. Banks.
- Magnitudo & statura omnino praecedentis. Corpus laeve, nitidum, immaculatum, mox aeneum, mox cupreum. Elytra laevia, glabra, testacea. Sternum antice valde porrectum, subclavatum, obtusum.
69. C. atra nitida thoracis margine omni elytro- *fucata*.  
rumque vittis duabus flavis.
- Cetonia quadrivittata. Oliv. Inf. 1. 6. 92. 7.  
fig. 65.
- Drury Inf. 3. tab. 44. fig. 4.
- Habitat in America meridionali Mus. D. Banks.
- Praecedentibus paullo minor. Caput atrum, immaculatum. Thorax laevis, ater, nitidus margine omni late flavo, nitido. Scutellum atrum. Elytra laevia, nitida, atra vittis duabus latis flavis apice coeuntibus. Sternum antice porrectum, elevatum. Corpus nigrum.
70. C. nigro aenea elytris lineis duabus elevatis *lurida*.  
alboque maculatis.
- Cetonia livida. Oliv. Inf. 1. 6. 43. 50. tab. 9.  
fig. 81.
- Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.
- Clypeus rotundatus, integer. Thorax vase punctatus, postice emarginatus. Elytra ob-

tusa, nigra, albo maculata. Lineae duae elevatae postice coeuntes apicem haud attingunt. Sturnum obtusum.

*aurichalcea* 71. C. cuprea nitida elytris acuminatis albo maculatis.

Cetonia aurichalcea. Oliv. Inf. 1. 6. 42. 49.  
tab. 9. fig. 78.

Habitat ad Suratte Indiae Mus. Britann.

Clypeus integer. Thorax cupreus, immaculatus.  
Elytra postice acuminata, cuprea, parum albo maculata.

*nitidula*. 72. C. viridis testaceo nitida clypeo emarginato, elytris acuminatis.

Habitat in Africa Dom. Lee.

Statura parva praecedentis. Corpus viride, testaceo nitidum. Clypeus late emarginatus apicibus nigris. Elytra ad futuram accuminata. Ultimum abdominis segmentum proeminet immaculatum. Pedes concolores.

*philippensis* 73. C. aenea nitida thorace margine punctisque duobus albis, elytris acuminatis maculatis.

Cetonia Philippensis. Oliv. Inf. 1. 6. 34. 37.  
tab. 10. fig. 97.

Pet. Gazoph. tab. 26. fig. 9.

Habitat in Insulis Philippinis Mus. Britann.

Clypeus valde emarginatus. Thorax rotundatus, aeneus, nitens margine punctisque duabus dorsalibus albis. Elytra viridia, splendida, albo maculata, postice acuminata.

*stolata*. 74. C. viridi fusca thorace margine punctisque, elytris acuminatis: fascia media maculisque niveis.

Cetonia stolata. Oliv. Inf. 1. 6. 43. 51. tab. 7.  
fig. 59.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput fuscum lineis duabus albis baseos. Clypeus emarginatus. Thorax obscure virescens margine laterali punctisque utrinque duobus albis: posteriore majore. Elytra obscure virescentia fascia in medio undata, quae tamen suturam haud attingit maculisque plurimis albis. Pedes fuscui.

75. C. atra albo maculata elytris acuminatis: vitta *festiva*. lata testacea.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Caput atrum clypeo emarginato. Thorax holosericeus, ater, minime nitidus subtus utrinque macula magna antica alba. Elytra atra margine exteriori albo maculato vittaque media lata testacea, apice ad suturam acuminata. Anus prominet punctis duobus albis. Pectus macula laterali alba. Abdomen atrum, nitidum maculis lateralibus transversis albis. Pedes atri.

76. C. atra nitida coleoptris fascia lata interrupta *abbreviata*. flava.

Habitat Senegal Mus. Dom. Geoffroy.

Media. Corpus totum atrum, nitidum fascia coleoptrorum lata, sinuata in medio ad suturam interrupta, flava.

77. C. aenea nitida thorace utrinque macula, elytris plurimis albis, sterno obtuso. *maculata*.

Cetonia maculata. Oliv. Inf. I. 6. 36. 40. tab. 7. fig. 66.

Voet. Coleopt. tab. I. fig. 8.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Caput aeneum, immaculatum. Thorax aeneus, nitidus utrinque macula magna, sinuata, alba. Elytra laevia, aenea, albo maculata, quarum anterior major fere fasciam constituit, apice vix

acuminata. Subtus cuprea pectore utrinque macula magna alba. Abdomen lineis quatuor punctorum alborum.

*acuminata*. 78. C. obscura aenea pallido maculata, elytris acuminatis.

Cetonia acuminata. Oliv. Inf. 1. 6. 42. 48. tab. 8. fig. 72.

Voet. Coleopt. tab. 5. fig. 37.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Elytra postice excurrunt in spinam compressam, acutissimam. Subtus aenea lateribus albo maculatis.

*haemorrhoi-* 79. C. nigra elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis.

Cetonia haemorrhoidalis. Oliv. Inf. 1. 6. 55. 66. tab. 4. fig. 24. tab. 11. fig. 24.

Degeer Inf. 7. 642. 43.

Herbst Arch. tab. 43. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Hunter.

Parva. Caput nigrum clypeo emarginato. Thorax glaber, rufus linea media lata, nigra. Scutellum nigrum. Elytra substriata, viridia, nitida. Anus rufus prominent. Corpus nigrum.

*areata*. 80. C. nigra pubescens elytris disco rufo.

Cetonia areata. Oliv. Inf. 1. 6. 48. 58. tab. 9. fig. 82.

Habitat in Virginia Mus. Britann.

Thorax niger, pubescens. Elytra glabra, postice gibba ad futuram linea unica elevata nigra disco ferrugineo. Abdomen nigrum.

*hirta*. 81. C. nigricans hirta elytris pallido maculatis, thorace carinato.

Cetonia hirta. Oliv. Inf. 1. 6. 52. 63. tab. 8. fig. 36. 44.

Scarabaeus hirtellus. Linn. syst. nat. 2. 556. 69.

- Schaeff. Icon. tab. 198. fig. 8.  
 Voet. Coleopt. tab. 4. fig. 33. 34.  
 Scopol. Ent. carn. 8.  
*B.* Scarabaeus squalidus. Linn. syst. nat. 2.  
 556. 68.  
 Voet. Scarab. tab. 4. fig. 33.  
 Habitat in Europa australiori.
82. C. glabra nigra thorace elytrisque albo *funesta*.  
 punctatis.  
 Habitat in Italia D. Allioni.  
 Caput nigrum, immaculatum clypeo emarginato. Thorax laevis, glaber, obscurus, utrinque punctis quinque albis. Elytra obtusa, nigra, obscura punctis plurimis albis sparsis. Subtus atra, nitida.
83. C. clypeo emarginato nigra albo maculata ab- *stictica*.  
 domine subtus punctis quatuor albis.  
 Cetonia stictica. Oliv. Inf. 1. 6. 53. 64. tab. 7.  
 fig. 57.  
 Scarabaeus sticticus. Linn. syst. nat. 2. 552. 54.  
 Scarabaeus nigro coerulescens. Geoff. Inf. 1.  
 79. 14.  
 Herbst Arch. tab. 19. fig. 27.  
 Voet. Coleopt. tab. 22. fig. 32.  
 Habitat in Galliae Carduis frequens.
84. C. cinerea elytrorum striis albo punctatis. *punctulata*.  
 Cetonia punctata. Oliv. Inf. 1. 6. 54. 64.  
 tab. 6. fig. 47.  
 Habitat in Senegal Mus. D. Geoffroy.  
 Statura parva C. sticticae. Thorax cinereus  
 punctis parvis albis distinctis, sparsis. Elytra  
 cinerea striis obscurioribus, albo punctatis.
85. C. glabra nigra thoracis elytrorum abdominis- *floralis*.  
 que margine albo.

Habitat in Africæ floribus compositis Dom.  
Prof. Vahl.

Caput atrum punctis duobus albis inter oculos.  
Clypeus subemarginatus. Thorax ater mar-  
gine laterali & postico albis. Elytra nigra  
marginé albo maculari interdumque maculis  
aliquot sparsis albis. Anus prominet albus.  
Abdomen atrum margine albo maculato. Pe-  
des nigri.

Variat minor fere tota nigra.

*I4maculata* 86. C. capite thoraceque aureis , elytris punctis  
quatuordecim albis.

Habitat — — Muf. Dom. Lee.

. Parva. Caput & thorax aurea, nitidissima. Cly-  
peus emarginatus. Thorax postice productus,  
acus. Elytra obscure viridia, glabra punctis  
septem albis. Pectus albo maculatum. Ab-  
domen subtus utrinque lineis duabus puncto-  
rum alborum.

*verficolor.* 87. C. nigra thorace rufo nigro maculato, elytris  
nigris albo punctatis: dorso rufo.

Cetonia verficolor. Oliv. Inf. 1. 6. 46. 54.  
tab. 4. fig. 23.

Scarabaeus cruentus. Pall. Icon. tab. B. fig. 24.  
Herbst Arch. tab. 19. fig. 28.

Acta Berol. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Aegypto Prof. Forstkahl.

Caput atrum. Thorax rufus antice maculis dua-  
bus, magnis, nigris lineolaque marginali cine-  
rea. Margo tamen ipse parum elevatus, te-  
nuissime niger. Scutellum nigrum puncto api-  
cis albo. Elytra nigra punctis sparsis albis &  
disco macula magna, oblonga, ferruginea. Ab-  
domen atrum marginibus quoque albo ma-  
culatis.

Variat maculis thoracis atris albo pupillatis & coecis.

88. C. atra thorace margine elytrisque maculis albis *variegata*.  
sparsis.

Cetonia variegata. Oliv. Inf. I. 6. 47. 56.  
tab. 5. fig. 30. 31. 6.

Scarabaeus albellus. Pall. Icon. I. 17. tab. A.  
fig. 18.

Herbst Arch. tab. 19. fig. 29.

Habitat Tranquebariae D. Koenig.

Forte mera praecedentis varietas, at color rufus omnino deest.

89. C. atra thoracis margine albo, coleoptris testa-*aequinoctialis*: macula scutellari apiceque atris. lis.

Cetonia aequinoctialis. Oliv. Inf. I. 6. 50. 60.  
tab. 6. fig. 42.

Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput atrum clypeo emarginato. Thorax ater margine albo. Elytra rufescentia macula communij ad scutellum atra, apice acuminata, atra macula transversa albida. Corpus atrum.

90. C. atra elytris acuminatis: macula magna mar- *sanguinolenta*.

Cetonia sanguinolenta. Oliv. Inf. I. 6. tab. 6.  
fig. 41.

Habitat in Senegal Mus. Dom. Geoffroy.

Statura praecedentis. Elytra acuminata macula magna irregulari, sinuata, laterali, fulva.

91. C. atra elytris fulvis: macula scutellari *apice-discoidea*.

que atris fasciaque media purpurea.

Habitat in Bengalia Mus. de Paykull.

Statura praecedentium. Caput, thorax, scutellum atra, immaculata. Elytra fulva macula

communi ad scutellum atra striga baseos fascia-  
que media ad marginem bifida purpurea. Apex  
late ater, immaculatus. Corpus atrum.

- lugubris.* 92. C. glabra atra elytris macula lateralí anoque  
albis.

Cetonia lugubris. Oliv. Inf. 1. 6. 44. 52.  
tab. 7. fig. 60.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Clypeus integer. Abdomen utrinque macula  
lineaque punctorum albis.

- histrio.* 93. C. testacea capite thoracis lineis duabus elytro-  
rum futura maculisque tribus nigris.

Cetonia histrio. Oliv. Inf. 1. 6. 45. 53. tab. 10.  
fig. 94.

Habitat in Aegypto D. Prof. Forskahl.

Caput nigrum. Thorax testaceus lineis duabus  
dorsalibus, apice convergentibus, nigris. Scu-  
tellum testaceum. Elytra acuminata, testacea  
futura & maculis tribus: posteriore transversa.  
Subtus picea punctis plurimis albis.

- modesta.* 94. C. supra viridis opaca albo punctata capite  
emarginato atro.

Habitat Tranquebariae Dom. de Sehestedt.

Parva. Caput atrum, immaculatum antennis  
palpisque testaceis. Clypeus emarginatus. Tho-  
rax supra obscure viridis punctis duobus, par-  
vis, albis, subtus utrinque lobo antico albo.  
Scutellum viride. Elytra obscure viridia punctis  
parvis, sparsis, albis. Corpus piceum, nitidum  
lateribus dense villosis. Ultimum abdominis  
segmentum prominet, basi album, apice ferru-  
gineum. Pedes atri.

95. C. testacea nitida lineis abbreviatis nigris. *gloriosa.*

Melolontha Dorcyi. Oliv. Inf. I. 5. 34. 38.

tab. 4. fig. 41.

Habitat in Insula St. Domingo.

Magnitudo C. auratae. Caput testaceum orbita oculorum atra. Thorax nitidus lineolis apicis sex nigris, abbreviatis, intermediis longioribus. Scutellum testaceum margine nigro. Elytra laevia lineis duabus abbreviatis liturisque aliquot marginalibus atris. Subtus brunnea, flavo lineata.

96. C. atra glabra elytris postice punctis duobus *hottentotta.*

albis.

Cetonia hottentotta. Oliv. Inf. I. 6. 56. 68.

tab. 7. fig. 55.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Statura reliquis longior & angustior. Caput atrum clypeo obtuso, integro. Thorax ater, glaber, nitens, postice rotundatus. Elytra basi gibba, vix striata, atra, apice pari punctorum alborum notata. Ultimum abdominis segmentum prominet utrinque macula obscure picea. Pedes atri.

97. C. glabra atra thorace postice maculis duabus *cruenta.*  
elytrisque sanguineis.

Cetonia cruenta. Oliv. Inf. I. 6. 57. 69. tab. 6.

fig. 37. tab. 7. fig. 58.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentis. Caput retusum, atrum. Thorax punctatus, ater, nitidus, postice maculis duabus sanguineis, quae totum fere marginem posticum occupant. Elytra striata, atra vitta lata sanguinea. Corpus atrum anno sanguineo.

77. MELOLONTHA. *Maxilla brevis,*  
*cornea, apice multidentata : denti-*  
*bus simplicibus,*  
*acutis.*

*Antennae lamel-*  
*latae.*

- Fullo.* 1. *M. testacea albo maculata scutello macula dupli-*  
*plici, antennis heptaphyllis.*  
*Scarabaeus Fullo.* Linn. syst. nat. 2. 553. 57.  
*Fn. Sv. 394.* Geoff. Inf. 1. 69. 2.  
*Oliv. Inf. 1. 5. 9. 1. tab. 3. fig. 28.*  
*Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 2.*  
*Pet. Gaz. tab. 138. fig. 1.*  
*Voet. Scarab. tab. 6. fig. 48. 49.*  
*Petagna Inf. Calabr. 3. 11. tab. 1. fig. 1.*  
*Frish Inf. 11. 22. tab. 1. fig. 1.*  
*Roef. Inf. 4. tab. 30.*  
*Aub. Miscell. tab. 16. fig. med.*  
*Habitat in Europae sylvis arenosis.*  
*Conf. Scarabaeus albus.* Pall. Icon. 1. 19. tab. B.  
*fig. 21.*  
*Scarabaeus heloleucus.* Pall. Icon. 1. 19. tab. B.  
*fig. 21.*

---

Melolonthae corpus oblongum, gibbum, tomentosum, laeve, immarginatum, tardum, capite ovato, inferto, labio rotundato, oculis globosis, lateralibus, insertis, antennis brevibus, sub oculis insertis, thorace transverso, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tibiis dentatis, tarsis quinquearticulatis, colore variegato.

Melontha alba. Oliv. Inf. 1. 5. 10. 2. t. 8. f. 91.  
vix mihi distincta videtur.

2. M. obscure testacea clypeo emarginato, thoracis margine serrato.

Oliv. Inf. 1. 5. 11. 4. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Coromandel D. Koenig Mus. D. Banks.

Magnitudo M. vulgaris. Capitis clypeus fuscus apice elevatus, emarginatus. Thorax laevis, obscure testaceus margine dentibus nigris serrato. Elytra testacea lineis aliquot elevatis, obsoletis.

3. M. testacea thorace villoso, incisuris abdominis albis.

Scarabaeus melolontha. Linn. syst. nat. 2. 554.

60. Fn. Sv. 392.

Geoff. Inf. 1. 70.

Oliv. Inf. 1. 5. 12. 5. tab. 1. fig. 1.

Pet. Gazoph. 29. tab. 19. fig. 2.

Roef. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 14.

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 45. 46.

Schaeff. Elem. tab. 8. fig. 3. tab. 109. fig. 4.

Icon. tab. 93. fig. 1. 2. tab. 102. fig. 3. 4.

Habitat in Europae borealis graminosis.

Variat thorace rufo & nigro & utraque varietas alternat annuatim Roeffel.

Animalculum inter omnia nostrata maxime fatale.

Larva mollis, grisea capite pedibusque testaceis per plures annos sub terra degit & devorat radices vegetabilium agros prataque desolens.

Imago vesperi volitans cum susurro devastat folia arborum tilia intacta.

Devoratur a suibus, corvis, cornicibus, picis, gallinis, meleagribus, carabis majoribus. Per diem arboribus concussis facillime colligitur a pueris.

- villofa.* 4. *M. testacea clypeo marginato reflexo, corpore subtus lanato, scutello albo.*  
*Scarabaeus saepicola.* Linn. syst. nat. 2.  
*Scarabaeus cerealis.* Scop. Flor. Inf. 1. 49. tab. 21. fig. B.  
Oliv. Inf. 1. 5. 13. 6. tab. 1. fig. 4.  
Habitat in Europa australiori Dom. Allioni.  
Statura & magnitudo *M. vulgaris*. Clypeus major & latior quam in reliquis apice reflexus. Thorax rotundatus, niger, ferrugineo pubescens. Scutellum albo villosum. Elytra testacea. Subtus lana densa alba tecta.
- pilosa.* 5. *M. villosa nigricans clypeo reflexo subemarginato, antennis ferrugineis.*  
Habitat in Hungaria Mus. D. de Sehestedt.  
Affinis certe *M. villosa*, cuius varietatem olim credidi, at minor & distincta videtur. Corpus nigricans, tomento cinereo tectum in primis subtus. Scutellum latum, subemarginatum. Antennae ferrugineae.
- occidentalis* 6. *M. testacea thorace pubescente, elytris lineis quatuor niveis.*  
*Scarabaeus occidentalis.* Linn. syst. nat. 2. 555. 62.  
Oliv. Inf. 1. 5. 14. 7. tab. 1. fig. 7.  
Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 2.  
Habitat in Europa australiori.
- servida.* 7. *M. glabra testacea clypeo emarginato.* Oliv. Inf. 1. 5. 24. 21. tab. 9. fig. 109.  
Habitat in America septentrionali.  
Praecedenti affinis at minus *villosa* totaque testacea, rore coerulescente tecta.
- reflexa.* 8. *M. glabra testacea clypeo reflexo.* Oliv. Inf. 1. 5. 24. 22. tab. 4. fig. 32.

Habitat in Africa Mus. Dom. Banks.

Praecedente paullo minor. Corpus totum glabrum.

9. M. fulvo hirta clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. Oliv. Inf. 1. 5. 18. 9.  
tab. 4. fig. 35.

*Scarabaeus vertumnus.* Pall. Itin. 1. 10. 28.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Clypeus rotundatus, glaber margine reflexo emarginato. Caput & thorax pilis densissimis, fulvis tectum. Elytra glabra, laevia, nigra, immaculata. Corpus hirtum.

10. M. cinereo hirta elytris nigris, clypeo reflexo *tomentosa*. integro.

Habitat in India orientali Dom. Lee.

Statura & magnitudo M. Alopex. Clypeus rotundatus, reflexus, integer. Caput, thorax abdomen cinereo hirta, immaculata. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata. Pedes nigri.

11. M. testacea thorace villoso, elytris luteo palli- *solfstitialis*. dis: lineis tribus pallidioribus.

*Scarabaeus solstitialis.* Linn. syst. nat. 2. 554.

61. Fn. Sv. 393.

Oliv. Inf. 1. 5. 16. 10. tab. 2. fig. 8. 11.

Frish Inf. 9. 30. tab. 15. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 93. fig. 3.

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 51. 52.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 15.

Habitat in Europae arboretis

M. vulgaris ferio ad solstitialium aestivum frequens.

12. M. clypeo rotundato, corpore villoso albo. *candida*.

*Melolontha candida.* Oliv. Inf. 1. 5. 15. 8.  
tab. 8. fig. 98.

Habitat in India orientali Dom. Lee.



Statura fere M. vulgaris at duplo major & corpus villoso albidum. Punctum niveum versus apicem elytrorum.

- atra.* 13. M. clypeo reflexo villosa nigra antennis ferrugineis.

Melolontha atra. Herbst Arch. tab. 24. fig. 1.

Melolontha fusca. Oliv. Inf. 1. 5. 99. 13. tab. 2. fig. 10.

Habitat in Europa australiori Dom. Prof. Vahl. Magnitudo & statura M. solstitialis. Caput nigrum clypeo rotundato, reflexo, integro. Thorax rotundatus, villosus. Elytra striata, nigra. Pectus albo villosum. Corpus nigrum. Antennae rufae. Pedes nigri.

- aequinoctialis.* 14. M. villosa testacea clypeo subreflexo.

*lis.* Melolontha aequinoctialis. Herbst Arch. tab. 22. fig. 11.

Melolontha aestiva. Oliv. Inf. 1. 5. tab. 2. fig. 11. 6.

Habitat in Hungaria Dom. Helwig.

Statura omnino M. solstitialis at alia & distincta, tota testacea, pilis cinerascentibus hirta. Antennae rufae.

- Pini.* 15. M. nigra clypeo thoracis lateribus elytris pedibusque pallidis.

Melolontha Pini. Oliv. Inf. 1. 5. tab. fig.

Habitat in Barbaria Mus. D. Desfontaines.

Affinis M. solstitiali. Caput nigrum clypeo subreflexo, pallido. Thorax niger margine late pallido. Elytra striis elevatis. Corpus fuscum pedibus pallidis. Tibiae dentatae.

- maculata.* 16. M. oblonga glabra testacea thorace utrinque macula abdomineque flavis. Oliv. Inf. 1. 5. 33. tab. 5. fig. 45.

Habitat in China Mus. Dom. Banks.

Thorax testaceus utrinque macula magna flavescens. Elytra vix striata, testacea. Abdomen flavum maculae ultimi segmenti testacea. Pedes flavescens.

17. *M. oblonga villosa pallida elytris futura apice-que nigris, clypeo reflexo.*

Oliv. Inf. 1. 5. 28. 28. tab. 8. fig. 99.

Habitat in Barbariae Atriplice hamilifolio Mus. Dom. Prof. Vahl.

Clypeus rotundatus, reflexus. Caput, thorax, corpus villosa, pallida, immaculata. Elytra sublaevia, pallida futura apiceque late nigris. Pedes pallidi tarsis fuscis.

18. *M. oblonga glabra nigra elytris obsolete striatis. oblonga.*

*Scarabaeus oblongus.* Scop. carn. 10.

Oliv. Inf. 1. 5. 19. 14. tab. 4. fig. 34.

Habitat in Germania.

Minor *M. vulgari* tota glabra, nigra. Oculi testacei. Elytrorum striae per paria approximatae, obsolete.

19. *M. villosa testacea abdomine albicante. ruficornis.*

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 50.

Habitat in Germania Dom. Hattorff.

Forte varietas *M. solstitialis.* Caput nigricans antennis rufis. Thorax & pectus villis densis albis tecta. Elytra testacea, immaculata. Abdomen albidum ano nigricante. Pedes nigri.

20. *M. subtus lanata capite thoraceque aureis, elytris luteis. lanigera.*

*Scarabaeus lanigerus.* Linn. syst. nat. 2. 555.

67. Mus. Lud. 20.

Oliv. Inf. 1. 5. 21. 17. tab. 4. fig. 39.

Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 6.

Voet. Coleopt. tab. 7. fig. 59.

Habitat in India.

Clypeus truncatus, obtusus. Sternum antice acutum.

*longicornis.* 21. M. supra glabra nigra elytris ferrugineis, antennarum clava elongata.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo M. lanigerae. Capitis clypeus rotundatus, glaber, integer, niger. Antennarum clava lamellis tribus porrectis, obscure ferrugineis. Thorax glaber, niger, immaculatus. Elytra glabra, laevia, obscure ferruginea. Subtus fulvo hirta abdomine glabro.

*punctata.* 22. M. testacea elytris punctis tribus fuscis distans tibus.

Scarabaeus punctatus. Linn. syst. nat. 2. 557.  
76. Mus. Lud. 23.

Oliv. Inf. 1. 5. 22. 18. tab. 1. fig. 6.

Drury Inf. 1. tab. 34. fig. 6.

Gronov. Gazoph. 438.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 65.

Habitat in America.

Ungues arcuati, acutissimi.

*viridis.* 23. M. glabra supra viridis subtus aurea.

Oliv. Inf. 1. 5. 29. 31. tab. 3. fig. 21. 6.  
tab. 3. fig. 18.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Sternum haud porrectum.

*aenea.* 24. M. glabra aenea abdominis lateribus albis, elytris acuminatis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Color supra aeneus, nitidus, immaculatus, subtus magis coerulescens pectoris abdominalisque marginibus piloso albis. Scutellum rotundatum. Elytra apice ad futuram acuminata.

Sternum porrectum, acutum. Femora linea  
punctorum impressorum.

25. *M. viridis elytrorum sutura flavescente Oliv. futuralis.*

*Inf. 1. 5. 31. 34. tab. 7. fig. 80.*

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput viride, immaculatum margine elevato.

Thorax glaber, viridis marginibus parum flavescentibus: postico obtuse angulato. Elytra glabra, substriata, viridia sutura flavescente. Pectus & abdomen pilis albis tecta sterno porrecto, acuto. Pedes virides tarsis ferrugineis.

26. *M. glabra viridis subtus testacea pedibus apice bicolor.*

*aureis Oliv. Inf. 1. 5. 30. 33. tab. 7. fig. 86.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Duplo praecedente minor supra tota viridis, glabra, obscura, immaculata, subtus obscure testacea, aeneo colore tincta, Femora pallidiora. Tibiae & tarsi aurei.

27. *M. glabra nigra nitida abdominis ultimo segmento prominulo barbata.*

*Scarabaeus barbatus Mant. Inf. 1. 10. 91.*

Habitat in India.

Tota laevis, glabra, nitens. Ultimum abdominis segmentum ultra elytra prominet pilis longioribus ferrugineis barbatum.

28. *M. glabra testacea capite elytrorum sutura tibiisque posticis nigris, clypeo reflexo elata.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. de Sehestedt. Statura & magnitudo omnia M. punctatae. Caput nigrum clypeo reflexo oculisque albido. Thorax laevis, glaber, testaceus, utrinque punto parvo fusco. Scutellum testaceum margine nigro. Elytra laevia, testacea. Pedes testacei tibiis posticis nigris.

- dorsalis.* 29. M. glabra testacea capite thoracis coleoptrorum.  
que dorso nigris.  
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
Paullo minor M. solstitiali. Caput nigrum.  
Thorax niger lateribus testaceis: puncto  
nigro. Coleoptra testacea linea lata, communi,  
dorsali, nigra. Pedes testacei tibiis posticis  
nigris.
- glacialis.* 30. M. glabra picea antennis pedibusque testaceis  
Oliv. Inf. 1. 5. 78. 46. tab. 6. fig. 61.  
Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.  
Corpus magnitudine praecedentis glabrum, pi-  
ceum, obscurum. Clypeus einarginatus. Pedes  
testacei, postici obscuriores.
- lurida.* 31. M. thorace nigro: margine pallido, elytris  
griseis nigro punctatis.  
Habitat — — Mus. Dom. Tunstall.  
Caput nigrum clypeo subintegro. Thorax ni-  
ger margine laterali pallido. Elytra grisea  
macula oblonga ad marginem exteriorem ba-  
seos, punctis duobus ad suturam & unico  
versus apicem nigris. Pedes nigri.
- striata.* 32. M. glabra aenea elytris striatis: sutura lineis-  
que quatuor cupreis.  
Oliv. Inf. 1. 5. 39. 49. tab. 6. fig. 65.  
Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.  
Statura praecedentium at minor. Caput &  
thorax glabra, aenea, nitida. Scutellum  
aeneum. Elytra paullo obscuriora, sulcis de-  
cem striata. Sutura lineaeque quatuor, quae  
postice per paria coeunt, cuprea. Corpus sub-  
tus & pedes atra.
- triflisis.* 33. M. thorace villoso obscuro, elytris laevibus  
testaceis, scutello albo.  
Habitat in America boraeli Dom. Blackburn.

Caput & thorax hirta, obscura. Scutellum rotundatum, hirsutie densa albidum. Elytra laevia, testacea. Corpus obscurum.

34. M. glabra testacea capite obscuriore, elytris striatis. *testacea*.  
 Oliv. Inf. 1. 5. 39. 47. tab. 5. fig. 49.  
 Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.  
 Statura omnino M. brunneae at paullo major.  
 Corpus totum testaceum capite tamen magis nigricante & punctum nigrum ad apices femorum. Labium emarginatum. Elytra striata.
35. M. hirta nigra elytris punctatis glabris rufis. *hirticollis*.  
 Habitat in Africa Dom. Prof. Vahl.  
 Clypeus rotundatus, reflexus, niger. Caput, thorax, abdomen, pedes nigra, punctata, cinerreo hirta. Scutellum nigrum. Elytra glabra, punctata, rufa, immaculata.
36. M. glabra testacea capite elytrorumque futura *pallida*.  
 nigris.  
 Melolontha spinipes Herbst Arch. 13. 4. tab.  
 19. fig. 21.  
 Oliv. Inf. 1. 5. 25. 24. tab. 9. fig. 103.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Major M. brunnea. Caput rotundatum, nigrum ore pallidiore. Thorax glaber, laevis, testaceus. Elytra substriata, pallidiora futura in primis ad scutellum nigra. Pedes pallidi apice nigri.
37. M. glabra punctata ferruginea elytris testaceis. *ruficollis*.  
 Oliv. Inf. 1. 5. 27. 26. tab. 9. fig. III.  
 Habitat in Coromandel Koenig Mus. Dom. Banks.  
 Major M. brunnea. Clypeus rotundatus, integer, obscure ferrugineus, in medio lineis duabus elevatis, transversis. Thorax glaber,

valde punctatus, rufus, immaculatus. Elytra  
glabra, testacea, punctata.

- variolosa.* 38. *M. villosa nigra thorace elytrisque variolosis.*  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.  
Statura M. signatae. Corpus supra nigrum  
punctis impressis cinereis, subtus villosum.  
Clypeus rotundatus, reflexus lineaque media  
transversa, elevata.

- signata.* 39. *M. glabra pallida thorace lineis duabus elytris  
maculis tribus nigris.*  
Scarabaeus nigrocephalus scutellatus rufo livi-  
dus, capite rufo postice nigro, corpore oblongo.  
Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 6.  
Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.  
Caput basi atrum. Clypeus integer, pallidus.  
Thorax pallidus lineolis duabus atris, quae  
tamen nec basin nec apicem attingunt. Elytra  
glabra, laevia, pallida maculis tribus 2. 1.  
quarum exterior reliquis minor. Subtus pallida  
abdomine nigro. Tibiae anticae apice com-  
pressae, dentatae. Tarsi picei basi apiceque  
spinosi.

- marginata.* 40. *M. glabra aenea elytris testaceis : futura mar-  
gineque exteriori aeneis.*  
Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
Media. Caput & thorax punctata, aenea, nitida  
clypei margine obscuriore. Scutellum aeneum.  
Elytra subpunctata, striata, testacea futura  
margineque anteriori viridi aeneis. Corpus  
obscure aeneum. Tibiae dentatae.

- coeruleoce-  
phala.* 41. *M. glabra coeruleo nigra elytris testaceis : futura  
ferruginea.*  
Oliv. Inf. 1. 5. 36. 43. tab. 6. fig. 59.  
Habitat — — Mus. Dom. Banks.

- Paullo praecedente minor. Caput coeruleo nigrum clypeo subreflexo. Thorax glaber, laevis, coeruleo niger margine exteriori testaceo. Scutellum coeruleo nigrum. Elytra vix striata, testacea futura ferruginea. Corpus obscurum.
42. *M. glabra testacea elytris striatis, thorace brunnea.*  
utrinque puncto notato.  
*Scarabaeus brunneus* Linn. Syst. nat. 2. 556. 72.  
*Scarabaeus fulvus* Geoff. Inf. 1. 83. 22.  
*Degeer* Inf. 4. tab. 10. fig. 17.  
*Oliv.* Inf. 1. 5. 43. 55. tab. 4. fig. 33.  
*Ross.* Fn. Etr. 1. 22. 50.  
*Voet.* Coleopt. tab. 7. fig. 53. 54.  
*Sulz.* Hist. Inf. tab. 1. fig. 9.  
Habitat in Europae arboretis.  
Larva mollis, albida capite pedibusque testaceis devorat radices, imago folia.
43. *M. glabra refescens capite nigro, elytris pallidis,* *melanocephala.*  
*Oliv.* Inf. 1. 5. 43. 55. tab. 7. fig. 83.  
*Voet.* Coleopt. tab. 9. fig. 80.  
Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
Statura & magnitudo praecedentis. Clypeus rotundatus, reflexus, ater, orbita oculorum albida. Thorax glaber, rufescens, nitidus. Scutellum rufum. Elytra laevia, pallida. Subtus uti & pedes rufescens.
44. *M. glabra pallida capite rufo basi nigro;* *Oliv.* *erythrocephala.*  
Inf. 1. 5. 41. 51. tab. 7. fig. 80.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Affinis *M. melanocephala* at duplo minor.  
Corpus totum glabrum, laeve, immaculatum capite solo obscure rufo, basi nigro.
45. *M. nigricans thorace pallido: punctis duobus mixta:*  
nigris.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Lee.  
 Statura & magnitudo omnino M. melanocephala. Caput nigrum oculis albis. Thorax glaber, laevis, pallidus utrinque puncto nigro. Elytra nigricantia, flavo mixta. Corpus nigrum femoribus testaceis.

- obscura.* 46. M. obscure picea immaculata pilis brevissimis erectis albis. Oliv. Inf. 1. 5. 42. 53. tab. 6. fig. 64.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks. Corpus magnitudine M. rufae, totum obscurum, rufum & pilis brevissimis albis vix nudo oculo conspicuis tectum.
- rufa.* 47. M. glabra rufescens elytris testaceis, clypeo quinquedentato.  
 Oliv. Inf. 1. 5. 4. 3. tab. 7. fig. 29.  
 Voet. Scarab. tab. 9. fig. 70.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Statura M. brunneae. Clypei margo reflexus dentibus quinque obtusissimis. Caput & thorax rufescentia. Elytra laevia, testacea, subtus pilis albidis hirta.
- festiva.* 48. M. supra glabra viridis thorace linea dorsali, elytris sutura nigris. Oliv. Inf. 1. 5. 47. 62. tab. 5. fig. 48.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Minor M. brunnea. Caput viride clypeo emarginato. Antennae ferrugineae clava nigra. Thorax glaber, viridis, nitens linea dorsali fusca. Elytra viridia, nitida striis novem exarata, sutura longitudinali fusca. Corpus subtus testaceum, albo pilosum. Sternum porrectum, subcornutum.
- laeta.* 49. M. supra glabra aurea thoracis linea dorsali scutelloque sanguineis.

- Oliv. Inf. 1. 5. 48. 63. tab. 6. fig. 56.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Forte praecedentis mera varietas. Differt tamen  
 colore aureo, nitido thoracis linea & scutello  
 sanguineis elytrorumque futura concolore.
- 50 M. supra viridis holofericea subtus cuprea ely- *holofericea*  
 tris lineis elevatis quatuor.  
 Habitat in Rossia australiori Dom. Boeber.  
 Paullo major M. Frishii. Corpus totum supra  
 viridi holofericeum, subtus cupreum.
- 51 M. viridi aenea elytris substriatis obscuris. *Julii.*  
 Scarabaeus dubius Herbst Arch.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Affinis certe M. Frishii at minor & elytra ob-  
 scura, minime nitida, substriata, mox virescen-  
 tia, mox subtestacea. Pedes nigricantes.
52. M. glabra nigra clypeo reflexo, elytris obsolete *nigrita*.  
 striatis.  
 Habitat in America.  
 Statura omnino M. Julii. Clypeus rotundatus,  
 reflexus, niger, immaculatus. Elytra glabra,  
 obsoleta striata. Corpus nigrum. Majorem vix  
 distinctam ex Italia misit Dom. Allioni.
53. M. nigro aenea nitida elytris testaceis. *Frishii.*  
 Scarabaeus Vitis Frish. Inf. 4. 29. tab. 14.  
 Oliv. Inf. 1. 5. 35. 40. tab. a. fig. 29.  
 Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 16.  
 Schaeff. Icon. tab. 23. fig. 3. 7.  
 Habitat in Vite, Rosa Germaniae.  
 Caput & thorax obscure aenea, glabra, nitida.  
 Scutellum aeneum.  
 Elytra testacea futura aenea.  
 Variat elytris testaceis, aeneis, cyaneis.
54. M. viridis thoracis lateribus flavis. *Vitis.*  
 Oliv. Inf. 5. 34. 39. tab. 2. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 6.

Petagn. Inf. Calabr. 5. 19.

Voet. Scarab. tab. 6. fig. 56. 57.

Sulz. Hist. Inf. tab. 1. fig. 11.

Habitat in Europae, Americae Vite.

Nimis praecedenti affinis. Color elytrorum variat. Thoracis margine flavo distincta videtur.

*Cardui.* 55. M. glabra viridi aenea abdomine rufo cinereo villoso.

Melolontha maura. Oliv. Inf. 1. 5. 38. 45. tab. 8. fig. 90.

Scarabaeus maurus thorace inermi, capite mucronibus tribus, corpore violaceo, abdomine testaceo. Mant. Inf. 1. 9. 68. Linn. Syst. nat. 2. 5. 48. 304.

Habitat in Carduo pycnocephalo Africæ Prof. Vahl.

Caput, thorax, elytra glabra, viridiaenea, immaculata. Elytra vix striata. Abdomen rufum pilis cinereis villosum. Corpus cyaneum.

*Serratulae.* 56. M. villosa viridis elytris serratis acuminatisque, femoribus posticis incrassatis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura & magnitudo omnino M. Cardui. Caput viride, nitidum ore antennisque fuscis. Thorax punctatus, viridis, nitidus. Elytra viridia pilis brevissimis, rufis villosa, margine exteriori denticulis plurimiis, acutis, nigris ferrato: apicis majori, acuminato. Subtus villosa, cuprea abdomine subtestaceo, femoribus posticis valde incrassatis tibiisque incurvis, apice unispinosis.

*fastuosa.* 57. M. viridi aenea nitida elytris vittis duabus aureis.

Melolontha Leei Oliv. Inf. 1. 5. 30. tab. 8. fig. 37.

Scarabaeus Leei scutellatus muticus caeruleus  
nititissimus, capitis disco, thorace fascia inter-  
rupta elytrisque vittis quatuor aureis. Swed.

Act. Holm. 1787. 188. 4.

Habitat in India orientali Dom. Lee.

Statura & magnitudo M. Frishii, viridis, nitida.

Caput macula, thorax duabus elytrisque vit-  
tis duabus laete aureis. Subtus aurea abdo-  
mine apice subtestaceo.

58. M. testacea thorace maculis duabus nigris, pedi- *errans.*  
bus rufis.

Oliv. Inf. 1. 5. 45. 58. tab. 8. fig. 92.

Habitat in Anglia Mus. Dom. Tunstall.

Statura M. horticola. Variat thoracis colore,  
interdum testaceus, immaculatus, rarius niger  
margin'e testaceo. Elytrorum margo interdum  
niger.

59. M. subtestacea griseo villosa pedibus testaceis. *umbrosa.*

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Magnitudo M. brunneae. Corpus totum villis  
brevibus, densis, cinereis tectum. Clypeus  
rotundatus, integer margine parum reflexo.  
Pedes soli testacei.

60. M. villosa virescens capite nigro. *ruplicola.*

Oliv. Inf. 1. 5. 68. 92. tab. 6. fig. 70.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Parva. Caput nigrum. Thorax & elytra pube-  
scens, virescentia. Corpus subtus cinereum.

61. M. glabra nigra thoracis margine abdomine *innuba.*  
femoribusque testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 46. 59. tab. 8. fig. 93.

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Parva, nitida. Caput nigrum ore antennisque  
flavis. Thorax punctatus, niger margine late-  
rali testaceo. Elytra substriata, nigra, imma-

- — —
- culata. Pectus nigrum. Abdomen testaceum.  
Pedes nigri femoribus testaceis.
- elongata.* 62. M. capite thoraceque nigris, elytris nitidulis,  
corpore testaceo.  
Habitat — — Dom. Lee.  
Corpus parvum at reliquis longius. Antennae  
pallide testaceae. Elytra viridi nitidula mar-  
gine testaceo. Corpus testaceum, cinereo vil-  
losum. Pedes testacei.
- rauca.* 63. M. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis  
nigro aeneis.  
Oliv. Inf. 1. 5. 41. 56. tab. 6. fig. 62.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Clypeus punctatus, niger margine reflexo.  
Thorax punctatus, nigro aeneus, obscure nitidus.  
Elytra punctata, nigro aenea linea una  
alterave elevata. Corpus nigrum.
- ferruginea.* 64. M. rufa thorace elytrisque vage punctatis.  
Oliv. Inf. 1. 5. 44. 56. tab. 7. fig. 82.  
Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.  
Praecedenti affinis at duplo minor & color rufus,  
nitidus.
- splendida.* 65. M. atra elytris vitta abbreviata aurea.  
Oliv. Inf. 1. 5. 49. 65. tab. fig. 50.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Parva. Capitis clypeus punctatus, ater, apice  
emarginatus. Thorax punctatus, ater, imma-  
culatus. Elytra punctata vitta vel potius ma-  
cula oblonga, aurea.
- aulica.* 66. M. cuprea nitida clypeo emarginato.  
Oliv. Inf. 1. 5. 49. tab. 7. fig. 81.  
Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Banks.  
Statura praecedentium. Caput cupreum, nitidum,  
late emarginatum. Thorax punctatus, cupreus,  
nitidus. Elytra punctata, cuprea, nitida.

67. *M. nigra hirta elytris striatis testaceis.* *arbicola.*  
*Melolontha nitidula.* Oliv. Inf. I. 5. 46. 60.  
 tab. 9. fig. 102.  
 Habitat in America.  
 Statura omnia *M. horticolae* at paullo major.  
 Caput & thorax nigra, cinereo pilosa. Elytra  
 valde & dense striata, testacea margine exte-  
 riori parum nigricante. Corpus nigrum. Pe-  
 des cupro parum nitent.
68. *M. capite thoraceque coeruleo pilosus, elytris horticola.*  
 testaceis, pedibus nigris.  
*Scarabaeus horticola* Linn. Syst. nat. 2. 554.  
 Fn. Sv. 391.  
*Scarabaeus Geofr.* Inf. I. 75. 8.  
*Oliv.* Inf. I. 5. 26. tab. 2. fig. 17.  
*Schaeff.* Icon. tab. 32. fig. 4.  
*Degeer* Inf. 4. tab. 10. fig. 18.  
 Habitat in Europae hortis.  
 Larva devastat radices Brassicae Botrydis &  
 capitatae, intactis viridis & favoyae, imago  
 pomonam, intacta Pyro communi. Si Malo  
 sativi ac sylvestris folia depasci contingat,  
 tunc chylus in intestinis contentus croceus  
 ad picturam adhiberi potest. Lister.
69. *M. capite thoraceque coeruleo pilosus, elytris abdomi-*  
*testaceis, abdomine villoso albo.* *nalis.*  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Nimis affinis *M. horticolae*. Antennae testaceae.  
 Pedes nigri.
70. *M. cyanea nigra glabra elytris rufis, abdomine floricola.*  
 punctis fasciculatis albis, clypeo reflexo.  
*Melolontha austriaca* Herbst Arch. tab. 20. fig. 8.  
 Habitat in Africa Dom. Prof. Vahl.  
 Statura & summa affinitas *M. horticolae*. Cly-  
 peus valde reflexus. Caput, thorax, scutel

lum, corpus cyaneo nigra, glabra, immaculata. Abdomen punctis lateribus, fasciculatis, albis.

Variat rarius colore elytrorum nigro Desfontaines.

*aruicola.* 71. M. hirta capitis clypeo reflexo, thorace coerulecente, corpore nigro.

Oliv. Inf. 1. 5. 6. 4. 78. tab. 7. fig. 84.

Habitat in Rossiae regionibus australioribus.

Nimis affinis M. horticolae, at elytra nigra.

*praticola.* 72. M. thorace subpiloſo nigro flavoque vario, elytris testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 60. 83. tab. 7. fig. 74.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Affinis M. agricolae, at clypeus haud reflexus.

Variat colore. Caput nigrum. Thorax mox magis flavus, mox magis niger. Scutellum nigrum. Elytra pallide testacea, interdum fascia media nigra.

*fruticola.* 73. M. capite thoraceque coeruleo pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo.

Oliv. Inf. 1. 5. 36. 56. tab. 2. fig. 13.

Petagn. Inf. Calabr. tab. 1. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 1.

Scarab. campestris Herbst Arch. 15. 11. tab. 19. fig. 25.

Scarab. segetum Herbst Arch. 15. 10. tab. 19. fig. 24.

Scarab. austriacus Herbst Arch. 16. 12. tab. 19. fig. 26.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 67.

Habitat in Europae spicis fecaliniis.

Faemina macula quadrata coleoptrorum nigra scutellum cingente.

74. M. thorace villoso, elytris lividis: limbo fascia- *agricola*.  
que nigris, clypeo apice reflexo.  
Scarabaeus agricola Linn. Syst. nat. 2. 553.  
58. Oliv. Inf. 1. 61. 84. tab. 2. fig. 19.  
Habitat in Germaniae Graminibus.  
Variat interdum fascia elytrorum obsoleta.
75. M. atra sericea elytris rufis: margine omni *ruricola*.  
nigro.  
Scarabaeus Geoff. Inf. 1. 80. 15.  
Scarabaeus marginatus Fourcr. Parif. 1. 9. 15.  
Oliv. Inf. 1. 5. 52. 71. tab. 3. fig. 25.  
Panz Naturf. 24. tab. 1. fig. 10.  
Herbst. Arch. tab. 43. fig. 7.  
Habitat in Angliae graminosis Dom. Lee.  
Variat interdum elytris obscuris margine tamen  
semper obscuriore.
76. M. albo farinosa thorace canaliculato atro, *atomaria*,  
elytris fuscis, abdomine albo: punctis latera-  
libus atris.  
Oliv. Inf. 1. 5. 71. 98. tab. 5. fig. 52.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Statura M. farinosae. Caput & thorax atra ato-  
mis plurimis albis pilisque rarioribus erectis  
adspersa. Thorax canaliculatus. Elytra fusca,  
atomis albis irrorata. Abdomen niveum utrin-  
que linea laterali e punctis nigris.
77. M. supra coeruleo subtus argenteo squamosa *farinosa*.  
nitens clypeo integro.  
Scarabaeus farinosus scutellatus muticus niger  
polline virescente, elytris abbreviatis Linn.  
Syst. nat. 2. 555. 64. Fn. Sv. 399.  
Scarabaeus violaceus squamosus: squamis sub-  
tus argenteis. Geoff. Inf. 1. 79. 13.  
Scarabaeus coeruleus Drury Inf. 2. tab. 32. fig. 4.

Oliv. Inf. 1. 5. 66. 90. tab. 2. fig. 14. a. c.

Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 73.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 23.

Habitat in Europa australiori.

Supra coerulea, nitida. Thorax latior quam in reliquis & elytra parum abbreviata. Aqua calida imbuta color coeruleus in vivacissimum viridem transit.

*squamosa*. 78. M. supra viridi squamosa subtus pallido nitens capite fusco.

Melolontha minuta Panz. Naturf. 24. 9. 11. tab. 1. fig. 11.

Melolontha argentea Laichart. 1. 42. 7.

Oliv. Inf. 1. 5. 65. 89. tab. 2. fig. 14. 6.

Herbst Arch. tab. 20. fig. 6.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 23.

Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 71. 72.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Summa affinitas M. farinosae at paullo minor.

Corpus supra squamo viride, immaculatum, subtus pallidius capite solo fusco.

*regia*. 79. M. squamosa supra lutea capite nigro subtus cinerea.

Scarabaeus aulicus scutellatus muticus pilosus luteus, capite nigro, pedibus posticis elongatis uniunguiculatis. Linn. Syst. nat. 2. 555. 65.

Oliv. Inf. 1. 5. 44. 88. tab. 9. fig. 106.

Habitat in Africa Prof. Vahl.

Supra laete flava, subtus cinerea. Pedes postici elongati, uninguiculati.

*argentea*. 80. M. clypeo marginato nigra subtus argenteo nitens elytris testaceis.

Scarabaeus argenteus Scop. carn. 9.

Scarabaeus Philanthus Herbst Arch.

Oliv. Inf. 1. 5. 67. 91. tab. 8. fig. 22.

Voet. Scarab. tab. 8. fig. 68.

Habitat in Angliae floribus frequens.

Descriptio Scopoli optima, at nullo modo Linnaei  
Scarab. farinosus. Elytra abdomine breviora,  
postice gibba. Pedes testacei, postici elongati.

81. M. argenteo squamosa clypeo reflexo. *graminicola*  
Melolontha farinosa. Herbst Arch. tab. 25.  
fig. 3.

Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.

Duplo praecedente minor. Caput fuscum clypeo  
rotundato, reflexo. Antennae testaceae clava  
fusca. Thorax fuscus squamis argenteis tectus.  
Corpus squamis argenteis tectum. Pedes ni-  
gricantes.

82. M. pubescens obscure ferruginea antennis pedi- *chrysomelina*-  
busque testaceis. Schrank. Ent.

16. 25.

Habitat in Austria Prof. Helwig.

Statura praecedentium. Caput fuscum anten-  
nis trilamellatis, testaceis. Thorax pubescens,  
obscurus. Elytra striata, magis rufefcentia.  
Pedes ferruginei.

83. M. nigro aenea nitida elytris brunneis: mar- *cincta*,  
gine nigro.

Melolontha marginata. Oliv. Inf. I. 5. 70.

96. tab. 3. fig. 23.

Habitat in Insula Guadeloupe Mus. Dom. Olivier.

Parva. Caput & thorax obscure aenea, nitida,  
immaculata. Elytra brunnea margine nigro.  
Pedes spinosi, nigri.

84. M. clypeo porrecto subreflexo hirta nigra ely- *proboscidea*,  
tris testaceis: margine nigro.

Oliv. Inf. I. 5. 59. 81. tab. 8. fig. 96.

Habitat in India Mus. Dr. Hunter, in Africæ floribus. Prof. Vahl.

Clypeus valde porrectus, integer. Caput & thorax nigra, villo cinereo hirta. Elytra testacea margine exteriori nigro.

- spinipes.* 85. M. nigra immaculata pedibus posticis elongatis: femoribus basi unispinosis.

Oliv. Inf. 1. 5. 72. 100. tab. 6. fig. 63.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks. Clypeus apice elevatus, niger, obscurus. Thorax & elytra nigra, minime nitida. Pedes postici elongati, incrassati femoribus ad basin interiorem spina valida, acuta.

- dentipes.* 86. M. nigra elytris testaceis, clypeo quadridentato, femoribus tibiisque posticis spinosis.

Oliv. Inf. 1. 5. 73. 102. tab. 6. fig. 66.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Affinis praecedenti. Caput & thorax villosa, atra. Elytra testacea. Femora postica compressa, unispinosa. Tibiae spinis duabus aequalibus.

- podagrifica.* 87. M. nigra clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis dentatis.

Oliv. Inf. 1. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 51.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax atra, vix hirta, immaculata, clypeo apice denticulis tribus elevatis. Thorax postice rotundatus. Elytra laevia, atra macula una alterave grisea. Pedes nigri femoribus posticis incrassatis, compressis, apice interiori unispinosi. Tibiae breves, incurvae spina brevi, valida baseos & altera elongata apicis.

- arthritica.* 88. M. nigra elytris griseis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque posticis incrassatis subinermibus.

Oliv. Inf. I. 5. 75. 104. tab. 5. fig. 44.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus paullo minor. Caput & thorax atra, immaculata. Elytra grisea. Abdomen atrum, utrinque albomaculatum. Femora & tibiae postica, incrassata, compressa, fere inermia.

89. M. grisea pedibus rufis: femoribus posticis in- *gonagra*. crassatis muticis.

Oliv. Inf. I. 5. 64. 103. tab. 6, fig. 68.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus minor. Clypeus subbidentatus. Abdomen retusum, atrum. Pedes omnes rufi femoribus posticis incrassatis, compressis, muticis. Tarsi nigri unguiculis arcuatis.

90. M. atra albo maculata pedibus posticis elongatis *crassipes*.

Oliv. Inf. I. 5. 72. 99. tab. 2. fig. 15.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum clypeo subemarginato. Thorax rotundatus, ater margine punctisque aliquot minutissimis, albis. Elytra atra, albomaculata. Abdomen album. Pedes atri, postici elongati, incrassati digito incurvo, intus dentato ungue arcuato.

91. M. atra albo irrorata femoribus posticis elongatis *cancroides*. crassissimis apice spinosis, tibiis unidentatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Nimis affinis M. crassipes. Clypeus late emarginatus. Thorax niger margine tantum paullo albo maculato. Elytra haud maculata, sed punctis pluriinis parvis irrorata. Abdomen album ultimo segmento prominente fascia lata atra. Pedes nigri femoribus posticis valde

incrassatis apice bispinosis tibiisque basi unidentatis.

*marginella*. 92. M. thorace nigro: margine albo, elytris testaceis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Statura M. crassipes. Caput nigrum, immaculatum. Thorax rotundatus, niger: margine omni albo. Elytra brevia, testacea. Scutellum cinerium. Corpus subtus villoso album. Pedes nigri, postici parum elongati.

*pulverulenta*. 93. M. corpore polline virescenti argenteo, elytris pedibusque testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 69. 49. tab. 7. fig. 87.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 7.

Sulz. Hist. tab. 1. fig. 7.

Habitat in Germania.

Duplo minor M. argentea. Clypeus submarginalis. Thorax polline obscuriore adpersus. Elytra testacea, abdomine breviora. Subtus nitida, viridi argentea, farinosa.

*Morio*. 94. M. hirta atra clypeo reflexo.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino M. horticolae at duplo minor.

Corpus totum hirtum, atrum, immaculatum. Clypeus valde reflexus.

*sylvicola*. 95. M. clypeo reflexo integro, corpore glabro nigro.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Minor M. ruricola. Clypeus rotundatus margine reflexo, integro. Caput & thorax glabra, nigra, immaculata. Antennae fuscae. Elytra abdomine breviora, laevia, nigra.

Variat interdum elytris fuscis.

*subspinosa*. 96. M. flavescens pedibus rufis, thorace subspinosa.

Melolontha elongata Herbst Arch. tab. 26. fig. 3.

Oliv. Inf. 1. 5. 70. 97. tab. 7. fig. 73.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Antennae rufae lamellis nigris. Corpus totum flavescentia, immaculatum. Thorax utrinque in medio exserit dentem brevissimum, obtusissimum. Pedes rufi plantis nigris.

97. M. capite thoraceque atris, elytris villosis pe- *longipes*.  
dibusque testaceis, abdomine brevi retuso.

Oliv. Inf. 1. 5. 76. 106. tab. 7. fig. 72.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax atra, nitida, vix pubescentia. Clypeus rotundatus, integer. Elytra pubescentia, testacea, immaculata. Adbomen breve, obtusissimum. Pedes ideo in primis posteriores longiores apparent, testacei femoribus subincrassatis, plantis nigris.

98. M. villosa nigra clypeo tridentato, elytris ab- *abbreviata*.  
breviatis testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 75. 105. tab. 5. fig. 54.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus minor. Capitis clypeus brevis, niger, apice tridentatus. Thorax canaliculatus, pilosus, niger. Elytra abdomine multo breviora, angustiora, laevia, testacea. Corpus atrum pilis aliquot albis.

99. M. nigra elytris griseis, pedibus testaceis: fe- *minuta*.  
moribus posticis acute dentatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Minuta. Caput & thorax pilosa, nigra. Elytra glabra, grisea, immaculata. Pedes omnes testacei femoribus posticis crassioribus basi dente valido, recurvo, acuto.

100. M. atra tomento cinereo villosa, *mutabilis*.

Oliv. Inf. 1. 5. 61. 69. tab. 3. fig. 24.

Voet. Coleopt. tab. 9. fig. 75.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

=====

Reliquis minor, tota atra, at tomento cinereo  
subtilissimo testa, quo cinereo colore certo  
situ resplendit.

*variabilis.* 101. M. nigricans elytris cinereo nitentibus, an-  
tennis pedibusque testaceis.

Scarabaeus atro fuscus supra veluti cinerascens,  
antennis pedibusque fuscis, lamellis anten-  
narum longis, elytris striatis. Geoff. Inf. 1.

74. 25.

Trox holosericeus Laichart. 1. 31. 4.

Scarabaeus Sulzeri Fyes. Helvet. 35.

Melolontha Berolinensis Goez. Beytr. 1. 93.

Scarabaeus pellucidus Harrer. tab. 21. fig. 24.

Oliv. Inf. 1. 5. 52. 70. tab. 21. fig. 37.

Habitat in Germaniae, Americae ligno pu-  
trescente.

Antennae pallide testaceae. Caput & thorax  
atra, immaculata. Elytra striata, atra, cinereo  
colore splendentia. Pedes testacei.

Varietas americana tomento aureo testa.

*vericolor.* 102. M. obscure aenea elytris tomento cinereo  
nitidulis.

Oliv. Inf. 1. 5. 51. 68. tab. 9. fig. 105.

Habitat in Sierra Leon. Africæ Mus. Dom.  
Banks.

Pärva. Caput, thorax, elytra nigra, immacu-  
lata, pilis erectis albis hirta. Scutellum uti &  
abdomen subtus albo villosa. Thorax subca-  
naliculatus. Pedes nigri.

*picea.* 103. M. glabra ferruginea elytris striatis.

Oliv. Inf. 1. 5. 47. 61. tab. 5. fig. 43.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Statura gibba M. variabilis. Corpus totum fer-  
ruginosum capite thoraceque obscurioribus

omnino glabris. Pedes postici compressi tibiis ferratis.

104. M. clypeo subreflexo flavescens elytris ferrugineis fusco subfasciatis. *araneoides.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Statura omnino praecedentium. Caput & thorax flavescenti hirta, immaculata. Elytra ferrugineo hirta fasciis duabus fuscis. Corpus flavescenti hirtum. Pedes nigri.

105. M. obscure virescens elytris lineis duabus rufis. *lineata.*

Oliv. Inf. 1. 5. 49. 66. tab. 6. fig. 68.

Habitat in Sierra Leon. Africæ. Mus. Dom. Banks.

Corpus parvum, gibbum. Caput & thorax obscure viridia ore nigro. Elytra obscure viridia lineis duabus rufis, ad basin coeuntibus, quae tamen apicem haud attingunt. Subtus nigra pedibus piceis.

106. M. gibba testacea tomento cinerascente nitidula. *gibba.*

Oliv. Inf. 1. 5. 50. 67. tab. 6. fig. 67.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Reliquis magis gibba. Praecedente duplo major. Capitis clypeus reflexus. Corpus totum testaceum, tomento cinereo tenuissimo nitidulum. Tibiae posticae extus unidatae, intus ferratae, apice truncatae, spinosae.

107. M. clypeo integro reflexo glabra testacea, *ca- monticola.*  
pice atro.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Minuta. Caput atrum clypeo integro, reflexo.

Antennæ testaceæ. Corpus testaceum. Elytra abdomine multo breviora, nitidula.

108. M. atra elytris basi punctoque medio pallidis. *humeralis.*

Oliv. Inf. 1. 5. 53. 72. tab. 3. fig. 26.

Habitat in Europa Mus. Dom. Tunstall.

Parva. Caput atrum clypeo reflexo, truncato, integro. Thorax ater, immaculatus. Elytra substriata, basi pallida puncto nigro. Punctum parvum, pallidum in medio elytrorum. Pedes nigri.

*Ursus.* 109. M. hirsutissima atra pedibus quatuor anticus testaceis.

Oliv. Inf. 1. 5. 58. 79. tab. 8. fig. 88.

Wulf. Inf. Cap. tab. 2. fig. 19.

Voet. Coleopt. tab. 9 fig. 74.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Clypeus porrectus, apice emarginatus. Corpus atrum pilis longioribus nigris hirsutissimum. Pedes quatuor antici testacei femoribus nigris.

Variat pedibus omnibus nigris at vix distincta videtur.

*Lynx.* 110. M. hirta nigra elytrorum margine aureo.

Oliv. Inf. 1. 5. 58. 80. tab. 9. fig. 101.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Statura & magnitudo omnino praecedentis, cuius forte mera varietas. Differt tantum elytrorum margine exteriore aureo, nitido.

*crinita.* 111. M. hirta supra viridis subtus nigra.

Scarabaeus longipes scutellatus muticus atro cyaneus, pedibus nigris: posticis elongatis uniunguiculatis. Linn. syst. nat. 2. 555. 66. Mus. Lud. Ulr. 20.

Scarabaeus bombyliformis Pall. Icon. tab. A fig. 17.

Oliv. Inf. 1. 5. 57. tab. 2. fig. 16.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Affinis praecedentibus tota pilis longioribus  
nigris tecta, at supra viridis nitens.

**112.** M. hirta capite thoraceque viridibus, ely- *hirta*.  
tris fuscis.

Scarabaeus Alopecias Pall. Icon. tab. A. fig. 15.

Oliv. Inf. 1. 5. 65. 66. tab. 7. fig. 17.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Statura praecedentium. Caput & thorax viridia, nitida pilis albis elongatis hirta antennis que piceis. Scutellum viride. Elytra fusca pilis albis hirta margineque pilis erectis, nigris ciliato. Sutura parum virescit. Subtus pilis densioribus albis tecta. Pedes virides, nitidi.

**113.** M. aurea fulvo hirta abdomine ferrugineo. *vulpes.*

Oliv. Inf. 1. 5. 55. tab. 7. fig. 76.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Clypeus brevis, integer, aureus margine nigrante. Thorax aureus pilis fulvis, elongatis, densissimis tectus. Elytra magis testacea itidem pilis fulvis densis tecta. Abdomen rufum, basi nigrum apice pube maris cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.

Varietas sexus praecedentis teste Pallas.

**114.** M. fulva hirta elytris abbreviatis atris, abdo- *Meles.*  
mine ferrugineo.

Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae basi hirtae clava suborbiculata, obscure

rufa. Clypeus reflexus, integer. Caput & thorax nigro aenea tomento denso, fulvo tecta. Elytra laevia, nigra, immaculata ab domine breviora. Abdomen rufum. Pectus nigro aeneum. Pedes nigri.

*bombylius.* 115. M. nigra cinereo hirta elytris testaceis: lineis tribus apicis albidis.

Habitat in Africæ plantis Dom. Vahl.

Statura & magnitudo praecedentium. Caput, thorax, corpus, pedes nigra pilis densis cinerascentibus. Elytra glabra, testacea lineis tribus albicantibus a medio ad apicem ductis, lateralibus submarginalibus.

*vittata.* 116. M. pilosa cyanea elytris testaceis: lineis tribus albicantibus.

Scarabaeus acuminatus muticus corpore viridi, elytris flavis corpore brevioribus apice acuminatis Lepech. Itin. I. 508. tab. 16. fig. 9.

Oliv. Inf. I. 5. 55. 74. tab. 8. fig. 94.

Scarabaeus oxypterus Pall. Itin. I. 462. 26. Pall. Icon. I. 14. tab. a. fig. 14.

Degeer Inf. 7. 644. 40. tab. 48. fig. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 12.

Voet. Scarab. tab. 5. fig. 35.

Habitat in Indiis.

Reliquis magis oblonga. Clypeus truncatus. Caput, thorax, scutellum cyanea, valde pilosa. Elytra ab domine paullo breviora, testacea, lineis tribus e villis albicantibus exarata. Subtus hirta.

78. BUPRESTIS. *Palpi* quatuor filiformes: articulo ultimo obtuso, truncato.

*Maxilla* obtusa, unidentata.

*Labium cylindricum,* acuminatum.

*Antennae* filiformes, ferratae.

1. B. elytris unidentatis aeneis: margine aureo. *unidentata.*

Buprestis unidentata Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 86.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Magna. Antennae breves, nigrae. Caput viride fronte canaliculato, aureo. Thorax viridis lineis tribus latis cupreo aureis. Elytra glabra, viridia, nitida margine aureo, apice unidentata. Corpus viride, nitens plantis fuscis.

2. B. elytris acuminatis viridi aeneis: macula flava, *bicolor.*  
pectore abdomineque flavis.

Buprestis bicolor Oliv. Inf. 32. tab. fig.

Habitat in America Dom. Drury.

Magna. Antennae ferratae, nigrae. Caput viridi aeneum oculis testaceis. Thorax viridi aeneus

Buprestis corpus oblongum, depressiusculum, rarius rotundatum, immarginatum, glabrum, tardum, capite rotundato, inserto, obtuso, oculis magnis, lateralibus, oblongis, vix prominulis, antennis thorace brevioribus, ferratis, approximatis, sub oculis insertis, thorace transverso, saepius sinuato, elytris rigidis, concavis: margine saepius dentato, scutello parvo, rotundato, pedibus brevibus, validis, tarsis quinque articulatis, colore saepius nitido, vario.

utrinque macula flava baseos, apice ad futuram acuminata. Pectus, gula, abdomen flava. Pedes aenei.

- 4 dentata.* 3. B. elytris acuminatis obscuris, corpore aeneo nitido, ano quadridentato.

Habitat — — Mus. Dom. Banks.

Media. Caput aeneum, nitidum macula cordata, elevata, frontali. Vertex obscurus. Thorax subobscurus punctis numerosissimis viridibus, nitidulis. Elytra obscura, laevia, minime nitida, immaculata basi punto impresso, apice acuminata. Corpus aeneum, nitidum ab domine supra marginibusque segmentorum subtus cya-neis. Sternum gibbum. Anus quadridentatus, cyaneus.

- gigantea.* 4. B. elytris bidentatis rugosis, thorace laevi, corpore inaurato.

Linn. Syst. nat. 2. 659. 1. Mus. Lud. Ulr. 85.  
Buprestis gigantea. Oliv. Inf. 32. tab. 1. fig. 1.  
Degeer Inf. 4. 134. 1.

Grew. Mus. 165. tab. 13.

Sloan. Jamaic. 2. tab. 236. fig. 1. 2.

Petiv. Gazoph. 147. fig. 16. 17.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 38.

Merian Surinam tab. 50. fig. inf.

Seb. Mus. 3. tab. 48. fig. 12.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 1.

Habitat in America, Asia.

- vittata.* 5. B. elytris bidentatis punctatis: lineis quatuor elevatis viridi aeneis vittaque lata aurea.

Buprestis vittata. Oliv. Inf. 32. tab. 3. fig. 17.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 14.

Habitat in India. Mus. Dom. Banks.

Statura B. ignitae. Caput viride fronte aureo antennisque nigris. Thorax punctatus macula

aurea utrinque ad basin. Elytra tomento ferrugineo tecta.

Variat rarius thorace lineis duabus vittaque elytrorum brunnea.

6. B. elytris bidentatis punctato striatis viridibus: *fastuosa*. dorso aureo.

Buprestis fastuosa Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 81.

Habitat in America septentrionali Mus. Banks.

Caput scabrum, antice emarginatum, aureum. Thorax punctatus, viridi aeneus. Elytra viridia, splendida dorso aureo punctis majoribus striata. Subtus punctata, aenea sterno antice posticeque emarginato.

7. B. elytris bidentatis fuscis: fasciis duabus flexuosis *regalis*. lineolisque duabus remotis viridibus.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Geoffroy.

Media. Caput fuscum oculis testaceis. Thorax fucus margine lineaque dorsali aureis. Elytra fusca sutura parum auro nitida, lineola baseos, fasciis duabus valde flexuosis lineaque apicis viridibus.

8. B. elytris bidentatis viridi aureis, thorace fusco *collaris*. nitido: strigis duabus aureis, sterno cupreo.

Buprestis collaris Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 9.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Caput viride, nitens antennis nigris. Thorax fucus, nitidus strigis duabus aureis fere marginibus. Elytra bidentata, striata, viridia disco aureo. Corpus viridi aeneum, nitidum sterno toto cupreo, nitidissimo.

9. B. elytris bidentatis attenuatis striatis viridi aenea: *attenuata*. futura cuprea.

Habitat in Rio Janeiro Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo B. fastuosa. Caput & thorax punctata, viridia, nitida. Elytra striata

apice attenuata, bidentata sutura cuprea. Corpus cupro nitet.

*punctatissima.* 10. B. elytris bidentatis cupreis: punctis numerosis violaceis.

Buprestis punctatissima Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 76.

Habitat in Sierra Leon. Africæ Mus. Dom. Banks. Corpus cupreum, nitidum maculis plurimis sparsis, violaceis.

*rufipes.* 11. B. elytris striatis cyaneis: maculis quatuor flavis, corpore viridi aeneo nitido.

Buprestis rufipes Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 73. Petiver. Gazoph. tab. 2. fig. 2.

Habitat in Marylandia Mus. Britann.

Caput viridi aeneum, nitidum antennis brunneis.

Thorax vix punctatus, viridi aeneus lateribus subtus flavis. Elytra bidentata, striata, cyanea maculis quatuor: baseos longitudinali, elongata 2. 3. transversis, 4. apicis. Abdomen basi aeneum maculis flavis, apice brunneum. Pedes brunnei.

*berolinensis.* 12. B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, anō tridentato.

Buprestis berolinensis Herbst Arch. tab. 28. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.

Pall. Icon. tab. D. fig. 10.

Habitat in Germania.

Corpus subtus cupreum,

*corrusca.* 13. B. elytris bidentatis aenea nitidissima, elytris apice abdomineque aureis.

Buprestis corrusca Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 99. Buprestis tereticollis Pall. Icon. tab. D. fig. 18.

Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.

- Antennae cyaneae. Abdomen auro nitidum.  
Pedes viridi aenei.
14. B: elytris bidentatis striatis aeneis coeruleo micans.  
cantibus: margine aureo.  
Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch, Hafniae Mus. Dom. Lund.  
Statura & magnitudo B. decorae. Caput aureum  
antennis viridibus. Thorax punctatus, viridi  
aeneus, nitidus. Elytra subbidentata, striata,  
viridi aenea, coeruleo micantia, nitida margine  
exteriori aureo. Corpus viridi aeneum, niti-  
dissimum. Pedes virides.
15. B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta decora.  
coerulecente marginibusque aureis.  
Buprestis decora Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 82.  
Habitat in America Mus. Dom. Banks.  
Caput scabrum. Thorax postice rotundatus, au-  
reus. Elytra truncata, subbidentata, viridia  
vitta media coerulecente, margine exteriori  
& sutura aureis. Subtus punctata, aurea  
sterno antice posticeque emarginato.
16. B. elytris bidentatis obscure aenea thorace funesta.  
punctato cupreto nitido, elytris striatis.  
Habitat in Guinea Dom. Isert.  
Magna. Antennae serratae, breves, nigrae.  
Caput punctatum, obscurum. Thorax puncta-  
tus, obscure aeneus, cupro nitidulus. Elytra  
striata, obscuriora. Abdomen nigrum lateri-  
bus cinereo villosis.
17. B. elytris bidentatis striatis nigro aeneis: vitta umbrosa.  
marginali nitidiore.  
Habitat in Guinea Dom. Isert.  
Praecedente paullo minor. Caput punctatum,  
nigro aeneum, obscurum. Thorax nigro  
aeneus, obscurus punctis duobus dorsalibus

elevatis, glabris, distinctis, nigris. Elytra bidentata, striata, nigro aenea, obscura vitta marginali, impressa, nitidiora. Corpus obscure aeneum.

- lurida.* 18. B. elytris bidentatis obscura ano tridentato.  
Buprestis lurida. Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 83.  
Habitat in America boreali Dom. Banks.  
Thorax elytraque rugosa, aeneo cinereoque varia,  
subtus aenea.
- obscura.* 19. B. elytris bidentatis obscure aenea: punctis elevatis obscurioribus.  
Habitat in America boreali Mus. Dom. Blackburn.  
Parva. Corpus totum supra obscure aeneum,  
punctis elevatis, obscurioribus. Subtus tota  
cuprea, nitida.
- punctata.* 20. B. elytris subbidentatis striatis aenea, capite ab-  
domineque testaceo maculatis.  
Buprestis punctata Oliv. Insect. 32. tab. 10.  
fig. 114.  
Habitat in Barbaria. Dom. Prof. Vahl.  
Caput aeneum punctis ad os duobus aliisque duo-  
bus inter antennas orbitaque oculorum testa-  
ceis. Thorax punctatus, aeneus macula utrinque  
apicis testacea. Elytra striata, aenea. Abdomen  
aeneum punctis utrinque quatuor testaceis:  
ultimo majore.
- morbillosa.* 21. B. elytris bidentatis striatis nigris: punctis im-  
pressis numerosis albis.  
Buprestis morbillosa Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 84.  
Habitat in America meridionali Mus. D. Banks.  
Media. Caput nigricans fronte impresso, villoso,  
albido. Thorax punctatus, niger. Elytra striata,  
nigra punctis impressis, numerosis, villoso albis.  
Corpus villoso albidum. Pedes nigri.

- 22.** B. elytris bidentatis viridibus: maculis impressis *aurifer*.  
aureis numerosis, pedibus cyaneis.  
Buprestis aurifer Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 95.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
Media. Caput viride, obscurum. Thorax viridis, nitidus maculis impressis, magnis, aureis. Elytra bidentata, punctata, striata, viridia maculis numerosis, impressis, aureis, fere fascias constituentibus. Corpus obscure nitidum pedibus cyaneis.
- 23.** B. elytris bidentatis viridi aeneis apice cyaneis: *fasciata*.  
fasciis duabus ferrugineis.  
Buprestis fasciata. Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 92.  
Habitat in America boreali Mus. Dr. Hunter.  
Antennae nigrae. Caput & thorax viridi aenea, nitida. Elytra striata, viridi aenea, apice cyanea punto medio fasciisque duabus pone medium ferrugineis, anteriore sinuata, posteriore margines haud attingente. Corpus aeneum.
- 24.** Belytris bidentatis aenea nitidissima: vitta abbreviata abdomeque fulvo aeneis.  
Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.  
Parva. Antennae desunt. Caput & thorax punctata, viridi aenea, nitidissima. Elytra punctata, viridi aenea vitta dorsali lata fulva, quae tamen apicem elytrorum haud attingit. Corpus viridiæneum abdome toto fulvo, aureo.
- 25.** B. elytris bidentatis substriatis, corpore obscure *rancia*.  
aeneo immaculato.  
Habitat in Barbaria Prof. Vahl.  
Corpus parvum, totum obscure aeneum, nitidum, immaculatum.
- 26.** B. elytris truncatis subbidendatis cupreis: lineis *striata*.  
elevatis quatuor.

Buprestis striata. Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 77.  
Habitat in Pensylvania Mus. Dom. Banks.

Antennae breves, nigrae. Caput & thorax scabra, obscure cuprea. Elytra lineis quatuor elevatis, quarum exteriores apice coeunt, inferiores abbreviatae.

*rutilans.* 27. B. elytris tridentatis ferratisque viridibus nigromaculatis: margine aureo.

Buprestis rutilans Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 45.  
Buprestis fastuosa Jaqu. Miscell. 2. tab. 23. fig. 2.

Schaeff. Icon. tab. 35. fig. 6.

Pall. Icon. tab. D. fig. 12.

Habitat in Austria Dr. Schulz.

Antennae fuscae. Thorax scaber, viridi nitens margine aureo. Elytra striata, viridia margine aureo punctis numerosis nigris. Corpus sub-tus viride, nitidum.

*ignita.* 28. B. elytris tridentatis, thorace impresso, corpore inaurato.

Linn. Syst. nat. 2. 669. 3.

Buprestis ignita. Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 33.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 14.

Petiv. Gazoph. tab. 20. fig. 8.

Kaempf Japonens. 1. tab. 10. fig. 7.

Habitat in India orientali.

*lineata.* 29. B. elytris truncatis subtridentatis nigro aeneis: vittis duabus fulvis.

Buprestis lineata. Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 80.

Habitat in America Mus. Dom. Banks.

Caput aeneum margine antico pallido fasciaque media rufa. Thorax punctatus, aeneus margine exteriori antice rufo. Elytra vittis duabus rufis, quarum exterior ad basin flexuosa, interior basi latior apicem haud attingit. Ster-

num antice posticeque emarginatum. Primum abdominis segmentum sulcatum.

30. B. viridi nitens elytris tridentatis: maculis ocellata. duabus aureis ocellarique flava.

Buprestis ocellata Oliv. Inf. 32. tab. 1. fig. 3.

Sulz. Hist. tab. 6. fig. 15.

Degeer Inf. 7. 633. 30. tab. 47. fig. 12.

Habitat in India orientali.

Thorax aureus linea longitudinali coerulescente.

Elytra lineis tribus elevatis viridibus maculis duabus aureis, altera ad basin, altera ad apicem, in medio vero macula subocellaris, flava, quae in quibusdam fere fasciam constituit.

31. B. elytris tridentatis, corpore aeneo immaculato. aenea.

Buprestis tricuspidata Oliv. Inf. 32. tab. 8.

fig. 87.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Corpus totum aeneum, obscure nitidum. Elytra striata.

32. B. elytris tridentatis cyaneis flavo maculatis. maculata.

Buprestis maculata. Oliv. Inf. 32. tab. 6. fig.

61. tab. 10. fig. 61.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Caput cyaneum ore flavo. Frons flava punctis duobus nigris maculisque duabus cyaneis.

Thorax punctatus, cyaneus margine flavo.

Elytra striata, cyanea maculis duabus magnis lunatis, flavis, quarum posterior interdum in duas divisa. Corpus aeneum ab domine utrinque linea punctorum flavorum.

33. B. elytris truncatis dentatis striatis nigris: maculatis quatuor flavis. flavo maculata.

Buprestis flavo maculata Degeer Inf. 4. 137. 6.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 8.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull,

Caput aeneo nigrum fronte flava. Thorax niger  
marginē flavo. Elytra striata, apice truncata,  
dentata maculis quatuor flavis: postica didy-  
ma. Abdomen aeneo nigrum apice punctis  
duobus fulvis. Pedes nigri.

*interrupta.* 34. B. elytris subtridentatis nigris: lineis tribus ba-  
seos unicaque apicis interrupta impressis albis.

Buprestis interrupta Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 28.  
Habitat in Senegalia Mus. Dom. Olivier.

Statura & magnitudo B. sternicornis. Caput  
nigrum, cyaneo nitidum sulco medio villoso,  
albo. Thorax niger punctis numerosis albis  
impressis. Elytra nigra lineolis tribus abbre-  
viatis baseos impressis albis posticaque longiori  
intefrupta. Corpus cinereo villosum sterno  
porrecto, aeneo, nitido. Pedes aenei.

*sternicornis.* 35. B. elytris ferrato tridentatis: punctis cinereis  
impressis, sterno porrecto conico. Linn. syst.  
nat. 2. 660. 5. Mus. Lud. Ulr. 88.

Buprestis sternicornis. Oliv. Inf. 32. tab. 6.  
fig. 52.

Herbst Arch. tab. 46. fig. 2.

Grew. Mus. 167. tab. 13.

Habitat in India orientali.

Variat punctis elytrorum consolidatis excepto  
puncto latiori baseos.

*chrysis.* 36. B. elytris ferrato tridentatis castaneis, sterno  
conico porrecto.

Buprestis Chrysis. Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 8.

Buprestis sternicornis Linn. syst. nat. 2. 660. 5. β.

Mus. Lud. Ulr. 88. β.

Degeer Inf. 4. 136. 2. tab. 17. fig. 25.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 2.

Habitat in India orientali.

Differt a praecedente elytris castaneis, laevibus.

37. B. elytris ferrato tridentatis castaneis: puncto *castanea*.  
baseos ferrugineo impresso, thorace atro ferrugineo reticulato.

Buprestis castanea. Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 3. 6.  
Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Statura & summa affinitas praecedentis. Caput nigrum antennis castaneis. Thorax niger punctis numerosissimis impressis, ferrugineis reticulatus. Elytra vix striata, castanea puncto magno baseos ferrugineo, villoso, impresso. Corpus nigrum abdomine utrinque maculis lateralibus, transversis, ferrugineis. Sturnum conicum, vix porrectum.

38. B. elytris truncato quadridentatis violaceis, *violacea*.  
corpore elongato cyaneo.

Habitat in Sierra Leon. Afriæ Dr. Pflug.

Corpus totum cyaneum elytris solis violaceis.

39. B. elytris ferratis cyaneis: fascia postica *equestris*.  
testacea.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Lee.

Media. Corpus aeneum, nitidum sterno parum porrecto. Thorax cyaneo nitidus, immaculatus. Elytra ferrata, punctato striata, in medio punctorum duorum par & postice fascia sinuata, testacea. Pedes cyanei femoribus aeneis.

40. B. elytris ferratis sulcatis, corpore depresso *depressa*.  
obscuro.

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forstkahl.

Thorax punctatus, canaliculatus, obscurus, utrinque angulatus. Elytra subtilissime ferrata, sulcis octo exarata. Corpus magis cupreum.

41. B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis: mariana.  
culis duabus impressis, thorace sulcato. Linn.  
syst. nat. 2. 660. 6. Fn. Sv. 754. Mus. Lud. 89.



Buprestis mariana. Oliv. Inf. 32. tab. 1. fig. 4.  
Herbst Arch. tab. 28. fig. 4.  
Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 1. tab. 128. fig. 3.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Antennae nigrae. Caput canaliculatum, fuscum  
orbita oculorum aurea. Thorax obscure aeneus  
dorso canaliculato, marginibus lunula impressa.  
Elytra rugosa, viridia fulco longitudinali a  
medio ad apicem impressa. Corpus aeneum,  
polline ferrugineo adspersum.

*ventricosa.* 43. B. elytris ferratis viridibus punctatis, thorace  
aeneo: fulco maculisque aureis impressis.

Buprestis ventricosa. Oliv. Inf. 32. tab. 6.  
fig. 63.

Habitat in Madagascar Mus. Dom. Olivier.

Statura praecedentis. Antennae nigrae. Caput  
aeneum fulco profundo impressio. Thorax  
aeneus fulco dorsali maculisque lateralibus  
aureis. Elytra ferrata, punctata punctis baseos  
majoribus, aureis. Corpus aeneum abdominis  
basi prominulo.

*smaragdula* 44. B. elytris ferratis viridi aenea thorace utrinque  
macula impressa aurea.

Buprestis smaragdula. Oliv. Inf. 32. tab. 1. fig. 8.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Olivier.

Caput viridi aeneum, retusum, nitidum. Thorax  
viridi aeneus, nitidus: maculis duabus dorsa-  
libus, impressis, aureis. Elytra substriata, nitida.

*fulminans.* 45. B. elytris ferratis aenea nitidissima elytris apice  
aureis.

Habitat in Indiis Mus. Dom. Zschuck.

Corpus magnum, aeneum, nitidissimum. Elytra  
punctata apice rubro aurea.

*cyanipes.* 46. B. elytris ferratis striatis viridi aeneis, thorace  
plano coeruleo.

Buprestis cyanipes. Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 104.  
 Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.  
**Caput** cum antennis cyaneum. Thorax punctatus dorso plano, coeruleus, immaculatus. Elytra striata striis crenatis, apice valde ferrata. Corpus viridi aeneum pedibus cyaneis.

- 47.** B. elytris ferratis corpore obscurioribus: maculae modesta. culis tribus impressis aureis.

Buprestis modesta. Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 72.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Caput impressum, viride oculis testaceis. Thorax punctatus, aeneus maculis tribus impressis. Elytra subsulcata, obscuriora, basi nitidora maculis tribus aureis impressis.

- 48.** B. elytris ferratis attenuatis sulcatis viridi blanda. aeneis: sulcis cupreis.

Buprestis blanda. Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 94.  
 Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
 Corpus viridiaeneum, nitidum. Thorax linea dorsali impressa viridi cupreoque rutilans. Elytra ferrata, sulcata, attenuata lineis elevatis.

- 49.** B. elytris ferratis aurea thorace aeneo. aurata.

Buprestis aurea. Oliv. Inf. 32. fig. 33.  
 Habitat in America Mus. D. Hunter.

Caput sulcatum, aeneum oculis testaceis. Antennae aeneae dentibus nigris. Thorax laevis, obscure aeneus. Elytra vix striata, aurea, nitida. Corpus aureum.

- 50.** B. elytris ferratis viridi aenea thorace vittis fulgida. duabus, elytris unica rufo cupreis.

Buprestis fulgida. Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Geoffroy.  
 Magna. Caput sulcatum, viridi aeneum. Thorax vittis duabus dorsalibus rufo cupreis.

Elytra laevia, viridi aenea, nitida vittæ lata,  
rufo cuprea. Corpus aeneum.

- 3 punctata.* 51. B. elytris ferratis striatis cupreis: punctis tribus impressis aureis.

Buprestis 3 punctata. Oliv. Inf. 32. tab. 2.  
fig. 10.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
Corpus aureum. Caput & thorax cuprea, obscure  
nitida, immaculata. Elytra striata punctis tri-  
bus parvis, dorsalibus, impressis, aureis. Anus  
bidentatus.

- elegans.* 52. B. elytris ferratis aenea nitida thorace lineis  
duabus elytrorumque unica aureis.

Buprestis elegans. Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 89.  
Habitat ad Cap. Bon, spei Mus. Dom. Banks.

Caput scabrum, viride. Thorax punctatus &  
fere variolosus, aeneus lineis duabus dorsalibus,  
approximatis, aureis. Elytra lineis quatuor  
elevatis interstitiisque valde punctatis viridia  
linea longitudinali aurea. Subtus aenea.

- trifasciata.* 53. B. elytris ferratis nigro aenea pubescens elytris  
fasciis tribus flavis: anteriore margine dilatata.

Habitat in America meridionali.

Statura omnino B. 9. maculatae at duplo ma-  
jor. Antennæ nigrae. Caput aeneum. Tho-  
rax pubescens, aeneus margine ad basin fla-  
vescente. Elytra fasciis tribus flavis, quarum  
prima in medio ad marginem valde dilatata  
puncto parvo nigro, ad suturam vero paullo  
abbreviata, secunda etiam abbreviata, tertia  
integra. Praeterealineola abbreviata, fere obso-  
leta ad scutellum. Corpus villosum, nigro  
aeneum.

- 9 maculata.* 54. B. elytris ferratis nigra fronte punto unico  
thorace duobus elytris tribus flavis.

*Buprestis* 9 *maculata*. Linn. syst. nat. 2. 662. 17.

Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 30.

Panz Naturf. 24. 33. 47. tab. 1. fig. 48.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 17.

Habitat in Europa australi Mus. Dom. Zschuck.

Macula baseos elytrorum basi biloba.

55. B. elytris ferratis porcatis, thorace angulato, *poreata*.  
corpore fusco nitido.

*Buprestis depressa*. Linn. Mant. 2. 533.

Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 15.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Thorax punctatus dorso valde impresso lateribusque prominentia obtusa angulatis. Elytra porcata vel lineis elevatis tribus, spatio interiecto punctis concatenatis in duplice serie striatis. Corpus fuscum, cupreum nitidum.

56. B. elytris ferratis obscure aenea abdominis dorso aureo, ano bidentato.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Corpus totum obscure aeneum solo abdominis dorso aureo. Elytra glabra, laevia basi punctis duobus parvis, impressis.

57. B. elytris ferratis longitudinaliter sulcatis: ma- *chrysoflig-*  
*culis* duabus aureis impressis, thorace punctato. ma.

Linn. Syst. nat. 2. 660. 7. Fn. Sv. 755.

*Cucujus aureus* elytrorum fossulis quatuor impressis nitentibus. Geoff. Inf. 125. 1.

Degeer Inf. 4. 129. 3.

Oliv. Inf. 32. tab. 6. fig. 54.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 31. fig. 1. 2.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 39.

Habitat in Europae nemoribus.

*impressa.* 58. B. elytris ferratis laevibus aeneis: punctis tribus impressis.

Buprestis impressa. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 42.

Habitat in India Mus. Dom. Bernoulli Basiliensis.

Corpus obscure aeneum abdominis margine albo punctato. Thorax puncto utrinque impresso. Elytra toto margine serrato punctisque tribus distinctis, impressis. Linea unica ad suturam elevata.

*frontalis.* 59. B. elytris ferratis nigris: maculis sex viridibus, fronte impressa.

Buprestis frontalis. Oliv. Inf. 32. tab. fig.

Habitat in Carolina australiori Mus. Dom. d'Orcy.

Statura & magnitudo omnino B. impressae. Caput aeneum, nitidum fronte valde impressa. Thorax utrinque angulatus, viridi aeneus, nitens maculis duabus magnis, dorsalibus, atris. Elytra nigra maculis duabus baseos, duabus in medio, exteriori majori, duabus parvis, approximatis pone medium, viridibus. Pedes aenei femoribus anticis dente valido, compresso.

*ornata.* 60. B. elytris ferratis obscuris albo maculatis.

Buprestis ornata. Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 67.

Habitat in Pennsylvania Mus. Dom. Banks.

Antennae breves. Caput & thorax punctata, nigra. Elytra margine toto ferrata, punctata, striata, obscura maculis plurimis albis sparsis. Corpus nigrum.

*ferrata.* 61. B. elytris ferratis aenea fronte tuberculo transverso elevato, ab domine ferrato.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Parva. Caput aeneum tuberculo frontali transverso, elevato. Thorax laevis, glaber, aeneus, nitidulus. Elytra brevia, aenea, obscure nitida

margine ferrato. Abdomen aeneum, nitidulum margine itidem ferrato. Pedes aenei.

- 62.** B. elytris ferratis cinereo villoso elytris nigris: *taeniata*.  
fasciis duabus ferrugineis.

Buprestis blanda. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 41. 49.

Ross. Fn. Etr. 1. 191. 474.

Pill. It. Pos. Scl. 84. tab. 7. fig. 12.

Habitat in Hyperici floribus Europae austri-  
lioris.

Antennae nigrae. Caput & thorax villoso, ob-  
scure grisea. Fasciae elytrorum pone medium,  
quarum postica margines haud attingit. Ante  
fascias punctum unum alterumve ferrugineum.  
Corpus cinereo villosum.

- 63.** B. elytris ferratis virescentibus, corpore elongato cupreo. *elongata*.

Buprestis elongata. Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 102.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Olivier.

Reliquis multo longior & angustior, tota cuprea  
elytris virescentibus cupro tamen nitentibus.

- 64.** B. elytris ferratis: fasciis tribus sanguineis ab- pulcra.  
breviatis, corpore atro.

Habitat in Marocco Dom. de Sehestedt.

Media. Antennae serratae, nigrae. Caput atrum.  
Thorax canaliculatus, punctatus, ater, imma-  
culatus. Elytra crenato striata fasciis tribus  
sanguineis pone medium, quae nec marginem,  
nec futuram attingunt. Ante fascias punctum  
unum alterumve sanguineum. Corpus atrum.

- 65.** B. elytris ferratis striatis basi gibbis viridi aenea gibbosa.  
thorace canaliculato.

Buprestis gibbosa. Oliv. Inf. 32 tab. 6. fig. 59.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Olivier.

Parva. Antennae nigrae. Thorax glaber, aeneus  
canali dorsali maculaque utrinque laterali im-

pressis. Elytra crenato striata striis futuralibus laevioribus. Corpus nigrum.

- nobilis.* 66. B. elytris ferratis viridi aenea capite thorace que fusco maculatis, elytris atris: fasciis tribus lineolaque apicis viridibus.

Buprestis nobilis. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 43.  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.

Parva. Antennae nigrae, basi aeneae. Caput aeneum, antice compressum, fuscum. Thorax aeneus maculis duabus magnis, dorsalibus, fuscis. Elytra laevia, atra fasciis tribus, anteriore baseos, secunda interrupta, tertia retrorsum arcuata lineolaque apicis viridibus. Corpus aeneum.

- cylindrica.* 67. B. elytris ferratis striatis, thorace villoso, corpore cylindrico nigro.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Oculi testacei. Thorax fuscus, cupro parum nitens. Corpus magis cylindricum quam in reliquis, nigrum.

- volvulus.* 68. B. elytris ferratis flavo maculatis, thorace inaequali villoso, corpore cylindrico.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Statura & magnitudo praecedentis. Caput nigrum, cinero villosum. Thorax inaequalis dorso nempe canaliculato lateribusque valde impressis niger, cinereo villosum. Elytra villosa maculis mox pluribus, mox rarioribus flavis. Corpus cinereo villosum pedibus nigris.

- scabra.* 69. B. elytris integris, fronte sulcata, corpore scabro aureo.

Buprestis scabra. Oliv. Inf. 32. tab. 3. fig. 25.

Habitat in Indiis Dr. Mallet.

Corpus totum cupreo aureum, scabrum, imma-

culatum. Caput fulco profundo exaratum.  
Oculi testacei.

70. B. elytris integris aurea nitidissima thoracis *Trochilus*.  
dorso elytris pedibusque viridibus.

Habitat in Austria Mus. Dr. Schulz.

Caput aureum antennis viridi fuscis. Thorax  
aureus dorso coeruleo : linea media viridi. Ely-  
tra laevia viridia. Corpus aureum pedibus vi-  
ridibus.

71. B. elytris integris elevato striatis fuscis : punctis *chrysostig-*  
quinque flavis. *ma.*

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Thorax punctatus, nigricans, cupreo nitens.  
Elytra striis tribus abbreviatis, elevatis nigra  
punctis quinque flavis: primo solitario, reli-  
quis vero elytris complicatis in circulum dispo-  
sitis. Corpus nigro aeneum.

72. B. elytris integris: maculis quatuor albis, cor- *8 guttata*.  
pore coeruleo. Linn. Syst. nat. 2. 659. 2. Fn.

Sv. 753.

Buprestis *8 guttata*. Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 36.

Geoff. Inf. 1. 126. 2.

Degeer Inf. 4. 132. 5. tab. 4. fig. 20.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 7.

Schaeff. Icon. tab. 204. fig. 4.

Habitat in Europae nemoribus.

73. B. elytris integris striatis: punctis fasciculato *fascicularis*  
pilosis, corpore hirsuto inaurato. Linn. Syst,  
nat. 2. 661. 12. Mus. Lud. Ulr. 90.

Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 38.

Seb. Mus. 2. tab. 20. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 6. fig. 4.

Degeer Inf. 7. tab. 47. fig. 6.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 9.

Wulf. Inf. capens. tab. 1. fig. 12.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Variat corpore nigro fasciculisque fulvis flavis que.

*variolaris.* 74. B. elytris integris obscuris: punctis impressis numerosis, thorace carinato.

Buprestis variolaris. Oliv. Inf. 82. tab. 8. fig. 85. Pall. Icon. tab. D. fig. 2.

Habitat in Onopordine & Echinope Russiae.

Caput & thorax scabra obscure nigra linea dorsali thoracis elevata. Elytra scabra, nigra punctis plurimis impressis, cinereo villoso. Corpus hirtum, cupro paullo nitens.

*Onopordi.* 75. B. elytris integris obscure aeneis: sulcis albo villoso, thorace scabro.

Habitat in Barbariae Onopordine Prof. Vahl.

Corpus aeneum, albo villosum. Thorax scaber.

Elytra aenea sulcis punctisque pluribus magnis, impressis, albo villoso. Pedes cuprei.

*hirta.* 76. B. elytris integerrimis, pedibus ferrugineis, corpore hirto. Linn. Syst. nat. 2. 661. 13. Mus. Lud. Ulr. 91.

Buprestis hirta. Oliv. Inf. 32. tab. 3. fig. 18. 19.

Habitat in Africa, Barbaria.

*austriaca.* 77. B. elytris integris sulcatis aeneis, capite thoraceque viridibus. Linn. Syst. nat. 2. 661. 9, Oliv. Inf. 32. tab. 10. fig. 113.

Habitat in Austria Dom. Scopoli.

*sibirica.* 78. B. elytris integris atris: vittis duabus impressis cinereo tomentosis.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 11.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus atrum, subtus cinereo villosum. Caput, thorax scabra. Elytra glabra, atra vittis duabus impressis cinereo tomento repletis, inte-

riore obliqua a margine exteriore baseos ad futuram apicis ducta, exteriore marginali.

79. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis. *splendens,*

Habitat in China.

Corpus viride, nitens elytrorum margine & futura aureis.

80. B. elytris integris obscure fuscis, subtus aenea *fusca.*  
abdomine punctis lateralibus fulvis.

Buprestis fusca. Oliv. Inf. 32. tab. 8. fig. 88.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Caput rugosum, fuscum oculis flavescentibus, fusco maculatis. Thorax obscure fuscus lateribus impressis, scabris. Elytra punctato striata, fusca. Corpus aeneum utrinque linea punctorum fulvorum.

81. B. elytris emarginatis striatis obscure aeneis. *rufica.*

Linn. Syst. nat. 2. 660. 8. Fn. Sv. 756.

Cucujus Geoff. Inf. 1. 126. 3.

Degeer Inf. 4. 130. 4. tab. 4. fig. 10.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 1.

Oliv. Inf. 32. tab. 3. fig. 22.

Habitat in Europae nemoribus.

In altero sexu anus five ultimum abdominis segmentum prominet maculis duabus flavis.

82. B. elytris integris obscura abdomine subtus canaliculato: ano quadridentato. *canaliculata.*

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Caput fuscum antennis nigris. Thorax punctatus, fuscus lateribus obscure aeneo nitentibus lunulaque impressis. Elytra obscura, punctata lineis elevatis: exterioribus abbreviatis. Abdomen supra cyaneum, in medio canaliculatum anoque quadridentato. Pectus & femora aenea.



*acuminata.* 83. B. elytris integris attenuato acuminatis obscuris, corpore cupreo.

Buprestis acuminata. Oliv. Inf. 32. tab. 5.  
fig. 46.

Degeer Inf. 4. 128. tab. 4. fig. 18.

Petiv. Gazoph. tab. 2. fig. 2.

Pall. Icon. tab. D. fig. 10.

Habitat in Russia meridionali Dom. Boeber.

Distincta elytris postice elongatis, attenuatis.

Thorax cupreus, nigro macularus.

*excavata.* 84. B. elytris integris nigra obscura thorace macula baseos utrinque impressa.

Buprestis excavata, Oliv. Inf. 32. tab. fig.

Buprestis impressa Mant. Inf. 1. 182. 61.

Habitat Tranquebariae Dr. Pflug.

Thorax antice prominens, postice utrinque macula magna impressa. Elytra punctata striisque quatuor elevatis, postice coeuntibus,

*moesta.* 85. B. elytris integris truncatis supra obscura, subtus cuprea thorace rugoso.

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Statura & magnitudo B. lugubris at alia & distincta. Corpus supra obscure nigrum, minime nitidum, subtus cupreum. Thorax rugosus. Elytra truncata punctisque aliquot majoribus, oblongis.

*lugubris.* 86. B. elytris integris striatis obscuris nigro scabris, corpore subtus cupreo.

Buprestis plebeja Mant. Insect. 1. 182. 60.  
vixdiffert.

Buprestis lugubris. Oliv. Inf. 32. tab. 10.  
fig. 106.

Buprestis oxyptera. Pall. Icon. tab. D. fig. 11.

Habitat in Europa australiori Mus. Dom. Schulz.

Caput obscurum, griseum antennis nigris. Thorax laevis, griseus margine auro pauco nitidulo. Elytra grisea punctis oblongis elevatis scabra. Corpus cupreum.

Faemina aculeo brevi ferrato ani.

87. B. elytris integris atra antennis albis, thorace *cariofa*. varioloso.

*Buprestis cariofa*. Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 68.

*Buprestis brutia* Petagn. Spec. Inf. Calabr. inf. 22. 108. tab. 1. fig. 20.

Habitat in Russia australiori. Dom. Boeber.

Duplo major B. Tenebrionis. Corpus nigrum, atomis albis adspersum. Elytra substriata.

Thorax maculis plurimis, elevatis, glabris.

88. B. viridi aenea elytris integris apice obscuris : *undata*, strigis undatis albis.

Habitat in Germania Mus. Dr. Schulz.

Caput & thorax immaculata. Elytra basi viridi aenea strigis aliquot fere obsoletis, albis, apice nigricantia strigis albis distinctis, valde undatis.

89. B. elytris integris substriatis obscura ab domine *tenebricosa*, subtus cyaneo auro punctato.

*Buprestis tenebricosa*. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 48.

*Buprestis Tenebrionis*. Ross. Fn. Etr. 1. 184.

459.

Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. Olivier.

Statura omnino B. Tenebrionis. Antennae nigrae. Thorax obscurus punctis aliquot elevatis, atris. Elytra striata, obscura punctis atris irrorata. Abdomen subtus cyaneum punctis parvis, aureis, numerosissimis.

90. B. elytris integris truncatis atra thorace dilato. *Tenebrionis* varioloso. Linn. Syst. nat. 2. 661. 11.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 16.

Oliv. Inf. 32. tab. 6. fig. 16.

Ross. Fn. Etr. 1. 185. 459.

Herbst Arch. tab. 28. fig. 15.

Cyrilli Ent. neapol. 1. tab. 1. fig. 13,

Habitat in Europa, Africa.

Thorax punctis elevatis, planis, nitidis, distinctis  
angulo rotundato utrinque prominet.

*Rubi.* 91. B. elytris integris: fasciis cinereis undatis,  
corpo cylindrico nigro. Linn. Syst. nat. 2.  
602. 14.

Buprestis Rubi. Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 29.  
Habitat in Europae Rubo.

*aurulenta.* 92. B. elytris integris: margine aureo, supra ob-  
scure viridis, subtus cuprea.  
Buprestis aurulenta. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 51.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Antennae nigrae. Caput & thorax laevia, viri-  
dia, obscura. Elytra obscuriora margine exte-  
riori laete aureo. Corpus cupreum.  
*terfata.* 93. B. elytris integris viridis thorace punctato, pe-  
dibus apice cyaneis.  
Habitat in Marocco Dom. de Sehestedt.

Caput & thorax punctata, viridia. Antennae  
nigricantes. Elytra punctata concolora sulco  
marginali, aurulento, villoso, impressio. Corpus  
nitidulum. Pedes cuprei, apice cyanei, nitidi.  
Affinis videtur B. aurulentae.

*cyanicornis* 94. B. elytris integris obscure viridibus, thorace  
lineis duabus obscurioribus, antennis coerulis.  
Buprestis cyanicornis. Oliv. Inf. 32. tab. 2.  
fig. 11. tab. 3. fig. 20.  
Buprestis Stephanelli Petag. spec. Inf. Cal. 23.  
110.  
Buprestis femorata Villars Ent. 1. 338. 34.  
tab. 1. fig. 40.

Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. Olivier.  
Affinis praecedenti videtur. Antennae coeruleae.

Thorax scaber, rufo nitidulus lineis duabus latis, obscurioribus. Elytra viridia, immaculata. Corpus subtus aeneum, nitidum femoribus posticis incrassatis.

Alter sexus thorace aureo lineis duabus fuscis femoribusque simplicibus.

95. B. elytris integris striatis: macula rubra, cor-*bimaculata*, pore fusco viridi. Linn. Syst. nat. 2. 662.

16. Mus. Lud. Ulr. 92.

Sulz. Hist. Inf. 57. tab. 6. fig. 15.

Habitat in India.

Macula magna rubra in medio elytrorum.

96. B. elytris integris viridis thorace postice ely-4 *maculata*. trisque maculis duabus aureis.

Buprestis 4 maculata. Oliv. Inf. 32. tab. 10. fig. 110.

Habitat in India Dr. Fottergill.

Thorax viridis, postice late aureus. Elytra viridia maculis duabus magnis aureis.

97. B. elytris integris marginatis, corpore cupreо, *trifinis*. abdomine punctis decem nigris. Linn. Syst. nat. 2. 662. 18. Mus. Lud. Ulr. 93.

Habitat in Indiis.

Abdomen in singulo segmento utrinque puncto nigro.

98. B. elytris integris, thoracis lateribus scabris, *cuprea*. scutello tuberculari, corpore cupreо. Linn. Syst. nat. 2. 662. 20. Mus. Lud. Ulr. 94.

Habitat in America.

Thoracis latera depressa, scabra. Scutellum puncto elevato prominet.

99. B. elytris integris coeruleofuscis, corpore *tarda*. obscure aeneo nigro.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Praecedente paullo minor. Corpus totum nigro aeneum, obscure nitidum elytris solis obscure coerulecentibus.

*metallica*. 100. B. elytris integris substriatis, corpore aeneo immaculato.

Habitat in Gallia meridionali.

Statura & magnitudo B. aeneae at elytra integra, substriata: striis laevibus. Corpus aeneum, obscure nitidum.

*nobilitata*. 101. B. elytris integris: strigis duabus undatis inauratis, corpore fuseo. Linn. Syst. nat. 2. 662. 21.

Buprestis nobilis Mant. Inf. 1. 183. 72.

Habitat in Indiis.

*appendicu-* 102. B. elytris integerrimis subacuminatis, corpore *lata*. laevi atro immaculato.

Habitat in Germania D. Schneider.

Magnitudo & statura praecedentis at tota atra, immaculata.

*bicolor*. 103. B. elytris integris substriatis supra aenea subtus cuprea.

Buprestis barbara. Oliv. Inf. 32. tab. fig.

Habitat in Barbaria Dom. Vahl.

Caput & thorax laevia, obscure aenea. Elytra substriata, concolora. Subtus cuprea.

*umbellata*- 104. B. elytris integris laevibus, corpore obscure cupreo immaculato.

Buprestis umbellatarum. Oliv. Inf. 32. tab. 3. fig. 23.

Habitat in Barbariae floribus umbellatis D. Vahl.

Corpus totum obscure cupreum, minime nitidum absque ullo charactere.

*morio*. 105. B. elytris integris laevibus, corpore nigro immaculato.

- Habitat Hafniae Dom. Lund.
- Statura omnino B. 4. punctatae at thorax laevis. Corpus totum supra nigrum, immaculatum, minime nitidum, subtus aeneum.
106. B. elytris integris punctatis, thorace punctis quatuor impressis, corpore obscuro. Linn. Syst. 2. 662. Fn. Sv. 759.  
Degeer Inf. 4. 134. 8.  
Oliv. Inf. 32. tab. 10. fig. 117.  
Herbst Arch. tab. 28. fig. 17.  
Habitat in Europae floribus frequens in Calla palustri.
107. B. coleoptris integerrimis aureis: punctis duobus cruceque postica nigris. Buprestis cruciata. Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 74.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Caput canaliculatum, aureum antennis nigris.  
Thorax aureus, nitens. Corpus aureum.
108. B. elytris integris substriatis obscure aenea lineata. thorace striis impressis albidis.  
Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.  
Parva. Caput aeneum, obscurum. Thorax obscure aeneus lineis tribus longitudinalibus, impressis, villoso albis. Elytra substriata. Corpus aeneum.
109. B. elytris integris obscuris, thorace aureo: manca. striis duabus nigris. Linn. Syst. nat. 2. 1067. 10.  
Cucujus aeneus, elytris fuscis, thorace rubro fasciis fuscis Geoff. Inf. 1. 127. 4.  
Buprestis manca. Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 12.  
Herbst Arch. tab. 28. fig. 18.  
Habitat in Europae nemoribus.
110. B. elytris integris cyaneis, capite thoraceque pygmaea. aeneis nitidis.

Buprestis pygmaea, Oliv. Inf. 32. tab. 4. fig. 34.  
 Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Vahl.  
 Caput & thorax laevia, aenea, nitidissima.  
 Elytra cyanea, immaculata. Corpus obscurum.

*minuta.* 111. B. elytris integris transverse rugosis, thorace subtrilobo laevi, corpore ovato nigro. Linn.  
 Syst. nat. 2. 663. 24. Fn. Sv. 760.

Cucujus fusco cupreus triangularis: fasciis undulatis villoso albidis. Geoff. Inf. 1. 128. 6.  
 Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 14.  
 Herbst Arch. tab. 28. fig. 19.  
 Habitat in Europae Corylo.

*meditabunda-* 112. B. elytris integris fusco nitidis, capite thora-  
 ceaque cupreis, corpore aeneo.

Buprestis meditabunda. Oliv. Inf. 32. tab. 10.  
 fig. 107.

Habitat in America boreali Mus. Dr. Hunter.

Paullo major B. viridis. Caput & thorax viridia lateribus depresso. Elytra fere linearia,  
 integra, fusca puncto majori baseos aliquotque obsoletis dorsalibus impressis. Corpus aeneum.

*atomaria.* 113. B. elytris integris linearibus: linea media ele-  
 vata, corpore aeneo; atomis numerosis ci-  
 nerascensibus.

Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.

Statura B. viridis at triplo major. Antennae nigrae. Caput aeneum atomis cinerascentibus fronte valde impressa. Thorax viridi aeneus atomis cinereis irroratus. Elytra linearia,  
 viridi aenea atomis numerosis cinerascenti-  
 bus. Linea dorsalis in medio elytrorum ele-  
 vata, basi flexuosa.

- 114.** B. elytris integris linearibus punctatis, corpore *viridis*.  
 viridi elongato. Linn. Syst. nat. 2. 663. 25.  
 Fn. Sv. 162.  
 Cucujus viridi cupreus oblongus. Geoff. Inf.  
 1. r27. 5.  
 Degeer Inf. 4. 133. 6. tab. 5. fig. 1.  
 Oliv. Inf. 32. tab. 11. fig. 124.  
 Herbst Arch. tab. 28. fig. 21.  
 Habitat in Europae Betula alba.  
 Variat corpore obscuriore & cupreo.
- 115.** B. elytris integris linearibus viridibus: puncto 2 *guttata*.  
 albo, abdomine cyaneo: punctis utrinque  
 tribus albis.  
 Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 75.  
 Ross. Fn. Etr. 191. 473.  
 Herbst Arch. tab. 28. fig. 22.  
 Habitat in Anglia Dom. Yeats.  
 Variat corpore coeruleo & viridi.
- 116.** B. elytris integris linearibus viridibus, capite *linearis*.  
 thoraceque obscure aureis.  
 Habitat in Dania Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Statura & affinitas B. viridis. Antennae  
 aeneae. Caput & thorax obscure aurea, mar-  
 gine postico sinuata. Elytra punctata, viridia.  
 Corpus aeneum.
- 117.** B. elytris integris linearibus, corpore elongato atro. Linn. Syst. nat. 2. 663. 26.  
 Habitat in Germania.  
 Simillima B. viridi, ut vix distinguatur nisi  
 colore.
- 118.** B. elytris integris linearibus, corpore elongato aureo nitido.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura oblonga B. atrae, at minor & tota  
 aenea, nitida.

- pavida.* 119. B. elytris integris linearibus coeruleo fusca,  
subtus aenea.  
Habitat — — Dom. de Sehestedt.  
B. atra duplo minor. Thorax canaliculatus.  
Corpus supra fuscum, cyaneo nitidum, sub-  
tus aeneum, immaculatum.
- emarginata* 120. B. elytris integris linearibus atra, capite  
fulcato.  
Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
B. atra quadruplo minor, linearis, tota atra, im-  
maculata. Caput sulcatum.
- ruficollis.* 121. B. elytris integris linearibus nigra, thorace  
cupreo.  
Buprestis ruficollis. Oliv. Inf. 32. tab. 9.  
fig. 101.  
Habitat in America Mus. Dr. Hunter.  
Corpus totum obscure nigrum, mimime niti-  
dum thorace solo obscure cupreo. Pedesatri.
- festiva.* 122. B. elytris integris: maculis sex coeruleis,  
corpo elongato viridissimo. Linn. Syst.  
nat. 2. 663. 27.  
Buprestis festiva. Oliv. Inf. 32. tab. 9. fig. 100.  
Habitat in Africa.  
Thorax punctis duobus, elytris sex coeruleis.
- nitidula.* 123. B. elytris integris, thorace marginato utrin-  
que depresso, corpore viridi nitido. Linn.  
Syst. nat. 2. 662. Fn. Sv. 757.  
Oliv. Inf. 32. tab. 11. fig. 122.  
Schaeff. Icon. tab. 50. fig. 7.  
Herbst Arch. tab. 28. fig. 20.  
Habitat in Europae plantis.
- laeta.* 124. B. elytris integris viridibus, capite thorace-  
que aureis.  
Buprestis laeta. Oliv. Inf. 32. tab. 5. fig. 50.  
Habitat Halae Dom. Schaller.

Caput & thorax rubro aurea, nitida. Elytra viridia sutura aurea. Pedes rufescentes.

125. B. elytris integris viridis nitens coleoptris *Salicis*, aureis basi viridibus.

Oliv. Inf. 32. tab. 2. fig. 13.

Herbst Arch. tab. 46. fig. 5.

Schrink Inf. 195. 365.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 12.

Habitat in Europae Salice Mus. Dr. Schulz.

Caput viride antennis fuscis. Thorax depresso-  
fus, marginatus, viridis maculis duabus cya-  
neis, impressis. Elytra ruja a basi imprimis  
ad futuram viridibus. Subtus viridis, imma-  
culata.

126. B. elytris integerrimis supra viridis subtus ni- *Sophorae*.  
gra, abdome supra aureo.

Habitat in Guineae Sophora occidentali Dr.  
Isert.

Parva. Caput, thorax, elytra viridia, nitida.  
Abdomen supra aureum. Corpus subtus ni-  
grum, obscurum, immaculatum.

127. B. elytris integris aenea villosa elytorum *discoidea*.  
disco testaceo.

Oliv. Inf. 32. tab. 7. fig. 65. tab. 10. fig. 65.

Habitat in Barbariae plantis umbellatis D. Vahl.

Thorax canaliculatus, aeneus, cinereo villo-  
sus. Elytra testacea limbo omni aeneo. Cor-  
pus villosum, aeneum.

Variat disco elytrorum testaceo, fascia aut striis  
aeneis.

128. B. elytris integris rugosis, corpore cyaneo. *cyanea*.

Habitat Halae Saxonum Dom. Schaller.

Corpus totum cyaneum, nitidum oculis  
testaceis.

79. ELATER. *Palpi securiformes.**Maxilla unidentata, obtusa.**Labium bifidum.**Antennae filiformes.**flabellicornis.* 1. E. fuscus antennarum fasciculo flabelliformi.

Linn. Syst. nat. 2. 651. 1.

Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 28.

Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 1.

Voet. Coleopt. 1. tab. 45. fig. 34.

Habitat in India.

Corpus maximum, totum fuscum. Fasciculus antennarum e lamelis octo magnis, nigris.

*fascicularis* 2. E. thorace murino, elytris pallidis fusco undatis, antennarum fasciculo flabelliformi.

Elater fascicularis. Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 56.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Antennae nigrae. Caput &amp; thorax laevia, murina, nitida. Elytra striata, pallescentia basi striga unica, apice plurimis, undatis, fuscis. Corpus murinum. Pedes picei.

*speciosus.* 3. E. albus nigro maculatus. Linn. Syst. nat. 2. 652. 2.

Oliv. Inf. 31. tab. 7. fig. 70.

Elateris corpus elongatum, subcylindricum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, inferto, oculis globosis, lateralibus, haud prominulis, antennis longitudine thoracis, serratis, distantibus, sub oculis insertis, thorace plano, angulo postico utrinque prominulo, acuto, pectorisque dente e fovea abdominis resiliente, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis, pedibus brevibus, validis, tarsis quinquearticulatis, color vario, saepius obscuro.

Habitat in India.

Antennae breves, nigrae.

4. E. cinereo tomentosus elytris substriatis, plan- *luridus*.  
tis fuscis.

*Elater luridus*. Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 57.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Corpus magnum, obscurum, cinereum plantis  
foliis fuscis. Thorax punctatus. Elytra substriata.

5. E. niger thorace punctis duobus impressis albis, *foveatus*.  
elytris striatis.

Habitat in Guinea Dom. Isert.

Magnus, totus niger. Thorax laevis at punctis  
duobus magnis, dorsalibus, albidis impressus. Ely-  
tra striata, immaculata. Corpus nigrum pedibus  
fuscis.

6. E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro *oculatus*.  
albo maculato. Linn. Syst. nat. 2. 651. 3.

*Elater oculatus*. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 34.

Petiv. Gazoph. tab. 10. fig. 4.

Act. Angl. 246. 396. 13. & 271. 841. 32.

Voet. Coleopt. 1. tab. 45. fig. 33.

Degeer Inf. 4. 159. 1. tab. 17. fig. 28.

Habitat in America septentrionali.

7. E. thorace ocellis duobus atris, corpore nigro *luscus*.  
immaculato.

*Elater luscus*. Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 64.

Habitat in America Dom. Drury.

Affinis E. oculato, at duplo fere minor. Ocelli  
thoracis absque iride & corpus immaculatum.

8. E. ater thorace maculis duabus ocellaribus, ely- *coecus*.  
tris strigis duabus arcuatis punctoque postico  
ferrugineis.

Habitat in Africa Dom. Lee.

Caput atrum, laeve, nitidum, immaculatum.

Thorax ater utrinque ocello coeco five annule

magno, oblongo, ferrugineo. Elytra laevia, atra strigis duabus, anteriore antrorsum, posteriore retrorsum arcuata, postice punctum oblongum, obscurius.

- lineatus.* 9. E. ater thorace elytrisque rufo lineatis.  
 Elater lineatus. Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 63.  
 Habitat in Brasilia Mus. Regis Galliae.  
 Magnus. Corpus atrum capite thoracis elytrorumque lineis rufis.
- noctilucus.* 10. E. thoracis lateribus macula flava glabra.  
 Elater noctilucus. Linn. Syst. nat. 2. 657. 4.  
 Mus. Lud. Ulr. 82.  
 Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 14.  
 Degeer Inf. 4. 160. 2. tab. 13. fig. 1.  
 Brown. Jamaic. 432. tab. 44. fig. 10.  
 Sloan. Jamaic. 2. 206. tab. 237. fig. 1.  
 Voet Coleopt. 1. tab. 43. fig. 16.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis.
- phosphorus.* 11. E. thorace postice maculis duabus flavis. Linn.  
 Syst. nat. 2. 652. 5.  
 Elater phosphoreus. Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig.  
 20. & fig. 14. b.  
 Degeer Inf. 4. 161. 3. tab. 18. fig. 2.  
 Habitat in Americae Insulis.  
 Nimis praecedenti affinis, quamvis duplo minor.
- ignitus.* 12. E. fuscus thorace nigro: margine flavo.  
 Elater ignitus. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 78.  
 Elater indicus. Herbst Arch. tab. 27. fig. 3.  
 Voet. Coleopt. 1. tab. 43. fig. 18.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Praecedentibus minor & distinctus. Corpus to-  
 tum fuscum. Thorax niger margine inprimis  
 postico flavo. Elytra striata.
- fusipes.* 13. E. ater antennis pedibusque fuscis.  
 Elater fusipes. Oliv. Inf. 71. tab. 3. fig. 21.

Habitat in India orientali Dr. Koenig.

Magnus, totus ater solis antennis pedibusque fuscis. Elytra striata.

14. *E. cinereus thorace punctis quatuor, elytris 4 maculatus fasciis duabus nigris.*

*Elater quadrimaculatus.* Oliv. Inf. 31. tab. 8.  
fig. 79.

*Elater fasciatus.* Drury Inf. 3. tab. 57. fig. 2.

Habitat in Africa aequinoctiali.

Antennae nigrae. Scutellum nigrum.

15. *E. nigricans griseo maculatus thoracis limbo rubiginosus elytrorumque macula magna pallidis.*

Habitat in Sierra Leon. Africæ Dr. Pflug.

Caput nigrum fronte fordide pallida. Thoracis limbis pallidus margine rufescente linea- que dorsali nigra. Elytra nigra atomis griseis. Ad basin punctum magnum ferrugineum & pone medium macula magna pallida, fere fas- ciam constituens. Pectus nigrum lateribus rubiginosus. Abdomen nigrum segmentis tri- bus baseos utrinque macula rubiginosa puncto- que marginali albo. Pedes nigri.

16. *E. ferrugineus elytris mucronatis, antennis ni- ligneus.*  
gris. Linn. Syst. nat. 2. 652. 7. Amoen.  
acad. 6. 395. 24.

*Elater ligneus.* Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 15.

Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 4.

Voet. Coleopt. 1. tab. 42. fig. 9.

Habitat in America meridionali.

17. *E. ferrugineus capite thoraceque obscurioribus. rufus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura magna *E. ferruginei.* Caput fuscum, an- tice retusum. Antennæ ferrugineæ. Thorax fuscus lateribus ferrugineis. Scutellum ferru-



gineum. Elytra striata. Corpus & pedes ferruginea.

*ferrugineus* 18. E. thorace elytrisque ferrugineis, thoracis margine postico corporeque nigris. Linn. Syst. nat. 2. 654. 20. Fn. Sv. 729.

Elater thorace elytrisque rubris. Geoff. Inf. 1. 130. 1. tab. 2. fig. 4.

Elater ferrugineus. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 35. Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 1.

Habitat in Europa.

*porcatus*. 19. E. viridi aeneus elytris fulcatis: fulcis villoso albis. Linn. Syst. nat. 2. 652. 6.

Elater porcatus. Oliv. Inf. 31. tab. 7. fig. 74.

Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 7.

Habitat in America meridionali.

Sutura atra, nitida.

*fulcatus*. 20. E. villoso albidus elytris striis tribus elevatis glabris.

Elater fulcatus. Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 10.

Habitat in America meridionali Dom. Spengler.

Affinis certe praecedenti, attamen distinctus videtur. Caput atrum. Thorax villoso albidus, antice nigricans. Pectoris sutura glabra, atra. Elytra villoso albida fulcis tribus elevatis, atris, nitidis. Corpus albo villosum.

*virens*. 21. E. villosus nigro viridis antennis nigris.

Elater virens. Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 19.

tab. 9. fig. 55.

Voet Coleopt. 1. tab. 42. fig. a.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dr. Hunter.

Corpus totum nigro viride, villosum, immaculatum. Elytra striata.

*fulgens*. 22. E. cyaneo nitidus subtus cupreus elytris acuminatis.

Elater fulgens. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 43.

Habitat in India Mus. Britann.

Magnus. Caput viridi aeneum, nitidum anten-  
nis nigris. Thorax cyaneus lateribus aeneis.  
Elytra glabra, laevia, cyanea, nitida, apice  
valde acuminata. Corpus cupreum pedibus  
fuscis.

- 23.** E. cyaneo niger thorace inaequali, elytris *inaequalis*.  
striatis rubris.

Habitat in Italia Mus. Dom. Bosc.

Paullo major E. aterrimo. Antennae atrae. Ca-  
put & thorax cyaneo nigra, immaculata. Tho-  
rax canaliculatus scutello obscuro. Corpus  
cyaneo nigrum.

- 24.** E. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. *aterrimus*.  
Linn. Syst. nat. 2. 653. 17. Fn. Sv. 726.

Elater totus niger nitidus. Geoff. Inf. 1. 136. 73.

Elater aterrimus. Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 53.

Habitat in Europae hortis.

- 25.** E. niger opacus elytris striatis, antennis pedi- *niger*.  
busque concoloribus.

Elater niger thorace laevi, elytris pedibus cor-  
poreque nigris. Linn. Syst. nat. 2. 656. 36.

Fn. Sv. 743.

Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 65.

Habitat in Europae hortis.

Statura & summa affinitas praecedentis. Color  
totius corporis niger, minime nitidus anten-  
nis pedibusque concoloribus.

- 26.** E. thorace obscure cinereo, elytris cinereo ne- *murinus*.  
bulosis, plantis rufis. Linn. Syst. nat. 2. 655.

22. Fn. Sv. 738.

Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 6.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig. 26.

Habitat in Europae hortis frequens.

*holosericeus* 27. E. obscurus thorace elytrisque cinereo fuscoque nebulosis subholosericeis.

Elater niger elytris villoso murinis. Geoff. Inf. 1. 135. 10.

Oliv. Inf. 31. tab. 3. sig. 33. tab. 7. fig. 69.

Voet. Coleopt. tab. 44. fig. 27.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Summa affinitas E. murini at minor & alias.

Supra totus cinereo fuscoque varius. Corpus nigrum.

*tessellatus*. 28. E. elytris aeneis: maculis pallidioribus conservatis, unguibus rubris. Linn. Syft. nat. 2. 659. 22. Fn. Sv. 738.

Elater tessellatus. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 22.

Geoff. Inf. 1. 135. 9.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 7.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig. 27.

Degeer Inf. 4. 148. 7.

Habitat in Europae hortis.

Scutellum pallidum.

*fasciatus*. 29. E. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: fascia undulata alba. Linn. Syft. nat. 2. 655. 27. Fn. Sv. 737.

Elater fasciatus. Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 46.

Panz. Naturf. 24. 32. 45. tab. 1. fig. 46.

Habitat in Europae hortis.

*varius*. 30. E. niger thoracis margine elytrorumque basi fasciaque postica villoso flavescentibus.

Elater varius. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 26. tab. 7. fig. 68.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 11.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Distinctus omnino ab E. fasciato duplo minor,  
 Caput nigrum antennis obscure ferrugineis,  
 Thorax canaliculatus, niger lateribus villis den-  
 sis, flavescentibus tectis: Elytra nigra basi pa-  
 rum villoso flavescentia fasciaque lata apicis,  
 Corpus nigrum pedibus obscure ferrugineis.

31. E. thorace elytrisque aeneis, antennis simplici- *aeneus*.  
 bus nigris. Linn. Syst. nat. 2. 655. 31. Fn.  
 Sv. 740.

Elater aeneus. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 83.  
 Degeer Inf. 4. 149. 8.

Act. nidross. 3. tab. 4. fig. 6.

3. Elater germanus thorace elytrisque atro coe-  
 ruleis, corpore toto pedibusque nigris. Linn.  
 Syst. nat. 2. 555. 36. Fn. Sv. 730.

Elater Germanus. Oliv. Inf. 31. tab. 2. fig. 12.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

32. E. pubescens niger thorace linea dorsali punctis- *impressus*.  
 que duobus impressis, elytris striatis aeneo  
 nitidulis.

Habitat in Suecia Dom. Schneider.

Praecedente magis oblongus. Thorax niger,  
 obscure nitidus linea dorsali in primis postice  
 punctoque utrinque linea dorsali approximato  
 impressis. Scutellum retusum. Elytra striata,  
 aeneo colore nitida. Corpus nigrum.

33. E. thorace elytrisque aeneis, antennis maris *pectinicornis*-  
 pectinatis. Linn. Syst. nat. 2. 655. 42. Fn. *nis.*  
 Sv. 741.

Elater fuscus viridi aeneus. Geoff. Inf. 1. 133. 7.

Elater pectinicornis. Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 4.  
 tab. 6. fig. 4.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 36.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 4.

Degeer Inf. 4. 145. 2. tab. 5. fig. 3.  
Habitat in Europae hortis frequens.

- furcatus.* 34. E. thorace ferrugineo : linea dorsali nigra, coleoptris attenuatis testaceis : striis quinque nigris, capite furcato.

Habitat in India Mus. Britann.

Medius. Caput ferrugineum labio antico furcato vel bifido : mucronibus porrectis acutis. Thorax glaber, laevis, ferrugineus, nitidus linea dorsali atra. Elytra attenuata, punctato striata, testacea, futura, vitta media margineque exteriori postice coeuntibus, nigris. Margo basi flavus. Corpus flavum.

- futuralis.* 35. E. thorace utrinque unidentato ferrugineo : linea dorsali nigra, coleoptris testaceis : vittis tribus atris.

Elater futuralis. Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 3.

Elater angulatus. Drury Inf. 3. tab. 47. fig. 5.

Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Affinis videtur praecedenti. Caput atrum labio furcato vel bifido mucronibus porrectis, acutis. Thorax utrinque ante medium unidentatus, ferrugineus, nitidus linea dorsali lineaque parva, dorsali, approximata atris. Elytra substriata, attenuata, basi puncto parvo impresso, apice acutissima, testacea futura communi margineque exteriori basin haud attingente atris. Abdomen testaceum utrinque vitta atra, quae postice coeunt, at anum haud attingunt. Scutellum atrum.

- vittatus.* 36. E. fuscus elytrorum vitta pedibusque testaceis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Medius. Antennae piceae. Caput & thorax subvillosa, fusca. Elytra striata, fusca vitta in

- medio lata, fere obsoleta, obscure testacea. Abdomen ferrugineum.
37. *E. cupreus* elytris dimidiato flavis. *cupreus.*  
*Elater cupreus.* Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 50.  
*Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.*  
*Habitat in Anglia.*  
*Antennae pectinatae, nigrae. Elytra striata, basi testacea, apice cuprea.*  
*Variat antennis simplicibus corporeque aeneo.*
38. *E. thorace nigro: lateribus ferrugineis, coleop- cruciatus.*  
*tris flavis margine cruceque nigris.* Linn. Syst. nat. 2. 653. 12. Fn. Sv. 722.  
*Elater cruciatus.* Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 40.  
*Geoff. Inf. 1. 133. 6.*  
*Degeer Inf. 4. 149. 9.*  
*Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 10.*  
*Voet. Coleopt. 2. tab. 43. fig. 12.*  
*Habitat in Europae hortis.*
39. *E. thorace rufo, elytris fascia duplii alba, corpore nigro.* Linn. Syst. nat. 2. 653. 11.  
*Mus. Lud. Ulr. 83.*  
*Habitat in Oriente.*  
*Minor. Fascia elytrorum, altera ad basin, altera in medio.*
40. *E. thorace testaceo pubescente, elytris flavis castaneus.*  
*apice nigris, corpore nigro.* Linn. Syst. nat. 2. 654. 18. Fn. Sv. 727. Geoff. Inf. 1. 132. 4.  
*Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 25. & tab. 5. fig. 51.*  
*Degeer Inf. 4. 153. 15.*  
*Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 9. tab. 31. fig. 4.*  
*Habitat in Europae campis.*
41. *E. niger thorace glaberrimo rubro, elytris testaceis.* Linn. Syst. nat. 2. 654. 19. Fn. Sv. 728.  
*Elater livens.* Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 52.  
*Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 8.*

Habitat in Europae hortis.

*mesomelus.* 42. E. thorace marginaque elytrorum ferrugineis,  
corpore elytrisque nigris. Linn. Syst. nat. 2.  
653. 16. Fn. Sv. 725.

Elater mesomelus. Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 54.  
Habitat in Europae hortis.

Larva hexapoda, filiformis, duriuscula caudae  
scuto corneo: lateribus dentatis, subtus tuber-  
culo conico, pediformi, tubuloso.

Forte mera varietas sexus praecedentis.

*linearis.* 43. E. thorace rufo: medio fusco, elytris linearibus  
testaceis. Linn. Syst. nat. 2. 655. 15. Fn.  
Sv. 723.

Elater linearis. Oliv. Inf. 31. tab. 7. fig. 67.  
Degeer Inf. 4. 154. 17.

β. Elater marginellus thorace nigro: margine  
ferrugineo, elytris testaceis. Mant. Inf. 1.  
114. 51.

Habitat in Europa.

Caput, corpus & scutellum nigra. Os anten-  
narum basis, & tibiae pallidae.

*obscurus.* 44. E. piceus thorace elytrisque obscure nigris.  
Linn. Syst. nat. 2. 655. 25. Fn. Sv. 735.

Elater obscurus. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 76.  
Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.

Habitat in Europae hortis frequens.

*flavipes.* 45. E. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis,  
pedibus testaceis.

Elater flavipes. Oliv. Inf. 81. tab. 2. fig. 17.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Simillimus E. obscuro, pedibus tamen flavescentibus  
facillime distinguitur.

*castaneus.* 46. E. fuscus cinereo subvillosus antennis tibiisque  
testaceis.

Habitat in Insula Guadeloupe Dom. de Badier.

Medius. Caput, thorax, elytra obscura, pilis cinereis tomentosa. Elytra striata. Antennae & pedes testaceae.

47. *E. ferrugineus* elytris nigro punctatis. *maculatus.*

Elater maculatus. Oliv. 31. tab. 2. fig. 18.

Habitat in America meridionali.

Antennae nigrae. Thorax ferrugineus macula media, triangulari, nigra. Elytra ferruginea punctis quatuor nigris. Pedes fusci.

48. *E. cinereo fuscus* immaculatus. *filiformis.*

Elater filiformis. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 41.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Corpus E. obscuro duplo minus, filiforme, cinereo fuscum, immaculatum.

49. *E. thorace atro nitido*, elytris basi margineque *tristis.*

exteriori lividis. Linn. Syst. nat. 2. 655. 26,

Fn. Sv. 736.

Elater tristis. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 39.

Schaeff. Icon. tab. 194. fig. 1.

Habitat in Europae ligno putrescente.

50. *E. thorace fusco*, elytris testaceis: margine undique nigro. *marginatus* Linn. Syst. nat. 2. 655. 26. Fn.

Sv. 736.

Elater marginatus. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 29.

A&t. nidross. 3. 16. tab. 6. fig. 6.

Habitat in Europae plantis.

51. *E. niger* thorace toto rufo. *thoracicus.*

Elater niger thorace rufo. Geoff. Inf. 1. 132. 5.

Elater thoracicus. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 24.

Voet. Coleopt. 1. tab. 42. fig. 6.

Habitat in Anglia, Gallia.

52. *E. niger* thorace postice rubro nitido, Linn. *ruficollis.*

Syst. nat. 2. 655. 14. Fn. Sv. 724.

Elater ruficollis. Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 61.

Degeer Inf. 4. 153. 16.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 3.

Habitat in Europae graminosis.

*brunneus.* 53. E. thorace rufo: medio nigro, elytris corpore-  
que ferrugineis. Linn. Syst. nat. 2. 653. 10.  
Fn. Sv. 721.

Elater brunneus. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 30.

Schaeff. Icon. tab. 151. fig. 5. 6.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 6.

Habitat in Europaē plantis.

*haematoches* 54. E. niger thorace pubescente fulvo, elytris stria-  
tis sanguineis.

Elater haematoches. Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 6.

Elater purpureus. Herbst Arch. tab. 27. fig. 10.

Elater sanguineus. Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 6.

Habitat in Germania.

Antennae nigrae. Scutellum nigrum.

*sanguineus* 55. E. ater elytris striatis sanguineis immaculatis.

Linn. Syst. nat. 2. 654. 21. Fn. Sv. 731.

Elater niger, elytris rubris. Geoff. Inf. 1. 131. 2.

Elater sanguineus. Oliv. Inf. 31. tab. 1. fig. 7.  
tab. 5. fig. 48. a.

Degeer Inf. 4. 151. 13.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 7.

Habitat in Europaē hortis.

Larva Stroem in Actis Nidrosiensibus 2. tab. fig.

Variat major thorace magis fulvo pubescente,  
elytris magis coloratis lituraque obsoleta ba-  
seos nigra.

*ephippium.* 56. E. ater elytris striatis sanguineis: macula com-  
muni dorsali nigra.

Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 48. b.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 9.

Schaeff. Icon. tab. 31. fig. 5.

Voet. Coleopt. tab. 43. fig. 11.

Habitat in Germaniae Pinis putrescentibus.

Statura & summa affinitas praecedentis. Differt tamen thorace pube nigra toto coleoptrisque macula magna dorsali communi nigra, alias simillimus.

57. E. ater elytris striatis sanguineis apice nigris. *praefusus.*

Habitat in Germaniae Pinis putrescentibus Dom.

Smidt.

Forte mera varietas praecedentium. Differt tantum elytrorum apicibus nigris.

58. E. niger elytris striatis pedibusque testaceis. *testaceus.*

Habitat in Germania D. Schneider.

Paullo major sequente. Caput, thorax, corpus nigra, obscura. Elytra striata, testacea. Pedes testacei.

59. E. elytris antice dimidiato rufis, corpore nigro. *balteatus.*

Linn. Syst. nat. 2. 654. 22. Fn. Sv. 732.

Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 77.

Degeer Inf. 4. 152. 14.

Schaeff Icon. tab. 77. fig. 2.

Voet. Coleopt. 1. tab. 43. fig. 10.

Habitat in Europae hortis.

60. E. ater elytris testaceis apice nigris. *elongatus.*

Elater elongatus. Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 58.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Praecedenti affinis. Corpus atrum. Elytra punctato striata, testacea, apice nigra. Pedes apice testacei.

61. E. sanguineus capite thoracis linea dorsali elytrorumque apicibus nigris. *melenocephalus.*

Elater melanocephalus. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 36.

Elater melanocephalus. Thunb. nov. sp. 3. 63.

Habitat in Coromandel Mts. Dom. Banks.

- Caput & antennae nigra, immaculata. Thorax laevis, nitidus, sanguineus linea dorsali nigra, quae tamen basin haud attingit. Elytra punctato striata, sanguinea, apice nigra. Corpus sanguineum abdominis apice nigro. Pedes sanguinei.
- sputator.* 62. E. thorace fusco nitido, elytris cinereis, corpore nigro. Linn. Syst. nat. 2. 654. 24. Fn. Sv. 734.  
 Elater sputator. Oliv. Ins. 32. tab. 4. fig. 31.  
 Degeer Ins. 4. 151. 11.  
 Schaeff. Icon. tab. 19. fig. 2.  
 Habitat in Europae hortis frequens.
- analis.* 63. E. niger elytris ano pedibusque testaceis.  
 Habitat in Germania.  
 Statura E. pilosi. Antennae nigrae basi testacea.  
 Caput & thorax nigra, nitidula, immaculata.  
 Elytra striata, testacea. Corpus nigrum ano pedibusque testaceis.
- elegans.* 64. E. niger thoracis marginibus elytrorumque vitta pedibusque testaceis.  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.  
 Caput nigrum antennis testaceis. Thorax niger, nitidus margine laterali & postico testaceo.  
 Elytra nigra vitta lata ante marginem marginem ipso tenuissime testaceis. Corpus piceum pedibus pallide testaceis.
- variabilis.* 65. E. thorace fusco obscuro, elytris striatis testaceis.  
 Habitat in Germaniae truncis emortuis Dom. Smidt.  
 Statura & summa affinitas E. sputator, at paullo major. Caput & thorax fusca, minime nitida, nec canaliculata. Elytra striata, testacea, immaculata.  
 Variat rarius elytris fuscis.

66. E. fuscus cinereo subvillosum elytris striatis. *pilosus.*  
 Elater pilosus Lefk. Itin. I. pag. II. I. tab. A.  
 fig. I.  
 Habitat in Lusatiae montibus. Prof. Lefke.  
 Parvus, totus obscurus, villo parvo cinereo tectus.  
 Elytra striata.
67. E. tomentosus livens thorace elytrisque obscuris longicollis.  
 rioribus.  
 Elater longicollis. Oliv. Inf. 31. tab. 8. fig. 81.  
 Habitat in Gallia.  
 Indistinctus. Antennae testaceae. Caput & tho-  
 rax villosa, obscura. Elytra crenato striata,  
 livida. Corpus nigrum pectore utrinque nigro.
68. E. fuscus elytris striatis, antennis pedibusque *pallipes.*  
 flavis.  
 Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.  
 Parvus, fuscus antennis pedibusque flavis. Simil-  
 limum e Suecia misit Dom. de Paykull.
69. E. niger elytris fuscis. *striatus.*  
 Elater lineatus. Oliv. Inf. 31. tab. 3. fig. 32.  
 Habitat in Suecia.  
 Caput & thorax obscure nigra. Elytra fusca  
 lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus.  
 Antennae ferrugineae. Pedes fusi.
70. E. ater thorace nitido, elytris striatis, pedibus *rufipes.*  
 rufis.  
 Elater rufipes. Oliv. Inf. 31. tab. 7. fig. 72.  
 Elater niger pedibus rufis. Geoff. Inf. I. 136. 14.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura & summa affinitas E. minutus. Caput &  
 thorax atra, nitida, immaculata. Elytra striata,  
 nigra. Pedes omnes rufi digitis nigris.
71. E. thorace atro nitido, elytris pedibusque ni- *minutus.*  
 gris. Linn. Syst. nat. 2. 656. 34. Fn. Sv. 744.



- Elater minutus.* Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 62.  
Habitat in Europa.  
Corpus parvum, nigrum, nitidum.
- pallens.* 72. *E. ater elytris striatis pedibusque testaceis.*  
Geoff. Inf. 1. 139. 19.  
Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
Statura omnino *E. limbati*, at elytra immaculata.  
Thoracis margo anticus parum pallidus. Caput & thorax atra, nitida.
- limbatus.* 73. *E. thorace atro nitido, elytris testaceis: limbo nigro.*  
*Elater limbatus.* Thunb. nov. sp. 3. 64.  
*Elater limbatus.* Oliv. Inf. 31. tab. 7. fig. 73.  
Habitat Kiliae Dom. Lund.  
Statura & magnitudo *E. minutus*, cui valde affinis, at elytra testacea margine omni nigro.
- riparius.* 74. *E. nigro aeneus elytris striatis, pedibus rufis.*  
Habitat in Lapponia ad ripas aquarum D. de Paykull.  
Statura & magnitudo praecedentium totus obscure aeneus, pedibus solis rufis.
- advena.* 75. *E. ater elytris striatis pedibusque obscure cinereis.*  
Habitat ad Bizerta Hispaniae Dom. Vahl.  
Parvus. Caput & thorax atra, parum nitida.  
Elytra acuminata, striata, obscure cinerea.  
Abdomen nigrum pedibus cinereis.
- nitidulus.* 76. *E. elytris striatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis.*  
Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
Triplo minor *E. pulchello*. Caput & thorax subpubescentia, atra, immaculata. Elytra striata, nigra, maculis duabus magnis flavis, anteriore baseos majore. Antennae & pedes flavae.

77. E. capite thoraceque atris, elytris nigris: maculis flavescentibus, pedibus flavis. Linn. Syft. nat. 2. 656. 35. Fn. Sv. 745.  
*Elater pulchellus.* Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 38.  
*Herbst Arch. tab. 27. fig. 7.*  
*Habitat in Europae hortis.*
78. E. niger elytris striatis: macula media rufa. *2 guttatus.*  
*Elater 2 guttatus.* Oliv. Inf. 31. tab. 6. fig. 59.  
*Habitat in Gallia meridionali Mus. Dom. Olivier.*  
*Statura E. pulchelli paullo major. Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Elytra striata, nigra macula media ad marginem rufa. Corpus nigrum.*
79. E. niger elytris testaceis apice nigris: puncto 2 *maculatus* albo.  
*Elater 2 maculatus.* Oliv. Inf. 31. tab. 5. fig. 10.  
*Ross. Fn. Etrusc. 1. tab. 3. fig. 10.*  
*Habitat in Gallia meridionali Dom. Olivier.*  
*Magnitudo omnino E. pulchelli. Corpus nigrum. Elytra striata, testacea, in medio macula transversa, marginali, nigra. Apex late niger puncto magno, distincto, albo.*
80. E. niger elytris striatis testaceis: maculis tri-3 *maculatus* bus nigris.  
*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*  
*Statura & magnitudo omnia E. pulchelli. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra striata, testacea macula magna baseos communi. In medio macula magna ad marginem exteriorem, quae fere cum macula postica coit. Corpus nigrum pedibus flavescentibus.*
81. E. supra niger thoracis limbo maculisque duabus elytrorum testaceis. *4 maculatus*  
*Habitat in Italia Dr. Allioni.*

Statura & magnitudo omnino E. pulchelli.  
Caput nigrum antennis testaceis. Thorax glaber, laevis, in medio obscure nigricans limbo omni testaceo. Corpus obscurum pectore, ano pedibusque testaceis.

*politus.* 82. E. ater nitidus elytris striatis, pedibus anticis pallidis.

Habitat in Dahlikarliae montibus de Paykull.

E. minuto duplo minor & affinis. Thorax nitidus. Elytra striata. Pedes antici pallidi.

*guttatus.* 83. E. laevis ater elytris punctis tribus albis.

Elater 6 guttatus. Thunb. nov. sp. 3. 65.  
fig. 75.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Corpus minimum, atrum, nitidum,

*buprestoides* 84. E. cylindricus niger immaculatus capite retracto.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus medium, cylindricum, nigrum, minime nitidum. Caput intra thoracem retractum. Elytra vix striata.

Ab E. buprestoides. Linn. omnino diversus.

*pygmaeus.* 85. E. niger obscurus tibis piceis.

Habitat in Germaniae truncis putrescentibus Dom. Smidt.

Minutus, totus niger, obscurus, minime nitidus. Tibiae solae piceae.

*notatus:* 86. E. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis apice nigris: maculis duabus albis.

Elater notatus. Oliv. Inf. 31. tab. 4. fig. 37.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Caput atrum fronte villis cinereis. Thorax rufus antice maculis duabus magnis, atris, annulo cinereo tomentoso cinctis. Elytra striata, basi rufa, ultra medium nigra maculis duabus, transversis, albis. Abdomen nigrum, cinereo nitidulum. Femora nigra tibiis pallescentibus.

87. E. thorace ferrugineo, elytris atris: fasciis *festivus*.  
duabus flavis.

Elater festivus. Thunb. nov. spec. 3. 64. fig. 74.

Habitat in Aegypto Prof. Forstkahl.

Parvus. Caput fuscum. Thorax rufescens. Elytra striata, nigra fasciis duabus flavis, altera versus apicem.

88. E. niger nitidus elytris puncto baseos rubro. 2 *pustulatus*.  
Linn. Syst. nat. 2. 642. 9. Geoff. Inf. 1. *tus*.  
136, 15.

Elater 2 pustulatus. Oliv. Inf. 31. tab. 2.  
fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 104. fig. 6.

Herbst Arch. tab. 27. fig. 8.

Voet. Coleopt. 1. tab. 44. fig 22.

Habitat in Germaniae nemoribus.

Variat interdum elytrorum basi rufa sutura tam  
men semper nigra.

89. E. niger elytris striatis: punctis duobus testaceis. 4 *pustulatus*.

Habitat Halaë Saxonum Dom. Hybner.

Minutus. Caput & thorax nigra, immaculata.

Elytra nigra maculis duabus, distinctis, testaceis. Corpus nigrum, pedibus testaceis.

80. LUCANUS. *Penicilli duo sub labio  
palpigeri.*

*Antennae pectinato fil-  
files.*

*Alces.*

1. *L. mandibulis exsertis apice quadridentatis.*

Oliv. Inf. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3.

Petiyer. Gazoph. tab. 57. fig. 15.

Habitat in Asia.

Caput magnum, depresso, atrum, utrinque sinuatum. Mandibulae capite longiores, apice compressae, quadridentatae, & in medio interno dente validissimo armatae.

*Cervus.*

2. *L. Mandibulis exsertis unidentatis apice bifurca-  
tis, labio deflexo: ruga transversa elevata.*  
Linn. Syst. nat. 2. 559. 1. Fn. Sv. 405. Geoff.  
Inf. 1. 61. 1. tab. 1. fig. 1.

Roeff. Inf. 2. Scarab. 1. tab. 4. 5.

Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 1 & 7.

Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 1.

*β. Lucanus Dorcas Myll. Zool. Dan. 444.*

*Platycerus fuscus. Geoff. Inf. 1. 60. 2.*

Roeff. Inf. 2. tab. 5. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 133. fig. 2.

Oliv. Inf. 1. 8. 1. tab. 2. fig. 3. 6.

Habitat in Ligno putrescente Europae.

Lucani corpus magnum, oblongum, depresso,  
glabrum, immarginatum, tardum, capite magno,  
plano, exerto, fere quadrato, mandibulis saepius  
exsertis, corniformibus oculis rotundatis, margini-  
libus, antennis distantibus, sub apice capitis promi-  
nulo insertis, longitudine thoracis, thorace transverso,  
utrinque deflexo, scutello rotundato, elytris rigidis,  
fornicatis, pedibus validis, cursoriis, tarsis quinque-  
articulatis; colore nigro.

Faemina  $\beta.$  mare multo minor mandibulisque haud exsertis. Cornua officinalia maris mandibulae exsertae ad dimicandum.

Larva obesa, albida capite pedibusque ferrugineis. Cossum veteram credit Roesel.

3. L. mandibulis exsertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Elaphus.*

Oliv. Inf. 1. 12. 4. tab. 3. fig. 7.

Habitat in Virginia.

Capitis margo posticus valde elevatus, emarginatus. Simillimus L. cervo at minor. Faemina minor absque mandibulis exsertis.

4. L. mandibulis exsertis: denticulis mediis difformibus apice bifurcatis. *capreolus.* Linn. Syst. nat. 2. 560.

2. Amoen. acad. 6. 391. 4. Mus. Lud. Ulr. 30.

Lucanus Capra. Oliv. Inf. 1. 12. 3. tab. 1. fig. 12.

Sulz. Hist. tab. 2. fig. 1.

Habitat in Germania.

Lucano Cervo duplo fere minor. Mandibulae exsertae, capite longiores, in medio denticulis duobus, crassis, approximatis, lobatis. Corpus nigrum.

5. L. mandibulis exsertis intus bidentatis longitudine *Dama.* capit. 1.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 11. 12.

Oliv. Inf. 1. 15. 8. tab. 3. fig. 14.

Habitat in Virginia.

Mandibulae arcuatae apice integrae dente postico minutissimo. Femora ferruginea.

6. L. mandibulis exsertis tridentatis niger femori- *femoratus.* bus ferrugineis. Oliv. Inf. 1. 17. 10. tab. 4. fig. 10.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Banks.

Mandibulae valde exsertae intus denticulis tribus, baseos valido, medio minori, apicis validiori

acuto. Caput planum labio vix ullo. Thorax obscurior margine antico fulvo ciliato, postico utrinque bidentato. Scutellum fulvo holofericum. Femora omnia ferruginea.

*Bison.*

7. L. mandibulis exsertis multidentatis, thoracis elytrorumque margine rubro.

Lucanus Bison. Olivier Inf. I. 13. 5. tab. 3. fig. 6.

Voet Coleopt. tab. 30. fig. 6.

Habitat in America meridionali.

Thoracis margo rufus lineola nigra.

*Gazella.*

8. L. mandibulis intus bidentatis ater elytrorum margine testaceo. Oliv. Inf. I. 13. tab. 4. fig. 13.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Mandibulae breves, intus tridentatae. Caput planum lamella ante oculos auctum. Thoracis margo posticus utrinque emarginatus. Elytra margine late testaceo. Tibiae angulato sulcatae, nigrae.

*Lama.*

9. L. mandibulis exsertis tridentatis capite brevioribus, thorace angulato.

Lucanus Lama. Oliv. Inf. I. 14. 7. tab. 3. fig. 8.

Habitat in India orientali.

Similis L. Ceruo feminae at multo major.

*futuralis.*

10. L. mandibulis exsertis basi dentatis testaceus : linea dorsali atra.

Lucanus futuralis. Oliv. Inf. I. 16. 9. tab. 5. fig. 12.

Habitat — — —

Parvus. Mandibulae basi interiori tridentatae. Caput testaceum margine lineaque dorsali apice bifida, cum mandibulis coeunte, atris. Thorax testaceus linea dorsali puncto utrinque basos atris. Corpus brunneo atrum.

- 11.** L. mandibulis dente laterali elevato, corpore de- *paralelepi-*  
*presso.* Linn. Syst. nat. 2. 561. 6. *pedus.*  
 Platycerus niger. Geoff. Inf. 1. 62. 3.  
 Oliv. Inf. 1. 17. II. tab. 4. fig. 9.  
 Voet. Scarab. tab. 29. fig. 7.  
 Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 7.  
 Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 9.  
 Habitat in Europae sylvis.  
 Alter sexus mandibulis minoribus punctoque  
 dupli capitis prominente.
- 12.** L. mandibulis incurvis: intus dente incrassato *cancroides.*  
 difformi, elytris punctatis subpubescentibus.  
 Oliv. Inf. 1. 18. 12. tab. 3. fig. 11.  
 Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.  
 Thorax parum canaliculatus. Tibiae serratae.
- 13.** L. mandibulis lunatis unidentatis ater thorace *tenebroides.*  
 marginato, elytris substriatis.  
 Habitat in Russia Dom. Boeber.  
 Paullo major L. caraboides. Abdomen piceum.
- 14.** L. coerulescens mandibulis lunatis, thorace mar- *caraboides.*  
 ginato. Linn. Syst. nat. 2. 561. 7. Fir.  
 Sv. 407.  
 Geoff. Inf. 1. 63. 4. Schaeff. Icon. tab. 6.  
 fig. 8. tab. 75. fig. 7.  
 Degeer Inf. 4. tab. 12. fig. 11.  
 Oliv. Inf. 1. 20. 14. tab. 2. fig. 2.  
 Habitat in Europae locis suffocatis.  
 Variat virescens ab domine pedibusque rufescen-  
 tibus, at vix distinctus.

81. PASSALUS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, arcuata,  
dentata, apice acuta.

*Antennae* arcuato lamel-  
latae.

*interruptus*. 1. L. niger vertice spina recumbente.

Lucanus interruptus. Mant. Inf. 1. 218. Linn.

Syst. nat. 2. 560. 4. Mus. Lud. Ulr. 53.

Oliv. Inf. 1. tab. 3. fig. 5.

Degeer Inf. 4. tab. 19. fig. 13.

Sulz. Inf. tab. 2. fig. 2.

Voet, Scarab. tab. 29. fig. 1.

Brown. Jamaic. 429. tab. 44. fig. 7.

Petiv. Gazoph. tab. 27. fig. 7.

Habitat in Americae meridionalis Insulis sub fac-  
charo putrefacente.

Os palpis maxillisque. Palpi quatuor inaequales,  
filiformes, anteriores parum longiores, quadri-

Passali corpus elongatum, depresso, planum,  
glabrum, immarginatum, capite magno, transverso,  
angulo antico prominulo, acuto, oculis parvis, glo-  
bosis, marginalibus, vix prominulis, antennis di-  
stantibus, sub capitibus apice insertis, thorace brevio-  
ribus, thorace plano, canaliculato, subtus tomentoso,  
ab abdomen remoto, scutello nullo, elytris rigidis,  
planis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus  
brevibus, validis, tarsis quinquearticulatis, colore  
nigro, nitido.

articulati: articulis aequalibus; ultimo ovato ad haerentes maxillae dorso, posteriores breviores, triarticulati: articulo secundo longiori adnati labii medio. Mandibula valida, cornea, arcuata, dentata, apice fissa. Maxilla porrecta, cornea, arcuata dentibus duobus, uno post alterum, validis, apice acuta. Labium crassum, fere quadratum, corneum, apice sinuatum. Antennae articulis fere moniliformibus: secundo longiori, ultimis tribus lamellatis.

Thorax elytraque rufo ciliata.

**2. P. capite multidentato, thoracis lateribus punctatis. *dentatus.***

Lucanus striatus. Oliv. Inf. 1. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Insula Guadeloupe Americae meridionalis Dom. de Badier.

Nimis affinis praecedenti at triplo minor. Corpus depresso, totum atrum. Caput denticulis plurimis, elevatis, brevibus. Thorax glaber, nitidus, in medio sulcatus lateribus punctis impressis, nec ciliatus. Elytra remota, plana, sulcata sulcis subcrenatis. Pedes breves.

**3. P. ferrugineus elytris testaceis. *minutus.***

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.

Corpus depresso, planum, at minutum, vix pediculo majus. Caput & thorax glabra, laevia, ferruginea mandibulis exsertis, brevibus, inermibus, acutis. Elytra vix striata, testacea.

— — —

82. PRIONUS. *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla cylindrica, integra.*  
*Labium brevissimum,*  
*membranaceum.*  
*Antennae setaceae.*

*longimanus* 1. P. thorace spinis mobilibus, elytris basi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis.

Prionus longimanus. Oliv. Inf. 60. tab. 3, fig. 12.  
 tab. 4. fig. 12.

Cerambyx longimanus. Linn. Syst. nat. 2, 621.  
 Mus. Lud. Ulr. 64.

Degeer Inf. 5. 102. 6.

Sloan, Jamaic. 2. 209.

Grew. Mus. 161. tab. 13.

Roef. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 2.

Aub. Miscell. tab. 64. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

*fuliginosus* 2. P. thorace crenato marginato unidentato ater  
 elytris apice crenato dentatis, thorace canaliculato.

Habitat in America Mus. Britann.

Statura & summa affinitas P. lineati uti suadent antennae, pedes & gibber sterni. Dissert

Prioni corpus magnum, oblongum, depresso,  
 glabrum, tardum, capite magno, transverso, piano,  
 inserto, oculis transversis, reniformibus, marginali-  
 bus, antennis distantibus, elongatis, supra mandibu-  
 las insertis, thorace piano, marginato: mārgīne fae-  
 pitis dentato, scutello rotundato, elytris rigidis, for-  
 nicatis, immarginatis, longitudine abdominis, pedi-  
 bus longiusculis, cursoriis, tarsis quadriarticulatis,  
 colore obscuro.

tamen dente thoracis magis versus posteriora  
inferto & corpore atro, immaculato sola linea  
thoracis dorsali impressa, villosa, alba. Pedes &  
antennae mox nigrae, mox rufae.

3. P. thorace marginato unidentato rufo, mandibu- *rostratus*.  
lis inflexis acutis, sterno spinoso.  
Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.  
Caput atrum, canaliculatum. Mandibulae mag-  
nae, inflexae, os obtegentes, acutae, atrae.  
Antennae piceae, corpore breviores: articulis  
ultimis valde ferratis. Thorax utrinque in me-  
dio obtuse dentatus, glaber, rufus, nitidus.  
Elytra obtusa, nigra. Pectus rufum sterno spina  
erecta, acuta. Pedes rufi.
4. P. thorace marginato crenato unidentato niger *lineatus*.  
albo vittatus elytris apice crenato dentatis.  
Cerambyx lineatus. Linn. Syst. nat. 2. 624. 14.  
Sloan. Jam. 209. tab. 237. fig. 34.  
Brown Jam. 430. tab. 43. fig. 7.  
Herbst Arch. tab. 32. fig. 1.  
Habitat in America Mus. Britann.  
Mandibulae breves, inermes. Thorax niger li-  
neis tribus villosis, albis. Elytra nigra vitta  
media lata & parva marginali albis. Sternum  
antice gibbere elevato, obtuso, postice bifidum.  
Pedes ferruginei.
5. P. thorace marginato crenato unidentato cyaneo *nitidus*.  
aeneus elytris cupreis.  
Prionus nitidus. Oliv. Inf. 66. tab. 12. fig. 48.  
Habitat in Brasilia Mus. Dr. Hunter.  
Antennae longae, cyaneae. Caput canaliculatum,  
viridiaeneum. Thorax planus: valde marginatus,  
crenatus denteque medio porrecto, acuto, ar-  
cuato, obscure aeneus. Elytra punctata, rufa

cuprea, obtusa. Pectus cyaneum. Abdomen viridi aeneum, nitidum. Pedes cyanei.

*Faber.* 6. P. thorace marginato utrinque unidentato, elytris piceis, antennis mediocribus.

*Cerambyx Faber.* Linn. Syst. nat. 2. 622. 6.  
Fn. Sv. 646.

Frish. Inf. 13. 22. tab. 17.

Schaeff. Icon. tab. 72. fig. 3. tab. 111. fig. 1.  
Habitat in Europa rarius.

Mas thorace magis laevi margine crenato absque dente.

*scabricornis* 7. P. thorace submarginato unidentato subvillosum nigricans elytris fuscis: lineis duabus elevatis, antennis mediocribus.

*Prionus scabricornis.* Scopol. Carniol. 174.

*Cerambyx scabricornis.* Oliv. Inf. 66. tab. fig.

*Cerambyx scabricornis.* Fyefl. Inf. Helv. 13. 241.  
tab. 1. fig. 3.

*Leptura nigra* thorace subcylindrico. Geoff. Inf. 1. 210. 6.

Habitat in Europa australiori Mus. Dom. Olivier.  
Reliquis angustior. Thorax vix marginatus, subvillosum, in altero sexu fere inermis.

*depsarius.* 8. P. thorace submarginato unidentato pubescente, corporenigricante, antennis brevibus rubris.

*Cerambyx depsarius.* Linn. Syst. nat. 2. 624. 12.

Schaeff. Icon. tab. 67. fig. 3.

Habitat in Suecia Mus. Dom. Zschuck.

Minor angustiorque P. coriario.

*mucronatus* 9. P. thorace marginato bidentato, elytris mucronatis rufis.

Habitat in America Dom. Drury.

Corpus P. cervicorni paullo minus, Frons retusa antennis brevibus, compressis. Thoracis dorsum

bituberculatum. Elytra rufescentia, holofericea,  
acuminata.

10. P. thorace bidentato: dentibus arcuatis niger, *arcuatus*.  
elytris obtusis testaceis.

Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.

Antennae compressae, mediocres, nigrae. Thorax niger utrinque dentibus duobus validis, retrorsum arcuatis. Elytra testacea, basi obscuriora. Abdomen subitus ferrugineo holofericeum. Pedes picei, antici nigri.

11. P. thorace marginato tridentato niger elytris *maculatus*.  
cinereo maculatis.

Prionus maculatus. Oliv. Inf. 66. tab. 4. fig. 14.

Habitat in Senegal Mus. Regis Galliae.

Major P. coriario. Mandibulae exsertae, dentatae. Antennae longitudine corporis nigrae. Thorax acute tridentatus. Elytra cinereo fere variegata.

12. P. thorace marginato utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus unispinosis, antennis brevibus.

Prionus cervicornis. Oliv. Inf. 56. tab. 2. fig. 8.

Cerambyx cervicornis. Linn. Syst. nat. 2. 6.  
22. 3. Mus. Lud. Ulr. 65.

Sloan. Jam. 2. tab. 237. fig. 6.

Merian Surin. tab. 48.

Roel. Inf. 2. scarab. 2. tab. 1. fig. 8.

Brown Jamaic. tab. 44. fig. 8.

Aubent. Miscell. tab. 90. fig. 3.

Habitat in Americae ligno bombacis.

Larva edulis in deliciis.

Mandibulae magnae, intus dentatae, extus versus apicem spina unica, valida, acuta.

13. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice spinosis.

Habitat — — Mus. Britann.

Medius. Mandibulae exsertae, forcipatae, nigrae medio interiori dente valido, acuto. Antennae mediocres, piceae, basi nigrae: articulis spina apicis valida, acuta longitudine articuli sequentis. Oculi maximi, aeneo nitiduli. Thorax angustus, acute unidentatus, obscure ferrugineus. Elytra apice parum ad futuram acuminata.

*buphtalmus* 14. P. thorace utrinque tridentato ater nitidus antennis brevibus: articulis ultimis apice spinosis.

*Huslarus Ceylonensis*. Voet. Scarab. 2. tab. 3. fig. 11.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Mandibulae exsertae, breves, arcuatae, medio interiori unidentatae, acutae. Antennae breves articulis obconicis: ultimis unispinosis. Oculi maximi fronte inter oculos sulcata. Thorax ater, nitidus antice dentibus duobus validis, acutis tertioque minori, potius margine postico tantum prominulo. Elytra glabra, atra, nitida, omnino inermia. Corpus nigrum pectore rufo. Basis abdominis acuta prominet.

*coriarius*. 15. P. thorace marginato tridentato; corpore piceo, antennis brevibus.

*Prionus coriarius*. Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 1.

*Prionus*. Geoff. Inf. 1. 198. tab. 3. fig. 9.

*Cerambyx coriarius*. Linn. Syst. nat. 2. 622. 7. Fn. Sv. 647.

*Cerambyx Prionus*. Degeer Inf. 5. 591. tab. 3. fig. 5.

Roes. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 1. fig. 1. 2.

Schaeff. Elem. tab. 102.

Icon. tab. 67. fig. 3. tab. 9. fig. 1.

Frisch Inf. 13. tab. 9.

Habitat in Europae Betulis putridis.

Cerambyx imbriconis. Linn. Syst. nat. 2. 624. 5.

mera hujus varietas.

Lucanus tridentatus. Linn. Syst. nat. 2. 560. 3.

hujus specimen mutilatum videtur.

Ova magna, oblonga, flavescentia.

16. P. thorace utrinque bidentato, corpore nigro, *giganteus*.

elytris ferrugineis, antennis brevibus.

Cerambyx giganteus. Linn. Mant. 1. 531.

Oliv. Inf. 66. tab. 6. fig. 21.

Aubent. Miscell. 1. tab. 64. fig. 2.

Habitat Cajennae.

17. P. thorace marginato tridentato obscurus pectore *cylindricus*

abdomineque ferrugineis, antennis brevibus.

Cerambyx unicolor. Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 1.

Habitat in America boreali Dom. Blackburn.

Antennae compressae. Caput & thorax nigra.

Elytra picea. Pectus & abdomen ferruginea.

Corpus magis cylindricum quam in reliquis.

18. P. thorace marginato utrinque quadridentato, *armillatus*

elytris ferrugineis nigro marginatis.

Pronus armillatus. Oliv. Inf. 66. tab. 5. fig. 17.

Cerambyx armillatus. Linn. Syst. nat. 2. 622. 4.

Petiv. Gazoph. 525. tab. 15. fig. 6.

Habitat in India.

Maximus. Frons retusa. Mandibulae emarginatae.

Thorax lateribus rufescens. Elytra apice acuminata.

19. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis *Luzonum*.

porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anticus elongatis.

Petit. Gazoph. tab. 74. fig. 1.

Habitat in Insulis Luzonum Mus. Britann.

Antennae mediocres, nigrae: articulo 2. 3. 4. 5. subtus aculeatis. Mandibulae prominentes, basi unidentatae apiceque bifidae. Thorax glaber, niger margine spinis duodecim ciliato. Elytra mucronata, pallide ferruginea, basi subpunctata. Pedes antici scabri, subtus aculeati.

- seripes.* 20. P. thorace marginato multispinoso, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus spinoso ferratis.

Habitat in Africa aequinoctiali D. Banks.

Caput nigrum ore intus barbato. Mandibulae validae, basi unidentatae, apice tridentatae. Antennae mediocres: articulo secundo subtus scabro. Thorax ater, scaber margine spinis duodecim. Elytra subferruginea. Pedes omnes valde ferrati.

- damicornis.* 21. P. thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus.

*Cerambyx damicornis.* Linn. Mant. 1. 532.

Degeer Inf. 5. 97. 2.

Drury Inf. 1. tab. 38. fig. 1.

Habitat in America.

Larva Americanis edulis.

- bifasciatus.* 22. P. thorace marginato denticulato, corpore nigro, elytris rubris: fasciis duabus atris, antennis brevibus. Linn. Syst. nat. 2. 624. 16.

Gronov. Zooph. 532. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

Fascia elytrorum altera in medio, altera postica, terminalis.

- Thomae.* 23. P. thorace marginato crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo.

*Cerambyx Thomae.* Acta Soc. Berol. 4. tab. 7. fig. 9,

Habitat in Insula St. Thomae America.

Elytra apice rotundata.

24. P. thorace marginato crenato albo bilineato, ely- *bilineatus*.  
tris ferrugineis: atomis albis margineque  
luteo.

Habitat in America Dom. v. Rohr.

Affinis praecedenti, a quo tamen differt thora-  
cis dorso lineis duabus albis, elytris atomis  
albis irroratis apice subspinosis.

25. P. thorace marginato crenato, capite submandi-*spinibarbis*:  
bulis spinoso scabro, mandibulis tridentatis.

*Cerambyx spinibarbis*. Linn. Syst. nat. 2. 624. 4.

Mus. Lud. Ulr. 67.

Merian Surinam. 24. tab. 24.

Habitat in America meridionali.

Mandibulae magna, crassae, intus tridentatae,  
apiceque emarginatae.

26. P. thoracis lateribus scabris multidentatis: dente *palmatus*:  
posteriori palmato, antennis brevibus.

Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.

Statura & magnitudo P. spinibarbis. Caput ca-  
naliculatum, nigrum. Antennae breves, com-  
pressae, obscure piceae. Thoracis dorsum pla-  
num, laeve, nitidum, lateribus scabris: mar-  
gine multidentato; dente tertio ante apicem  
majori, palmato. Elytra laevia, picea, ad su-  
turam apice mucronata. Pedes intus ferrati.

27. P. thorace marginato crenato, mandibulis por-*maxillosus*.  
rectis intus hirsutis quadridentatis.

*Prionus maxillosus*. Oliv. Inf. 66. tab. 1. fig. 3.

*Cerambyx maxillosus*. Drury Inf. 1. tab. 38.  
fig. 3.

Habitat in America Mus. Britann.

Minor P. melanopo, totus ater, nitens. Man-  
dibulae porrectae, acutae, intus hirsutae,

apice tridentatae basique unidentatae. Elytra  
apice mucronata.

*canalicula-* 28. P. thorace marginato crenato: canali dorsali  
*tus.* albo villoso, antennis brevibus.

Habitat in Americae Insulis Mus. Dr. Hunter.  
Antennae breves, compressae, nigrae. Caput  
canaliculatum, nigrum, immaculatum. Tho-  
racis dorsum canali albo villoso. Scutellum  
albo villosum. Elytra subscabra. Pedes nigri,

*cinnamo-* 29. P. thorace marginato denticulato, mandibulis  
*moeus.* porrectis tridentatis.

*Cerambyx cinnamomeus.* Linn. Syst. nat. 2.  
623. 10. Mus. Lud. Ulr. 66.

Oliv. Ins. 66. tab. 5. fig. 18.

Drury Ins. 1. tab. 40. fig. 2.

Sulz. Ins. tab. 5. fig. 2.

Merian Surinam tab. 24.

Habitat in America meridionali.

Duplo minor P. cervicorni.

*melanopus.* 30. P. thorace marginato dentato, mandibulis por-  
rectis multidentatis, elytris mucronatis.

*Cerambyx melanopus.* Linn. Syst. nat. 2. 623. 8.

*Cerambyx crenulatus.* Drury Ins. 1. tab. 38.  
fig. 2.

Merian Surinam. tab. 24. fig. 1.

Habitat in America meridionali.

Affinis P. maxilloso.

*spinofus.* 31. P. thorace multidentato nigro, elytris uniden-  
tatis testaceis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Caput canaliculatum. Antennae breves, com-  
pressae, nigrae. Thorax vix marginatus, subtus  
cinereo hirtus dorso canaliculato.

*barbatus.* 32. P. thorace marginato integro, mandibulis ferru-  
gineo hirsutissimis, antennis mediocribus.

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Banks.

Antennae scabrae: articulo ultimo compresso, laevi. Caput atrum mandibulis porrectis labiisque ferrugineo hirsutissimis. Elytra picea. Abdomen villoso album. Pedes nigri.

33. *P.* thorace submarginato mutico testaceus, anten-*pectinicornis* brevibus pectinatis. Oliv. Inf. 66. tab. *nis.*

Habitat in Senegal Mus. Geoffroy.

Reliquis minor & thorax minus marginatus, muticus, totus testaceus. Antennae corpore breviores, valde pectinatae. Mandibulae exsertae, in medio unidentatae.

83. CERAMBYX. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla obtusa, unidentata.*

*Labium bifidum.*

*Antennae setaceae.*

1. *C.* thorace spinoso viridis nitens antennis medio-*moschatus.* cribibus cyaneis.

*Cerambyx moschatus.* Linn. Syst. nat. 2. 627.

34. Fn. Sv. 652.

*Cerambyx moschatus.* Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 7.

*Cerambyx odoratus.* Degeer Inf. 5. 64. 2.

Geoff. Inf. 1. 103. 5.

*Cerambycis corpus oblongum, angustum, depresso-fuscum, glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, inserto, oculis parvis, rotundatis, lateribus, antennis elongatis, inter oculos insertis, thorace rotundato, piano, inaequali, utrinque spinoso, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus longiusculis, cursoriis, femoribus compressis, tarsis quadriarticulatis, colore vario-*

Geoff. Inf. 1. 103. 5.  
 Frish. Inf. 13. tab. 11.  
 Schaeff. Icon. tab. 11. fig. 7. tab. 55. fig. 1.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 14.  
 Habitat in Europae Salice.

- virens.* 2. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, femoribus rufis.  
 Cerambyx virens. Linn. Syst. nat. 2. 627. 33.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 78.  
 Drury Inf. 1. tab. 40. fig. 1.  
 Brown Jamaic. tab. 43. fig. 8.  
 Habitat Larva in truncis Amyris balsamiferae.  
 Imago Eugeniam Jambos spirat. Dr. Schwarz.  
 Variat antennis corpore longioribus & brevioribus, femoribus dentatis & muticis.
- nitens.* 3. C. thorace rotundato subspinoso viridi nitens femoribus clavatis: clava anticornum rufa.  
 Cerambyx nitens. Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 107.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 15.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.  
 Antennae corpore duplo longiores, nigrae. Thorax subspinosis. Corpus totum viride, nitens.  
 Pedes nigri femoribus omnibus clavatis, clava quatuor anteriorum ferruginea. Tibiae posticae compressae.
- afer.* 4. C. thorace rotundato spinoso, corpore viridi, antennis pedibusque rufis.  
 Cerambyx afer. Linn. Mant. 532.  
 Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 4.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 141.  
 Habitat in Africa Dr. Solander.  
 Duplo minor C. virente. Frons retusa. Antennae corpore vix longiores, rufae. Thorax spinosus, rugosus. Elytra attenuata, viridia sutura nitens.

- diore. Pedes omnes rufi femoribus quatuor anticus clavatis.
5. C. thorace spinoso viridi, elytris violaceis basi *festivus*, viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 44. tab. 18. fig. 44.  
 Habitat ad fluvium Gaboon Africæ Mus. Dom. Banks.  
 Antennæ mediocres, nigrae primo articulo rufo. Labium superius subrufum. Thorax utrinque spinis duabus obtusis: posteriori majori. Femora unidentata, ferruginea. Tibiae fuscae.
6. C. thorace spinoso viridis nitens thorace elytris- *vittatus*. que nigro lineatis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 10.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 10. fig. 41.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Antennæ mediocres, nigrae. Thorax spinosus, inaequalis lineis duabus dorsalibus, atris. Elytra obtusa, viridia lineis duabus longitudinalibus, atris. Femora inermia, rufa. Tibiae nigrae.
7. C. thorace spinoso niger: vitta atra. *velutinus*.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 41.  
 Voet Coleopt. 2. tab. 10. fig. 40.  
 Habitat in America Dr. Schulz.  
 Antennæ mediocres. Corpus nigrum. Elytra obtusa, nigra vitta dorsali velutina, atra. Tibiae posticae compressæ, apice spinosæ.
8. C. thorace spinoso holofericeo ater elytris futura *sericeus*. vittaque viridibus, femoribus rufis.  
 Cerambyx sericeus. Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 37.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dr. Olivier.  
 Antennæ mediocres, nigrae. Caput & thorax, atra, velutina, viridi nitido maculata. Pedes atri femoribus rufis, posticis tantum ad dimidium. Tibiae posticae compressæ.



- futuralis.* 9. C. thorace spinoso ater elytris futura vitta media aureis.  
Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 40.  
Voet. Coleopt. 2. tab. 10. fig. 42. 43.  
Habitat in America meridionali Dr. Hunter.  
Antennae mediocres, nigrae. Corpus atrum quasi velutinum ab domine subtus coerulescente, nitido. Elytra atra futura dorsali vitta media, quae postice coenit, aureis. Pedes nigri femoribus clavatis, postici femoribus tibiisque compressis.
- elegans.* 10. C. thorace spinoso capiteque viridi aeneis nitidis, elytris obscuris, antennis longis pedibusque rufis.  
Cerambyx elegans. Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 35.  
Habitat in Americae meridionalis Insulis Mus. Dom. Olivier.  
Statura omnino C. afer. Antennae corpore duplo longiores, rufae. Caput & thorax viridi aenea, nitida. Elytra obscura. Corpus pubescens, rufo aureum. Pedes rufi posticis compressis.
- latipes.* 11. C. thorace spinoso depresso virescens elytris cupreis, tibiis compresso dilatatis.  
Cerambyx latipes. Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 116.  
Cerambyx latipes thorace spinoso viridi aeneo, antennis medioribus, elytris obscure purpureis, tibiis posticis latissimis compressis. Degeer Inf. 7. 655. 60. tab. 49. fig. 3.  
Fyefl. Arch. 7. 1. 169. 12. tab. 45. fig. 11.  
Habitat ad Cap. Bon. spei.  
Statura C. moschati. Antennae mediocres, virescentes. Elytra cuprea margine parum virescente.

**12.** C. thorace subspinoso cyaneo viridis antennis *longipes*.  
longioribus, femoribus clavatis.

Saperda longipes Mant. Inf. 1. 148. 16.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 3.

Cerambyx fusiformis. Degeer Inf. 7. 657. 62.  
tab. 49. fig. 7.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Antennae corpore duplo longiores, cyaneae, apice  
obscure. Pedes elongati, cyanei femoribus  
clavatis. Thorax & elytra magis viridia.

**13.** C. thorace spinoso ater elytris maculis tribus *interruptus*.  
linearibus albis, antennis brevibus.

Cerambyx interruptus. Oliv. Inf. 67. tab. 17.  
fig. 133.

Habitat — — Mus. Dr. Olivier.

Antennae corpore breviores. Corpus atrum.  
Elytra macula linearī baseos duabusque in me-  
dio transversis, albis. Pedes postici longiores  
tibiis compressis.

**14.** C. thorace spinoso rugoso niger elytris rotun- *Cerdo*.  
datis, antennis longis.

Cerambyx Cerdo. Linn. Syst. nat. 2. 629. 39.

Cerambyx Cerdo. Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 65.

Geoff. Inf. 1. 201. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 5.

Habitat in Europa.

**15.** C. thorace spinoso rugoso niger elytris subspi- *Heros*.  
nosis piceis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 200. 1.

Frish. Inf. 1. 13. tab. 8.

Drury Inf. 1. tab. 49. fig. 1.

Voet. Coleopt. 2. tab. 5. fig. 9.

Ross. Fn. Etr. 1. 141. 358.

Habitat in Europae Quercu.

*spinicornis.* 16. C. thorace subspinoso niger, elytris viridibus apice spinosis.

Cerambyx torridus. Oliv. Inf. 67. tab. 14.  
fig. 95.

Habitat in Sierra Leon Africae Mus. D. Banks.  
Antennae longae, nigrae articulo 3. 4. 5. 6.  
apice spinosis. Thorax niger utrinque tuber-  
culis tribus: lateralibus obtusis. Elytra viri-  
dia, nitida, apice spina acuta armata. Pedes ni-  
gri femoribus clavatis, subferrugineis.

*ater.* 17. C. thorace subspinoso ater antennis mediocribus  
rufo nigroque annulatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 32.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Olivier.  
Praecedentibus paullo minor. Antennae medio-  
cres articulis basi rufis, apice nigris. Corpus  
atrum pectore cinereo, nitido. Pedes nigri fe-  
moribus basi rufescentibus, postici elongati.

*Batus.* 18. C. thorace rugoso subspinoso, elytris apice spi-  
nosi, antennis longis uncinato aculeatis.

Cerambyx Batus. Linn. Syst. nat. 2. 615. 20.  
Mus. Lud. Ulr. 69.

Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 32.

Mus. Petrop. 652. 154.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

C. Heros paullo minor, fuscus.

*ferrugineus.* 19. C. thorace acute spinoso rugoso niger elytris  
ferrugineis, antennis longis.

Cerambyx ferrugineus. Linn. Syst. nat. 2. 626.  
25. Mus. Lud. Ulr. 70.

Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 134.

Cerambyx gigas. Mant. Inf. 1. 132. 20.

Habitat in India orientali Dom. de Schlanbusch.  
Corpus totum nigrum elytris ferrugineis.

**20.** C. thorace spinoso, coleoptris fascia maculisque *alpinus*.  
quatuor atris, antennis longis.

Cerambyx alpinus. Linn. Syst. nat. 2. 628, 35.

Fn. Sv. 654.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 58.

Geoff. Inf. 1. 202. 4.

Scheyhaz. Itin. 1. tab. 1. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 4. fig. d.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 5.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 38.

Habitat in Europae montosis.

**21.** C. thorace spinoso fuscus: linea longitudinali *scalaris*,  
alba, antennis longis.

Habitat in America meridionali Dom. Banks.

Antennae corpore triplo longiores. Caput fuscum orbita oculorum lineaque dorsali albis.

Thorax acute spinosus, fuscus linea dorsali alba.

Elytra fusca puncto medio suturaque dentata albis. Pedes fusi.

**22.** C. thorace spinoso viridi aeneus elytris testaceis,  
antennis brevibus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. D. Hunter.

Antennae breves, ferratae, nigrae. Thorax inaequalis, immaculatus.

**23.** C. thorace bispinofo rugoso ater antennis longioribus ferrugineis.

Habitat Cajennae Dr. Hunter.

Antennae corpore duplo longiores articulis cylindricis, ferrugineis 1. 2. totis, 3. 4. 5. basi nigris. Thorax rugosus utrinque spinis duabus: posteriore majore. Elytra laevia, basi impressa, apice truncata.

**24.** C. thorace spinoso niger elytris sanguineis: manula nigra. Linn. Syst. nat. 2. 631. 50.

Geoff. Inf. 1. 204. 6.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 13.

Schaeff. Icon. tab. 1. fig. 1. tab. 153. fig. 4.

Herbst Arch. 9. tab. 25. fig. 6.

Habitat in Europa australiori.

Thorax variat immaculatus & macula laterali rufa. Elytra apice emarginata.

*Lundii.*

25. C. thorace spinoso sanguineus antennis elytrorum apicibus abdomine pedibusque nigris.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo praecedentis. Antennae breves, nigrae. Caput sanguineum mandibulis nigris. Thorax gibbus, spinosus, sanguineus, immaculatus. Scutellum atrum. Elytra laevia, sanguinea, apice late atra. Pectus sanguineum. Abdomen nigrum tuberculo acuto, rufo inter pedes secundi paris. Pedes atri femoribus subclavatis.

*Desfontai-* 26. E. thorace spinoso sanguineo nigro maculato ater elytris sanguineis basi apiceque atris, antennis longissimis.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino C. Kaehleri. Caput atrum antennis longissimis. Thorax spinosus, sanguineus maculis baseos medioque interdum lineis nigris. Elytra laevia macula baseos parva, apicis magna atris. Corpus atrum immaculatum,

*succinctus.* 27. C. thorace bispinosa rugoso, elytris fascia flava, antennis longioribus compressis. Linn. Syst. nat. 2. 627. 32. Mus. Lud. Ulr. 72.

Cerambyx fusco castaneus. Degeer Inf. 5. 113. 14. tab. 14. fig. 5.

Oliv. Inf. 68. tab. 7. fig. 43.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 17.

Habitat in America, Brasilia.

- 28. C. thorace subspinoso rugoso ferrugineus ely-*striatus.***  
 tris flavo striatis, antennis longis. Oliv. Inf.  
 67. tab. 10. fig. 71.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae cylindricae, corpore duplo longiores,  
 ferrugineae, apice nigrae. Caput ferrugineum  
 punctis tribus verticalibus nigris. Thorax ru-  
 gosus utrinque spinis duabus, fere aequalibus,  
 ferrugineis, nigro punctatus. Scutellum apice  
 nigrum. Elytra laevia, ferruginea striis qua-  
 tuor flavis, quae apicem haud attingunt &  
 quinta suturali, abbreviata. Femora apice  
 nigra.

- 29. C. thorace bispinosa rufo, elytris laevibus ni-*rufipes.***  
 gris, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 3. tab. 13. fig. 89.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Hunter.

Antennae corpore longiores, flavescentes arti-  
 culorum apicibus ferrugineis. Thorax bispino-  
 sus spina posteriore validiore. Elytra glabra,  
 nitida puncto magno baseos impressio. Pedes  
 flavescentes femoribus apice nigris. Abdomen  
 nigrum.

- 30. C. thorace bispinoso rugoso flavus nigro puncta-*dimidiatus.***  
 tus elytris nigris basi flavis, antennis me-  
 diocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 96.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae flavae. Caput flavum punctis tribus  
 verticalibus, flavis. Thorax spinis duabus po-  
 steriore majore flavus, nigro punctatus. Scu-  
 tellum flavum, apice nigrum. Elytra glabra,  
 nitida, atra, basi ad suturam flava. Corpus  
 flavum abdomine dimidiato, atro. Pedes flavi.

- bicolor.* 31. C. thorace bispinoso tuberculatoque ferrugineus  
elytris ultra dimidium abdomineque atris.  
Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 61.  
Voet Coleopt. 2. tab. 8. fig. 24.  
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Antennae mediocres, basi ferrugineae, in medio  
flavae, apice fuscae. Caput ferrugineum gula  
prominente, acuta. Elytra basi ferruginea  
puncto magno impresso, apice atra. Pedes fer-  
ruginei.
- depressus.* 32. C. thorace multispinoso depresso niger cinereo  
variegatus elytris acuminatis, antennis longis.  
Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 30.  
Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 5.  
Voet Coleopt. tab. 13. fig. 55. 56.  
Habitat in Americae Insulis Dom. Banks.  
Caput nigrum maculis impressis, cinereo villoso.  
Thorax utrinque spinis quatuor aut quinque  
brevibus, approximatis villis cinereis varie-  
gatus. Elytra striata, acuminata, nigra macu-  
lis cinereis & in his puncta atra. Pedes atri.
- fasciatus.* 33. C. thorace spinoso cyaneus elytris fascia flava,  
antennis mediocribus ante apicem flavis.  
Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 4.  
Pall. Inf. tab. F. fig. 4.  
Voet. Coleopt. 2. tab. 11. fig. 49.  
Herbst Arch. 5. tab. 25. fig. 3.  
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
Antennae compressae, cyaneae articulis quatuor  
penultimis flavis, ultimo cyaneo. Pedes cya-  
nei, postici compressi.
- barbicornis.* 34. C. thorace spinoso, antennarum quatuor primis  
articulis nigro barbatis, corpore testaceo nigro  
variegato. Linn. Syst. nat. 2. 625. 18.  
Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 48.

- Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 37.  
 Habitat in India orientali.
35. C. thorace spinoso, elytris punctis fasciisque *nebulosus*.  
*nigris*, antennis longioribus. Linn. Syst. nat.  
 2. 627. 29. Fn. Sv. 650.  
 Oliv. Inf. 66. tab. 7. fig. 47.  
 Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 9.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 4. fig. 4.  
 Geoff. Inf. 1. 204. 7.  
 Degeer Inf. 5. 71. 8.  
 Sulz. Inf. tab. 4. fig. c.  
 Habitat in Abietum truncis.
36. C. thorace spinoso fulvo villoso, elytris nigris: *obscurus*.  
*macula postica villosa fulva*, antennis medio-cribus.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.  
 Statura & magnitudo C. nebulosi. Antennae longitudine corporis: articulis baseos ferrugineis. Caput & thorax fulvo villosa, immaculata. Elytra subscabra, nigra macula postica villoso fulva. Pedes nigri tibis flavescentibus.
37. C. thorace spinoso fusco, elytris laevibus: *fasciis griseis nigro punctatis*, antennis longissimis.  
 Habitat in Germania D. de Loewenskiold.  
 Nimis affinis C. nebuloso at major. Antennae corpore triplo longiores: articulis basi cinereis, apice nigris. Caput & thorax fusca, vix maculata. Elytra obscura fascia baseos, media apicisque cinereis, nigro punctatis. Sutura punctata. Corpus cinereum. Femora nigro punctata. Tibiae apice nigrae.
38. C. thorace spinoso griseus elytris lineis elevatis nigro punctatis apice fuscis, antennis longissimis.

Habitat in Germania Dom. de Loewenfkiold.

Statura & summa affinitas praecedentis. Antennae corpore duplo longiores, nigrae articulis basi albidis. Caput & thorax grisea thorace unispinoso. Elytra punctata lineis elevatis quatuor nigro punctatis, quae tamen apicem haud attingunt, basi grisea, apice fusca. Pedes grisei.

*fascicula-* 39. C. thorace spinoso, elytris integris: punctis tribus hispidis, antennis medicoribus hirtis. Panz.

Naturf. 24. 26. 34. tab. I. fig. 44.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Caput & thorax fusca. Elytra basi pallidiora, apice omnino integra. Pedes grisei.

*hispidus.* 40. C. thorace spinoso, elytris basi albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. Linn.

Syst. nat. 2. 627. 30. Fn, Sv. 651.

Geoff. Inf. 1. 206. 9.

Oliv. Inf. 67. tab. II. fig. 77.

Schaeff. Icon. tab. 176. fig. 5.

Frish. Inf. 13. tab. 16.

Degeer Inf. 5. 71. 9. tab. 3. fig. 17.

Habitat in Europa boreali.

*pilosus.* 41. C. thorace bispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis.

Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 60.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Praecedente minor. Elytra punctis tribus elevatis hispidis grisea basi parum pallidiora, apice unidentata.

*balteatus.* 42. C. thorace subspinoso brunneus elytris fascia fusca.

Cerambyx balteatus. Linn. Syst. nat. 2. 627. 31.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 124.

Habitat in Lusitania.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae breves. Thorax spina obtusa sive potius angulo prominente. Elytra fascia lata, fusca.

43. C. thorace inermi rugosissimo niger antennis *rugieollis*. mediocribus pedibusque piceis.

Habitat Tranquebariae Dom. Hybner.

Antennae compressae, piceae. Elytra nigra, apice obtusa & fere truncata. Pedes picei.

44. C. thorace mutico rufus elytris testaceis: macula nigra, antennis brevibus.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Medius. Antennae villosae, rufae, corpore breviores. Caput & thorax villosa, rufa, immaculata. Thorax inaequalis, tuberculatus, at haud spinosus. Elytra punctata, testacea macula magna ante medium nigro violacea. Pedes testacei.

45. C. thorace subspinoso rufus elytris testaceis *splendidus*. basi atro cyaneis, antennis brevibus.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura & magnitudo omnino C. 2 maculati. Antennae breves, basi rufae, medio testaceae, apice fuscae. Caput punctatum, rufum, immaculatum. Thorax rotundatus, punctatus, rufus utrinque spina brevi, obtusa. Elytra striis tribus elevatis laevibus: testacea basi late atro cyanea. Corpus villosum, rufum ab domine subtus dente prominulo canali thoracis correspondente. Pedes rufi.

46. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco *longicornis* griseoque vario, antennis longissimis.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Antennae corpore triplo longiores, nigrae articulis basi cinerascentibus. Caput cinereum basi lineaque laterali nigris. Thorax omnino iner-

mis dorso plano & fere impresso, fusco cinereoque varius. Elytra punctato striata. Corpus cinereum.

*marginalis* 47. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro,

Habitat ad Cap Bon. spei Mus. Dom. Banks. Antennae mediocres, piceae. Caput fuscum. Thorax ovatus, fuscus margine antico & postico nigris. Elytra laevia, subtestacea sutura marginaque tenuissime nigris. Pedes nigricantes.

*brevicornis* 48. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis brevibus nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 22.

Habitat in Sierra Leon Africæ Mus. D. Banks. Caput viride antennis brevibus, compressis, nigris. Thorax punctatus, viridis, nitens. Elytra laevia, viridia, obscura. Pedes nigri femoribus clavatis, anticis quatuor rufis, posticis viridibus.

*invexus* 49. C. thorace inermi rugoso, elytris acuminatis nigris lanuginoso canescensibus, antennis longissimis. Linn. Syst. nat. 2. 631. 53.

Habitat in America.

Antennæ corpore sesquilongiores. Thorax valde rugosus.

*holosericus*. 50. C. thorace inermi rugoso griseus elytris unidentatis holosericeis fusco cinereoque micantibus, antennis medicoribus.

Oliv. Inf. 62. tab. 17. fig. 127.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Caput griseum. Thorax inermis, rugosissimus, obscurus. Elytra unispinosa, holosericea, fusco cinereoque micantia, nitida. Corpus subtus micans.

51. *C. thorace inermi subrugoso cinereus immaculatus antennis longissimis.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Statura elongata praecedentium. Antennae corpore duplo longiores, cinerascentes. Caput magnum, prominens, cinereum. Elytra apice obtusa & fere emarginata. Corpus cinereum.

52. *C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus antennis longissimis.* *longicollis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 11. fig. 73.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Caput fuscum antennis corpore duplo longioribus. Thorax elongatus, cylindricus, antice parum angustatus, nigricans. Scutellum ferrugineum. Elytra nigra, ferrugineo irrorata. Pedes fusci tibiis quatuor anticis apice unidentatis. Digi antici subtus villosi.

#### 84. LAMIA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* cornea, bifida.

*Labium* corneum, bifidum.

*Antennae* setaceae.

1. *L. thorace acute spinoso rugoso, elytris cinereis: gigas, macula marginali nigra, basi bituberculatis scabris, antennis longis.*

Oliv. Inf. 67. tab. 23. fig. 91.

Lamiae corpus cylindricum, rotundatum, glabrum, immarginatum, tardum, capite magno, obtuso, declivi, inter antennas canaliculato, oculis magnis, rotundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis, approximatis, inter oculos insertis, thorace cylindrico, spinoso, inaequali, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus validis, cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Guinea Mus. Dom. Banks.

Magna. Antennae corpore duplo longiores, pale  
lide testaceae. Caput magnum, obscurum man-  
dibularum margine laterali excavato. Thorax  
rotundatus, rugosus spina utrinque valida,  
erecta, acuta. Elytra grisea macula magna la-  
terali nigra, basi punctis elevatis scabra tuber-  
culisque duobus magnis oblongis, obtusis, apice  
acuminata. Corpus fuscum. Tibiae secundi pa-  
ris unidentatae.

*Tribulus.* 2. L. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spi-  
nosis, antennis longioribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 100.

Habitat ad fluvium Gaboon Africæ Dr. So-  
lander.

Antennae corpore longiores, fuscae articulis  
basi cinereis. Caput fusco cinereoque varium.  
Thorax rotundatus spinis quatuor erectis: late-  
ralibus acutioribus. Puncta duo cinerea ad basin  
spinarum intermedianarum. Scutellum parvum,  
rotundatum denticulis duobus, brevibus, erectis.  
Elytra fusco cinereoque variegata, basi versus  
marginem exteriorem gibbere bispinoso armata,  
versus futuram spinae duae, validae, erectae,  
acutae. In medio elytri spina sensim elevata,  
recumbens, acuta. Apex acuminatus denticulo  
brevi, acuto. Pedes fusco nigroque variegati.  
Tibiae intermediae apice tubculo parvo no-  
tantur.

*fronticornis* 3. L. thorace spinoso, frontis cornu porrecto apice  
emarginato recurvo, antennis longis.

Cerambyx 2 [punctatus]. Drury Inf. 2. tab. 31.  
fig. 2.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae longae, fuscae articulis apice nigris. Caput fuscum mandibulis atris, nitidis. Frontis cornu porrectum, crassum, fuscum, supra planum, hirtum, apice late emarginatum apicibus recurvis, atris. Thorax spinosus, subrugosus, fuscus, supra immaculatus, subtus vero utrinque linea lata, alba. Elytra fusca, glabra basi punctis aliquot elevatis scabra, ante medium maculae duae ocellares, atrae, exteriori minori & pone hanc macula major, albida. Abdomen & pedes fusca.

4. L. thorace elytrisque spinosis, femoribus anticis *pedicornis*.  
cornutis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 119.

Habitat in nova Hollandia Mus. D. Banks.

Caput griseum antennis villosis, mediocribus. Thorax rotundatus, griseus spinis sex brevibus, dorsalibus, erectis. Scutellum inerme. Elytra grisea macula marginali lunata fasciaque media cinerea. Spinae plurimae, breves, erectae, atrae ad basin. Pedes grisei, femoribus anticis cornu elongato, arcuato, acuto.

5. L. thorace quinquespinoso, elytris fasciculato *hystrix*. pilosis, antennis mediocribus ferratis.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 110.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae pilosae, apice valde ferratae, testaceae articulis apice fuscis. Caput pilosum, griseum. Thorax spinis quinque erectis, validis, atris: intermedia paullo minori. Praeterea tuberculæ duo elevata, atra ante spinam intermedium. Elytra fasciculato pilosa, carneo fuscoque variegata. Corpus parvum, cinereum.

- erifla.* 6. L. thorace acute spinoso grisea elytris basi tuberculo compresso tridentato.  
Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 101.  
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
Antennae corpore paullo longiores, cinereae articulis apice nigris. Thorax utrinque spina acuta armatus & sub spina punctum fulvum. Elytra antice grisea tuberculo magno, compresso, tridentato, postice pallida striga parva, obliqua, nigra. Femora clavata, nigra: clava grisea. Tibiae griseae, apice nigrae.
- ambulator.* 7. L. thorace antice utrinque bispinoso, corpore nebuloso.  
Petiv. Gazoph. tab. 37. fig. 6.  
Habitat in Insulis Luzonum Mus. Britann.  
Antennae teste Petiverio mediocres. Thorax castaneo cinereoque nebulosus, antice spinis duabus brevibus una supra alteram armatus. Elytra cinereo castaneoque nebulosa.
- textor.* 8. L. thorace spinoso, elytris convexis atris, antennis mediocribus.  
Cerambyx textor. Linn. Syst. nat. 2. 629. 41.  
Fn. Sv. 656.  
Geoff. Inf. 1. 201. 3.  
Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 39.  
Degeer Inf. 5. 64. 3.  
Schaeff. Icon. tab. 10. fig. 1.  
Habitat in truncis arborum Europae.
- vaginator.* 9. L. thorace spinoso rugoso nigra elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus.  
Habitat in India orientali Dom. Lund.  
Antennae compressae, ferrugineae. Thorax rugosus, acute spinosus, niger. Scutellum cinereo villosum. Elytra laevia, ferruginea, basi gibba, apice emarginata. Subtus cinereo villosa.

10. L. thorace spinoso nigra elytris vitta semicirculari punctoque marginali cinereis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 68.

Habitat — — Mus. Dom. Olivier.

Corpus magnum, obscure nigrum. Antennae corpore duplo longiores. Thorax acute spinosus utrinque linea obliqua, obsolete ferruginea. Elytra vitta lata cinerea, quae ad basin incipit, in medio ad suturam excurrit & apicem tegit. Punctum parvum in medio marginis exterioris. Pedes nigricantes.

11. L. thorace spinoso nigra antice fasciis postice *pulchra*. punctis viridibus, elytris basi mucronatis.

*Cerambyx pulchra*. Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 6.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 6.

Habitat in Africa Dom. Drury.

Pulcherrima, nitida. Antennae corpore paullo longiores, nigrae. Caput nigrum striis tribus viridibus, quarum laterales oculos ambient. Thorax obtuse spinosus strigis tribus viridibus, quarum intermedia curvata, & in curvatura striga parva, abbreviata ejusdem coloris. Elytra punctata basi denticulis duobus elevatis, truncatis mucronata, antice fasciis duabus, postice punctis numerosis sparsis viridi nitentibus. Subtus nigro viridiique variegata.

12. L. thorace spinoso viridi fasciato, elytris viridi *regalis*. irroratis maculisque tribus fulvis,

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 24.

Brown. Illustr. tab. 50. fig. 1.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae corpore longiores, nigrae. Caput atrum, viridi lineatum maculaque suboculari fulva. Thorax ater fasciis tribus impressis, viridibus. Elytra substriata, nigra atomis numerosissimis viridibus & praeterea maculis tribus fere marginalibus, fulvis. Subtus viridis abdome utrinque linea punctorum fulvorum.

*undata.* 13. L. thorace mutico cinerea thorace fascia elytris duabus undatis atris.

Oliv. Inf. 671. tab. 4. fig. 26.

Habitat — — —

Magnitudo L, regalis. Antennae corpore longiores, nigrae. Thorax muticus, griseus fascia media, atra. Elytra grisea fasciis duabus undatis, atris.

*irrorata.* 14. L. thorace spinoso fusco ferrugineo que vario, elytris nigris ferrugineo irroratis, antennis mediocribus.

Voet. Coleopt. 2. tab. 7. fig. 18.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Lund.

Corpus medium. Antennae mediocres, cincrascentes. Caput fusco ferrugineo que varium mandibulis atris, nitidis. Thorax spinosus, fuscus, ferrugineo varius. Scutellum ferrugineum. Elytra fusca, ferrugineo irrorata, apice acuminata. Corpus & pedes variegata.

*nigricornis.* 15. L. thorace mutico grisea elytris dorso planis, antennis brevibus nigris.

Habitat in Coromandel Mus. Dom. Banks.

Corps griseum, supra testaceo mixtum. Elytra dorso plana punctis aliquot marginalibus baseos atris, impressis, apice obtusa & fere truncata.

*aedilis.* 16. L. thorace spinoso: punctis quatuor luteis, elytris obtusis nebulosis, antennis longis.

- Cerambyaxedilis. Mant. Inf. 1. 130. 1. Linn.  
 Syst. nat. 2. 628. 37. Fn. Sv. 653.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 59.  
 Degeer Inf. 5. 66. 5. tab. 4. fig. 1. 2.  
 Frish. Inf. 13. tab. 12.  
 Sulz. Inf. tab. 4. fig. 27.  
 Schaeff. Icon. tab. 14. fig. 7.  
 Habitat in Truncis arborum Europae borealis.
17. L. thorace spinoso tuberculatoque cinerea ely- *atomaria*,  
 tris fusco variis punctis elevatis nigris scabris,  
 antennis longis.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Statura omnino L. aedilis at minor. Antennae  
 corpore longiores, cinereo nigroque variae.  
 Thorax spinosus dorsoque quadrituberculato.  
 Elytra cinereo fuscoque varia lineis quatuor  
 elevatis postice coeuntibus, quae tamen apicem  
 haud attingunt punctisque numerosis, elevatis,  
 atris irrorata. Corpus cinereum atomis nigris,  
 numerosis.
18. L. thorace spinoso tuberculatoque, corpore ni- *varia*,  
 gro cinereoque vario, femoribus clavatis, an-  
 tennis mediocribus.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 16.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 142. 360.  
 Habitat in Europa australiori Mus. D. Zschuck.  
 Antennae cinereo nigroque annulatae. Caput  
 fuscum. Thorax spinosus dorsoque trituber-  
 culato. Elytra rotundata. Corpus subtus ni-  
 grum. Femora omnia clavata, nigricantia.  
 Tibiae atrae cinereo annulatae. Tarsi cinerei.
19. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris poro- *araneiformis*,  
 antennis longis: articulo quinto uniden-  
 tato. Linn. Syst. nat. 2. 625. 22.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 34.

Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 4

Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 24.

Voet. Coleopt. 2. tab. 9. fig. 33. 34.

Habitat in America meridionali.

*punctata.* 20. L. thorace spinoso fusca albo punctata.

Oliv. Inf. 67. tab. 6. fig. 42.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Statura & magnitudo omnino L. aedilis. Antennae mediocres, nigrae. Caput nigrum punctis duobus supra labium duobusque verticalibus, albis. Thorax spinosus tuberculatus que punctis duobus majoribus utrinque ad marginem quatuorque parvis dorsalibus albis. Elytra nigra punctis albis sparsis.

*nodoso.* 21. L. thorace spinoso, elytris cinereis nigro mactatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 103.

Habitat in Marylandia Mus. Britann.

Antennae corpore quadruplo longiores: articulo tertio gibbere rotundato, obtuso, prominente. Elytra plana, rotundata, cinerea maculis aliquot oblongis, nigris, basi punctata.

*cancriformis.* 22. L. thorace multidentato: dorso plano, elytris tibiisque anticis unidentatis.

Cerambyx pustulatus. Drury Inf. 2. tab. 35. fig. 1.

Habitat in Jamaica.

Antennae longiores articulo primo apice unidentato. Thorax cinereus dorso valde explanato, margine dentibus quinque vel sex minoribus, in duabus seriebus digestis. Elytra cinerea, punctis elevatis fuscis irrorata, apice unidentata. Femora clavata tibiisque anticis unidentatis.

23. L. thorace spinoso tuberculatoque, elytris pun-*tuberculata*.

Estatim spinosisque, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 114.

Habitat in Jainaica Mus. Dr. Hunter.

Corpus griseum elytris fascia angulata alba.

Antennae fuscae articulis apice cinereis. Mandibulae atrae. Thorax tuberculis plurimis, elevatis, obtusis. Elytra punctata spinisque plurimis, elevatis, acutis, atris. Pedes nigri tibiis annulo albo.

24. L. thorace acute dentato: dorso bicarinato, *hebraea*.

elytris cinereis fusco striatis maculatisque,

Cerambyx hebraeus. Mant. Inf. 1. 131. 7.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 106.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.

Antennae breves, nigrae. Thorax cinereus utrinque spina porrecta, valida, acuta, basi anteriori unidentata, dorso lineis duabus elevatis, atris, glabris. Elytra rotundata, cinerea sutura striisque tribus fuscis & inter has strias maculae plurimae, difformes ejusdem coloris. Pedes cinerei.

25. L. thorace acute spinoso cinerea elytris spino-*horrida*.

fis, antennis longis.

Cerambyx horridus. Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 29.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Magnitudo & statura L. Scorpio. Antennae longiores, cinerascentes articulis apice nigris. Thorax cinerascens spina valida, subarcuata, acuta. Elytra spinosa, grisea.

26. L. thorace quadrispinoso, elytris tuberculato *Scorpio*. granulatis, tibiis anticis apice dilatatis.

Cerambyx Scorpio Mant. Inf. 1. 131. 8.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 19.

Habitat in America meridionali Dr. Hunter.



Antennae breves, cinereae articulis apice nigris.  
Mandibulae atrae. Thorax cinereus spinis  
quatuor dorsalibus, elevatis, apice atris. Elytra  
cinerea tuberculis variis, elevatis, obtusis, granis  
glabris, atris, nitidis adspersis. Pedes breves,  
cinerei tibiis quatuor anticis apice dilatatis.

- glaуca.* 27. L. thorace quinque spinoso glauca: elytris  
muricatis latere fasciaque nigris, antennis  
longis.

Cerambyx glaucus. Mant. Inf. 1. 131. 9. Linn.  
Syst. nat. 2. 626. 28.

Degeer Inf. 5. 7. 13. tab. 14. fig. 4.

Habitat in America.

Elytra apice unidentata.

- bidentata.* 28. L. thorace subspinoso, elytris bidentatis scabris  
cinereo fuscis.

Cerambyx bidentatus. Mant. Inf. 1. 131. 10.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig 62.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Antennae longae, griseae articulis apice fuscis.

Thorax inaequalis utrinque spina obtusa. Ely-

tra bidentata, punctis elevatis, acutis scabra.

Femora clavata. Color cinereo fuscoque ne-  
bulosus.

- scabra.* 29. L. thorace spinoso trituberculatoque, elytris  
basi scabris apice bidentatis, antennis lon-  
gissimis.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 128.

Habitat — — Mus. Britann.

Antennae longissimae, basi testaceae, apice cine-  
reae. Mandibulae atrae. Thorax cinereus utrin-  
que spina parva acuta & praeterea tuberculis  
tribus dorsalibus, elevatis. Elytra testacea basi  
punctis elevatis, glabris. Corpus cinereum.  
Femora clavata.

30. L. thorace tuberculato, elytris punctatis cinereis *praemorsa*.  
apice bidentatis fuscis, antennis longis.  
Habitat in Insula Guadeloupe de Badier.  
Parva in hac familia. Antennae corpore duplo  
longiores, cinereae articulis apice fuscis: primo  
elongato. Caput cinereum. Thorax punctatus,  
cinerous tuberculis dorsalibus tribus maculis-  
que utrinque duabus baseos nigris. Elytra  
punctata, cinerea punctisque aliquot elevatis,  
nigris scabra, apice bidentata: dente exteriori  
majori, fusco. Pedes cinerei femoribus cla-  
vatis.
31. L. thorace spinoso cinereo villosa elytris biden- *spinifera*.  
tatis testaceis, antennis longis.  
Habitat in America meridionali D. Pflug.  
Media. Antennae obscure cinerascentes, corpore  
longiores. Caput & thorax villoso cinerea tho-  
race acute spinoso. Scutellum subflavescens.  
Elytra laevia, testacea, apice acute bidentata.  
Corpus villoso cinereum.
32. L. thorace mutico grisea elytris basi tuberculis *grifator*.  
duobus apice spinosis, antennis brevibus vil-  
losis.  
Habitat Tranquebariae Dom. de Schlanbusch.  
Elytra grisea basi tuberculis duobus elevatis,  
compressis, apice pallidiora spinis aliquot eleva-  
tis, brevibus futuraque elevata, ferrata. Abdo-  
men & pedes grisea.
33. L. thorace spinoso tuberculatoque grisea ely- *aedificator*.  
tris basi bituberculatis, antennis mediocribus.  
Habitat in India orientali Mus. D. Lund.  
Media. Antennae pilosae articulo primo elon-  
gato, crassiori. Caput canaliculatum, cinereum  
labio rotundato, flavescente. Thorax utrinque  
spinosus tuberculisque duobus. Elytra apice

truncata, pubescentia, grisea basi angulo pa-  
rum elevato, compresso, tuberculoque medio  
parvo, obtuso. Pedes grisei.

*amputator.* 34. L. thorace spinoso, elytris cinereis nigro irro-  
tis maculisque numerosis testaceis.

Habitat in Americae Insulis ramos etiam cras-  
fiores abscindere dicitur. Mus. Banks.

Media. Antennae longae, cinereae. Thorax  
ruga media elevata cinereus. Elytra cinerea  
punctis parvis, subelevatis, atris irrorata inacu-  
lisque numerosis, testaceis adspersa. Corpus  
cinereum.

*sternutator.* 35. L. thorace spinoso, elytris basi porosis, antennis  
mediocribus.

Habitat in Insula Barbados Dom. Drury.

Antennae nigricantes articulo ultimo acuto.  
Thorax inaequalis. Elytra obtusa, nigra basi  
punctis majoribus, inaequalibus adspersa. Sub-  
tus tomento flavo tecta.

*spinner.* 36. L. thorace spinoso elytrisque basi daedaleis  
apice griseis, antennis mediocribus.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Affinis certe praecedenti. Antennae nigrae, apice  
cinereae. Caput atrum. Thorax utrinque acute  
spinofus: dorso sinibus daedaleis exarato.  
Elytra basi nigra punctis majoribus daedaleis  
exarata, apice tomentosa, grisea. Corpus griseo  
nigrum,

*guttutator.* 37. L. thorace spinoso, elytris testaceis albo irro-  
tis: basi punctis elevatis glabris.

Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 92.

Habitat in Africa Mus. Britann.

Caput testaceum linea longitudinali nigra, gla-  
bra. Thorax testaceus ruga media transversaliter  
elevata. Elytra obtusa, testacea atomis flavican-

tibus irrorata basi punctis aliquot elevatis, glabris, rubris.

38. L. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineo que variis: macula marginali cinerea, antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 15.

Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 4.

Habitat in Germania Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae articulis basi cinereis. Caput & thorax ferruginea, nigro lineata. Elytra punctata, ferrugineo fusco que varia macula magna cinerea in medio marginis exterioris. Pedes fuscii.

39. L. thorace spinoso obscura elytris fascia postica repandator. repanda albida: basi punctis elevatis atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Statura & magnitudo praecedentium. Antennae corpore longiores, fuscae. Caput & thorax obscura, immaculata. Elytra obscura basi punctis plurimis glabris, elevatis, atris anguloque parum elevato. In medio fascia postice repanda, albida. Abdomen albidum.

40. L. thorace spinoso lineato, elytris fuscis: linea variolator. semicirculari alba.

Habitat in Indiis.

Antennae corpore longiores. Thorax fuscus linea dorsali lateralique albis. Elytra obtusa, fusca linea alba, quae ab angulo humerali incipit, in medio cum sutura coit & versus apicem ad marginem exteriorem excurrit.

41. L. thorace spinoso, elytris atris ferrugineo maculatis, scutello luteo, antennis longissimis. sutor.

Cerambyx sutor. Linn. Syst. nat. 2. 628. 38.

Fn. Sv. 655.

Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 20.



Schaeff. Icon. tab. 65. fig. 1.

Degeer Inf. 5. 65. 4.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 4.

Habitat iu Europae sylvis.

- sartor.* 42. L. thorace spinoso niger scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis.

Habitat Dresdae in Aesculo Hippocastano Mus. Dom. Zschuck.

Affinis praecedenti at major. Frons inter antennas valde canaliculata.

- dentator.* 43. L. thórace spinoso fusco cinereoque varia.

Habitat in Carolina.

Statura & maguitudo L. Sutor. Antennae corpore triplo longiores, ferrugineae, basi nigrae. Corpus totum fusco cinereoque varium. Tibiae intermediae compressiae versus apicem dente parvo dorsali.

- reticulator.* 44. L. thorace spinoso nigra thorace elytrisque fulvis, thorace nigro lineato, elytris reticulatis. Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 85.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Caput atrum, immaculatum. Antennae mediocres, ferrugineae primo articulo toto nigro, secundo basi apiceque clavato, villoso, nigro. Thorax supra fulvus lineis duabus dorsalibus, nigris. Elytra fulva, nigro reticulata, apice emarginata. Corpus nigrum.

- scalator.* 45. L. thorace acute spinoso atra elytris strigis numerosis interruptis albis, antennis mediocribus.

Habitat in Louisiana Mus. Dom. Bosc.

Magnitudo & statura L. reticulator. Antennae mediocres, atrae. Caput atrum fascia supra clypeum orbitaque oculorum albis. Thorax ater lateribus lineisque duabus latis albis.

Elytra atra, nitida margine suturaque albis, e quibus exeunt ramos plurimos strigas constituentes, interruptas. Corpus cinereo villosum. Pedes nigri.

46. L. thorace subspinoso obscure cinerea fusco maculata elytris apice rufis.

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 99.

Habitat Cajennae Dr. Hunter.

Antennae mediocres, fuscae. Caput cinereum fronte rufa. Thorax obscure cinereus punctis plurimis fuscis, margine antico posticoque rufis. Elytra laevia, obscura maculis punctisque plurimis fuscis, apice obtusa, rufa. Abdomen rufescens.

47. L. thorace spinoso, elytris cinereo fusco glaucoque nebulosis, antennis longissimis rufis.

Oliv. Inf. 61. tab. 15. fig. 109.

Habitat in Carolina Mus. Britann.

Antennae rubrae articulo primo fusco. Thorax antice tuberculis duobus minutissimis. Elytra punctata, cinerea maculis fuscis glaucisque inordinatis, sparsis. Tibiae rufae, secundi paris gibbere parvo notatae.

48. L. thorace spinoso, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis.

Cerambyx incanus. Forst. nov. sp. Cent. I. 38.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 104.

Petiv. Gazoph. tab. 24. fig. 6.

Habitat ad littora sinus Campechiani Mus. Britann.

Antennae mediocres, cinereo fuscoque variegatae. Caput cinereo pulverulentum lineis duabus glabris, atris. Thorax cinereus lineis tribus longitudinalibus, atris. Elytra cinerea vittis duabus flavis, marginibus elevatis atris.

Maculae aliquot sparsae, atrae ad basin elytrorum.

*oculator.* 49. L. thorace spinoso nigra elytris maculis quatuor flavis subocellaribus, antennis longis.

*Cerambyx oculatus.* Degeer Inf. 7. 654. tab. 49. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 11.

Voet Coleopt. 2. tab. 7. fig. 21.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Thorax antice posticeque strigis duabus tenuissimis, flavis, impressis. Elytra substriata maculis quatuor flavis, annulo albo cinctis, quarum prima baseos rotundata, major, secunda ad marginem exteriorem, tertia in medio, quarta versus apicem orbicularis.

*capensis.* 50. L. thorace bispinoso nigra elytris fasciis quatuor rufis, antennis mediocribus.

*Cerambyx capensis.* Linn. Syst. nat. 2. 628. 32.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 51.

Drury Inf. 1. tab. 39. fig. 3.

Petiv. Gazoph. tab. 3. fig. 8.

Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 25.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

*hottentotta.* 51. L. thorace spinoso rufo, elytris nigris: fascia maculisque duabus marginalibus sanguineis.  
*Cerambyx hottentotta.* Brown. Illustr. 118. tab. 49. fig. 1.

Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 27.

Voet. Scarab. 2. tab. 8. fig. 26.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Yeats.

Antennae mediocres. Thorax scaber, obscure rufus. Elytra aeneo tintata. Pedes nigri.

*ferrugator.* 52. L. thorace spinoso obscure ferruginea elytris obscure virescentibus: striga interrupta sanguinea, antennis longis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Spengler.  
 Antennae nigrae. Thorax subrugosus utrinque denticulo parvo. Elytra punctata, obscura, viridi nitidula, ante medium striga interrupta, sanguinea. Margo exterior apice sanguineus. Corpus ferrugineum. Pedes ferruginei tarsis nigris tibiisque intermediis extus subdentatis.

53. L. thorace spinoso, elytris flavis nigro fasciatis *humeralis*.  
 antice mucronatis.

Habitat — — — Dom. Drury.

Antennae corpore longiores, nigrae. Caput flavum lineis quatuor nigris. Thorax flavus fasciis tribus nigris, basi utrinque emarginatus. Elytra flava fasciis variis, passim confluentibus, nigris, basi mucronata. Sternum porrectum, apice bidentatum.

54. L. thorace bispinoso nigra elytris fasciis quinque rubris, antennis mediocribus. *5fasciata*.

Habitat in Guinea Dr. Isert.

Statura omnino praecedentium. Antennae nigrae. Thorax scaber, niger spinis utrinque duabus, brevibus. Elytra basi scabra, nigra fasciis tribus tenuioribus, rufis. Corpus nigrum.

55. L. thorace subspinoso atra elytris fasciis tribus *trifasciata*, flavis, antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 121.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 10.

Habitat ad Sierra Leon Africæ Dr. Solander.

Thorax ater tuberculo tantum obsoleto utrinque notatus. Elytra abdomine subbreviora, atra fasciis tribus latis flavis. Pedes atri tibiis intermediis apice tuberculatis.

56. L. thorace spinoso postice sinuato, elytris flavis: *bifasciata*, fasciis duabus maculaque rhombea cyaneis.

Habitat in Jamaica Mus. Britann.

Antennae corpore paullo longiores, atrae. Caput flavum orbita oculorum cyanea. Thorax flavus postice fascia cyanea sinibusque duobus erosus. Scutellum basi apiceque cyaneum. Pedes lutei femoribus cyaneis.

*nobilis.*

57. L. thorace spinoso atro: margine flavo, elytris atris: fasciis tribus flavis punctisque duobus albis.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Antennae mediocres, atrae. Caput atrum macula frontali duabusque pone oculos flavis. Thorax holosericeus, ater margine flavo, basi albo. Spina versus basin atra. Elytra holosericea, atra fascia baseos interrupta, media sinuata, apicis abbreviata. Puncta duo alba inter fasciam 2. 3.

*aethiops.*

58. L. thorace spinoso atra elytris fasciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 1. fig. 2.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax subrugosus. Elytra holosericea, atra fasciis duabus flavis, quae tamen futuram haud attingunt punctoque parvo apicis luteis. Pedes compressi, atri.

Punctum apicis interdum deest.

- variegator.* 59. L. thorace spinoso cinerea thorace elytrisque fusco variis, antennis longis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 112.

Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.

Antennae fuscae. Caput, thorax, elytra fusca, cinnereo variegata coloribus mixtis, indistinctis ore nigro.

*curculio-*  
*noides.*

60. L. thorace mutico fusca thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris.

*Cerambyx curculionoides.* Linn. Syst. nat. 2.

63. 4. 48.

Oliv. Inf. 67, tab. 10, fig. 69.

Geoff. Inf. 1. 210. 5.

Schaeff. Icon. tab. 39, fig. 1.

Habitat in Europa australiori.

61. L. thorace spinoso rugoso nigra ferrugineo irro- *lusca.*  
rata elytris basi macula ocellari atra, anten-  
nis longissimis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Antennae atrae. Caput nigrum punctis aliquot ferrugineis. Thorax subrugosus, niger utrinque linea punctorum ferrugineorum. Elytra obtusa & fere truncata, ferrugineo irrorata maculaque subocellari in ipsa basi. Pedes nigri tibiis intermediis dorso unidentatis.

62. L. thorace spinoso obscura elytris punctis duo- *notata.*  
bus approximatis atris.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae mediocres. Corpus supra fuscum, subtus nigrum. Thorax striga punctorum impressorum. Elytra punctata, fusca, pone medium ad futuram punctis duobus atris, approximatis.

63. L. thorace acute spinoso nigra elytris scabris *lugubris.*  
ferrugineo obsolete punctatis, antennis lon-  
gissimis.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch.

Statura omnino L. funestae at triplo major.  
Antennae corpore duplo longiores, nigrae.  
Corpus scabrum, nigrum elytris punctis parvis,  
obsolete, ferrugineis. Pedes nigri tibiis qua-  
tuor anticis dente parvo apice elevato, obtuso.

64. L. thorace spinoso fusca elytris scabris: macu- *tristis.*  
lis duabus atris, antennis medioeribus.



- Cerambyx tristis.* Linn. Syst. nat. 2. 629. 42.  
Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 62.  
Herbst Arch. tab. 25. fig. 7,  
Habitat in Ligno cupressi Galliae australioris.  
Variat sexu antennis longitudine corporis &  
duplo longioribus.
- funebris.* 65. L. thorace spinoso fusca elytris laevibus : macu-  
lis duabus atris, antennis brevibus,  
Oliv. Inf. 67. tab. 9. fig. 63.  
Panz. Naturf. 24. 26, 36. tab. 1. fig. 36.  
Ross. Fn. Etr. 1. 145. 366.  
Habitat in Galliae Sambuco Dr. Brousonet.  
Duplo minor praecedente. Elytra haud scabra.
- punctator.* 66. L. thorace spinoso atra elytris albo punctatis,  
antennis longis.  
*Cerambyx farinosus.* Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4.  
*Cerambyx punctator.* Oliv. Inf. 67. tab. 7.  
fig. 49.  
*Cerambyx Chinensis.* Forst. nov. spec. Cent.  
1. 39.  
Habitat in China Dr. Fothergill.  
Antennae nigrae articulis basi pallidis. Elytra  
basi scabra. Pedes atri.
- crispa.* 67. L. thorace spinoso, elytris lineis tribus eleva-  
tis ferrulatis, corpore cinereo, antennis me-  
diocribus.  
Oliv. Inf. 67. tab. 3. fig. 18.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.  
Thorax inaequalis, acute spinosus. Elytra  
lineis tribus acute ferrulatis.
- fasciculata.* 68. L. thorace spinoso hirtoque, elytris punctis pi-  
loso cristatis.  
*Lamia fasciculata.* Oliv. Inf. 67. tab. 17.  
fig. 131.  
Habitat Cajennae Mus. Dr. Olivier.

Media. Antennae mediocres, nigrae articulo primo villoso, flavo. Thorax acute spinosus pilis densis pallentibus tectus. Elytra fusca puncto uno altero albidio, linea suturali elevata, atra, praeterea cristae tres e pilis elevatis fuscis ad basin, quarum exterior brevissima. Versus apicem duo paria cristarum approximatarum. Pedes variegati.

69. L. thorace spinoso cinerea elytris subfasciatis, *rotator.*  
antennis mediocribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 126.

Habitat in India Mus. Dom. Banks.

Antennarum articuli cinerei, apice fusi. Caput sulcatum, cinereum palpis nigris. Elytra cinerea, fusco subfasciata.

70. L. thorace spinoso nigra elytris bicarinatis *Glycyrrhi-*  
albo lineatis, pedibus ferrugineis, antennis  
brevibus. *zae.*

Cerambyx ovatus. Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 9.

Cerambyx Glycyrrhizae. Oliv. Inf. 67. tab. 16.  
fig. 115.

Pallas Iter. 2. 723. 60.

Habitat in Sibiria Mus. Dom. Banks.

Caput atrum litura baseos albida. Antennae breves, nigrae articulo primo ferrugineo, apice nigro. Thorax lineis tribus albis. Sutura alba. Pedes ferruginei, apice albi.

71. L. thorace spinoso nigra coleoptris cruce me- *cruciata,*  
dia alba.

Cerambyx cruciatus. Pall. Icon. tab. F. fig. 5.

Habitat in Russia australiori Dom. Boeber.

Antennae breves, nigrae. Caput nigrum. Thorax niger linea dorsali alba. Coleoptra nigra sutura lata fasciaque media, abbreviata albis. Pedes nigri.

- fuliginator.* 72. L. thorace subspinoso nigra elytris cinerascentibus, antennis brevibus.  
 Cerambyx fuliginator. Linn. Syst. nat. 2. 539. 43.  
 Geoff. Inf. 1. 205. 8.  
 Olivier Inf. 67. tab. 4. fig. 21.  
 Frish. Inf. 13. tab. 19.  
 Degeer Inf. 5. 70. 7.  
 Voet. Scarab. tab. 8. fig. 30.  
 Habitat in Europa australiori.  
 Variat aetate tota nigra.
- cineraria.* 73. L. thorace spinoso cinerascens antennis brevibus.  
 Pallas Icones tab. F. fig. 11.  
 Habitat in Russia meridionali Dom. Hybner.  
 Praecedente duplo minor & tota cinerascens.
- carinata.* 74. L. thorace spinoso nigra elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus.  
 Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae breves, crassae, nigrae. Caput & thorax punctata lineaque media impressa, nigra.  
 Elytra obtusa, picea linea laterali elevata, villosa albida. Corpus subtus albidum.
- Coquus.* 75. L. thorace subspinoso hirsuta elytris obtusis sulcatis atris antice ferrugineis, antennis mediocribus. Linn. Syst. nat. 2. 630. 44.  
 Habitat in America boreali.  
 Spinae thoracis minutissimae.
- rufipator.* 76. L. thorace spinoso fusco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuscis cinereo variegatis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 129.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
 Antennae mediocres, fuscae. Caput fuscum.  
 Scutellum ferrugineum. Elytra punctata obtusa, fusca, cinereo varia, qui color postice fasciam constituit. Corpus fuscum.

77. L. thorace spinoso quadripunctato, elytris *tornator.*  
rufis: maculis quatuor nigris, antennis bre-  
vibus.

Cerambyx tetrophthalmus, Forster Cent. I. 41.

Oliv. Inf. 67. tab. 8. fig. 52.

Herbst Arch. tab. 32. fig. 4.

Habitat in America boreali.

Antennae nigrae. Caput rufum puncto elevato  
atro ad basin antennarum. Thorax utrinque  
obtuse spinosus, rufus punctis quatuor dorsali-  
bus, nigris. Elytra obtusa puncto ad marginem  
exteriorem baseos, duobus approximatis in  
medio, quantoque versus apicem. Subtus ni-  
gra, cinereo nitens.

78. L. thorace spinoso grisea elytris ferrugineo *Bankii.*  
irroratis fasciisque duabus cinereis.

Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 111.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Parva. Antennae mediocres, fusco cinereoque  
variae. Thorax antice utrinque spinis duabus,  
anteriore brevissima, ferrugineo irroratus.  
Elytra fasciis duabus, altera ad basin fere  
obsoleta, altera in medio obliquas futuram haud  
attингente.

79. L. thorace inermi grisea elytris fasciis duabus *saltator.*  
macularibus abbreviatis strigaque postica pun-  
ctata niveis, antennis brevibus.

Habitat — — —

Parva. Thorax linea dorsali alba. Elytra puncta-  
ta, obtusa fascia ante medium abbreviata, ni-  
vea e lineolis tribus: intermedia breviori  
punctoque interiore constans. Pone medium  
fascia altera itidem lineolis tribus exteriore  
minore punctoque interiore. Versus apicem  
striga obsoleta e punctis quatuor.

- histrio.* 80. L. thorace inermis flavescens: punctis numerosis niveis sparsis, antennis brevibus.  
 Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.  
 Statura praecedentis. Antennae breves, griseae.  
 Caput punctatum, flavescens punctis obsoletis albidis. Thorax rotundatus, inermis, obscure flavescens punctis plurimis niveis, distinctis. Elytra punctata, flavescentia punctis numerosis, niveis. Corpus flavescens.
- testator.* 81. L. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 122.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
 Corpus parvum, breve, villosum, testaceum. Caput magnum fronte plana. Thorax in medio dorsi cornu brevi, recumbente, lato, apice retuso. Elytra villosa, striata, immaculata.
- pedestris.* 82. L. thorace spinoso atra: vitta integra alba, antennis mediocribus.  
 Cerambyx pedestris. Linn. Syst. nat. 2. 631. 51.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 4. fig. 23.  
 Ross. Fn. Etr. 1. 146. 368.  
 Habitat in Europa australiori.
- rufipes.* 83. L. thorace spinoso nigra elytrorum sutura alba, antennarum basi pedibusque rufis.  
 Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
 Statura & magnitudo praecedentis. Antennae compressae, nigrae primo articulo rufo. Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra laevia, atra sutura alba. Pedes rufi.
- morio.* 84. L. thorace spinoso nigra elytris unicoloribus, antennis brevibus.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 10. fig. 67.

Herbst Arch. tab. 25. fig. 10.

Scopoli Ent. carniol. 169.

Habitat in Germania australi Mus. Dom. Zschuck.

L. pedestri paullo major & elytra unicolora,  
mox nigra, mox testacea. Antennae nigrae  
articulo primo interdum testaceo. Pedes mox  
nigri, mox testacei.

85. L. thorace spinoso atra elytris marginibus li- *lineata*.  
neisque duabus utrinque coeuntibus albis.

Cerambyx Scopoli. Herbst Arch. tab. 25. fig. 11.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Statura & magnitudo L. pedestris. Caput &  
thorax atra linea dorsali alba. Elytra atra mar-  
gine, futura lineisque duabus, antice postice-  
que coeuntibus albis. Pedes nigri.

86. L. thorace spinoso fusca: vittis tribus integris *mollitor*.  
albis, antennis medioribus.

Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 84.

Ross. Fn. Etrusc. 1. 147. 369.

Habitat in India Mus. Britann.

Corpus supra fuscum vittis tribus albis, a ca-  
pite ad apicem elytrorum ductis; intermedia  
in thorace subdidyma per futuram elytrorum  
excurrit. Lineola parva ad basin elytrorum  
intervittas. Thorax tuberculo lateralii notatus.

87. L. thorace mutico grisea coleoptris basi bitu- *tuberculato-*  
*berculatis* maculisque duabus communibus al- tor.  
bis, antennis brevibus.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 120.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennae cinereae. Coleoptra tuberculis duo-  
bus baseos elevatis, compressis juxta futuram:  
Maculae praeterea duae magnae, communes,  
albidae, altera ad basin, alteraversus apicem.

- nulator.* 88. L. thorace mutico lineato cinereo villosa an tennis pedibusque testaceis.  
Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 102.  
Habitat in Otaheite Mus. Dom. Banks.  
Antennae mediocres. Thorax utrinque linea pallida. Elytra punctata, obtusa.
- Rubus.* 89. L. thorace spinoso bimaculato, elytris basi scabris basi apiceque mucronatis.  
Cerambyx Rubus. Linn. Syst. nat. 2. 625. 21.  
Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 57.  
Degeer Inf. 5. 106. 7. tab. 13. fig. 16.  
Habitat in India.
- 8 maculata.* 90. L. thorace spinoso bimaculato, elytris albo maculatis basi scabris mucronatis apice bidentatis.  
Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.  
Affinis certe praecedenti, cuius varietatem olim credidi. Corpus paullo minus. Antennae corpore longiores, scabrae, nigrae. Thorax inaequalis, acute spinosus maculis duabus dorsibus, lunatis, flavescentibus, impressis. Scutellum albidum. Elytra cinerea basi punctis elevatis nigris scabra anguloque mucronata, apice bidentata. In medio maculae quatuor albae, secunda majori lunata, quarta minima, orbiculata. Latera alba.
- spinicornis.* 91. L. thorace spinoso rugoso, elytris truncatis griseis, antennis compressis: articulis apice spinosis.  
Oliv. Inf. 67. tab. 5. fig. 33.  
Habitat in Africa aequinoctiali Dom. Banks.  
Antennae mediocres, compressae: articulis apice exteriori acute spinosis. Caput nigrum. Thorax valde rugosus, griseus. Elytra laevia, apice truncata, subspinosa.

92. L. thorace spinoso subtestacea elytris punctis *scabrador.*  
baseos atris scabris.

Oliv. Ins. 67. tab. 3. fig. 14. a. b.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres articulis apice nigris. Elytra apice subemarginata, ad futuram acuminata.  
Subtus & pedes concolora.

93. L. thorace spinoso tuberculatoque cinerea elytris *scabris:* *Spengleri.*  
maculis duabus lateralibus atris.

Habitat in America meridionali D. Spengler.

Antennae longae, cinereae articulis apice fuscis.  
Thorax utrinque obtuse spinosus tuberculisque  
tribus dorsalibus. Elytrorum macula posterior  
strigam emittit. Elytra apice acuminata.

94. L. thorace bispinoso tuberculatoque, elytris *fuscator.*  
apice tridentatis griseis: fascia cinerea.

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

Media. Antennae corpore vix breviores, griseae.  
Thorax inaequalis, griseus utrinque spinis dua-  
bus: anteriore majori, recurva, supra spinas  
tuberculum magnum, obtusum. Elytra grisea  
sive cinerea punctis numerosis ferrugineis  
irroratis. Pone medium fascia sinuata cinerea,  
distincta, apice bidentata. Pedes grisei.

95. L. thorace acute spinoso grisea elytris apice *bidentis.*  
bidentatis.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae longae, fuscae. Pedes inermes.

96. L. thorace mutico cinereo nigro punctato, elytris pallide testaceis apice bidentatis cinereis  
nigro maculatis.

Habitat in China Dom. de Schlanbusch.

Antennae mediocres, atrae. Caput cinereum  
punctis duobus lineolaque baseos nigris. Scu-



tellum nigrum marginé cinereo. Elytra pallide testacea, basi punctata, apice bidentata, cinerea, nigro maculata. Corpus & pedes nigra, cinerea villosa.

- Solandri.* 97. L. thorace subspinoso nigra elytris bidentatis fuscis cinero irroratis.

Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 118.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Antennae mediocres, nigrae. Thorax subrugosus, niger, utrinque spinula antica, acuta. Scutellum nigrum. Elytra punctata, nigra, cinereo irrorata, basi punctata, humeri gibbo, apice bidentata. Pedes nigri plantis fuscis.

- cornutor.* 98. L. thorace obtuse spinoso, mandibulis basi cornutis, antennis longissimis.

Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 132.

Habitat in America Mus. Britann.

Antennae nigrae. Caput canaliculatum, nigrum mandibulis porrectis, acutis, basi tuberculo elevato, valido, corniformi. Thorax niger, immaculatus. Elytra punctata, nigra, flavo maculata, basi mucrone parvo, inflexo armata, apice rotundata, inermia.

- leprosa.* 99. L. thorace spinoso, elytris basi variolosis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae obscure rufae. Thorax dorso inaequali. Elytra basi punctis majoribus concannatis impressa, postice laevia, cinerea, puncto parvo in medio, macula magna laterali & puncto parvo apicis nigris. Macula nivea utrinque ad basin abdominis. Pedes cinerei.

—

85. STENOCORUS. *Palpi* quatuor.  
*antici* filiformes.  
*postici* clavati.  
*Antennae* setaceae.

1. S. thorace subspinoso cyaneus elytris basi flavis. *cyaneus.*  
 Cerambyx palliatus. Forst. nov. sp. Cent. I. 40.  
 Habitat in India.  
 Antennae breves, cyaneae articulis clavatis.  
 Thorax antice angustatus, postice subspinosis.
2. S. thorace spinoso pubescente, elytris fastigiatis *lamed.*  
 lividis: taenia obscura longitudinali sinuata.  
 Cerambyx lamed. Linn. Syst. nat. 2. 630. 46.  
 Fn. Sv. 649.  
 Geoff. Inf. I. 226. 6.  
 Habitat in Europae floribus.
3. S. thorace spinoso, elytris bidentatis griseis: ma- *garganicus*  
 cula flava, antennis longissimis.  
 Oliv. Inf. 67. tab. 13. fig. 105.  
 Drury Inf. I. tab. 37. fig. 6.  
 Degeer Inf. 5. tab. 14. fig. 3.  
 Habitat in Marylandia Muf. Britann.  
 Antennae fuscae. Elytra in medio lunula albida.
4. S. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis *festivus.*  
 viridibus: linea laterali lutea.  
 Cerambyx festivus. Linn. Syst. nat. 2. 623. II.

Stenocori corpus subcylindricum, glabrum, immarginatum, tardum, capite rotundato, oculis magnis, reniformibus, lateralibus, antennis elongatis: articulis apice saepius spinosis, in sinu oculorum insertis, thorace rotundato, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicate, longitudine abdominis, apice saepius bidentatis, pedibus cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore varie.

- Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 113.  
 Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 5.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 16. fig. 66.  
 Herbst Arch. tab. 25. fig. 12.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 6.  
 Degeer Inf. 5. 100. 4. tab. 13. fig. 14.  
 Habitat in America.

*marylandi*- 5. S. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus.

*Callidium marylandicum*. Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5.

Habitat in Marylandia Mus. Britann.

Antennae subaculeatae. Corpus totum cinereus fuscoque variegatum.

*spinicornis*. 6. S. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore variegato.

*Cerambyx spinicornis*. Oliv. Inf. 67. tab. 17. fig. 103.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 4.

Voet. Coleopt. 2. tab. 24. fig. 131.

Habitat in America.

Corpus cinerascens punctis elevatis fuscis.

*bidens*. 7. S. thorace inermi subtuberculato, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo.

*Cerambyx bidens*. Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 125.

Habitat in America meridionali D. dē Paykull.

Statura omnino praecedentis, at minor & corpus minus variegatum.

*semipuncta*- 8. S. thorace spinoso inaequali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris.

Oliv. Inf. 67. tab. 2. fig. 19.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

**Caput atrum palpis posticis ferrugineis.** Antennae mediocres, fuscae articulis intermediis, apice spinosis. Thorax tomentosus, ater, tuberculatus. Elytra basi nigro flavoque variegata, punctata, apice atra, glabra, nitida macula flava. Pedes fuscii.

9. S. thorace mutico inaequali, elytris apice bidentatis albo irroratis, antennis longis aculeatis.

*Cerambyx irroratus.* Linn. Syst. nat. 2. 633. 62.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 145.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 3.

Habitat in America.

10. S. thorace mutico cinereo: linea glabra fusca, *glabratu*s. elytris bidentatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Rohr.

Antennae mediocres, fuscae articulis tribus spinosis. Thorax griseus linea dorsali glabra, fusca. Elytra griseo fuscoque varia.

11. S. thorace spinoso piceus elytris punctis sparsis *farinosu*s. farinosis, antennis longis.

*Cerambyx farinosus.* Mant. Inf. 1. 134. 35.

Linn. Syst. nat. 2. 626. 24.

Oliv. Inf. 67. tab. 7. fig. 46.

Drury Inf. 2. tab. 31. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 108. 9. tab. 13. fig. 17.

Voet. Coleopt. 2. tab. 6. fig. 12.

Habitat in Radice Argemonae mexicanæ,

Larva albicans capite caudaque nigris,

12. S. thorace spinoso ferrugineo, elytris acumina-tis: maculatis tribus flavis.

*Cerambyx sexmaculatus.* Oliv. Inf. 67. tab. 15. fig. 108.

Habitat Cajennæ Mus. D. Olivier.

Magnitudo omnino & Statura S. 4 maculati.  
 Antennae mediocres, villosae, ferrugineae.  
 Thorax ferrugineus utrinque spina parva, nigra.  
 Elytra maculis tribus magnis, oblongis, flavis,  
 apice spina nigra.

*5maculatus* 13. S. thorace subspinoso rufo: maculis quatuor flavis, elytris bidentatis rufis: punctis duobus lineaque apicis albis, antennis longissimis.

Habitat in Insula Guadeloupe Dr. Isert.

Statura omnino 4 maculatae. Antennae ferrugineae. Caput ferrugineum orbita oculorum cinerea. Thorax scaber linea laterali maculisque quatuor dorsalibus, pallidis. Scutellum albidum. Elytra ferruginea macula ante medium albida, in medio geminata, flava, glabra, apicebidentata linea longitudinali albida. Corpus subtus albidum.

*4maculatus* 14. S. thorace spinoso scabro, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris.

Cerambyx quadrimaculatus. Linn. Syst. nat. 2.27.

Oliv. Inf. 67. tab. 19. fig. 144.

Sloan. Jamaic. 2. tab. 237. fig. 21.

Drury Inf. 1. tab. 37. fig. 3.

Voet. Coleopt. 2. tab. 15. fig. 65.

Habitat in America meridionali.

Femora quatuor postica apice spinosa.

*maculosus*. 15. S. thorace spinoso fuscus elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris, antennis medioribus nigris.

Cerambyx maculosus. Oliv. Inf. 67. tab. fig.

Habitat in America meridionali Mus. Dr. Olivier.

Praecedente minor. Caput fuscum labio ferrugineo. Thorax spinosus, fuscus, immaculatus. Elytra pallidiora maculis duorum parium. Pedes nigri femoribus rufis.

**16.** *S. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, *geminatus*.  
elytris nigris: maculis duorum parium gla-  
bris, antennis longissimis.*

Habitat in Sierra Leon Africae Dr. Pflug.

Antennae nigrae. Caput rufum fronte puncto  
nigro. Maculae elytrorum, altera ad basin,  
altera in medio. Elytra apice truncata, cinereo  
nitidula. Pedes nigri femoribus rufis, posticis  
quatuor apice spinosis.

**17.** *S. thorace mutico pallidus elytris unispinosis: *pallens*.  
punctis tribus nigris, antennis longis.*

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.  
Isert.

Medius. Antennae longae, pallide testacea.  
Thorax rufus. Elytra pallide testacea punctis  
tribus nigris, parvis. Pedes pallidi.

**18.** *S. thorace mutico antice attenuato ferrugineus *strepens*.  
elytris pallidis.*

Cerambyx strepens. Oliv. Inf. 67. tab. fig.

Habitat in Galloprovincia noctu volitans cum  
strepitu Mus. Dom. Olivier.

Statura S. 4. maculati. Antennae compressae,  
mediocres, ferrugineae. Caput canaliculatum.  
Elytra laevia, pallide flavescens, immaculata.  
Corpus ferrugineum.

**19.** *S. thorace mutico atro, elytris bidendatis basi *fasciatus*.  
testaceis apice atris: fascia pallida.*

Oliv. Inf. 67. tab. 14. fig. 98.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Caput flavum basi  
lineisque tribus atris: lateralibus sub oculis.  
Thorax supra ater, subtus flavescens. Elytra  
basi punctata, testacea, truncata fascia ante  
apicem pallida. Abdomen testaceum macula  
utrinque baseos flava apiceque atrum.

- circum-*      20. *S.* thorace mutico ferrugineus elytris unidentatis testaceis: punctis duobus strigaque undata fuscis.  
*flexus.*      Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Antennae mediocres, ferrugineae. Elytra testacea punctis duobus oblique positis versus basin, in medio striga angulata margines haud attinens & apice dente unico, elongato, acuto fuscis. Pedes ferruginei.
- nanus.*      21. *S.* thorace rotundato mutico griseus pedibus testaceis.  
 Habitat — — Mus. Dom. Lund.  
 Parvus. Antennae mediocres, villosae, cinereae. Caput & thorax grisea, immaculata. Elytra grisea lineis duabus longitudinalibus, abbreviatis, nigris. Pedes testacei femoribus incrassatis.
- annulatus.* 22. *S.* thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longis: annulis tribus albis.  
*Cerambyx annulatus.* Oliv. Inf. 67. tab. 16. fig. 117.  
*Cerambyx hirtipes.* Degeer Inf. 5. 16. 19. tab. 14. fig. 10.  
 Habitat — — Mus. Dom. Banks.  
 Antennae ferrugineae fascia alba in articulo tertio, quinto & penultimo. Caput fuscum lineis duabus albis. Thorax griseus lineis quatuor albis. Elytra grisea, apice fusca margine albo, truncata, unidentata. Pedes fusci, cinereo annulati.
- so macula-* 23. *S.* thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis.  
*sus.*      Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 86.  
 Habitat in America Mus. Dom. Banks.

23. Antennae longiores, ferrugineae. Thorax utrinque tuberculis duobus lateralibus. Elytra obsolete bidentata, ferruginea macula glabra, solitaria, flava ad basin, dein macula orbiculata, cinerea. In medio maculae duae approximatae, glabrae, flavae, & tandem linea cinerea, apice bifida ab apice elytri fere ad medium ducta.

24. S. thorace spinoso ferruginea elytris acuminatis testaceis: lineolis tribus glabris flavis.

Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 17.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Caput ferrugineum. Antennae corpore longiores. nigrae primo articulo ferrugineo. Elytra apice unispinosa, testacea lineola baseos duabusque in medio approximatis: exteriori longiori, flavis, glabris. Pedes nigri femoribus flavis: posticis quatuor apice spina valida, nigra.

25. S. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo varius. fusco flavoque variis: angulo baseos compresso.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Parvus, cinereus. Antennae corpore longiores, cinereae articulis apice fuscis. Thorax nigro lineatus punctisque flavescentibus. Elytra angulo baseos elevato, compresso & apice emarginato bidentata.

26. S. thorace spinoso ater elytris apice unispinosis basi testaceis, antennis longis. pubescens.

Cerambyx pubescens. Oliv. Inf. 67. tab. 18.

fig. 135.

Habitat Cajennae.

Minor. Antennae corpore longiores, nigrae articulis spinosis. Thorax spinosus, tubercula-

tus, ater, nitidus. Scutellum griseum. Femora rufa.

- villosum.* 27. S. thorace mutico obscurus cinereo villosum elytris bidentatis.

Habitat in Carolina.

Medius, tenuis, obscurus, villis rarioribus tectus.

- Drurii.* 28. S. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus.

Habitat in America Dom. Drury.

Antennae corpore breviores, piceae. Thorax utrinque spina parva armatus & dorso lineis quibusdam elevatis, transversis. Elytra apice truncata, bidentata, spina exteriori majori, ferruginea fasciis tribus cinereis, ad futuram connatis. Pectus ferrugineum maculis utrinque duabus majoribus, albis. Abdomen utrinque punctis tribus albis.

- undatus.* 29. S. thorace spinoso cinereus elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris.

Habitat in America Dom. Drury.

Caput cinereum oculis nigris. Antennae mediocres, villosae, nigrae articulis apice cinereis. Thorax cinereus maculis aliquot dorsibus, glabris, nigris. Elytra punctata: cinerea fasciis duabus valde undatis, nigris, posteriore crassiore.

- ruficollis.* 30. S. thorace spinoso ferrugineo fuscus elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis.

Oliv. Inf. 69. tab. 2. fig. 16.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Medius. Antennae corpore longiores, fuscae.

Caput & thorax obscura, ferrugineo pubescens. Elytra laevia, multo pallidiora, apice bidentata.

86. CALOPUS. *Palpi* quatuor.*antici* clavati.*postici* filiformes.*Maxilla* bifida.*Labium membranaceum,*  
bifidum.*Antennae* filiformes.

## 1. Calopus.

*Cerambyx ferraticornis* thorace mutico subovali,  
*serraticor-*corpo lurido fusco, antennis compressis an-  
tice serratis mediocribus. Linn. Syst. nat. 2.

634. 65. Fn. Sv. 665.

Degeer Ins. 5. 79. 16.

Habitat in Europa boreali.

Animalculum elongatum, cylindricum, obscurum.

87. RHAGIUM. *Palpi* quatuor capitati.*Maxilla* unidentata.*Labium membranaceum,*  
bifidum.*Antennae* setaceae.1. R. thorace spinoso griseum elytris nebulosis te- *mordax*.  
staceo subfasciatis.

Schaeff. Icon. tab. 8. fig. 2.

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Rhagii corpus oblongum, glabrum, immarginatum,  
tardum, capite magno, ovato, prominulo, oculis ro-  
tundatis, lateralibus, prominulis, antennis elongatis,  
approximatis, inter oculos insertis, thorace angusto,  
cylindrico, utrinque spinoso, scutello rotundato, ely-  
tris rigidis, fornicatis, thorace multo latioribus, lon-  
gitudine abdominis, pedibus cursoriis, tarsis quadri-  
articulatis, colore vario.

**Corpus majus R. inquisitore haud nigrum sed griseo villosum.**

***inquisitor.*** 2. R. thorace spinoso nigrum elytris nebulosis testaceo subfasciatis.

**Cerambyx inquisitor.** Linn. Syst. nat. 2. 630.

49. Fn. Sv. 659.

Geoff. Inf. 1. 223. 2.

Frish. Inf. 13. tab. 14.

Oliv. Inf. 69. tab 2. fig. 12.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 10.

Degeer Inf. 5. 126. 2. tab. 4. fig. 1.

Habitat in Europae truncis arborum.

Larva hexapoda, nuda, alba, capite collarique corneis fuscis, dorso canaliculato Stroem. Act. Hafniensis 1.

***indagator.*** 3. R. thorace spinoso cinereum elytris lineis tribus elevatis: atomis fasciisque duabus nigris.

Degeer Inf. 5. tab. 4. fig. 7.

Habitat in Germania Dr. Schulz.

Antennae nigrae, in medio piceae. Caput planum, cinereo villosum. Thorax cinereo villosus. Elytra cinerea atomis fasciisque duabus nigris. Pedes nigri.

***cursor.*** 4. R. thorace spinoso, elytris rufis: sutura lineaque nigris.

**Cerambyx cursor.** Linn. Syst. nat. 2. 630. 45.

Fn. Sv. 658.

Degeer Inf. 5. 127. 3.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 7.

Habitat in Europa boreali.

Margo exterior rufus.

5. R. thorace spinoso nigrum elytris subferrugi- *cindum.*  
neis: fascia flava, femoribus posticis uniden-  
tatis.

Habitat in Austria Dom. Saldoner.

Antennae mediocres, ferrugineae, apice compres-  
sae. Thoracis lobus anticus distinctus. Scutel-  
lum pube flavescente. Elytra punctata. Corpus  
subtus pube aurea. Pedes ferruginei femoribus  
quatuor posticis intus ante apicem unidentatis.

6. R. thorace spinoso nigrum antennarum basi fer- *Noctis.*  
ruginea.

Cerambyx Noctis. Linn. Syst. nat. 2. 630. 48.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 2.

Habitat in Europa boreali.

Nimis affinis R. Cursor. Differt tantum colore  
toto nigro.

Variat sexu elytris nigris & testaceis.

7. R. thorace spinoso, elytris fasciis duabus obli- *bifasciatum*  
quis flavis.

Leptura mordax. Degeer Inf. 5. 124. 1. tab. 4.  
fig. 6.

Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 8.

Oliv. Inf. 69. tab. 1. fig. 6.

Schaeff. Elem. tab. 118. fig. 1.

Icon. tab. 8. fig. 1. 3.

Herbst Arch. 170. tab. 45. fig. 12.

Geoff. Inf. 1. 222. 1.

Habitat in Europa boreali.

Antennae ferrugineae primo articulo nigro. Ca-  
put canaliculatum. Thorax subcanaliculatus.

Elytrorum fasciae margines haud attingunt.  
Pedes nigri femorum basi tibiisque rufis.

*clathratum.* 8. R. thorace subspinoso nigrum elytris flavo subreticulatis, pedibus rufis.

Habitat in Austria D. Schneider.

Statura omnino R. Noctis at minor. Caput & thorax atra. Elytra nigra in medio flavo subtilissime reticulata. Pedes omnes rubri,

*ornatum.* 9. R. thorace spinoso nigrum elytris fascia lata flava.

Habitat in Pennsylvania Mus. Dom. Banks.

Antennae subferrugineae. Caput nigrum oculis testaceis. Thorax niger spina utrinque acuta, recurva. Elytrorum margo exterior subferrugineus. Pedes ferruginei femoribus basi nigris.

*minutum.* 10. R. thorace spinoso, elytris elevato striatis cinereis nigro undatis.

Oliv. Inf. 69. tab. I. fig. 3.

Habitat Kiliae.

Corpus R. inquisitore triplo minus.

*muticum.* 11. R. thorace mutico rufo nigro bimaculato, elytris fuscis rufo striatis apice bidentatis.

Habitat in Suecia Mus. Dom. Lund.

Parvum. Caput cinereum antennis longitudine corporis, fuscis, basi albo annulatis. Thorax omnino muticus, rufus maculis duabus dorsilibus, nigris. Elytra subpunctata, fusca, rufo striata apiceque rufa emarginato bidentata: dente interiori brevissimo. Corpus cinereum. Pedes ferruginei.

88. SAPERDA. *Palpi quatuor filiformes.*  
*Maxilla membranacea,*  
*bifida.*

*Labium cordatum, trun-*  
*catum.*

*Antennae setaceae.*

1. *S. corpore griseo nigro punctato, antennis me- carcha-*  
*diocribus.* *rias.*

*Cerambyx carcharias.* Linn. Syst. nat. 2. 631.

52. Fn. Sv. 660. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 22.

*Leptura cinerea.* Geoff. Inf. 1. 308. 1.

Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 152. fig. 4.

Degeer Inf. 5. 73. 10. tab. 3. fig. 19.

Habitat in Europae sylvis.

2. *S. coleoptris linea suturali dentata punctisque fla- scalaris,*  
*vis, antennis mediocribus.*

*Cerambyx scalaris.* Linn. Syst. nat. 2. 632. 55.

Fn. Sv. 697. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 7.

Frish. Inf. 12. 29. tab. 3. fig. 3.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 5.

Degeer Inf. 5. 77. 14.

Habitat in Europae Populo.

3. *S. alba thorace coleoptrisque fuscis: vittis dua- candida.*  
*bus albis.*

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Saperdae corpus elongatum, cylindricum, glabrum,  
immarginatum, agile, capite rotundato, transverso,  
inferto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis  
elongatis, in oculorum sinu insertis, thorace brevi,  
rotundato, inermi, scutello parvo, rotundato, elytris  
rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus  
brevibus, cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore  
vario.

- Elytra obtusa, laevia.
- detrita.* 4. *S. nigra cinereo villoso thorace linea dorsali, elytris vitta albis, antennis brevibus.*  
*Habitat in Barbaria Dom. Desfontaines.*  
*Magnitudo & statura S. scalaris. Antennae vix longitudine corporis, nigrae. Caput nigrum vitta oculorum alba. Thorax niger linea dorsali scutelloque albis. Elytra punctata, rotundata, nigra vitta lata, dorsali, alba, versus basin parum detrita. Corpus cinereo hirtum.*
- irrorata.* 5. *S. atra elytris albo punctatis, antennis longis,*  
*Habitat in Africae plantis Dom. Vahl.*  
*Antennae nigrae articulis basi albis primo crassi, unicolore, secundo piceo. Thorax linea laterali, interrupta, alba. Elytra laevia.*  
*Variat elytris immaculatis forte aetate.*
- modesta.* 6. *S. nigra capite thorace anoque ferrugineis.*  
*Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.*  
*Caput & thorax immaculata. Elytra punctato striata, apice emarginata. Abdomen tomento cinereo nitidulum ano ferrugineo.*
- atricornis.* 7. *S. ferruginea antennis abdominisque apice supra nigris.*  
*Habitat in China Dom. de Sehestedt.*  
*Affinis videtur praecedenti. Antennae nigrae longitudine fere corporis. Caput & thorax laevia, glabra, rufa, immaculata. Pectus rufum. Abdomen supra basi rufum, apice nigrum ano sive ultimo segmento lineolis duabus albis. Subtus basi tomento argenteo villosum, apice rufum. Elytra punctato striata, obscuriora, apice emarginata. Alae ferrugineae, apice nigrae.*
- oculata.* 8. *S. thorace luteo: punctis duobus atris, elytris nigris.*

- Cerambyx oculatus. Linn. Syst. nat. 2. 633.  
 60. Fn. Sv. 664. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 4.  
 Schaeff. Icon. tab. 128. fig. 4.  
 Degeer Inf. 5. 74. 11. tab. 3. fig. 20.  
 Huffnag. Inf. tab. 13.  
 Habitat in Europae sylvis.
9. *S. ferruginea* elytris bidentatis punctato striatis *tricolor*.  
 virescentibus, antennis mediocribus nigris.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. de Sehestedt.
- Paullo minor *S. oculatae*. Antennae longitudine corporis, nigrae. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus basi punctis tribus parvis, obsoletis. Elytra striato punctata, virescentia, apice emarginata. Corpus rufum pedibus apice nigris.
10. *S. ferruginea* griseo villosa scutello orbitaque *hirta*.  
 oculorum fulvis.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae fuscae longitudine corporis. Caput griseum maculis quatuor baseos flavescentibus. Elytra pilis griseis hirta, apice obtusa. Pedes grisei.
11. *S. testacea* antennis pedibusque concoloribus, *unicolor*.  
 antennis longis.  
 Habitat in Insula Amsterdam Mus. Dom. Banks.  
 Antennae testaceae. Thorax punctatus, in quibusdam linea cinerea laterali. Scutellum griseum. Elytra uti & pedes testacea.
12. *S. cylindrica* nigra pedibus luteis, antennis mediocribus *linearis*.
- Cerambyx linearis. Linn. Syst. nat. 2. 632. 58.  
 Fn. Sv. 663. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 13.  
 Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 6.  
 Herbst Arch. tab. 26. fig. 1.

Habitat in Europae Corylo.

*nigripes.* 13. *S. cylindrica nigra thoracis lineis duabus seu telloque cinereis, pedibus nigris.*

Habitat in Hungaria Dom. Smidt.

Statura omnino *S. cylindrica* et paullo major.  
Antennae corporis fere longitudine, nigrae.  
Elytra rotundata, punctata, immaculata. Pedes omnes nigri.

*cylindrica.* 14. *S. cylindrica nigra pedibus anticus luteis.*  
Cerambyx cylindricus. Linn. Syst. nat. 2. 633.  
59. Fn. Sv. 662. Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 111.  
Roef. Inf. 2. Scarab. 2. tab. 3.  
Geoff. Inf. 1. 208. 2.  
Degeer Inf. 5. 75. 12.

Habitat in Pyri, Pruni ramis.

*tripunctata.* 15. *S. cylindrica atra thorace supra ferrugineo: punctis tribus nigris.*

Habitat in Virginia.

Statura & magnitudo omnino *S. cylindrica*.  
Antennae mediocres, villosae, nigrae. Corpus totum atrum, immaculatum thorace solo supra ferrugineo punctis tribus atris, duobus in medio & tertio in medio baseos. Elytra punctato striata,

*melanocephala.* 16. *S. thorace rufo, corpore nigro, pedibus rufis.*  
Habitat in Africa Dom. Vahl.

Antennae mediocres, nigrae. Caput, corpus, elytra nigra. Thorax & pedes rufi.

*pilicornis.* 17. *S. violacea antennarum articulo primo secundoque clavato pilosis.*

Pall. Icon. tab. F. fig. 12.

Habitat in America meridionali Dom. Hybner.  
Antennae corpore paullo longiores: articulo primo incurvo, clavato, hirto, secundo bafi subserrugineo apice clavato, hirto, nigro, reli-

quis basi ferrugineis apice nigris. Pedes nigri.

18. S. capite thoraceque rufis, elytris cyaneis, an-*barbicornis*.  
tennis mediocribus ante apicem barbatis.

Habitat — —

Media. Caput rufum antennis nigris articulo nono fasciculato piloso. Elytra laevia. Corpus nigrum ano sternoque rufis.

19. S. thorace villoso rufa antennis pectore elytris- *erytroce-*  
*phala*.

Cerambyx erytrocephalus. Schrank Austr. 270.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Caput rufum mandibulis antennisque mediocribus, nigris. Thorax valde villosum margine antico posticoque nigris. Elytra glabra, nigra. Pectus nigricans. Abdomen rufum basi nigrum. Pedes rufi.

20. S. thorace villoso rufa antennis elytrisque fuscis. *ruficollis*.

Habitat in Virginia.

Magnitudo & statura omnino praecedentis at distincta. Caput rufum antennis mediocribus, nigris. Thorax villosum, rufus, immaculatus. Elytra villosa, fusca. Corpus rufum. Pedes rufi, tibiis fuscescensibus.

21. S. thorace subspinoso cyanea elytris fasciis duabus flavis. *fasciata*.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum violaceum, subtus paullo cinereo nitidum.

22. S. viridis elytris maculis tribus flavis. *clavicornis*.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks.

Caput viride antennis fuscis, corpore longioribus, extrorsum subcraqsoribus. Thorax viridis. Elytra laevia, viridia maculis tribus flavis,

quarum prima totam basin occupat, reliquae  
duae marginales.

- latipes.* 23. *S. nigra* femoribus clavatis apice violaceis, tibiis posticis compressis, antennis longis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Prof. Lefke.  
Antennae corpore longiores articulo primo secundoque crassioribus, nigris, reliquis rufis apice nigris, ultimis totis nigris. Pedes antec quatuor rufi femoribus clavatis: clava violacea, postici violacei femoribus clavatis, basi rubris tibiisque compressis.
- vittata.* 24. *S. grisea* vittis tribus dentatis albis, antennis longis.  
Cerambyx trilineatus. Linn. Mant. 352.  
Drury Ins. 1. tab. 41. fig. 1.  
Oliv. Ins. 67. tab. 19. fig. 142.  
Habitat in America Dom. Drury.  
Antennarum articolus primus & secundus subtilissime barbatus. Caput nigrum linea laterali alba dorsalique duplicata, flava. Elytra apice unidentata, nigra, flavo irrorata margine exteriori suturaque albis.
- 6punctata.* 25. *S. nigra* elytris punctis tribus flavis.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.  
Corpus parvum, nigrum, cyaneo nitidum. Antennae longitudine corporis. Elytra scabra, nigra punctis tribus flavis. Pedes cyanei femoribus omnibus clavatis.
- lateralis.* 26. *S. nigra* thoracis lateribus elytrorumque vitta lateralii ferrugineis.  
Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.  
Antennae nigrae longitudine corporis. Thorax lateribus ferrugineis, qui color in capite coit. Elytra nigra vitta lateralii ferruginea margine tamen ipso nigro. Pedes nigri.

**27.** *S. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, lyncea.*  
elytris griseis acuminatis.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum antennis fuscis longitudine corporis. Scutellum ferrugineum. Elytra grisea, basi punctato striata, apice acuminata, divergentia. Corpus atrum abdomine utrinque punctis quatuor ferrugineis. Pedes fusti femoribus clavatis.

**28.** *S. grisea scutello margine, elytris lineolis flavescentibus, grisea.*

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae, corpore paullo longiores. Elytra subvillosa, grisea lineolis aliquot brevissimis flavis, basi punctis impressis, apice vix acuminatis. Pedes fusti femoribus clavatis.

**29.** *S. testacea elytrorum apicibus anoque nigris. analis.*

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae, interdum articulis apice testaceis. Caput testaceum, mox immaculatum, mox linea, mox punctis baseos nigris. Thorax itidem testaceus, mox immaculatus, mox punctis quatuor aut sex nigris. Elytra sulcata: sulcis striato punctatis, testacea, apice nigra. Corpus testaceum anno nigro.

**30.** *S. thorace rotundato: punctis quatuor nigris bidentata.*  
flava, elytris apice bidentatis nigris.

Habitat in Aquapim Guineae Dr. Isert.

Parva. Antennae longitudine corporis nigrae articulo tertio quartoque flavis. Caput flavum mandibulis punctoque frontali nigris. Thorax rotundatus punctis quatuor. Elytra punctato striata, flava, apice bidentata, nigra. Corpus & pedes flava.

*nigricornis.* 31. *S. fusca thorace lineato, scutello flavo, anten-*  
*nis longis.*

Cerambyx Cardui. Linn. Syst. nat. 2. 632. 56.

Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 5.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 2.

Habitat in Europae australioris Carduis,  
 Corpus fuscum, flavo irroratum lineis tribus  
 flavis in thorace.

*futuralis.* 32. *S. cinerea thorace lineato, elytris fuscis unico-*  
*loribus, antennis mediocribus.*

Habitat Lipsiae Prof. Leske.

Antennae mediocres, nigrae. Thorax niger lineis  
 tribus albidis, lateralibus abbreviatis. Elytra  
 laevia, fusca, unicoloria. Corpus cinerascens.

*annulata.* 33. *S. thorace rotundato lineato virescens elytris*  
*acuminatis: futura alba.*

Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 16.

Ross. Fn. Etr. 1. 152. 379.

Habitat in Africæ plantis Dom. Prof. Vahl.  
 Antennae mediocres articulis basi albis apice  
 nigris, primo toto nigro. Caput obscurum.  
 Elytra glabra, virescentia, haud rotundata sed  
 acuminata.

*lineata.* 34. *S. thorace rotundato subspinoso, antennarum*  
*articulis basi albis.*

Habitat in America meridionali Mus. Dom. Lund.  
 Media. Antennæ longitudine corporis, fuscae  
 articulo primo secundoque unicoloribus, reli-  
 quis basi niveis. Caput & thorax fusca, ferru-  
 gineo villosa, thoracis spina laterali parva. Ely-  
 tra & pedes fusca.

*trifinis.* 35. *S. thorace rotundato nigro albo lineato, elytris*  
*bidentatis testaceis albo lineatis.*

Habitat Tranquebariae Mus. Dom. Lund.

**Antennae breves, fuscae. Thorax spinis quatuor mediis obtusis, lateralibus majoribus acutis. Elytra laevia, acuta.**

**37. S. thorace flavo lineato, elytris punctis quatuor populnea. flavis, antennis mediocribus.**

**Cerambyx populneus. Linn. Syst. nat. 2. 632.**

**57. Fn. Sv. 661. Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 1.**

**Geoff. Inf. 1. 208. 3.**

**Schaeff. Icon. tab. 48. fig. 5.**

**Habitat in Americae, Europae Populetis.**

**Variat minor & punctis minoribus albis.**

**38. S. viridis thorace punctis duobus, elytris qua- tremula. tuor nigris.**

**Schaeff. Icon. tab. 101. fig. 1.**

**Habitat Halae Dr. Schreber.**

**Antennae mediocres.**

**39. S. viridis punctis nigris numerosis, antennis punctata. mediocribus.**

**Cerambyx punctatus. Linn. Syst. nat. 2. 1067. 7.**

**Oliv. Inf. 68. tab. 1. fig. 9.**

**Sulz. Hist. Inf. tab. 5. fig. 10.**

**Habitat in Europa australi.**

**Antennae & pedes nigrae.**

**40. S. thorace villoso cinereo, elytris subattenuatis virescens. viridibus.**

**Oliv. Inf. 68. tab. 2. fig. 11.**

**Panz Naturf. 24. 28. 37. tab. 1. fig. 37.**

**Habitat in Italia Dr. Allioni, in Galliae Sam- buco-Dom. Broussonet.**

**41. S. fusca pedibus testaceis, antennis longissimis longicornis. nigris: annulo albo.**

**Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.**

**Antennarum articulus nonus albus. Elytra apice bidentata. Pedes testacei apice nigri.**

- femorata.* 42. S. thorace antice fusco postice testaceo, elytris fasciis tribus nigris testaceisque, antennis longissimis.  
 Habitat — — Mus. Britann.  
 Media. Caput nigrum antennis longis flavis articulis apice subspinosis. Elytra obtusa fasciis tribus nigris testaceisque alternis: fascia prima nigra; puncto flavo. Pedes flavi femoribus incrassatis apice unidentatis.
- volvulus.* 43. S. supra nigra thoracis elytrorumque margine cinereo.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Antennae longae, nigrae: articulis ultimis basi pubescentibus. Caput nigrum. Thorax niger margine late cinerascente. Elytra margine late cinereo. Corpus cinereum pedibus nigris.
- ferruginea.* 44. S. thorace subspinoso ferruginea antennis pedibusque nigris.  
 Cerambyx cantharinus. Linn. Syst. nat. 2. 637. 82.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorff.  
 Antennae mediocres, nigrae. Thorax utrinque parum prominens, ferrugineus. Pedes nigri femoribus clavatis.
- brunnea.* 45. S. thorace subspinoso ferruginea antennis pedibusque concoloribus.  
 Habitat in Germania Dom. Prof. Helwig.  
 Nimis affinis praecedenti at triplo minor.
- testacea.* 46. S. nigra elytris testaceis.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
 Antennae mediocres, nigrae. Corpus totum nigrum solis elytris testaceis. Thorax rufo villosum.
- violacea.* 47. S. corpore violaceo immaculato.  
 Oliv. Ins. 68. tab. 2. fig. 12.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.

- Antennae mediocres, nigrae. Thorax subfuscens. Elytra rugosa. Pedes nigri.**
48. **S. nigra elytris flavis apice nigris.** *praeusta.*  
 Leptura praeusta. Linn. Syst. nat. 2. 641. 24.  
 Leptura nigra. Geoff. Inf. 1. 209. 4.  
 Schaeff. Icon. tab. 52. fig. 8.  
 Habitat in Europa australiori.
49. **S. nigra thoracis linea dorsali scutelloque cinereis, femoribus ferrugineis.** *ephippium.*  
 Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
 Affinis certe S. lineola at paullo major. Antennae corporis longitudine, nigrae. Caput nigrum luna cinerascente. Thorax niger linea dorsali scutelloque cinereis. Elytra obscura. Pedes nigri femoribus apice rufis.
50. **S. picea antennis pedibusque ferrugineis.** *picea.*  
 Habitat in America septentrionali D. Lund.  
 Parva tota obscure picea solis antennis pedibusque ferrugineis.
51. **S. nigra hirta antennis longis.** *hirta.*  
 Saperda Filum. Ross. Fn. Etr. 1. 152. 380.  
 tab. 5. fig. 10.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Statura & magnitudo omnino S. lineola at alia & distincta. Antennae corpore longiores, nigrae, pilosae.
52. **S. thorace subspinoso nigra antennis elytris scutellata, pedibusque cinerascentibus, scutello albo.**  
 Habitat in Germania Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Paullo S. lineola major. Antennae corpore breviores, griseae articulis basi ferrugineis apice nigris: primo toto nigro. Caput nigrum. Thorax subspinosus, niger lineola ad scutellum brevi, albida. Scutellum album. Elytra laevia, cinerascentia. Tibiae obscure ferrugineae.

*lincola.*

53. S. nigra thoracis linea dorsali femoribusque apice rufis.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 4.

Habitat in Italia Dom. Allioni.

Parva. Corpus cylindricum, nigrum. Antennae longitudine corporis. Femora omnia apice uti & tibiae anticae rubrae.

89. CALLIDIUM. *Palpi* quatuor clavati.

*Maxilla* membranacea,  
bifida.

*Labium* bifidum: laci-  
niis tenuissimis.

*Antennae* setaceae.

*obscurum.* 1. C. thorace subvilloso fusco, elytris testaceo cinereoque variis, antennis mediocribus.

Habitat in Terra Dumenii Mus. Dom. Banks.

Antennae pubescentes, fuscae. Elytra basi obscuriora. Pedes testacei.

*bajulus.* 2. C. thorace villoso: tuberculis duobus, corpore fusco.

Cerambyx bajulus. Linn. Syst. nat. 2. 636. 76.  
Fn. Sv. 672.

Oliv. Ins. 70. tab. 3. fig. 30.

Frish. Ins. 13. tab. 10.

Callidii corpus planiusculum, saepius pubescens, depresso-iusculum, immarginatum, tardum, capite ovato, obtuso, inferto, oculis lateralibus, reniformibus, antennis thorace longioribus in sinu oculorum insertis, thorace plano margine rotundato prominulo, scutello parvo, triangulo, elytris rigidis, fornicatis longitudine abdominis, pedibus elongatis, cursoriis, femoribus saepius clavatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

- Schaeff. Icon. tab. 68. fig. 1. Elem. tab. 76.  
fig. 4.
- Habitat in Europae truncis.  
Elytra in altero sexu pallida.
3. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, *fennicum*.  
antennis mediocribus.
- Cerambyx fennicus. Linn. Syst. nat. 2. 636. 77.  
Fn. Sv. 664.
- Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 9.
- Leptura atra. Geoff. Inf. 1. 219. 19,
- Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.
- Herbst Arch. tab. 26. fig. 8.
- Habitat in Europae truncis.
4. C. thorace subcylindrico spinoso rufo nigra ely- *ruficollis*.  
tris violaceis, antennis mediocribus piceis.
- Saperda ruficollis. Mant. Inf. 1. 150. 36.
- Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 27.
- Habitat in Italia Dr. Allioni.
- Caput nigrum antennis mediocribus piceis. Tho-  
rax hirtus, rufus. Pedes nigri femoribus sub-  
clavatis.
5. C. thorace tuberculato nigrum elytris violaceis. *ebulinum*.
- Cerambyx ebulinus. Linn. Syst. nat. 627. 83.
- Habitat in Africæ plantis Dom. Vahl.
- Antennæ mediocres, ferrugineæ articulo primo  
crassiori, nigro. Corpus nigrum. Elytra laevia,  
violacea, nitida. Femora clavata.
6. C. fuscum thorace elytrisque viridi aeneis, femori- *aeneum*.  
bus ferrugineis.
- Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 46.
- Habitat in India Mus. Dr. Hunter.
- Antennæ nigrae. Thorax absque tuberculis pu-  
bescens, aeneus. Elytra pubescentia, nitida.  
Corpus nigrum. Pedes nigri femoribus subcom-  
pressis, rufis geniculis tamen nigris.

- clavipes.* 7. *C. nigrum opacum femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus.*  
*Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 33.*  
*Herbst. Arch. tab. 26. fig. 9.*  
*Habitat in Germania Dom. de Hattorff.*  
*Femora omnia valde clavata.*
- spinofusum.* 8. *C. thorace spinoso nudo atrum antennis brevibus.*  
*Habitat in Hungaria Dom. Hybner.*  
*Magnitudo & statura omnino praecedentis. Antennae nigrae. Caput canaliculatum. Thorax planus, nudus, laevis, ater, immaculatus utrinque spina acuta. Elytra laevia, glabra, atra. Pedes nigri femoribus crassis, at haud clavatis.*
- violaceum.* 9. *C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis brevibus.*  
*Cerambyx violaceus. Linn. Syst. nat. 2. 635.*  
*70. Fn. Sv. 667.*  
*Frish. Inf. 12. tab. 3.*  
*Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 2.*  
*Herbst Arch. tab. 26. fig. 10.*  
*Habitat in Europae Sylvis.*
- femoratum.* 10. *C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus.*  
*Cerambyx femoratus. Linn. Syst. nat. 2. 634. 69.*  
*Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 77.*  
*Schaeff. Icon. tab. 55. fig. 7.*  
*Degeer Inf. 5. 93. 81.*  
*Habitat in Germaniae nemoribus.*
- fulcratum.* 11. *C. thorace nudo nitido, corpore atro, femoribus rufis, antennis mediocribus.*  
*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*  
*Statura & summa affinitas praecedentis. Dif- fert tamen paullo major thorace nitido ely-*

trisquam substriatis. Femora omnia compressa,  
rufa.

12. C. pubescens cyaneum pedibus rufis: femori- *amethysti-*  
*bus clava atra. num.*

Habitat in America boreali Prof. Helwig.

Corpus parvum, pubescens, cyaneum, nitidum.

Antennae breves, nigrae, basi rufae. Pedes  
ferruginei femoribus omnibus clavatis: clava  
magna atra.

13. C. thorace pubescente atrum elytris fasciis dua- *2 fasciatum*  
*bus rufis.*

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 42.

Habitat in America meridionali Dom. Banks.

Antennae mediocres articulis apice bispinosis.

Thorax bituberculatus. Pedes nigri femoribus  
subclavatis.

Variat interdum loco fasciae posticae macula  
marginali rubra.

14. C. thorace verrucoso nigricante, elytris acumi- *acumina-*  
*natis viridibus: futura cyanea. tum.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Lee.

Caput fuscum. Antennae mediocres, fuscae ar-  
ticulis apice spinosis. Thorax rotundatus, niger  
tuberculis plurimis, elevatis. Elytra viridia,  
nitida futura cyanea, apice acute acuminata.

Pedes nigri femoribus clavatis: clava rubra.

15. C. thorace verrucoso nigrum elytris testaceis: *ruficulum.*  
macula media apiceque nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 49.

Habitat in Russia Dom. Lee.

Caput nigrum antennis mediocribus. Pedes mu-  
tici, nigri.

16. C. thorace glabro, corpore fusco aeneo, anten- *variabile.*  
nis pedibusque fuscis.



*Callidum ungaricum.* Herbst Arch. tab. 26.  
fig. 12.

*Cerambyx variabilis.* Linn. Syst. nat. 2. 635. 75.  
Fn. Sv. 669.

Degeer Inf. 5. 89. 25.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 354.

Frish. Inf. 12. tab. 6. fig. 3. 4.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 12.

Habitat in Europae nemoribus.

- sericeum.* 17. C. thorace holofericeo cinereo, elytris testaceis: punctis elevatis rubris, scutello niveo.  
*Callidium holosericeum.* Ross. Fn. Etr. 1. 153.  
382. tab. 1. fig. 6.  
Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 38.  
Habitat in Barbaria Dom. Vahl.  
Antennae mediocres, sericeae. Corpus totum cinereo holofericeum elytris magis testaceis: punctis plurimis sparsis, elevatis, rufis.

- tenebrosum.* 18. C. thorace tuberculato obscure rufo: linea dorsali nigra, elytris depresso-cinerascentibus: lineis duabus elevatis atris.  
Oliv. Inf. 67. tab. 18. fig. 139.  
Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.  
Corpus parvum, nigrum, cinereo subtus nitidulum. Antennae mediocres, nigrae. Thorax obscure rufus linea dorsali nigra. Elytra depresso-cinerascentia futura lineisque duabus abbreviatis, atris. Pedes elongati atri femoribus subclavatis.

- ruficatum.* 19. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis brevibus. Linn. Syst. nat. 2. 634. 67. Fn. Sv. 666.  
Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 39.  
Schaeff. Icon. tab. 63. fig. 6.

- Sulz. Inf. tab. 4. fig. 29.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 13. fig. 1.  
 Habitat in Europae sylvis.
20. C. thorace rotundato nudo, elytris ferrugineis: *vittatum*.  
*vitta media nigra, antennis corpore longioribus.*  
 Habitat in Guinea Dom. Isert.  
 Statura & magnitudo praecedentis. Antennae corpore longiores, ferrugineae articulo secundo longiori, incurvo, apice subspinoso. Caput obscure ferrugineum. Thorax rotundatus, inermis, niger dorso obscure ferrugineo. Elytra plana, ferruginea: *vitta nigra*. Corpus obscurum. Femora clavata.
21. C. thorace nudo nigrum elytris striatis fuscis, *agreste*.  
*antennis brevibus.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Duplo minus C. rustico & elytra striata, fusca.
22. C. thorace punctato, corpore atro, elytris laevibus: *stigma*.  
 Cerambyx stigma. Linn. Syst. nat. 2. 625. 72.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 21.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 25. fig. 134. 135.  
 Degeer Inf. 5. 109. 22. tab. 14. fig. 13.  
 Habitat in America.
23. C. thorace hirto fuscum antennarum articulis *fugax*.  
*basi rufis.*  
 Callidium fugax. Oliv. Inf. 70. tab. fig.  
 Habitat in Gallo provincia Mus. Dom. Olivièr.  
 Corpus parvum, totum hirtum, fuscum. Antennae corpore breviores articulis basi rufis, apice fuscis. Femora clavata. Tibiae testaceae.
24. C. thorace nudo, corpore fusco, antennis longis *pygmaeum*.  
*flavescentibus.*  
 Saperda minuta. Mant. Inf. 1. 150. 39.

- Habitat in Italia, Anglia.
- equeſtre.* Antennae corpore longiores, flavae. Pedes femoribus clavatis.
25. C. thorace mutico nudo atrum nitidum coleopteris fascia interrupta rubra.
- Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.
- Antennae compressae, nigrae, mediocres. Corpus glabrum, laeve, atrum elytris fascia media rufa, quae tamen suturam haud attingit.
- fulvicolle.* 26. C. thorace mutico fulvo nigrum antennis longissimis.
- Habitat Surinami Mus. Dom. Bosc.
- Parvum. Antennae corpore fere duplo longiores. Caput porrectum, in medio parum angustatum. Thorax rotundatus, laevis, rufus. Elytra obsolete scabra.
- hirtum.* 27. C. thorace rotundato hirto, elytris acuminatis pallide testaceis.
- Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 62.
- Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.
- Antennae compressae, mediocres, nigrae, apice piceae. Thorax cinereo hirtus. Elytra glabra, pallide testacea, basi obscuriora, apice acuminata. Pedes nigri.
- pubescens.* 28. C. thorace rotundato pubescente testaceo, elytris virescentibus basi testaceis.
- Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 75.
- Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Olivier.
- Statura & magnitudo omnino C. testacei. Antennae mediocres, testaceae. Caput nigricans. Thorax depresso, pubescens, testaceus. Corpus pubescens, testaceum pedibus nigris.
- barbatum.* 29. C. thorace rotundato subtus utrinque macula tomentosa ferruginea, antennis longis barbatis.
- Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 41.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

Antennae corpore longiores, nigrae, tomento ferrugineo barbatae. Ad latera pectoris utrinque macula ocellaris e tomento ferrugineo.

Corpus nigrum.

30. C. thorace rotundato pubescente, corpore *griseum*. obscure cinereo, antennis brevibus.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura omnino C. barbati paullo tamen minus.

Antennae testaceae, cinereo villosae, corpore breviores. Caput obscurum. Thorax rotundatus, vix tuberculatus, obscurus, cinereo pubescens. Elytra cinereo pubescentia, dilutiora.

Pedes subtestacei.

31. C. thorace laevi obscure nigrum antennis longis compressis pedibusque testaceis, femoribus compressis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 44.

Habitat in Siam. Mus. Dom. Banks.

Caput, thorax, elytra, corpus laevia, obscura, nigra. Abdomen testaceum. Pedes omnes testacei femoribus valde compressis.

32. C. thoracis dorso glabro atro: lineis quatuor *variegatum*. albis, elytris flavo irroratis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 58.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae mediocres, nigrae: articulis ultimis duobus ferrugineis. Caput nigrum: lineis duabus strigaque transversali albidis. Thorax lateribus flavo irroratis. Elytra lineolis tribus subelevatis atra atomis flavescentibus numerosissimis. Abdomen atrum utrinque punctis flavis. Pedes nigricantes femoribus elongatis, posticis annulo albo.

33. C. thorace lineis duabus elytris quatuor albis: *lineatum*. mediis coeuntibus abbreviatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 50.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae breves, fuscae articulo primo ferrugineo. Caput nigrum lineis duabus albis. Labium albicans lineis tribus nigris. Oculi sinu albicante impressi. Scutellum albidum. Elytra obtusa, ferruginea linea impressa, villoso alba ad marginem exteriorem, duabus in medio ante apicem coeuntibus, & quarta suturali. Abdomen albidum, medio nigrum. Pedes ferruginei geniculis nigris.

*fulcatum.* 34. C. thorace tomentoso cinereo, elytris albo nigroque striatis.

Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 48.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Antennae breves, fuscae. Caput cinereum linea frontis elevata, glabra, atra. Thorax villis cinereis tectus. Elytra sulcata lineis elevatis glabris, atris, sulcis quatuor villosis albis. Pedes grisei.

*sanguineum* 35. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis, antennis mediocribus.

Cerambyx sanguineus. Linn. Syst. nat. 2. 636. 80.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 1.

Geoff. Inf. 1. 220. 21.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 1.

Habitat in Europae sylvis.

*testaceum.* 36. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis.

Cerambyx testaceus. Linn. Syst. nat. 2. 635.

75. Fn. Sv. 670. Geoff. Inf. 1. 218. 18.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 11.

Schaeff. Icon. tab. 64. fig. 6.

Habitat in Europae sylvis.

Elytra paullo pallidiora.

37. C. thorace subtuberculato ferrugineo, elytris *pilicorne*, testaceis, antennis mediocribus villosis, femoribus clavatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr. Isert.

Medium. Antennae mediocres, villosae, testaceae. Caput & thorax ferruginea. Elytra glabra, laevia, testacea. Pedes testacei femoribus valde clavatis.

38. C. thorace subtuberculato testaceum elytris *praeustum*. apice violaceis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Forte mera varietas C. testacei. Antennae mediocres, apice fuscae. Femora clavata.

39. C. thorace tuberculato villoso nigrum elytris *ligneum*. rubris: macula apiceque violaceis.

Habitat — — — Dr. Schulz.

Corpus nigrum. Antennae mediocres. Thorax planus, villosus, niger tuberculis elevatis, glabris. Elytra rufa macula media apiceque violaceis. Pedes nigri femoribus compressis.

40. C. thorace rotundato pubescente ferrugineum, *flavipes*. pedibus testaceis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

Parvum. Antennae corpore paullo longiores ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax rotundatus, cinereo pubescens, subtuberculatus, ferrugineus. Elytra paullo pallidiora. Pedes omnes testacei femoribus parum incrassatis.

41. C. thorace subtuberculato nudo nigrum elytris *luridum*. laevibus testaceis.

Cerambyx luridus. Linn. Syst. nat. 2. 634. 68.

Oliv. Inf. 70. tab. 7. fig. 78.

Habitat in Europae sylvis.

- fuscum.* 42. C. thorace subtuberculato canaliculato nudo nigrum elytris striatis obscurae testaceis, antennis mediocribus.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Antennae fuscae. Pedes nigri femoribus brevibus, crassis, compressis.
- maculatum.* 43. C. thorace villoso fuscum elytris maculis duabus ferrugineis, antennis longioribus.  
 Habitat in Insula Guadalupe Dom. de Badier.  
 Corpus parvum, obscurum. Antennae corpore longiores, subferrugineae, basi fuscae. Caput & thorax villosa, fusca. Elytra fusca maculis duabus ferrugineis: altera ante medium, altera ante apicem, linearis. Pedes obscure ferruginei femoribus clavatis.
- striata.* 44. C. thorace subtuberculato nudo, elytris substriatis, corpore lurido immaculato.  
 Callidium arvense. Panz. Naturf. 24. 30. 21. tab. 1. fig. 41.  
 Habitat in Saxoniae Quercu Dom. Hybner.  
 Triplo minus C. rustico & elytra magis striata.
- raucum.* 45. C. thorace laevi obscure ferrugineo, elytris testaceis.  
 Habitat in Africa aequinoctiali Mus. D. Banks.  
 Antennae mediocres, ferrugineae. Caput & thorax plana, laevia, obscure ferruginea. Elytra glabra, laevia, testacea. Abdomen conicum, testaceum.
- hafniense.* 46. C. thorace subvilloso nigro: lineis quatuor albis; intermediis abbreviatis, antennis brevibus.  
 Cerambyx liciatus. Linn. Syst. nat. 2. 636. 78.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 8.  
 Panz Naturf. 24. tab. 1. fig. 38.

Habitat Hafniae.

Affine praecedenti at thorax nitidus & elytra  
haud striata.

47. C. thorace laevi nitido, elytris violaceis, tibiis *rufipes*.  
rufis, antennis brevibus.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 66.

Habitat in Germania Dom. de Hattorff.

Antennae fuscae basi ferrugineae. Caput & tho-  
rax laevia, violacea, nitida. Abdomen aeneum.  
Pedes violacei tibiis rufis. Femora postica cla-  
vata basi rufa.

48. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris stria- *striatum*.  
tis, antennis brevibus.

Cerambyx striatus. Linn. Syst. nat. 2. 635.

73. Fn. Sv. 668;

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 24.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 13.

Degeer Inf. 5. 90. 26.

Habitat in Europae sylvis.

49. C. thorace glabro flavescente, capite elytrisque *bicolor*.  
virescentibus, antennis mediocribus nigris.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 4.

Habitat in America meridionali.

Praecedentibus paullo minus. Thorax planus,  
laevis, flavus. Elytra laevia, viridia. Pedes  
nigri.

50. C. thorace rotundato subspinoso villoso nigrum *lynceum*.  
elytris macula subdidyma fulva.

Cerambyx lynceus. Oliv. Inf. 67. tab. 12. fig. 97.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Yeats.

Thorax utrinque spina parva armatus. Elytra  
versus basin macula magna fulva, interne di-  
dyma.

51. C. thorace tuberculato spinosoque rufum pectore *Salicis*.  
elytrisque nigris.

*Rhagium etruscum.* Ross. Fn. Etr. I. 149. 373.  
tab. I. fig.

*Stenocorus ruficollis.* Herbst Arch. tab. 25.  
fig. 13.

Habitat in Lipsiae salicibus Dom. Zschuck.  
Antennae breves, rufae. Thorax tuberculis duo.  
bus dorsalibus spinaque utrinque acuta. Ely-  
tra vix striata, nigra. Abdomen & pedes rufa.  
Faemina elytris testaceis, immaculatis.

*cyaneum.* 52. C. thorace plano tuberculato villosum violaceum  
abdominis penultimo segmento ferrugineo, an-  
tennis mediocribus.

Habitat in Italia.

Corpus parvum, totum villosum. Antennae me-  
diocres, nigrae. Thorax planus tuberculisti-  
bus elevatis. Elytra laevia, violacea. Pedes  
nigri, femoribus clavatis.

*puffillum.* 53. C. thorace rotundato nigrum antennis tibiisque  
testaceis.

Habitat in Germania Dom. Schneider.  
Antennae corpore longiores, testaceae. Pedes  
femoribus clavatis, nigris tibiis testaceis.

*macula-  
tum.* 54. C. thorace rotundato villoso fuscum elytris  
maculis duabus ferrugineis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 61.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Antennae mediocres. Corpus villosum, fuscum,  
obscurum. Macula altera elytrorum in medio,  
altera ad apicem. Femora subclavata.

*flavum.* 55. C. thorace subrotundo, corpore flavo, femori-  
bus clavatis, antennis mediocribus.

Habitat in America Mus. Tottianum.

Antennae flavae. Oculi nigri. Femora omnia  
valde clavata.

56. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis *undatum*.  
 undatis duabus albis, antennis brevibus.  
*Cerambyx undatus*. Linn. Syst. nat. 2. 636. 79.  
 Fn. Sv. 675.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 36.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig 87.  
 Degeer Inf. 5. 91. 28.  
 Habitat in Europae truncis.
57. C. thorace rotundato, elytris lividis: fasciis *colonum*.  
 tribus fuscis, antennis brevibus.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 67.  
 Habitat in Carolina.  
*Thorax ferrugineo fuscus*. Elytra truncata, li-  
 vida, fasciis tribus fuscis, quarum ultima vix  
 futuram attingit.
58. C. thorace rotundato rufo, elytris nigris basi *varium*.  
 rufis: fasciis duabus albis.  
 Oliv. Inf. 71. tab. 5. fig. 55.  
 Habitat in America boreali Dom. Yeats.  
*Antennae mediocres, nigrae*. Caput rufum. Ely-  
 tra laevia basi rufa: fasciis duabus albis. Pe-  
 des nigri femoribus clavatis, rufis. Abdomen  
 atrum.
59. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris fasciis *flexuosum*.  
 septem flavis: anticus anterius posticus re-  
 trorsum arcuatis.  
*Leptura Robiniae* Forst. Cent. 1. 43.  
*Leptura picta*. Drury Inf. 1. tab. 41. fig. 2.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 76.  
 Voet. Coleopt. tab. 91. fig. 91.  
 Habitat in Americae Robinia.  
*Antennae & pedes ferruginea*. Caput nigrum  
 fasciis tribus flavis. Thorax niger etiam fasciis  
 tribus flavis, semicircularibus.

- minutum.* 60. *C. testaceum* elytris fascia abbreviata alba.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 56.  
 Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae mediocres: articulo primo testaceo,  
 reliquis basi albis, apice nigris. Caput testa-  
 ceum oculis fuscis. Elytra ante medium fascia  
 alba, quae suturam haud attingit. Pedes testa-  
 cei femoribus valde clavatis basi albis.
- florale.* 61. *C. thorace globoſo albo fasciato,* elytris nigris:  
 fasciis quinque albis; secunda tertiaque lu-  
 natis.  
*Callidium fasciatum.* Herbst Arch. tab. 26. fig. 17.  
*Cerambyx floralis.* Pall. Iter. 2. 724. 63.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 53.  
 Voet. Coleopt. 2. tab. 19. fig. 93.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Corpus nigrum antennis ferrugineis. Thorax  
 niger fasciis duabus albis. Elytrorum fascia  
 prima baseos, quinta apicis.
- fulminans.* 62. *C. thorace globoſo maculato,* elytris nigris:  
 fasciis undato angulatis albis.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 63.  
 Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks.  
 Antennae breves, cinereae. Thorax cinereus:  
 maculis tribus atris; inter media majori. Scu-  
 tellum nigrum margine cinereo. Corpus  
 fuscum.
- atomarium.* 63. *C. thorace globoſo cinereo maculato,* elytris  
 punctis strigaque postica flexuosa albidis.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Corpus magnum, nigrum. Antennae nigrae.  
 Caput nigrum lineis duabus albidis. Thorax  
 niger lineis duabus anticis, punctis duobus  
 dorsalibus lateribusque cinereis. Elytra nigra  
 basi punctis albidis & versus apicem striga-

- undata albida. Apex albicat. Subtus nigrum segmentorum margine albido. Pedes nigri.
64. C. thorace rotundato, elytris fasciis quatuor *arcuatum*.  
flavis: prima interrupta, reliquis retrorsum arcuatis.  
Leptura arcuata. Linn. Syst. nat. 2. 640. 21.  
Fn. Sv. 696.  
Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 16.  
Herbst Arch. tab. 26. fig. 14.  
Geoff. Inf. 1. 2. 12. 10.  
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 6. tab. 107. fig. 2. 3.  
Habitat in Europae hortis.  
Callidium lunatum. Mant. Inf. 1. 155. 47. hujus inera varietas.
65. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: fasciis *arietis*.  
flavis; secunda antrorsum arcuata, pedibus totis ferrugineis.  
Leptura arietis. Linn. Syst. nat. 2. 640. 23.  
Fn. Sv. 695.  
Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 20.  
Geoff. Inf. 1. 214. II.  
Herbst Arch. tab. 26. fig. 15.  
Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 7. tab. 107. fig. 3.  
Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 6.  
Frish. Inf. 12. tab. 3. fig. 5.  
Habitat in Europae hortis.  
Thorax antice posticeque flavus, at in medio interruptus. Antennae & pedes omnes ferruginei. Fascia elytrorum secunda cum scutello ad suturam coit.
66. C. thorace rotundato nigro, elytris nigris: *Gazella*,  
fasciis flavis; secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis: femoribus nigris.  
Habitat Kiliae.

Nimis affinis C. arietis & forte mera varietas.  
Antennae basi ferrugineae, apice nigrae. Thorax niger margine antico & postico haud interrupsis flavis. Elytra simillima, at fascia secunda haud uti in C. arietis ad suturam antice dilatata cum scutello fere juncta. Femora nigra.

*plebejum.* 67. C. thorace globoso immaculato, elytris nigris: strigis tribus punctoque humerali albis.

Callidium pallidum. Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 72.  
Leptura rustica. Linn. Syst. nat. 2. 639. 17.  
Fn. Sv. 692.

Geoff. Inf. 1. 215. 12.

Petiv. Gazoph. tab. 63. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Europae nemoribus.

Punctum humerale magnum striga arcuata inclusa. Pectus albo maculatum.

*massiliense.* 68. C. thorace globoso immaculato, elytris nigris: strigis tribus albis; anteriore incurva.

Leptura Massiliensis. Linn. Syst. nat. 2. 640. 19.

Geoff. Inf. 1. 215. 12.

Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 70.

Habitat in Germania.

Affine C. plebejo at duplo minus. Caput, antennae, thorax nigra. Elytra nigra strigis tribus absque puncto humerali. Corporis latera albo maculata. Pedes nigri.

*mucronatum.* 69. C. thorace rotundato maculato, elytris mucronatis nigris: strigis tribus arcuatis flavis basi ferrugineis.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 34.

Habitat in America Dr. Solander.

Caput fuscum lineis duabus flavis. Antennae breves, ferrugineae, apice fuscae. Thorax striga antica flava & utrinque macula ferruginea.

Scutellum fuscum margine flavo. Elytra basi ferruginea, dein fasciae tres flavae, quarum anterior antrorsum, posteriores retrorsum arcuatae.

70. C. thorace rotundato muricato, elytris mucronatis: *angulatum*.  
maculis tribus dorsalibus puncto que medio flavis.

Habitat — — Mus. Britann.

Medium. Caput fuscum maxillis antennisque testaceis. Thorax lineolis parvis, transversis, elevatis muricatus, obscure testaceus margine omni flavo. Elytra laevia, testacea maculis tribus dorsalibus, communibus, flavis & inter 1.  
2. in medio punctum parvum. Corpus rufescens maculis lateralibus albis.

71. C. thorace rotundato subspinoso, elytris bidentatis fuscis: strigis quatuor flavis, femoribus phralum.  
clavatis compressis.

Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 60.

Habitat in America Dr. Solander.

C. mucronato duplo minus. Caput, thorax, antennae obscure ferruginea. Thorax tuberculis aliquot dorsalibus, elevatis, acutis. Elytra nigra strigis quatuor rectis, flavis, apice bidentata. Pedes ferruginei femoribus clavatis, compressis.

72. C. thorace rotundato flavo fasciato, elytris nigris: fasciis quinque flavis, pedibus ferrugineis.

Leptura detrita. Linn. Syst. nat. 2. 646, 20.

Fn. Sv. 694.

Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 38. fig. 9. tab. 64. fig. 3.

Geoff. Inf. 1. 216. 13.

Habitat in Europae hortis.

- glaucum.* 73. C. thorace rotundato nigrum elytris glauceis basi nigro maculatis.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 68.  
 Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
 Corpus nigrum pube glaucescente.
- 6fasciatum* 74. C. atrum thorace fasciis duabus, elytris quatuor flavis.  
 Habitat Mus. Britann.  
 Caput nigrum lineis duabus longitudinalibus albis. Thorax potius flavus fascia lata media nigra. Elytra glabra, laevia : fasciis quatuor 1. 2. ad suturam coeuntibus. Corpus atrum albo maculatum.
- trifascia-* 75. C. thorace globoso ferrugineo, elytris nigris: *tum.* fasciis tribus albis; prima annulari.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 5. fig. 59.  
 Habitat in Lusitania Dr. Grey.  
 Caput atrum antennis rufis. Thorax rufus tomento cinereo. Abdomen subtus annulis albis.
- Verbasci.* 76. C. thorace rotundato nigro trimaculato, elytris rotundatis subvirescentibus : fasciis tribus abbreviatis nigris; prima lunari.  
 Leptura verbasci. Linn. Syst. nat. 2. 640. 22.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 5. tab. 6. fig. 15.  
 Sulz. Hist. tab. 5. fig. 12.  
 Herbst Arch. tab. 26. fig. 19.  
 Habitat in Europae australioris Verbasco.
- ornatum.* 77. C. thorace rotundato: fascia nigra, elytris virescentibus: fasciis tribus integris nigris; prima annulari.  
 Callidium ornatum. Herbst Arch. tab. 26. fig. 16.  
 Stenocorus duplex Scop. Fl. Inf. tab. 20. fig. 5.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minus. C. verbasci. Differt tantum fascia thoracis fasciisque elytrorum marginem futuramque attingentibus.

78. C. thorace rotundato virescens elytris punctatis 4 punctatum quatuor.

Leptura Geoff. Inf. 213. 8.

Habitat in Gallia haud infrequens.

Medium. Caput fuscum antennis brevibus. Thorax pubescens, immaculatus. Elytra punctatis quatuor 2. 1. 1. Corpus cinereo tomentosum.

79. C. thorace rotundato nigro maculato, elytris annulare. bidentatis subvirescentibus: fasciis tribus nigris; prima annulari.

Callidium annulare. Oliv. Inf. 70. tab. 6. fig. 74.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks in India Mus. Dom. Lund.

Antennae breves, nigrae. Caput virescens ore nigro. Thorax macula dorsali ramosa nigra. Elytra virescentia basi annulo magno, in medio lunula & postice fascia nigris, apice bidentata. Pedes cinerei.

80. C. thorace rotundato ferrugineo, elytris cinerascens aegyptiaribus: fasciis tribus fuscis; prima annulari.

Habitat in Oriente Dom. Prof. Forstahl.

Duplo minus C. verbasci & thorax ferrugineus.

81. C. thorace rotundato, elytris fuscis: fasciis mysticum, apiceque cinereis basi rufis.

Leptura mystica. Linn. Syst. nat. 2. 639. 18.

Fn. Sv. 693.

Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 14.

Geoff. Inf. 1. 217. 15.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 9.

Voet Coleopt. 2. tab. 26. fig. 8.

Habitat in Europae hortis.

- virens.* Variat elytris apice spinosis basique minus rufis  
 82. C. thorace rotundato virescens antennis nigris,  
 pedibus testaceis.  
 Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.  
 Statura & magnitudo praecedentium. Antennae  
 nigricantes. Corpus totum tomentosum, vi-  
 rescens.
- gibbosum.* 83. C. thorace rotundato nigrum elytris cinereo  
 fasciatis basi bituberculatis apice acuminata.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 2. fig. 18.  
 Habitat in Italia Dom. Daldorf.  
 Antennae mediocres, subferrugineae. Elytra  
 fascia lata ante medium apiceque cinereis.  
 Tubercula duo baseos elevata, compressa &  
 apice margo exterior excurrit in spinam va-  
 lidam.
- unifascia-* 84. C. thorace rotundato brunneo, elytris nigris:  
*tum.* fascia media nivea basi brunneis.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 1. fig. 12.  
 Habitat in Gallo Provincia Dom. Olivier.  
 Parva. Antennae mediocres. Caput & thorax  
 brunnea. Elytra basi brunnea, in medio fascia  
 nivea, quae tamen suturam vixattingit, apice  
 nigra. Abdomen nigrum. Femora clavata.
- picipes.* 85. C. thorace globoso atrum elytris striga obli-  
 qua alba.  
 Oliv. Inf. 70. tab. 4. fig. 43.  
 Habitat — — Mus. Dr. Hunter.  
 Antennae mediocres, piceae. Elytra laevia, in  
 medio striga abbreviata, obliqua, alba. Pedes  
 picei femoribus clavatis nigris.
- Alni.* 86. C. thorace rotundato nigrum elytris fasciis  
 duabus albis, elytrorum basi antennis tibiis-  
 que ferrugineis.

**Leptura Alni.** Linn. Syst. nat. 2. 689. 19.

Oliv. Inf. 70. tab. 3. fig. 7.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 21.

Scopol. Fn. Inf. tab. 20. fig. 3.

Habitat in Europa, Anglia.

Quadruplo minus C. mystico.

## 90. LEPTURA. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata, apice  
setosa.

*Labium* membranaceum,  
bifidum.

*Antennae* setaceae.

1. *L. nigra* elytris rufis: puncto medio nigro. *unipunctata*

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 9.

Habitat Dresdae Dom. Romanus.

Elytra sola rufa puncto medio nigro. Pedes nigri.

2. *L. atra* elytris rubris: apice suturaque media *haflata*.  
nigra.

Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 5.

Geoff. Inf. 1. 226. 6.

Sulz. Inf. tab. 5. fig. 11.

Habitat in Europa australiori.

Elytra in omnibus rubra & sutura a medio ad  
apicem nigra, versus apicem tamen color niger

Lepturae corpus oblongum antice posticeque at-  
tenuatum, saepius tomentosum, immarginatum, tar-  
dum, capite exerto, ovato, oculis globosis, promi-  
nulis, marginalibus, antennis thorace longioribus,  
approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundato,  
angusto, antice angustiore, inermi, scutello parvo,  
triangulo, elytris rigidis, fornicatis, saepe emarginati,  
longitudine abdominalis, pedibus longiusculis,  
cursoriis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

angustatus. Abdominis segmenta margine villis argenteis splendent.

Mas minor abdomine magis rufescente.

- 2 punctata.* 3. L. nigra villosa elytris lividis: futura puncto medio apiceque nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus nigrum tomento cinereo villosum. Elytra livida, rarius testacea futura, puncto medio apiceque nigris. Elytra apice rotundata.

- tomentosa.* 4. L. thorace villoso aureo, elytris testaceis apice nigris. Geoff. Ins. 1. 227. 8.

Habitat in Gallia Mus. Dom. de Sehestedt.

Differre videtur a L. melanura major. Caput cum antennis nigrum. Thorax tomento aureo tectus. Elytra laevia, testacea, apice subemarginata, nigra. Corpus nigrum abdome argento villoso, ano emarginato. Pedes atri.

- melanura.* 5. L. nigra elytris rubescens lividis: futura apiceque nigris. Linn. Syst. nat. 2. 637. 2.

Fn. Sv. 671. Geoff. Ins. 1. 226. 7. tab. 4. fig. 1.

Petiv. Gazoph. tab. 30. fig. 5.

Degeer Ins. 5. 137. 14.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 4.

Habitat in Europae floribus frequens.

- laevis.* 6. L. nigra elytris pedibusque lividis, elytris futura apiceque nigris.

Habitat Kiliae.

Affinis certe videtur praecedenti at alia & minor.

Antennae nigrae articulo primo apice livido.

Caput & thorax nigra, villosa. Corpus nigrum, argento nitidulum. Pedes lividi.

- livida.* 7. L. nigra elytris testaceis immaculatis, pedibus nigris.

Herbst Arch. tab. 26. fig. 23.

Habitat in floribus Kiloniensibus Mus. D. Lund.

- Statura omnino L. melanurae. Elytra apice rotundata, haud emarginata. Pedes nigri.
8. L. nigra elytris testaceis: vitta nigricante. *strigilata.*  
Habitat in Suecia Dom. Com. de Souza.  
Parva. Caput, antennae, thorax, corpus nigra.  
Elytra subemarginata, testacea: taenia obsoleta, nigra. Pedes nigri.
9. L. atra elytris purpureis apice emarginatis nigra. *emarginata*  
gris.  
Habitat Cajennae Dr. Hunter.  
Corpus atrum, immaculatum. Elytra subholosericea, purpurea, apice late emarginata, atra.  
Abdomen atrum segmentis basi argento nitentibus, apice bidentatum.
10. L. nigra elytris sanguineis. Linn. Syst. nat. 2. *sanguinolenta.*  
638. 4. Sv. 679.  
Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 13.  
Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 9.  
Habitat in Europae floribus.  
Mas elytris testaceis apice nigris.  
Variat elytrorum margine nigro.
11. L. thorace subspinoso, elytris fastigiatis, pectore *meridiana.*  
nitente.  
Cerambyx meridianus. Linn. Syst. nat. 2. 630.  
47. Fn. Sv. 648.  
Stenocorus meridianus. Mant. Inf. 1. 143. 1.  
Schaeff. Icon. tab. 82. fig. 4. tab. 279. fig. 3.  
Habitat in Europae floribus.  
Mas nigricans, faemina testacea.  
Larva pedibus longissimis Raj.
12. L. ferruginea antennis elytris pectoreque fuscis. *villica.*  
Schaeff. Icon. tab. 69. fig. 1.  
Habitat in Anglia Mus. Britann.  
Antennae nigrae articulo primo rufo. Caput rufum oculis nigris. Thorax rufus angulis

posticis acutis. Abdomen & pedes ferruginea.

- rubra.* 13. L. nigra thorace elytris tibiisque purpureis.  
 Linn. Syst. nat. 2. 638. 3. Fn. Sv. 500.  
 Frish. Inf. 12. tab. 3. tab. 6. fig. 6.  
 Sulz. Inf. tab. 5. fig. 30.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 2.  
 Habitat in Europa.

- testacea.* 14. L. nigra elytris testaceis, tibiis rufis, thorace politice rotundato. Linn. Syst. nat. 2. 638. 5.  
 Fn. Sv. 680.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 3.  
 Habitat in Europae floribus.  
 Mas praecedentis, saepius copula junctae inventiuntur.

- pubescens.* 15. L. nigra cinereo villosa: costa alarum basi testacea.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Affinis L. testaceae. Corpus totum nigrum, cinereo villosum sola costa alarum basi testacea.

- virens.* 16. L. sericeo virescens antennis fusco viridiisque variis. Linn. Syst. nat. 2. 638. 7. Fn. Sv. 682.  
 Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 111.  
 Panz. Naturf. 24. 31. 42. tab. 1. fig. 42.  
 Degeer Inf. 5. 131. 6.  
 Habitat in Europae arboribus.

- smaragdula* 17. L. sericeo virescens antennis pedibusque nigris.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Differt manifeste a praecedente. Corpus duplo minus, sericeo virescens antennis pedibusque totis nigris.

- atra.* 18. L. corpore toto nigro. Geoff. Inf. 1. 228. 10.  
 Oliv. Inf. 73. tab. 1. fig. 4.  
 Habitat in Europae floribus.

- Tota nigra. Abdomen serico albo nitet.  
 Variat pedibus nigris & testaceis.
- 19.** L. nigra humeris abdomineque ferrugineis. *humeralis.*  
 Habitat in Germania Dom. Schneider.  
 Statura L. 4. guttatae at duplo fere major. Pedes nigri.
- 20.** L. nigra elytris puncto baseos lineaque media exclamafavis. *exclamationis.*  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Parva, Caput & thorax atra, nitida, immaculata.  
 Elytra truncata, nigra puncto baseos lineolaque media lunata flavis. Abdomen argento villosum. Pedes nigri.
- 21.** L. cinerea elytris testaceis: sutura nigra. *futuralis.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner:  
 Antennae testaceae, apice nigrae. Caput, thorax, abdomen cinereo villosa. Elytra laevia, testacea futura sola atra, Pedes rufi geniculis nigris.
- 22.** L. nigra scutello albo. *scutellata.*  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Corpus nigrum solo scutello albo aut fulvo.  
 Elytra apice emarginata. Abdomen serico albo nitet.
- 23.** L. ferruginea elytris testaceis. *lurida.*  
 Habitat in sylvis Hercinia Dom. Helwig.  
 Praecedentibus minor, Caput & thorax rufa, immaculata. Elytra testacea. Corpus rufum femoribus apice nigris.
- 24.** L. nigra femoribus basi rufis. *femorata.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Caput, thorax, elytra, corpus nigricantia, minime nitida. Pedes nigri femoribus basi rufis. Tibiae anticae etiam rufae.  
 Variat pedibus omnibus nigris femorum annulotantum rufo.

- ruficornis.* 25. L. nigra antennis pedibusque rufis.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Corpus nigrum, pube flavescente sericeum. Antennae & pedes rufae femoribus posticis apice nigris.  
 Variat femoribus omnibus apice nigris.
- marginata.* 26. L. nigra elytrorum in margine tibiisque posticis rufis.  
 Habitat in Norwegia Mus. Dom. Lund.  
 Corpus totum nigrum, obscurum solo margine elytrorum tibiisque posticis rufis.
- nigra.* 27. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, ab domine rubro. Linn. Syst. nat. 2. 639. 14.  
 Fn. Sv. 687.  
 Stenocorus niger nitidus abdomine rubro. Geoff.  
 Inf. 1. 227. 9.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 7.  
 Degeer Inf. 5. 144. 24.  
 Habitat in Europae floribus.
- praeusta.* 28. L. aureo pubescens capite elytrorumque apicibus nigris.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Antennarum primus articulus ferrugineus. Thorax, elytra, pectus, abdomen tomento aureo tecta. Pedes rubri.
- 4 guttata.* 29. L. fusca elytris nigris: punctis duobus baseos ferrugineis.  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Thorax cinereo pubescens. Femora basi ferruginea.
- rostrata.* 30. L. obscure aenea pedibus flavis.  
 Habitat in Ammi majus Africae Dom. Vahl.  
 Caput obscure aeneum ore porrecto cylindrico.  
 Antennae obscurae basi flavescentes. Thorax

& elytra laevia, obscure aenea. Pedes omnes flavi.

31. L. lutea thorace lineis duabus, elytris fasciis *luteicornis*.  
quatuor nigris.

Habitat in Carolina Mus. Britann.

Caput cum antennis luteum. Thorax antice attenuatus. Pedes flavi femoribus posticis annulo nigro.

32. L. nigra elytris testaceis: maculis duabus nigris. 4 *maculata*.

Oliv. Inf. 73. tab. I. fig. 7.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino L. 8 maculatae, at duplo fere major. Corpus totum nigrum, minime nitidum elytris solis testaceis maculis duabus magnis nigris. Pedes nigri.

33. L. nigra elytris maculis duabus remotis ferrugineis. 4 *pustulata*.

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Macula elytrorum altera ad basin, ubi adhuc puncta duo minuta, marginalia, altera versus apicem fere fasciam constituens. Abdomen auro sericeum.

34. L. nigra elytris lividis: maculis quatuor nigris. 8 *maculata*.

Linn. Syst. nat. 2. 633. Fn. Sv. 684.

Schaeff. Elem. tab. 118. 2. Icon tab. I. fig. 7.

Habitat in Europae floribus.

35. L. nigra elytris flavis: linea longitudinali arcuata *interrogationis*.  
maculisque quatuor marginalibus nigris. Linn. *tionis*.

Fn. Sv. 685.

Habitat in Suecia Mus. Dom. de Souza.

Statura omnino praecedentis. Linea longitudinalis elytrorum ad futuram, maculae ad marginem exteriorem. Maculae I. 3. interdum linea arcuata connexae.

*marginella.* 36. L. nigricans elytris futura maculis duabus marginalibus apiceque flavis.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & summa affinitas praecedentis. Caput & thorax nigra tomento cinereo rario ri tecta. Elytra glabra, nigra futura, maculis duabus marginalibus apiceque flavis. In apice punctum nigrum.

*maculata.* 37. L. nigra elytris testaceis: fasciis tribus dentatis nigris; anteriore subinterrupta. Linn. Syst. nat. 2. 638. 11. Fn. Sv. 686.

Schaeff. Icon. tab. 6. fig. 9.

Deger Inf. 5. 133. 9.

Habitat in Europae hortis.

*punctata.* 38. L. nigrathorace testaceo: puncto nigro, coleoptris testaceis: punctis septem.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Corpus parvum, tenue uti L. rostratae. Antennae nigrae. Caput nigrum macula magna, frontali, testacea. Thorax testaceus puncto medio nigro. Coleoptra laevia puncto antico in medio, communi, tunc duobus paribus ultimisque apicis. Corpus nigrum abdomine testaceo. Pedes nigri.

*maculata* 39. L. nigra elytris flavis: maculis sex nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Paullo major L. sex maculata. Corpus totum nigrum. Elytra laevia, glabra, flava maculis sex nigris 1 ad scutellum 2 ad marginem extiore 3 ad marginem interiorem major, oblonga, 4 ad marginem extiore, 5 in medio & 6 ad apicem. Pedes nigri.

*attenuata.* 40. L. elytris attenuatis: fasciis quatuor nigris, pedibus testaceis. Linn. Syst. nat. 2. 639. 13. Fn. Sv. 688.

Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 6.

Habitat in Europae floribus.

Abdomen rufum, apice nigrum. Variat tamen abdomine toto nigro.

41. L. nigra coleoptris attenuatis flavis: fasciis *calcarata*.  
quatuor nigris; anteriore punctata, secunda  
interrupta, tibiis posticis bidentatis.

Geoff. Inf. I. 226. I.

Habitat in Germania Dom. Smidt, in America.

Statura & magnitudo L. attenuatae. Antennae nigrae articulis basi flavis. Thorax subspinosis. Coleoptra flava fascia anteriore e punctis quinque: intermedio in sutura, secunda in medio interrupta, ultimis duabus integris. Pedes quatuor antici flavi tarsis nigris, postici nigri tibiis flavis, ante apicem interne bidentatis. Femora postica basi flava.

42. L. nigra coleoptris testaceis: fasciis quatuor ni- *subspinosa*.  
gris; anteriore punctata, antennis pedibusque  
flavis.

Leptura armata. Herbst. Arch. tab. 26. fig. 24.

Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis at omnino distincta. Antennae flavae articulis apice parum nigris. Caput nigrum fascia frontali fulva. Thorax subspinosis, niger. Coleoptera emarginata, testacea fasciis quatuor: prima e punctis quinque, ultimis tribus integris. Pedes flavi femoribus posticis apice nigris. Corpus nigrum, auro nitidulum abdominalis segmentis tribus flavis.

43. L. nigra elytris maculis duabus punctisque duobus flavis. *sinuata*.

Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentium.  
 Antennae nigrae articulis basi flavis. Elytra  
 laevia, nigra macula baseos magna, medio in-  
 teriori sinuata, flava, secunda in medio adhuc  
 majore, marginem exteriorem attingente, ad fu-  
 turam dilatata. Puncta praeterea duo flava,  
 altera versus apicem maculae secundae, altera  
 in medio elytrorum versus apicem. Corpus  
 nigrum abdomine segmentis tribus flavis. Pe-  
 des flavi femoribus posticis apice nigris.

*4fasciata.* 44. L. nigra elytris testaceis: fasciis quatuor den-  
 tatis nigris. Linn. Syst. nat. 2. 639. 12. Fn.  
 Sv. 687.

Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 59. fig. 6.

Degeer Inf. 5. 132. 8. tab. 4. fig. 11.

Habitat in Europae floribus.

*aurulenta.* 45. L. atra thoracis margine antico posticoque au-  
 reis, elytris testaceis: fasciis quatuor simpli-  
 cibus nigris.

Habitat Kiliae.

Nimis affinis L. 4 fasciatae paullo minor. Thorax  
 niger margine antico & postico villis aureis  
 ciliato. Elytra laevia, testacea fasciis quatuor  
 haud dentatis, atris, apice emarginata. Corpus  
 atrum abdominis segmentis margine albis. Pe-  
 des picei femoribus basi nigris.

*dubia.* 46. L. nigra subvillosa elytris testaceis nigro pun-  
 ctatis, pedibus nigris.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum.  
 Elytra glabra, testacea antice punctis tribus  
 parvis: intermedio anteriore, in medio pun-  
 cto majusculo & versus apicem altero paullo  
 minore. Pedes nigri.

47. L. nigra elytris maculis tribus flavis. *sexguttata.*  
 Herbst Arch. tab. 26. fig. 25.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
 Elytrorum macula anterior baseos ad suturam,  
 reliquae duae in medio.
48. L. atra elytris fasciis tribus flavis: anteriore *trifasciata*,  
 interrupta.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 10.  
 Habitat in Suecia Dom. Lund.  
 Statura praecedentium. Antennae cinerascentes,  
 basi nigrae. Caput & thorax atra. Elytra ni-  
 gra fasciis tribus, anteriore e punctis duobus  
 constante, secunda dentem antrorsum emittente,  
 tertia lunata. Pedes nigri.
49. L. viridi coerulea elytris subfastigiatis. Linn. *sericea.*  
 Syft. nat. 2. 638. 8. Fn. Sv. 683.  
 Schaeff. Icon. tab. 84. fig. 1.  
 Habitat in Europae floribus.
50. L. thorace orbiculato, corpore toto atro nitido. *Morio.*  
 Habitat in Suecia Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Statura omnino L. collaris ideoque omnino a  
 L. atra distincta. Differt in primis thorace or-  
 biculato, gibbo.
51. L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris *collaris.*  
 nigris. Linn. Syft. nat. 2. 639. 16. Fn. Sv. 691.  
 Geoff. Inf. 1. 228. 11.  
 Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 9.  
 Degeer Inf. 5. 143. 22.  
 Habitat in Europae floribus.
52. L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdo- *virginea,*  
 mine rufo. Linn. Syft. n. 2. 639. 15. Fn. Sv. 690.  
 Oliv. Inf. 73. tab. 2. fig. 24.  
 Schaeff. Icon. tab. 58. fig. 8.  
 Degeer Inf. 5. 144. 23.  
 Habitat in Europae floribus.

9 i. NECYDALIS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum, late emarginatum.

*Antennae* filiformes.

*thalasina*. 1. N. thorace canaliculato, corpore viridi, pedibus nigris.

Habitat Kiliae.

Duplo major N. viridissima. Thorax utrinque gibbus, in medio canaliculatus. Corpus totum viridi aeneum, haud nitidum pedibus omnibus nigris.

*viridissima*. 2. N. thorace teretiusculo, corpore viridi, pedibus anticis testaceis.

*Cantharis* viridissima. Linn. Syst. nat. 2. 650, 23.

Fn. Sv. 717.

*Cicindela* viridi coerulea. Geoff. Inf. 1. 177. 14.

Degeer Inf. 5. 15. 4. tab. 1. fig. 13.

Habitat in Europae hortis frequens.

*coerulescens* 3. N. thorace teretiusculo, corpore coeruleo subopaco.

*Cantharis* coerulea. Linn. Syst. nat. 2. 650. 22.

Fn. Sv. 716.

*Telephorus* villosus violaceo coeruleus, antennis pedibusque nigris. Degeer Inf. 4. 76. 8.

Necydalis corpus oblongum, angustum, tomentosum, immarginatum, agile, capite ovato, inserto, oculis globosis, prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundate: dorso inaequali, scutello brevi, rotundato, elytris rigidis, attenuatis, incumbentibus, longitudine abdominis, pedibus longioribus, tenuibus, femoribus posticis saepius clavatis; tarsis anticis quinque posticis quadriarticulatis, colore vario.

Habitat in Europa cum praecedente.

4. N. thorace inaequali, corpore virescenti obscuro, *virescens*.  
antennis pedibusque nigris.

*Cantharis virescens* thorace teretiusculo, corpore virescenti fusco, femoribus posticis clavatis. Linn. Syst. nat. 2. 650. 24.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura omnino N. thalasinae at paullo minor.

Caput virescens, obscure nitidum antennis nigris. Thorax utrinque impressus. Elytra obscuriora lineis duabus elevatis: interiore abbreviata. Pedes nigri femoribus posticis in altero sexu clavatis, in altero simplicibus.

5. N. thorace ovato cyanea antennis pedibusque *cyanea*.  
nigris.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino praecedentis. Caput cyaneum antennis nigris. Thorax ovatus, planus, vix utrinque impressus, laevis, cyaneus, nitidus. Elytra aequalia, laevia, cyanea, immaculata. Corpus cyaneum pedibus nigris, femoribus cyaneis.

6. N. thorace teretiusculo rufo, corpore fusco. *sanguinicolli*.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Caput cum antennis fuscum. Thorax punctis duobus impressis. Elytra lineis tribus elevatis striata, fusca.

Variat femoribus posticis incrassatis.

7. N. thorace inaequali virescens elytris apice pe- *barbara*.  
dibusque flavescentibus.

Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.

Statura praecedentium. Differt tantum elytris apice flavescentibus. Pedes flavi femoribus posticis nigris, in altero sexu incrassatis.

- seladonia.* 8. N. thorace inaequali, corpore viridi nitidulo, elytris apice incrassatis coeruleis.  
 Habitat Kiliae.  
 Paullo minor N. virescente. Caput viride ore atro, nitido. Antennae nigrae. Thorax inaequalis, viridis, nitidulus. Elytra virescentia lineis tribus elevatis, apice subcraqsioribus, coeruleis. Corpus virescens. Pedes nigri femoribus viridibus.
- ruficollis.* 9. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi aeneis.  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Statura N. coerulescentis. Caput viride, nitidum antennis nigris. Thorax teretiusculus, rufus, nitidus, immaculatus. Elytra viridia. Abdomen rufum. Pedes nigri.
- trifinis.* 10. N. nigra thorace teretiusculo femorumque basi rufis.  
 Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.  
 Caput atrum. Elytra laevia, nigra. Corpus nigrum femoribus basi rufis.
- atra.* 11. N. elytris subulatis atra femoribus omnibus clavatis. Linn. Syst. nat. 2. 64. 65.  
 Habitat in Europa Australiori.  
 Segmentorum abdominis margo subtus ad latera albus. Alter sexus femoribus simplicibus.
- humeralis.* 12. N. elytris subulatis nigris basi flavis.  
 Cantharis humeralis. Oliv. Inf. tab. fig.  
 Cantharis nigra, elytris attenuatis antice flavis.  
 Geoff. Inf. 1. 342. 2.  
 Necydalis muralis. Forst. nov. sp. Cont. 1. 48. 48.  
 Habitat in Anglia.  
 Corpus nigrum. Elytra absque lineis aut margine elevatis. Pedes simplices nigri.
- ustulata.* 13. N. nigra elytris basi suturaque late testaceis.

Necydalis ustulata. Herbst Arch.

Habitat in Germaniae plantis.

Statura omnino praecedentis.

14. N. nigra thorace elytrisque testaceis: his apice *melanura*.  
nigris.

Habitat in Hispaniae plantis Dom. Vahl.

Corpus nigrum thorace elytrisque testaceis.

Elytra apice nigra.

15. N. capite thoraceque ferrugineis, elytris testa- *notata*.  
ceis apice nigris.

Habitat in Germania Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino N. melanurae.

Caput ferrugineum. Antennae mihi defunt.

Thorax subangulatus, ferrugineus, immacula-  
tus. Elytra testacea apice nigra. Abdomen  
nigrum. Pedes ferruginei.

16. N. atra thorace anoque fulvis, elytris subcoeru- *fulvicollis*.  
lescentibus.

Habitat in Germania Mus. Dom. Lund.

Paullo major N. melanura. Caput atrum anten-  
nis nigris. Thorax sublaevis, rufus, nitidus,  
immaculatus. Corpus nigrum ano rufo. Pedes  
nigri.

17. N. elytris subulatis nigra femoribus omnibus *rufa*,  
clavatis, elytris antennisque rufis. Linn. Syst.  
nat. 2. 642. 6.

Leptura nigra elytris pedibusque rubescens  
lividis, coleoptris attenuatis. Geoff. Inf. 1.  
220. 22.

Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 8.

Habitat in Europa.

Elytra basi puncto nigro. Scutellum album.  
Thorax basi apiceque albus. Abdomen maculis  
lateralibus albis.

- praeusta.* 18. N. atra elytris testaceis apice nigris, femoribus omnibus clavatis.  
 Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.  
 Statura omnino praecedentis, a quo tamen differt magnitudine minore, antennis nigris, thorace toto nigro, elytris apice nigris. Abdomen atrum maculis lateralibus supra albis.  
 Pedes mox nigri, mox testacei.
- coerulea.* 19. N. elytris subulatis coerulea femoribus posticis clavatis arcuatis.  
 Necydalis coerulea. Linn. Syst. nat. 2. 642. 4.  
 Cantharis viridi coerulea. Geoff. Inf. 1. 342. 3.  
 Necydalis ceramboides. Forster nov. sp. Cent. I. 47.  
 Sulz. Hist. Inf. 48. tab. 6. fig. 2.  
 Schaeff. Icon. tab. 94. fig. 7.  
 Habitat in Oriente, Europa australiori.  
 Variat pedibus simplicibus.
- Podagra-* 20. N. elytris subulatis testaceis, corpore nigro, femoribus posticis clavatis basi testaceis. Linn.  
*riae.* Syst. nat. 2. 642. 9.  
 Cantharis nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis. Geoff. Inf. 1. 343. 4.  
 Necydalis flavescens. Degeer Inf. 5. 155. 4.  
 Necydalis flavescens. Linn. Syst. nat. 2. 642. 8.  
 vix distincta videtur.  
 Habitat in Europae hortis.
- bicolor.* 21. N. coerulescens thoracis margine abdomine pedibusque testaceis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.  
 Antennae obscurae. Thorax rufus linea dorsali lata, coerulescente. Elytra vix striata, coerulecentia, immaculata. Abdomen testaceum. Pedes testacei femoribus posticis valde clavatis.

- 22.** N. nigra elytris attenuatis virescentibus, femori- *flavipes*.  
bus posticis incrassatis arcuatis.

Habitat Kiliae.

Praecedentibus duplo minor. Caput nigrum, im-  
maculatum. Thorax utrinque impressus, viridi  
niger, nitidulus. Elytra virescentia, obscura  
linea elevata sesquialtera. Corpus nigrum.  
Pedes nigri tibiis anticis femoribusque posti-  
cis clavatis, arcuatis.

- 23.** N. nigra thorace elytrisque testaceis, pedibus rufis. *testacea*.

Habitat in Germania.

Statura omnino praecedentium. Caput fuscum  
antennis nigris. Thorax planus, testaceus,  
immaculatus. Elytra attenuata, paullo palli-  
diora. Corpus nigrum pedibus rufis.

- 24.** N. elytris subulatis glaucis, corpore nigro, abdo- *glaucescen-*  
*minis* incisuris albis.

Necydalis glaucescens. Linn. Syst. nat. 2. 642. 7.

Schaeff. Icon. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

- 25.** N. elytris subulatis testaceis, pedibus simplici- *simplex*.  
bus. Linn. Syst. nat. 2. 643. 10.

Habitat in Europa.

Forte varietas sexus N. Podagrariae.

- 26.** N. elytris subulatis, abdomine pedibusque fla- *Quercus*.  
vescentibus.

Habitat in Daniae Quercu Mus. Dom. Lund.

Minuta. Antennae nigrae articulo primo flavo.  
Caput nigrum ore flavo. Thorax niger, im-  
maculatus. Elytra fusca. Abdomen & pedes  
flava.

92. MOLORCHUS. *Palpi* quatuor inaequales, filiformes.

*Maxilla* membranacea, bifida.

*Labium* membranaceum, bifidum.

*Antennae* setaceae.

*abbreviata.* 1. M. elytris dimidiatis ferrugineis immaculatis, antennis brevibus

Necydalis major. Linn. Syst. nat. 2. 641. 1.

Leptura abbreviata. Mant. Inf. 1. 100. 35.

Musca cerambyx major. Schaeff. Monogr. 1753.  
fig. 12. Elem. tab. 13. fig. 2. Icon. tab. 10.  
fig. 10. 11.

Degeer Inf. 5. 148. 1. tab. 5. fig. 1.

Habitat in Europae floribus.

Genus affine certe Lepturis maxilla bifida tamen distinctum. Palpi quatuor breves, inaequales, incurvi anteriores paullo longiores, quadriarticulati: articulo ultimo ovato, obtuso adhaerentes maxillae dorso, posteriores breviores: articulo ultimo ovato, obtuso adnati labii basi exteriori. Mandibula cornea, arcuata, edentula. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis

Molorchi corpus oblongum, angustatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, declivi, inserto, oculis reniformibus, vix prominulis, marginalibus, antennis thorace longioribus, approximatis, inter oculos insertis, thorace rotundato, angusto: dorso canaliculato, elytris rigidis, fornicatis, abbreviatis, alis plicatis, abdomine incumbentibus, fere longitudine abdominis, abdomine elongato, margine utrinque reflexo, pedibus longiusculis, femoribus clavatis, tarsis quadriarticulatis, colore testaceo.

subaequalibus. Labium breve, membranaceum, bifidum: laciniis rotundatis.

2. M. elytris abbreviatis, abdomine atro: fasciis *variegata*. fulvis.

Leptura variegata. Mant. Inf. 1. 108. 30.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae fuscae longitudine corporis. Caput atrum fronte flavescente. Thorax niger margine antico & postico lineaque dorsali fulvis. Scutellum fulvum. Elytra fusca, ad suturam grisea, apice nigra. Pectus atrum, fulvo maculatum. Abdomen atrum supra fascia baseos, pone hanc subtus fascia, versus apicem annulus totum abdomen cingens, pone hunc fascia dorsalis & tandem anus puncto fulvo terminatus. Pedes ferruginei plantis fuscis.

3. M. elytris dimidiatis testaceis apice lineola alba, *dimidiata*. antennis longis.

Leptura dimidata. Mant. Inf. 1. 100. 37.

Necydalis minor. Linn. Syst. nat. 2. 641. 2.

Fn. Sv. 837.

Musca cerambyx minor. Schaeff. Mon. 1753.

fig. 6. 7. Icon. tab. 95. fig. 5.

Sulz. Inf. tab. 7. fig. 51.

Degeer Inf. 5. 151. 2.

Habitat in Europae hortis.

4. M. elytris dimidiatis testaceis immaculatis, anten- *umbellata-*  
nis longis. *rum.*

Leptura umbellatarum. Mant. Inf. 1. 100. 38.

Necydalis umbellatarum. Linn. Syst. nat. 2.

641. 3.

Schaeff. Icon. tab. 95. fig. 4.

Sulz. Hist. Inf. tab. 6. fig. 1.

Habitat in Germaniae umbellatis.

Praecedente duplo minor.

93. SPONDYLIS. *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla conica, crassa,*  
*integra.*

*Labium corneum, bifidum.*

*Antennae moniliformes.*

*buprestoides.* 1. Spondylis.

*Attelabus buprestoides.* Linn. Syst. nat. 2. 621. 3.

Frish. Inf. 13. 23. tab. 19.

Degeer Inf. 5. 34. 21. tab. 5. fig. 21.

Habitat in Europa sylvis.

94. SYNODENDRON. *Palpi* filiformes, inaequales.

*Maxilla unidentata.*

*Labium filiforme, corneum,*  
apice palpigerum.

*Antennae lamellatae.*

*cylindricum.* 1. S. thorace antice truncato quinque dentato, capitis cornu erecto.

*Scarabaeus cylindricus.* Mant. Inf. 1. 6. 41.

Linn. Syst. nat. 2. 544. II. Fn. Sv. 380.

Oliv. Inf. 1. 3. 47. 54. tab. 9. fig. 80.

Degeer Inf. 4. tab. 10. fig. 2.

Voet. Scarab. tab. 20. fig. 131.

*Lucanus cylindricus* Laichart Inf. 4. 4.

*Lucanus tenebroides.* Scop. Intr. Hist. nat. 5. 75.  
Habitat in Pruni Cerasi truncis Europae borealis.  
*Faemina mutica.*

2. *S. thorace muricato gibbo, elytris ante apicem muricatum.*  
bispinosis.

*Dermestes muricatus niger* elytris postice retusis  
dentatis, thorace muricato. Linn. Syst. nat. 2.  
562. 6.

*Dermestes bidentatus.* Mant. Inf. 1. 37. 8.

Oliv. Inf. 77. tab. 1. fig. 1.

Ross. Fn. Etr. 1. 38. 92.

Habitat in Europae australioris, Africæ lignis.

Elytra obscure testacea, postice retusa denticulo  
elongato, hamato, nigro ad futuram & alio mi-  
nori ad marginem. Antennæ lamellatae, testa-  
ceæ.

3. *S. elytris integris nigris, thorace antice scabro.* *capucinus.*

*Bostrichus capucinus.* Mant. Inf. 33. 5.

Habitat in Coromandel Koenig. Mus. Banks.

Praecedente duplo minus. Corpus nigrum. Tho-  
rax antice denticulis elevatis, numerosis. Elytra  
laevia, apice retusa.

4. *S. laeve nigrum obscurum elytris striatis, pedi-* *Domini-*  
*bus piceis.* *cum.*

Habitat in America meridionali Dom. Pflug.

*Synodendron* corpus cylindricum, glabrum, immar-  
ginatum, antice posticeque obtusum, tardum, capite  
parvo, ovato, plano, oculis, parvis, rotundatis, mar-  
ginalibus, antennis brevibus, reflexis, sub oculis in-  
fertis, thorace gibbo, antice truncato, muricato aut  
inaequali, scutello parvo, triangulari, elytris rigidis,  
fornicatis, abdomen includentibus, apice faepius re-  
tus, dentatis, pedibus brevibus, validis, tibiis an-  
ticis dentatis, tarsis quinquearticulatis, colore ob-  
scuro.

Parvum. Caput atrum, nitidum, sub thorace inflexum. Thorax niger, obscurus, antice prominens, laevis. Elytra integra, striata, nigra, obscura. Pedes picei.

95. APATE. *Palpi* filiformes, aequales.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* membranaceum,  
truncatum.

*Antennae* perfoliatae.

*muricatus.* 1. A. elytris reticulatis postice retusis dentatis, thorace muricato gibbo.

Ligniperda terebrans. Pall. specil. Zol. 9. tab. 1.  
fig. 3.

Habitat in Americae meridionalis sacharo.

Corpus magnum, cylindricum elytris reticulatis.

*cornutus.* 2. A. thorace antice utrinque ultra caput porrecto ferrato hirto.

Bostriechus cornutus. Oliv. Inf. 77. tab. 1. fig. 5.  
Habitat in Madagascar Mus. Dom. Olivier.

Caput parvum, planum. Thorax utrinque ultra caput protensus, ferratus, hirsutie ferruginea tectus. Elytra striata: striis punctatis.

*hamatus.* 3. A. elytris ante apicem unispinosis, thoracis margine antico bihamato dentato.

Habitat in Saxoniae lignis Prof. Lefke.

Apate corpus cylindricum, subtomentosum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, infexo, oculis globosis, parvis, marginalibus, antennis distantibus, brevibus, suboculis insertis, thorace rotundato, gibbo, antice saepius muricato, scutello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis longitudo abdominis, pedibus brevibus, validis, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

**Minor A. muricato.** Caput fuscum ore pubescente, ferrugineo. Thorax rotundatus, antice subtus scaber margine antico utrinque hamo valido, denticulato, capitis basin tegente. Elytra punctata, fusca ante apicem dente valido, porrecto, obtuso.

4. **A. elytris obtusis, thorace gibbo truncato.** *Monachus.*  
Ligniperda cornuta. Pall. spicil. Zool. 9. 8. tab. I.  
fig. 4.

Habitat in Americae Insulis.

**Minor A. muricato.** Caput atrum fronte pilis densis, elongatis, rufis. Thorax globosus, truncatus antice ad latera denticulis brevibus, elevatis, numerosis. Elytra obtusa, integra. Abdomen piceum.

5. **A. elytris integris variolosis, thorace antice *Jesuita.* truncato.**

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae, apice ferrugineae. Thorax rotundatus, antice denticulis pluriinis, elevatis, acutis muricatus. Elytra punctis latioribus striata basique puncto elevato, gibbo.

6. **A. elytris retusis cylindricus ater femoribus anticus incrassatis.** *femoralis.*

Habitat in Insula St. Crux Americae Mus. D. Lund.

Statura & magnitudo omnino A. Jesuita. Corpus totum cylindricum, atrum, nitidum. Caput & thorax punctata antennis perfoliatis, flavescens tibus. Elytra laevissima, nitida, postice retusa margine prominulo. Pedes breves, obscure ferruginei. Femora antica crassa, compressa, subtus emarginata, apice dilatata, rotundata. Tibiae basi sinuatae, angustatae, apice unguiculatae.

Varietas minor an distincta antennarum clava crassiori elytrisque punctatis.

- capucinus.* 7. A. niger elytris abdomineque rufis, thorace emarginato retuso.  
*Bostrichus capucinus.* Mant. Inf. 1. 36. 1.  
*Dermestes capucinus.* Linn. Syst. nat. 2. 562. 5.  
 Fn. Sv. 416.  
*Bostrichus.* Geoff. Inf. 1. 302. 1. tab 5. fig. 1.  
 Schaeff. Elem. tab. 28. Icon. tab. 189. fig. 1.  
 Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 5.  
 Roff. Fn. Etr. 36. 87.  
 Habitat in Europae truncis emortuis.
- maculatus* 8. A. thorace gibbo scabro : utrinque macula postica alba nigro punctata, elytris postice unispinosis.  
*Bostrichus bimaculatus.* Oliv. Inf. 77. tab. 2.  
 fig. 14.  
 Habitat in Gallo provincia Mus. Olivier.  
*Medius.* Thorax gibbus, muricatus, niger macula magna, postica, alba punctis duobus nigris.  
 Elytra reticulata, nigra, ante apicem spina magna, elevata, obtusa.
- sinuatus.* 9. A. thorace gibbo muricato, elytris apice retusis sinuatis.  
 Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
 Minor praecedente. Antennae perfoliatae, flavae. Thorax elevatus, niger, nitidus, antice muricatus. Elytra obscuriora, apice retusa, sinu magno erosa.
- tridens.* 10. A. elytris retusis dentatis piceus thorace antice gibbo dentato.  
 Habitat in Insula St. Thomas Americae D. de Sehestedt.  
 Statura & summa affinitas praecedentium. Caput parvum, sub thorace inflexum antennis flavescientibus, uti videtur, perfoliatis. Thorax piceus, antice gibbus denticulis plurimis, recur-

vis. Elytra laevia, picea, postice retusa denticulis tribus.

11. A. ater thorace gibbo antice scabro, tibiis testaceis. *dispar.*

Habitat in Germaniae truncis Dom. Daldorf.

Praecedentibus minor. Thorax gibbus, scaber, subvillosum. Elytra striata, integra. Pedes nigri tibiis testaceis.

Mas duplo minor thorace planiore.

12. A. niger thorace testaceo: punctis duobus linearibus signatus. neolaque media nigris, elytris pallidis: linea postica nigra.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Duplo minor A. capucino. Thorax villosum, testaceus lineola media, abbreviata punctoque utrinque nigro. Elytra punctato striata lineola postica, abbreviata, nigra. Sutura nigra.

13. A. ater elytris integris pallidis: margine omni limbatus. nigro.

*Dermetes domesticus.* Linn. Synt. nat. 2. 643.

13. Fn. Sv. 424.

*Bostrichus limbatus.* Herbst Arch. tab. 20. fig. II.

Habitat Kiliae sub cortice Fagi. Daldorf.

Parvus. Thorax gibbus, ferrugineo hirtus.

14. A. ater laevis nitidus elytris laevissimis, pedibus piceis. *volvulus.*

Habitat in Gallia.

Parvus, omnino cylindricus. Antennae perforatae. Elytra atra, nitida, laevissima.

15. A. niger elytris integris piceis, thorace antice minutus. scabro.

Habitat in nova Zelandia Mus. Banks.

Minutus. Antennae perfoliatae, slavecentes.

Thorax rotundatus, gibbus, antice niger, punctis elevatis scaber. Elytra integerrima, laevia, testacea. Pedes testacei.

96. BOSTRICHUS. *Maxilla cornea.*

*Labium cylindricum,  
integrum, apice pal-  
pigerum.*

*Antennae clava fo-  
lida.*

*flavicornis.* 1. B. rufus elytris nigris apice spinoso dentatis,  
antennis flavis.

Habitat in America boreali.

Medius, totus cylindricus. Caput nigricans an-  
tennis flavis, clava compressa. Thorax cylin-  
dricus. Elytra substriata, apice vix retusa, den-  
ticulata: denticulo postico elongato in spinam  
validam, acutissimam. Pedes uti corpus subtus  
brunnei.

*cylindrus.* 2. B. cylindricus ater elytris striatis apice villosis  
dentatis, pedibus compressis testaceis.

Habitat in Germaniae Quercu D. Helwig.

Statura praecedentis cylindrica. Caput fere retu-  
sum, nigrum antennis flavis, clava magna,  
compressa, solida. Thorax ater, immaculatus.  
Elytra striata, nigra, apice parum retusa, rufo  
villosa denticulis brevibus. Pedes breves, com-  
pressi, testacei.

Bostrichi corpus parvum, cylindricum, tomento-  
sum, immarginatum, utrinque obtusum, tardum,  
capite parvo, rotundato, recondito, oculis rotundatis,  
marginalibus, antennis brevibus, distantibus, sub  
antennis insertis, thorace rotundato, cylindrico, scu-  
tello parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicatis, lon-  
gitudine abdominis, pedibus brevibus, pallidis, tarsis  
quadriarticulatis, colore obscuro, plerumque nigro.

3. *B. testaceus pilosus elytris striatis retusis praemorso dentatis.* *typographus.*  
*Dermestes typographus.* Linn. Syst. nat. 2. 562.  
 7. Fn. Sv. 418.  
 Degeer Inf. 4. tab. 6. fig. 1. 2.  
 Sulz. Inf. tab. 2. fig. 4  
 Act. Holm. 14. 163.  
 Schaeff. Icon. tab. 259. fig. 3.  
 Habitat intra cortices arborum labyrinthos daedaleos pulvere repletos formans. Variat colore & magnitudine.
4. *B. niger elytris retusis praemorso dentatis, pedibus piceis.* *Laricis.*  
 Habitat sub cortice Pini Laricis Germaniae Dom. Helwig.  
 Affinis praecedenti at distinctus & alias magis glaber, totus niger pedibus solis piceis.
5. *B. ater elytris praemorso dentatis rufis.* *chalcographus.*  
*Dermestes chalcographus.* Linn. Syst. nat. 2. 562. *phus.*  
 8. Fn. Sv. 417.  
 Habitat intra arborum cortices.  
 Triplo minor B. Typographo.  
 Variat colore. Vidi nigros & testaceos, vix tamen distinctos.
6. *B. nigricans elytris glaucis obtusiusculis.* *polygraphus.*  
*Dermestes polygraphus.* Linn. Syst. nat. 2. 562. *phus.*  
 10. Fn. Sv. 420.  
 Herbst Arch. tab. 20. fig. 9.  
 Habitat in Europa sub arborum corticibus.
7. *B. nigricans thorace rufo, elytris apice retuso monodentatis.* *monographus.*  
 Habitat in Germaniae arboribus Dom. Knoch.  
 Parvus. Corpus cylindricum, obscurum sive nigricans, nitidum, subvillosum. Thorax rufus,

immaculatus. Elytra parum retusa dentibus minutis. Pedes rufescentes.

- micrographus.* 8. B. ferruginens elytris integris testaceis.  
Dermestes micrographus. Linn. Syst. nat. 2.

562. 11.

Habitat in Europae ligno.

Parvus. Frons tomento argenteo. Elytra testacea.

- Scolytus.* 9. B. glaber nigricans elytris truncatis integris, abdomine retuso, fronte villoso cinerascente.  
Scolytus. Geoff. Inf. 1. 350. 1. tab. 5. fig. 5.  
Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 13.  
Schaeff. Icon. tab. 112. fig.  
Habitat in Angliae Ulmos Dom. Lee.  
Caput & thorax laevissima, atra, nitida longitudine elytrorum. Elytra striata, picea, apice truncata, integra, abdomine paullo longiora.  
Abdomen valde retusum, nigrum.

- crenatus.* 10. B. glaber ater elytris integris crenato striatis.  
Habitat in Germania Dom. Schneider.  
Affinis B. scolyto, at distinctus. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra integra, picea, crenato striata. Pedes picei.

- oleiperda.* 11. B. villosus fuscus elytris striatis griseis, pedibus testaceis.  
Habitat in Gallia meridionali Oleam destruens Mus. Dom. Bosc.  
Parvus. Caput & thorax villosa, fusca. Elytra striata, grisea. Pedes testacei.

- Oleae.* 12. B. villosus griseus antennarum clava elongata.  
Habitat in Galliae meridionalis Olea Mus. Dom. Bosc.  
Parvus, cylindricus, totus griseus, distinctus antennarum clava elongata, cylindrica, flavescente.

13. B. ater nitidus elytris integris rufis, abdomine *pygmaeus*.  
retuso.  
Habitat Halaes Saxonum Dom. Hybner.  
Statura omnino B. scolyti, at triplo minor &  
elytra rufa.
14. B. villosus nigricans tibiis quatuor posticis *ligniperda*.  
ferratis.  
Habitat in Germaniae ligno Dom. Hybner.  
Paullo major B. piniperda. Caput nigricans an-  
tennis testaceis. Thorax, elytra, abdomen  
villoso, nigricantia. Elytra striata, apice subre-  
tusa. Pedes breves, validi, testacei tibiis qua-  
tuor posticis ferratis.
15. B. villosus niger elytris laevibus piceis. *abietinus*.  
Habitat in Germaniae Abiete Dom. Smidt.  
Duplo major B. piniperda. Corpus totum villo-  
sum, nigrum elytris solis testaceis, nullo modo  
striatis.
16. B. villosus piceus pedibus testaceis. *villosus*.  
Habitat in Germaniae arboribus Dom. Helwig.  
Duplo minor B. ligniperda. Corpus totum pi-  
ceum, pilis rufescensibus hirtum. Elytra stria-  
ta, integra. Pedes testacei.
17. B. subvillosus niger elytris crenato striatis, *piniperda*.  
plantis rufis.  
Dermetes piniperda. Linn. Syst. nat. 2. 562. 9.  
Fn. Sv. 421.  
Degeer Inf. 4. tab. 6. fig. 8. 9.  
Habitat in ramulis Pini inferioribus, quos per-  
forat, exsiccat, destruit.
18. B. glaber testaceus elytris laevibus longitudine *testaceus*.  
abdominis.  
Habitat in Pini truncis Dom. Zschuck.  
Corpus oblongum, testaceum, immaculatum. Va-  
riat rarius corpore nigricante.

- pubescens.* 19. B. villosus niger antennis pedibusque flavescentibus, fronte villosa.  
 Habitat in Germaniae ligno Dom. Helwig.  
 Minor B. piniperda. Caput nigrum fronte cinerreo villosa. Thorax & elytra pubescentia, integra, nigra. Antennae & pedes flavescentes.
- ater.* 20. B. glaber ater nitidus elytris laevibus, pedibus piceis.  
*Ips cylindrica.* Oliv. Inf. 2. 18. 9. 10. tab. 2. fig. 16.  
 Habitat in Sueciae ligno D. de Paykull.  
 Statura cylindrica praecedentium. Corpus totum atrum, glabrum, nitidum pedibus solis piceis. Elytra laevissima.
- melenocephalus.* 21. B. villosus griseus capite nigro, pedibus flavescentibus.  
 Habitat in Daniae ligno Dom. Lund.  
 Parvus. Caput nigrum, immaculatum. Thorax & elytra grisea interdum litura aut punctis nigris. Pedes flavescentes.
- vittatus.* 22. B. subvillosus fuscus elytris vitta abbreviata cinerea.  
 Habitat in Holsatiae ligno Dom. Daldorff.  
 Minutus. Caput nigrum. Thorax fuscus, immaculatus. Elytra fusca vitta a basi usque ad medium suturae ducta cinerea.
- minutus.* 23. B. elytris integris glaber ater immaculatus.  
 Habitat Kiloniae in Boleto versicolore.  
 Corpus minimum, atrum, glabrum, immaculatum. Antennae clava solida, obtusa. Elytra laetitia, glabra, integra. Pedes nigri.
- bidens.* 24. B. fuscus elytris apice retusis ante apicem unidentatis.  
 Habitat in Kiliae ligno.  
 Minutus. Corpus totum fuscum, distinctum elytrorum dente uno, porrecto ante apicem. Pedes testacei.

97. BRUCHUS. *Palpi aequales, filiformes.*

*Maxilla membranacea,*  
bifida.

*Labium acuminatum.*

*Antennae filiformes.*

1. *B. griseus thorace elytrisque spinosis.* *spinosus.*

Habitat in Jamaica Dom. Drury.

Reliquis major. Antennae filiformes longitudine dimidii corporis. Thorax rotundatus, antice angustatus, griseus spinis tribus dorsalibus, elevatis, acutis. Elytra longitudine fere abdominis, grisea spinis sparsis, erectis, brevibus. Corpus & pedes grisei.

2. *B. cinereus elytris striatis, femoribus posticis Nucleorum.*  
ovatis dentatis.

Herbst Arch. tab. 20. fig. 16.

Habitat in Indiae Nucleis.

Major *B. Bactris* & *distinctus*. Elytra striata at haud punctata. Femora postica ovata, ferrata dente medio parum longiori. Tibiae striatae, incurvae.

3. *B. cinereus elytris sublaevibus, femoribus posticis ovatis, tibiis incurvis.* *Bactris.*  
Linn. Syst. nat. 2.

605. 4. Amoen. acad. 6. 392. 6.

Habitat in *Bactris* nucleis.

Bruchi corpus ovatum, parvum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite infexo, obtuso, ovato, inferto, oculis lateralibus, rotundatis, vix prominulis, antennis brevibus, ferratis, ante oculos insertis, thorace ovato, gibbo, scutello parvo, trianguli, elytris rigidis, fornicatis, abdomine brevioribus, ano prominulo, pedibus brevibus, validis, tarsis quadriarticulatis, colore vario, obscuro.

- Antennae valde serratae. Femora ovata, mutica.  
Elytra punctato substriata.
- umbellata-* 4. B. squamosus supra griseus subtus cinereus.  
*rum.* Habitat in Barbariae umbellatis Dom. Prof. Vahl.  
Magnus in hoc genere. Corpus totum squamis  
parvis, supra griseis, subtus cinereis irroratum,  
immaculatum. Aestate glaber & niger evadit.
- Pisi.* 5. B. elytris nigris albo maculatis, podice albo:  
punctis binis nigris. Linn. Syst. nat. 2. 604. 1.  
Muf. Lud. Ulr. 35.  
Mylabris fusca cinereo nebulosa abdominis apice  
cruce alba. Geoff. Inf. 1. 267. 1. tab. 4. fig. 9.  
Ledermyll. Microsc. tab. 99. fig. 2.  
Degeer Inf. 4. tab. 16. fig. 3. 4.  
Laria Salicis Scop. Ent. carniol 63.  
Habitat in America septentrionali, Europa australi  
destruens pisa. Devoratur a Gracula quiscula.  
Caput & antennae nigra. Femora subdentata.
- Cacao.* 6. B. corpore fusco griseo maculato.  
Habitat in Theobromae seminibus.  
Corpus statura praecedentis at paullo minus.
- Robiniae.* 7. B. griseo nitidulus elytris vix abdome brevio-  
ribus.  
Habitat in Robiniae pseudo acaciae seminibus Ame-  
rica borealis.  
Magnus in hoc genere. Corpus totum villis gri-  
seis nitidulum. Abdomen minus quam in reli-  
quis prominet.
- gibbosus.* 8. B. thorace gibbofo cupreο, elytris nigris tuber-  
culato spinosis.  
Habitat in America boreali.  
Caput retractum, subcupreum antennis filiformi-  
bus, flavis. Thorax tuberculatus, in medio gib-  
bosus gibbere canaliculato, cupreus. Elytra

- nigra tuberculis plurimis, elevatis, obtusis spinosa, postice obtusa. Pedes nigricantes.
9. B. elytris griseis nigro maculatis, pedibus rufis, *Theobromae* scutello albo. Linn. Syst. nat. 2. 605. 2.  
Habitat in *Theobromae* seminibus.  
Elytra punctis striata. Thorax sublineatus.
10. B. niger elytris cinereis: maculis tribus nigris *marginellus* margine connexis.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Antennae porrectae, nigrae. Caput & thorax atra puncto parvo, cinereo ad basin thoracis. Elytra laevia, cinerea macula ad basin, altera majori in medio marginis exterioris, tertiaque in ipsa apice elytri nigris. Discus immaculatus. Anus cinereus prominet. Pedes nigri.
11. B. subferrugineus elytris apice atris, ano atro: *analis*.  
linea apicis alba.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Corpus parvum. Caput testaceum supra tomento cinereo subvillosum. Thorax ferrugineus macula baseos alba. Elytra striata, ferruginea, apice late atra & ante apicem macula atra, quae arcu apice nigro jungitur. Abdomen ferrugineum ano prominente atro: linea media alba.
12. B. cinereus elytris fuscis: puncto baseos ocellari atro.  
Bruchus 2 punctatus. Sulz. Hist. Inf. tab. 4.  
fig. 2.  
Habitat in Helvetiae plantis.  
Distinctus puncto magno ocellari nigro iride flava ad basin elytrorum.
13. B. thorace nigro: macula baseos pallida, elytris 4 *maculatus* rufescensibus: macula apiceque nigris.  
Habitat in Insula St. Crux Americes Dr. Pflug.

Parvus. Caput nigrum antennis basi rufescentsibus. Thorax niger macula cordata baseos cinerea. Elytra striata, rufescens macula magna in medio marginis exterioris apiceque nigris. Abdomen rufescens ano nigro. Pedes rufescentes.

*scutellaris.* 14. B. ferrugineus thoracis macula baseos scutellaque albis.

Habitat — — Mus. Dom. Lund.

Statura praecedentis. Corpus totum ferrugineum capite thoraceque paullo obscurioribus. Thorax basi macula cordata, alba. Scutellum album. Elytra striata.

*granarius.* 15. B. elytris nigris: atomis albis, femoribus posticis unidentatis. Linn. Syst. nat. 2. 605. 5. Fn. Sv. 628.

Habitat in plantarum semenibus.

Antennae basi testaceae. Thorax futura alba. Elytra striata, abdomine breviora. Tibiae anticae testaceae.

*Cisti* 16. B. ater immaculatus femoribus muticis.

Habitat in floribus Cisti Helianthemi Mus. Dom. Banks.

Praecedentibus duplo minor.

*futuralis.* 17. B. niger futura elytrorum flavescente.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Caput & thorax nigra, subpubescentia. Thorax postice utrinque angulo exerto, flavescente. Elytra laevia, nigra futura flavescente, interdum alba aut cinerea. Corpus cinereo pubescens. Pedes nigri tibiis anticis interdum testaceis.

*abdominalis* 18. B. niger abdomine cinereo maculato, pedibus anticis testaceis.

Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.

Parvus. Caput & thorax nigra lateribus cinereo villofis. Elytra striata, nigra, immaculata. Abdomen cinereo villosum, immaculatum. Pedes quatuor antici testacei.

19. B. ater antennarum basi pedibusque anticis testaceis, femoribus muticis. Linn. Syst. nat. 2. 605. 6.

Mylabris nigra abdomine albo sericeo. Geoff. Inf. 1. 268. 3.

Habitat in Angliae floribus captus ♂. 28 Jun. prope Henley Anglorum.

Paullo minor B. granario. Caput prominens antennis quasi pedunculatis, crassis, ferratis. Thorax antice attenuatus. Elytra striata, abdome breviora. Pedes inermes.

20. B. villosus cinereus immaculatus. *vilosus.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura parva omnino praecedentis. Corpus totum holosericeum, cinereum, immaculatum.

21. B. niger obscurus antennis pedibusque rufis, *rufipes,* femoribus posticis incrassatis nigris.

Bruchus rufipes. Oliv. Inf. tab. fig.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Parvus, niger, minime nitidus. Antennae flavae, apice parum nigricantes. Abdomen subpubescens apice utrinque dente parvo, obtuso. Pedes flavescentes, femoribus posticis crassibus, nigris.

22. B. elytris punctatis testaceis nigro maculatis, *maculatus.* podice griseo: punctis binis nigris.

Habitat in America Dom. von Rohr.

Antennae serratae, testaceae. Thorax testaceus, obscure fusco maculatus. Elytra punctis striata, testacea maculis tribus magnis, fuscis,

- Minosae.* 23. B. testaceus immaculatus elytris substriatis, femoribus posticis acute dentatis.

Habitat in Mimosae seminibus Americae meridionalis Mus. Dom. Lund.

Paullo major B. seminario. Corpus supra mox obscurius mox dilutius testaceum, immaculatum. Elytra striata. Subtus magis cinerascens. Femora postica acute dentata.

- flavicornis.* 24. B. antennis pectinatis flavis, corpore atro, pedibus testaceis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Corpus parvum, ovatum, atrum, nitidum. Antennae valde ferratae, flavae. Elytra laevia, immaculata. Pedes inermes, picei.

- ferraticornis.* 25. B. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griseo fusco maculato.

Habitat in Oriente Prof. Forskahl.

Antennae longitudine corporis valde ferratae. Thorax tomento cinereo tectus, postice trilobus. Elytra abdomine breviora, sulcata, cinerea. Abdomen & pedes cinerea.

- pectinicornis.* 26. B. antennis pectinatis corpore ferrugineo longioribus. Linn. Syst. nat. 2. 605. 7.

Degeer Ins. 5. 281. 2.

Schaeff. Elem. tab. 86. fig. 1.

Habitat in Chinae seminibus.

Simillimus praecedenti, at totus ferrugineus.

98. ANTHRIBUS. *Palpi* quatuor aequales, filiformes.

*Maxilla* brevissima,  
bifida.

*Labium* bifidum.

*Antennae* articulis  
subaequalibus: ulti-  
mistribus ovatis, lon-  
gioribus, crassioribus;  
ultimo acuto insi-  
dentes rostro brevi,  
plano.

i. A. niger fronte anoque albis, thorace tubercu- *Albinus.*  
lato.

*Curculio Albinus.* Mant. Inf. 1. 118. 256. Linn.  
Syft. nat. 2. 616. 79. Fn. Sv. 632.

*Curculio brevirostris* antennis longis rectis, cor-  
pore oblongo nigro hispido, capite elytrorum-  
que apice albis, rostro planiusculo lato. Degeer  
Inf. 5. 255. 44. tab. 8 fig. 1. Paykull. Monogr.  
118. 112. Bonsd. Curc. 16. 1.

*Curculio niger* Udm. Diff. 27.

Habitat in Europa boreali.

*Anthribi* corpus ovatum, gibbum, subglabrum,  
immarginatum, tardum, capite ovato, antice porrecto,  
plano, obtuso, inserto, oculis marginalibus, globo-  
sis, prominulis, antennis longiusculis, in fovea late-  
rali sub oculis insertis, thorace rotundato, scutello  
parvo, rotundato, elytris rigidis, fornicateis, apice de-  
flexis longitudine abdominis, pedibus brevibus, vali-  
dis, tarsis quadriarticulatis, colore vario, saepius ob-  
scuro.

Os palpis quatuor aequalibus, filiformibus anticis quadriarticulatis: articulis subaequalibus; ultimo longiori cylindrico adhaerentes maxillae dorso, posteriores vix breviores, triarticulati: articulo ultimo cylindrico adnati labii inferioris basi. Mandibula crassa, cornea, acuta. Maxilla brevissima, membranacea, bifida: laciniis aequalibus, rotundatis. Labium brevissimum, membranaceum, bifidum: laciniis cylindricis.

Antennae maris longitudine corporis: articulo 3. 4. 5. 6. 7. apice albis 8. 9. totis albis, ultimis nigris, faeminae breviores, nigrae: articulo nono tantum albo.

*latirostris.* 2. A. rostro latissimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris.

Anthribus ater, elytris apice cinerascentibus.

Geoff. Inf. I. 307. 8. tab. 5. fig. 8.

Curculio *latirostris.* Mant. Inf. I. 118. 237.

Paykull. Monogr. 117. III.

Silpha oblonga. Sulz. Hist. Inf. tab. 2. fig. 17.

Schaeff. Icon. tab. 89. fig. 6.

Ross. Fn. Etr. I. 132. 339. tab. 5. fig. 5.

Habitat Halae Saxonum.

Affinis C. Albino & forte mera ejus varietas.

Rostrum latissimum, planum, album, apice nigrum. Thorax canaliculatus, niger. Elytra nigra striis interruptis, glaucis, apice alba, punctis duobus nigris. Pedes nigri, albo annulati. Abdomen album lateribus nigris. Antennae annulo albo.

*albirostris.* 3. A. rostro latissimo plano elytrisque postice albis nigro variis.

Curculio *albirostris.* Mant. Inf. I. 119. 238.

Paykull. Monogr. 120. 113.

*Curculio albirostris brevirostris niger*, rostro albo,  
elytris postice albis punctis nigris contiguis. Act.  
Hall. 1. 287.

*Curculio albirostris*. Herbst. Arch. 80. 66. tab.  
24. fig. 26.

Habitat in Saxoniae Betula Dom. Hybner.

Praecedente duplo minor. Thorax niger, immaculatus. Elytra nigra, apice alba macula magna, palmata, nigra. Pedes nigri tibiis tarfisque albo annulatis.

4. *A. griseus elytris postice cinereis.* *griseus.*

*Ptinus gigas*. Mant. Inf. 1. 40. 1.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Antennae filiformes, corpore longiores, apice nigrae articulo ultimo acuto. Thorax rotundatus, griseus, lineis quatuor obsoletis, fuscis puncto albo. Elytra grisea punctis aliquot oblongis apiceque cinereis. Abdomen & pedes cinerei.

5. *A. rostro plano latissimo nigro aeneus rostro pendibusque testaceis.* *planirostris.*

*Curculio planirostris*. Mant. Inf. 1. 119. 239.

239. Paykull. Monogr. 124. 117.

*Curculio fulvirostris*. Mant. Inf. 2. App.

*Attelabus ruficollis*. Herbst. Arch.

*Curculio rostratus*. Degeer Inf. 5. 252. 42.

Habitat in Holsatiae Aesculo Hippocastano Dom.

Daldorf.

Parvus. Rostrum breve, latissimum, planum, testaceum. Thorax & elytra laevia, aenea, nitida, immaculata. Pedes simplices, testacei.

Variat rarius thorace rufo.

6. *A. niger elytris elevato striatis rufis: punctis nigris sparsis.* *scabrosus.*

*Anthribus ovatus niger, elytris striatis rubro nigroque marmoratis.* Geoff. Ins. I. 306. tab. 5. fig. 3.

*Bruchus scabrosus.* Mant. Ins. I. 41. 7.

*Curculio scabrosus.* Paykull. Monogr. 121. 114.

*Bruchus scabrosus.* Herbst Arch. tab. 20. fig. 15.

Habitat in Europae Jacea.

*Thorax cinereo villosus. Elytra rufescentia: striis elevatis, albidis: punctis nigris holofericeis.*

*undatus.* 7. A. niger elytris fuscis: strigis undatis albis.

*Bruchus undatus.* Mant. Ins. I. 41. 9.

Habitat in Africæ floribus Dom. Vahl.

*Corpus medium, nigrum, immaculatum. Elytra laevia, fusca strigis tribus aut quatuor undatis fuscis.*

*-varius.* 8. N. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis striatis.

*Bruchus varius.* Mant. Ins. I. 42. 14.

*Curculio varius.* Paykull. Monogr. 122. 115.

*Anthribus minimus.* Geoff. Ins. I. 307. 2.

Habitat in Sueciae Pinetis Dom. de Paykull.

*Corpus nigrum, cinereo paullo micans. Elytra punctis plurimis, alternis striata. Pedes nigri femoribus muticis.*

*sepicola.* 9. A. cinereo fuscoque varius: punctis elevatis pilosis.

Habitat in Germaniae sepibus Dom. Schneider.

*Magnitudo praecedentium. Rostrum breve, apice incrassatum. Thorax & elytra fusco cinereoque variegata thorace punctis duobus, elytris pluribus elevatis, holofericeis. Pedes pallidi, nigro punctati.*

99. BRACHYCYERUS. *Palpi quatuor brevisimi.*

*antici* biarticulati.

*Labium* rotundatum, cornuum.

*Antennae* breves, extrorsum crassiores, rostro insidentes.

1. B. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo punctatis.

Brachycerus apterus. Oliv. Inf. 3. 82. tab. 1.  
fig. 3.

Curculio apterus. Mant. Inf. 1. 121. 267.

Curculio apterus brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. Linn. Syst. nat. 2. 619. 95.

Curculio cruciatus. Degeer Inf. 5. 275. tab. 16.  
fig. 1.

Habitat in India.

2. B. thorace spinoso antice excavato, elytris cineris: punctis atris subocellatis.

Brachycerus ocellatus. Oliv. Inf. 3. 82.

Brachyceri corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, inferto, antice producto in rostrum crassum, planum, obtusum, inaequale, oculis parvis, oblongis, marginalibus, antennis brevibus, sub medio marginis rostri insertis, thorace transverso, inaequali, saepius spinoso, scutello nullo, elytris connatis, rigidis, fornicatis, apice deflexis, longitudine abdominalis, pedibus brevibus, validis, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

*Curculio ocellatus.* Mant. Inf. I. 121. 268:

Habitat in Madagascar Mus. Britannicum.

Corpus magnum B. barbari. Rostrum breve, crassum, obtusum, unisulcatum. Thorax utrinque acute spinosus, antice fovea lata excavatus, scaber, fuscus lineis tribus longitudinalibus, griseis. Elytra grisea punctis elevatis, glabris, nitidis striata. Puncta duarum striarum subspinosa. Femora fusca annulo albo.

*scalaris.* 3. B. thorace spinoso inaequali ater elytris striis rufis denticulatis.

*Curculio scalaris.* Mant. Inf. I. 120. 255. Gen. Inf. 228.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Schulz.

Rostrum planum, crassum, obtusum. Thorax acute spinosus, fulcis tribus punctisque quatuor baseos impressis. Elytra connata, laevia, atra striis octo secundum totam longitudinem denticulis rufis.

*obesus.* 4. B. thorace spinoso inaequali ater elytris rubris: punctis nigris confertis.

*Brachycerus obesus.* Oliv. Inf. 82. tab. fig.

*Curculio obesus.* Mant. Inf. I. 220. 254.

*Curculio tuberculatus.* Degeer Inf. 7. 658. 63. tab. 49. fig. 8.

*Cuculio oedematosus.* Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 10.

*Cuculio ater.* Wulf. Inf. cap. tab. I. fig. 11.

Herbst Arch. tab. 45. fig. 8.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor brevissimi, filiformes, antici biarticulati: articulis globosis; primo paullo crassiori, secundo obtuso adhaerentes maxillae medio, postici parum longiores, triarticulati: articulis globosis, subaequalibus adnati sub labii apice. Mandibula brevis, crassa, cornea, apice tridentata. Maxilla brevis, mem-

branacea, pilosa, integra. Labium breve, cornuum, rotundatum, truncatum.

5. B. thorace spinoso quinquesulcato, elytris levibus. *globosus.*

*Brachycerus globosus.* Oliv. Inf. 82. tab. fig.

*Curculio globosus.* Mant. Inf. 1. 120. 253.

*Curculio globosus.* Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 4.

Habitat in Indiis Dom. Drury.

*Rostrum bisulcatum.* Thorax sulcis quinque: lateralibus in ipsa basi spinarum. Femora annulo pallido.

6. B. fuscus capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris postice spinosis. *rostratus.*

1. fig. 4.

*Curculio rostratus.* Mant. Inf. 1. 119. 245.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Banks.

*Spina brevis,* acuta sub antennis. Caput canaliculatum ore atro. Thorax sulcatus, griseo fuscus. Elytra griseo fusca, immaculata, postice lineis duabus spirarum erectarum. Pedes fusi.

7. B. aeneo niger elevato punctatus elytris postice *verrucosus.* *verrucosus.* Oliv. Inf. 1. 82.

*Curculio verrucosus.* Mant. 1. 119. 241. Linn.

Syst. nat. 2. 618. 90. Mus. Lud. Ulr. 60.

*Curculio verrucosus.* Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 5.

Habitat in Aethiopia.

*Totus aeneus,* minime splendens. Elytra striis tribus elevatis & inter has striae duas punctorum impressorum.

8. B. thorace subspinoso, elytris angulo duplici *barbarus.* *crispato.* Oliv. Inf. 82.

*Curculio barbarus.* Mant. Inf. 1. 120. 250. Linn.

Syst. nat. 617. 87.

Habitat in Africa.

Varietas duplo minor in Gallia meridionali.



- inaequalis.* 9. B. thorace scabro, elytris lineis elevatis crista-  
tis, capite bidentato. Oliv. Inf. 82. tab. 2. fig. 12.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dr. Olivier.  
Magnus. Os crassum. Caput dentibus duobus  
elevatis ante oculos. Pedes antici elongati.
- crispatus.* 10. B. niger thorace spinoso canaliculatoque, ely-  
tris cinereis: angulo exteriori crispato dentato.  
Habitat in Barbaria Mus. Dom. Desfontaines.  
Statura & magnitudo omnino B. Algiri. Caput  
nigrum orbita oculorum elevata. Thorax pun-  
ctatus, niger utrinque spina valida, obtusa, dorso  
valde canaliculato: linea media parum elevata.  
Elytra grisea angulo exteriori valde elevata,  
crispato, postice dentato & praeterea linea media  
elevata, abbreviata, sublaevi. Corpus nigrum.
- cornutus.* 11. B. cinereus thorace elytrisque subspinosis ely-  
trorum spinis fasciculato pilosis.  
Brachycerus cornutus. Oliv. Inf. 82. tab. 2.  
fig. 14.  
Curculio cornutus. Mant. Inf. 1. 120. 257.  
Linn. Syst. nat. 2. 618. 91. Mus. Lud. Ulr. 57.  
Habitat in Indiis.  
Thorax spinosus. Elytra punctis elevatis striata  
adjecto fasciculo pilorum.
- algirus.* 12. B. cinereus thorace spinoso sulcato, elytris an-  
gulo dupli spinosis. Oliv. Inf. 82. tab. 2.  
fig. 16.  
Curculio algirus. Mant. Inf. 1. 120. 151.  
Habitat in Africa Dom. Vahl.  
B. barbaro triplo minor. Elytra lineis elevatis  
duabus, spinosis & inter has punctis elevatis  
scabra.
- retusus.* 13. B. griseo fuscus elytris postice retusis dentatis.  
Brachycerus retusus. Oliv. Inf. 82. tab. 1. fig. 6.  
Curculio retusus. Mant. Inf. 1. 120. 259.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
 Rostrum crassum, inaequale, emarginatum. Thorax inaequalis, inermis. Coleoptra striis subelevatis, dentatis, fere obsoletis, griseo fusca macula communi dorsali, obscura, postice utrinque retusa dentibus acutis, prominulis.

14. B. fuscus thorace elytrisque globosis. *spectrum.*  
 Brachycerus spectrum. Oliv. Inf. 82. tab. 1.  
 fig. 5.  
 Curculio spectrum. Mant. Inf. 1. 119. 246.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei.  
 Corpus parvum singularis statura. Rostrum breve, crassum, inaequale. Thorax brevis, elytris angustior, globosus. Coleoptra connata, striata punctisque elevatis, acutis subspinosa, fere globosa. Pedes grisei.
15. B. thorace spinoso sulcato niger obscurus elytris lineis tribus elevatis crenatis. *muricatus.*  
 Brachycerus muricatus. Oliv. Inf. 82. tab. 1.  
 fig. 19.  
 Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
 Statura & magnitudo B. algiri totus obscure niger, minime nitidus. Rostrum apice emarginatum. Elytra lineis tribus approximatis, elevatis, crenatis sive subdentatis: interstitiis laevibus, apice obtusa & fere retusa.
16. C. thorace spinoso inaequali, elytris tuberculis *Uva.* elevatis obtusis numerosis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.  
 Medius. Thorax spinosus, inaequalis, ater macula utrinque supra spinam & alia sub spina fulvis. Elytra atra tuberculis numerosissimis, elevatis, obtusis. Pedes atri femoribus subtus macula magna e pilis fulvis.

100. ATTELABUS. *Palpi filiformes.**Maxilla bifida.**Labium corneum, palpos tegens.**Antennae moniliformes, rostro insidentes.**Coryli.***1.** *A. niger elytris rufis reticulatis.* Linn. Syst. nat. 2. 619. 1. Fn. Sv. 638.*Curculio excoriato ruber.* Degeer Inf. 5. 257. 46. tab. 8. fig. 3.*Curculio Avellanae.* Paykull. Monogr. 128. 121. Schaeff. Icon. tab. 75. fig. 8.*Sulz.* Inf. tab. 4. fig. 1. **$\beta$ .** *Attelabus Avellanae niger elytris thorace pedibusque rubris.* Linn. Syst. nat. 1. 619. 2.*Rhinomacer thorace elytrisque rubris, capite parce elongato.* Geoff. Inf. 1. 237. 11.*Schaeff. Icon. tab. 56. fig. 5. 6.**Habitat in Coryli foliis, quae in cylindrum voluit & utrinque claudit.**speciosus.***2.** *A. ater nitidus elytris maculis duabus rubris.**Habitat Tranquebariae Dom. de Sehestedt.**Sequentibus major. Antennae porrectae, atrae articulis cylindricis. Caput postice attenuatum,*

Attelabi corpus ovatum, parvum, glabrum, immarginatum, tardum, capite exserto, ovato, postice attenuato, antice porrecto, oculis globosis, marginalibus, ante rostrum insertis, antennis brevibus, approximatis, rostri basi insertis, thorace rotundato, ovato, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominalis, pedibus brevibus, validis, tarsis quadriarticulatis, colore vario plerumque obscuro.

atrum, nitidum oculis prominulis. Thorax rotundatus, ater, nitidus, immaculatus. Elytra laetitia, atra, nitida maculis duabus fulvis, altera baseos ad marginem crassiores, altera pone medium. Corpus atrum.

3. A. ater elytris macula baseos rufa. *2 pustulatus*  
 Habitat in America septentrionali Dom. Yeats.  
 Statura A. curculionoides. Corpus atrum, nitidum elytris macula magna baseos rufa. Pedes atri femoribus anticis intus unidentatis.
4. A. niger elytris rufis: fascia media apicisque *pennsylvanicus*.  
 nigra. Linn. Syst. nat. 2. 620. 5.  
 Habitat in America boreali.  
 Statura omnino praecedentium.
5. A. ferrugineus: tuberculis nigris sparsis. *gemma*  
*tus*.  
 Attelabus gemmatus. Thunb. nov. sp. 3. 68.  
 fig. 80.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei.  
 Caput attenuatum.
6. A. obscure ferrugineus elytris flavo notatis, pedibus flavis.  
 notatus.  
 Habitat in India Dom. de Paykull.  
 Statura omnino A. Coryli. Caput obscure ferrugineum, postice valde angustatum. Thorax obscure ferrugineus, immaculatus, antice angustatus. Elytra striata striis punctatis ferruginea basi in duplice serie flavo notata. Pedes flavi.
7. A. piceus elytris apice retusis, pedibus anticis elongatis: femoribus unidentatis.  
 longimanus.  
 Habitat in Senegal Dom. de Paykull.  
 Paullo major A. longimano. Caput & thorax laetitia, glabra, nigricantia. Elytra vix striata, picea, apice retusa gibbereque parvo notata. Corpus piceum. Pedes picei, antici valde elongati femoribus clavatis denteque valido armatis.

- nigripennis*. 8. A. ferrugineus elytris laevissimis atris.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.  
 Statura omnino A. coryli at paullo minor. Antennae fuscae. Caput postice parum angustum. Corpus ferrugineum, nitidum elytris solis laevissimis, atris.
- fuscicornis*. 9. A. ferrugineus antennis tarsisque fuscis, elytris punctato striatis.  
 Habitat in Senegalia Dom. de Paykull.  
 Duplo minor A. Coryli. Caput postice valde angustum, ferrugineum antennis apice fuscis. Thorax antice angustatus, ferrugineus, immaculatus. Elytra punctato striata. Pedes ferruginei tarsis omnibus fuscis.
- spinofus*. 10. A. ferrugineus thorace elytrisque spinosis.  
 Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. de Paykull.  
 Corpus parvum, totum ferrugineum. Caput postice attenuatum. Thorax postice tuberculis duobus elevatis, obtusioribus. Elytra spinis plurimis, validis, acutis, apice nigris.
- indicus*. 11. A. ferrugineus capite elytrorum basi fasciaque media cyaneis. Thunb. nov. sp. 3. 68. fig. 81.  
 Habitat in India orientali.  
 Statura & magnitudo omnino A. pensylvanici.
- curculio-*  
*noides*. 12. A. niger thorace elytrisque rubris. Linn. Syst. nat. 2. 619. 3.  
 Rhinomacer niger thorace elytrisque rubris, proboscide longitudine capitis. Geoff. Inf. 1, 273. 10.  
 Curculio nitens. Paykull. Monogr. 130. 122.  
 Schaeff. Icon. tab. 56. fig 7.  
 Sulz. Inf. tab. 4. fig. 12.  
 Habitat in Europae Corylo, Salice.  
 Alium vidi simillimum at vix distinctum thorace nigro.

13. *A. ferrugineus coleoptris angulatis: disco nigro. angulatus.*  
 Habitat Cajennae Dom. v. Rohr.  
 Antennae nigrae, basi ferrugineae. Caput ferrugineum oculis nigris. Thorax ferrugineus macula magna baseos fusca. Coleoptra striata, nigra margine omni ferrugineo. Angulus acutus utrinque versus basin. Corpus ferrugineum pectore nigro.
14. *A. violaceus hirtus rostro atro.* *pubescens.*  
 Curculio pubescens. Syst. Ent. 131. 19.  
 Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
 Corpus totum violaceo hirtum rostro solo nigro,  
 magis elongato quam in reliquis.
15. *A. aureus rostro plantisque nigris.* *Bachus.*  
 Curculio Bachus. Mant. Inf. 1. 99. 29. Linn.  
 Syst. nat. 2. 611. 38. Paykull. Monogr. 133.  
 124.  
 Rhinomacer niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboscide longitudine corporis.  
 Geoff. Inf. 1. 270. 4.  
 Curculio purpureus. Degeer Inf. 5. 250. 38.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 18.  
 Sulz. Inf. tab. 4. fig. 4.  
 Habitat in Vite, Corylo.
16. *A. corpore viridi aurato subtus concolore.* *Betuleti.*  
 Curculio Betulae. Mant. Inf. 1. 99. 30. Linn.  
 Syst. nat. 2. 611. 39. Fn. Sv. 605.  
 Rhinomacer viridi coeruleus. Geoff. Inf. 270. 2.  
 Curculio Populi. Paykull. Monogr. 131. 123.  
 Degeer Inf. 5. 248. 5. tab. 7. fig. 25.  
 Habitat in Betula alba, in Vite folia contorquens. Alter sexus thoracem antrorsum spinosum gerit.  
 Variat saepe colore coeruleo.

- Populi.* 17. A. corpore viridi ignito, subtus atro coerulescente.  
 Curculio Populi Mant. Inf. 1. 99. 31. Linn.  
 Syst. nat. 2. 511. 40. Fn. Sv. 606. Paykull.  
 Monogr. 132. 123. 8.  
 Rhinomacer viridi auratus, subtus nigro violaceus. Geoff. Inf. 270. 3.  
 Degeer Inf. 5. 249. 38.  
 Habitat in Betula, Populo.  
 Thorax in altero sexu antrorsum spinosus.
- bicolor.* 18. A. niger capite thorace elytrisque rubris, rostra longitudine corporis atro.  
 Curculio bicolor. Mant. Inf. 99. 32.  
 Habitat in America Mus. Dr. Hunter.  
 Statura A. Bachi. Caput rufum rostroatro. Thorax & elytra rufa, immaculata.
- hungaricus.* 19. A. villosus ater thorace elytrisque rufis: sutura atra.  
 Curculio Hungaricus. Herbst Arch. tab. 24.  
 fig. 10.  
 Habitat in Hungaria.  
 Statura & magnitudo A. Bachi. Rostrum elongatum, cylindricum, atrum. Antennae atrae clava oblonga. Thorax villosus, rotundatus, ruber, immaculatus. Elytra villosa, substriata, rubra sutura nigra ad basin dilatata. Pedes atri.
- aequatus.* 20. A. cupreo niger elytris rufis.  
 Curculio aequatus longirostris aeneus, elytris rubris, rostro nigro. Linn. Syst. nat. 2. 607. 9.  
 Paykull. Monogr. 135. 126.  
 Geoff. Inf. 1. 270. 4.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Statura omnino A. Bachi at minor. Caput cupreum nigrum rostro longo, cylindrico, atro. Thorax magis cupreus, obscurus. Elytra punctato

- striata, rubra, immaculata. Corpus cupreoni-  
grum.
21. A. violaceus nitens thorace elytrisque testaceis. *coeruleoace-*  
Curculio coeruleocephalus. Mant. Inf. 199.33. *phalus.*  
Herbst. Arch. tab. 24. fig. II.  
Act. Hallens. I. 282.  
Habitat in Saxoniae Crataego Dom. Hybner.  
Caput pubescens, violaceum. Thorax & elytra  
pubescentia, nitida, testacea. Corpus & pedes  
violacea.
22. A. obscure aeneus subtus obscurior. *cupreus.*  
Curculio cupreus. Mant. I. 100. 34. Linn.  
Syst. nat. 2. 608. 21. Fn. Sv. 593. Paykull.  
Monogr. 134. 125.  
Habitat in Europae borealis hortis.
23. A. niger elytris aeneis. *aeneus.*  
Curculio aeneus. Mant. Inf. I. 100. 36. Payk.  
Monogr. 142. 134.  
Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter, in Hyssopa  
officinali Paykull.  
Parvus. Corpus nigrum elytris solis aeneis.
24. A. griseus pedibus rufis, rostro femoribusque *fuscirostris.*  
basi nigris.  
Curculio fuscirostris. Mant. Inf. I. 100. 41.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Parvus. Rostrum elongatum, nigrum. Thorax  
& elytra striata, grisea lineis duabus aut tribus  
albis ad futuram. Pedes rufi femoribus basi nigris.
25. A. viridi aeneus elytris striatis, rostro cupreo. *cuprirostris.*  
Curculio cuprirostris. Mant. Inf. I. 100. 43.  
Curculio viridi sericeus. Geoff. Inf. I.  
Habitat in Saxoniae Betula D. Zschuck.  
Rostrum arcuatum, cupreum. Thorax viridi  
aeneus, nitidus. Elytra striata, concolora.  
Pedes fusci.

- rufirostris.* 26. A. niger rostro dimidiato pedibusque rufis.  
*Curculio rufirostris.* Mant. Inf. 1. 100. 46.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
 Caput fuscum rostro atro, nitido. Thorax gibbus, viridis lineis duabus dorsalibus fuscis. Elytra tomentosa, viridia, immaculata. Pedes fusti.
- Alliariae.* 27. A. pubescens cyaneus elytris striatis.  
*Curculio Alliariae.* Mant. Inf. 1. 101. 35. Linn.  
 Syst. nat. 2. 506. 4. Fn. Sv. 580.  
 Frish. Inf. 9. 35. tab. 18.  
 Degeer Inf. 5. 251. 39.  
 Habitat in Erysimo Alliaria.
- Craccae.* 28. A. niger obscurus elytris striatis obscure coeruleis, rostro apice depresso. Linn. Syst. nat. 2. 506. 6. Paykull. Monogr. 140. 131.  
*Curculio viciae.* Degeer Inf. 5. 253. 83. tab. 6. fig. 31. 32.  
 Habitat in hortis Holsatiae.  
 Statura oblonga praecedentis. Rostrum elongatum, cylindricum, apice depresso. Thorax cylindricus, antice parum angustatus, basi vix canaliculatus. Elytra ovata, striata, at haud punctata, obscure coerulea. Corpus nigrum, obscurum.
- Sorbi.* 29. A. ater elytris striatis obscure coerulecentibus, rostro arcuato longitudine corporis.  
*Curculio laevigatus.* Paykull. Monogr. 141. 138.  
 Habitat in Germaniae arboribus.  
 Statura omnino praecedentium. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum, longitudine corporis. Thorax ovatus postice punto medio impresso niger, obscurus. Elytra ovata, striata

- nullo modo punctata, obscure cōrulescentia.  
Corpus nigrum.
30. A. ater elytris cyaneis nitidulis. *cyaneus.*  
Curculio cyaneus. Mant. Inf. 1. 101. 55. Linn.  
Syst. nat. 2. 506. 5. Fn. Sv. 581.  
Herbst Arch. tab. 24. fig. 5.  
Habitat in Europae Malva.  
Thorax utrinque tuberculo elevato. Corpus  
minutum.
31. A. gibbus supra ater subtus cinereus. *globosus.*  
Curculio Craccae. Mant. Inf. 1. 101. 56.  
Curculio Hypoleucus. Paykull. Monogr. 75. 72.  
Quenz. Disl. Inf. 16.  
Habitat in Europae arena.  
Parvus, sere globosus, supra glaber, ater, subtus  
subvillosum, pallidus.
32. A. griseus elytris pedibusque testaceis. *Malvae.*  
Curculio Malvae. Mant. Inf. 1. 101. 67.  
Curculio Pineti. Paykull. Monogr. 61. 58.  
Habitat in Angliae Malvis.  
Thorax & abdomen pilis cinereis grisea. Elytra  
testacea.
33. A. ater femoribus luteis. *flavipes.*  
Curculio flavipes. Mantiss. Inf. 1. 102. 63.  
Paykull. Monogr. 143. 135.  
Rhinomacer niger striatus femoribus rufis. Geoff.  
Inf. 1. 272. 8.  
Habitat primo vere frequens locis apricis, cali-  
dioribus.
34. A. purpureus nitens rostro longissimo. *purpureus.*  
Curculio purpureus. Mant. Inf. 1. 102. 64.  
Linn. Syst. nat. 2. 607. 14. Fn. Sv. 585.

Degeer Inf. 5. 250. 38.

Bergstr. nomencl. 1. 16. 12. tab. 2. fig. 12.

Habitat in Europae plantis.

An satis a sequente distinctus mihi haud rite  
notus.

*frumenta-* 35. A. sanguineus elytris crenato striatis.

*rius.* Curculio frumentarius. Mant. Inf. 1. 102. 65.

Linn. Syst. nat. 2. 608. Fn. Sv. 586. Payk.  
Monogr. 139. 130.

Aet. Holmens. 1750. 186. 1.

Aet. Nidros. 3. 391.

Loewenh. Arcan. 183. aug. 6. 83. fig. 3.

Degeer Inf. 5. 251. 48.

Habitat in frumento diutius asservato.

*vernalis.* 36. A. nigricans elytris cinereis: fasciis duabus ni-  
gris, pedibus rufis.

Curculio vernalis. Paykull. Monogr. 138. 129.  
Habitat in Holsatiae Urtica primo vere.

Statura & magnitudo omnino A. flavipedis.  
Rostrum elongatum, cylindricum, nigricans  
puncto apicis atro. Thorax cylindricus, ni-  
gricans linea media impressa. Elytra striata,  
cinerea fasciis duabus latis, fuscis, obliquis. Pe-  
des omnes rufi.

*Betulae.* 37. A. pedibus saltatoriis, corpore atro. Linn. Syst.  
nat. 2. 620. 7. Fn. Sv. 640.

Curculio Betulae. Paykull. Monogr. 127. 120.

Curculio excoriato niger. Degeer Inf. 5. 209.  
47.

Habitat in Betulae foliis, quae rodendo pulchre  
crispa reddit.

101. RHINOMACER. *Palpi* quatuor extorsum crassiores: articulo ultimo truncato.

*Antennae* setaceae, rostro insidentes.

1. R. villoso griseus antennis pedibusque nigris. *curculioides*  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura omnino Curculionis. Antennae longitudo thoracis, setaceae articulo ultimo acuto, nigrae. Rostrum crassiusculum, planum, in medio impressum. Thorax elytraque grisea, laevia, immaculata. Subtus cinereus. Pedes cinerei.

2. R. villoso piceus antennis pedibusque testaceis. *attelaboides*

*Curculio Rhinomacer.* Paykull. Monogr. 126.  
119.

Habitat in Sueciae plantis Dom. de Paykull.

Praecedente minor. Rostrum porrectum, elevatum antennis setaceis, obscure testaceis. Thorax elytraque tomentoso picea. Corpus cinereum pedibus testaceis.

Rhinomacer corpus parvum, ovatum, villosum, immarginatum, tardum, capite inserto, antice rostro brevi, plano, oculis globosis, marginalibus, antennis longitudine thoracis in medio rostri insertis, thorace ovato, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicateis, longitudine abdominis, pedibus longiusculis, tenuibus, tarsis quadriarticulatis, colore obscuro.

102. CURCULIO. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla cylindrica,*  
unidentata.

*Antennae clavatae:*  
articulo primo longissimo, insidentes  
rostro corneo.

\* *Longirostres femoribus simplicibus.*

*gigas.* 1. C. longirostris thorace elytrisque scabris, antennis apice albis.

Curculio gigas. Oliv. Inf. 83. tab. 12. fig. 146.

Curculio Elephas longirostris fuscus thorace elytrisque variolosus, elytris postice spinosis. Mant. Inf. 1. 97. 7.

Habitat in Japonia Mus. Britann.

Rostrum cylindricum, elongatum, arcuatum, antice fuscum, postice cinereum. Thorax rotundatus in primis lateribus punctis elevatis, acutis, scaber, fuscus dorso cinerascente. Elytra connata, scabra, obscure grisea punctis fuscis albisque sparsis. Femora scabra. Antennae clavatae, apice albae.

Curculionis corpus oblongum, ovatumque, immarginatum, tardum, capite rotundato, inserto, antice porrecto in rostrum rotundatum, oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis longitudine thoracis, distantibus, medio rostri utrinque insertis, thorace saepius rotundato, scutello brevi, rotundato, elytris rigidis, fornicate, lateribus deflexis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, cursoriis, femoribus saepe dentatis, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

2. *C. longirostris ater thorace supra plano, elytris Palmarum.*  
abbreviatis striatis.

*Curculio Palmarum.* Oliv. Inf. 2. 83. tab. 2.  
fig. 16.

Linn. Syst. nat. 2. 506. 1. Mus. Lud. Ulr. 42.

Degeer Ins. 5. tab. 15. fig. 26.

Rumph. Amb. 1. 79. tab. 17. fig. 9.

Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 5.

Gronov. Zooph. 578. tab. 16. fig. 4.

Merian. Surin. tab. 48. fig. 3.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 20.

Habitat in Indiae Palmis.

3. *C. longirostris ater thorace lineis elytrisque pun- cruentatus.*  
Etis duobus ferrugineis.

*Curculio cruentatus.* Oliv. Inf. 33. tab. 12. fig.

147.

Habitat in Carolina Mus. Dom. Banks.

*C. Palmarum minor.* Rostrum elongatum, compres-  
siuscum, arcuatum, atrum, Antennarum clava  
ferruginea. Thorax planus, ater lineis duabus  
dorsalibus, subflexuosis, sanguineis. Elytra abbre-  
viata, striata, holosericea, atra punctis duobus  
disci sanguineis. Pedes atri. Tibiae apice spina  
valida, acuta, arcuata.

4. *C. longirostris nigricans elytris ferrugineis, ro- longipes.*  
stro emarginato, pedibus anticis longioribus.

*Curculio longipes.* Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 191.

Voet. Coleopt. 2. tab. 36. fig. 10.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Magnitudo fere *C. Palmarum.* Rostrum cylindri-  
cum, apice emarginatum. Antennarum clava  
truncata. Thorax in altero sexu niger, in altero  
rufus macula nigra, glaber, laevis. Elytra abbre-  
viata, striata, ferruginea. Pedes antici elongati.  
Tibiae incurvae, anticae intus hirtae.

- Colossus.* 5. *C. longirostris nigricans elytris brunneis aut cinereis, pedibus elongatis.*  
*Curculio Colossus.* Oliv. Inf. 83. tab. 3. fig. 32.  
*Curculio longipes.* Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 3.  
*Voet.* Coleopt. 2. tab. 36. fig. 9.  
*Habitat in India orientali.*  
*Corpus magnum, nigricans elytris in altero sexu brunneis, in altero cinereis. Rostrum elongatum in altero lineis duabus tuberculorum elevatum. Pedes elongati, nigri.*
- Indus.* 6. *C. longirostris ater thorace subovato excavato punctato, elytris rugoso sulcatis, tibiis spinosiss.* Linn. Syst. nat. 2. 506. 2. Mus. Lud. Ulr. 43.  
*Degeer Inf. 5. 15. 22.*  
*Habitat in India.*  
*Magnitudo C. Palmarum.*
- paganus.* 7. *C. longirostris griseus thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bisulcato.*  
*Habitat in Indiis Dom. Torstenson.*  
*Duplo major C. Pini. Rostrum crassum, capite duplo longius, fuscum sulcis duobus exaratum. Antennae griseae, basi nigrae. Thorax lateribus griseis, dorso fusco, arcubus quatuor lineolaque media cinereis. Elytra obtusa, immaculata. Femora mutica.*
- ferrugineus.* 8. *C. longirostris obscure purpurascens elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis.*  
*Curculio ferrugineus.* Oliv. Inf. 83. tab. 2. fig. 16.  
*Sulz. Hist. 4. tab. 4. fig. 11.*  
*Habitat in Brasilia.*
- hemipterus.* 9. *C. longirostris obscure purpurascens, elytris abbreviatis maculatis.* Linn. Syst. nat. 2. 506. 3.  
*Mus. Lud. Ulr. 44.*  
*Curculio hemipterus.* Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 4.

*Curculio rufofasciatus.* Degeer Inf. 5. tab. 15.

fig. 25.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Distinctus omnino a praecedente triplo minor.

Colore variat semper tamen elytris obscurius maculatis.

10. *C. longirostris rufo nigroque varius rostro apice variegatus.*  
nigro.

*Curculio variegatus.* Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 158.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Rostrum elongatum, cylindricum, ferrugineum,  
apice nigrum. Thorax ferrugineus lineis tribus nigris: lateralibus abbreviatis. Pectus nigrum lineis tribus ferrugineis. Elytra striata,  
nigra lineolis aliquot ferrugineis. Pedes nigri  
femoribus ferrugineis: annulo nigro.

11. *C. longirostris cinereus coleoptris macula communi cordata fusca.* Linn. Syst. nat. 2. 608. dius.

18. Mus. Lud. Ulr. 45.

Sulz. Histor. Inf. tab. 4. fig. 11.

Habitat in India.

Antennae nigrae.

12. *C. longirostris nigricans thoracis elytrorumque limbatus.*  
margine rufo.

*Curculio limbatus.* Oliv. Inf. 83. tab. 2. fig. 22.

Habitat in Senegallia.

Magnus. Rostrum longum, nigrum. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra striata, nigra  
margine ferrugineo.

13. *C. longirostris niger thorace subspinoso: lineis cruciatus.*  
elytris postice cruce albis.

*Curculio cruciatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 131.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum fascia baseos cinerea. Rostrum  
thorace longius, cylindricum, inflexum antennis

nigris. Thorax ovatus punctis elevatis acutis, subspinosis, niger linea laterali albida. Elytra itidem punctis elevatis, acutis, numerosissimis subspinosa, nigra lineola baseos cruceque postica albis. Pedes nigri femorum apice tibiarumque basi punto albo.

*sanguinolentus.* 14. C. longirostris ater elytris fascia baseos sanguinea.

*Curculio sanguinolentus.* Oliv. Inf. 83. tab. 10. fig. 116.

Habitat in Insula Tabago Americes Dom. Lee. Duplo minor C. cruentato. Fascia elytrorum marginem haud attingit.

*fasciatus.* 15. C. longirostris ater elytris striatis: fascia media sanguinea.

*Curculio fasciatus.* Oliv. Inf. 83. tab. 11. fig. 136.

Habitat — — Mus. D. Francillon.

Magnitudo praecedentis. Fascia elytrorum marginem haud attingit.

*striatus.* 16. C. longirostris niger elytris holosoriceo striatis.

*Curculio striatulus.* Oliv. Inf. 83. fig. 140.

Habitat in Insula Terra neuve Mus. D. Banks.

Rostrum longum, ferrugineum, apice nigrum.

Thorax rotundatus, scaber, niger. Elytra nigra striis elevatis, holosericeis e punctis albis nigrisque alternis. Pedes ferruginei.

*rubetra.* 17. C. longirostris ater antennis apice griseis, femoribus sulcatis.

*Curculio gagates.* Oliv. Inf. 83. fig. 104.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Magnitudo C. Pini. Corpus totum atrum, laeve, nitidum. Thorax laevis. Elytra subtilissime punctato striata. Femora canaliculata, atra.

*gagates.* 18. C. longirostris ater glaber nitidus rostro subcompresso.

- Habitat Cajennae de Paykull.
- Praecedente triplo minor, totus ater, nitidus, laevissimus, gibbus. Rostrum compressiusculum.
19. *C. longirostris ovatus cineraescens elytris striatis. mendicus.*  
*Curculio mendicus.* Oliv. Inf. 83. tab. 9. fig. 108.  
 Habitat in Insula Madagascar Mus. Regis Galliae.  
 Magnitudo omnino praecedentis totus cinereus.
20. *C. longirostris niger elytris striatis albo maculatis.*  
*Pineti.*  
*Curculio confusus.* Paykull. Monogr. 35. 33.  
 Habitat in Sueciae Pino Dom. de Paykull.  
 Statura omnino C. Abietis at paullo major & femora inermia. Elytra maculata, sive potius punctis nigris albisque alternis striata: albis majoribus.
21. *C. longirostris elytris rufescentibus: fasciis nebulosis.* Linn. Syst. nat. 2. 608. 19. Fn. Sv. 589. Paykull. Monogr. 36. 34.  
*Curculio Pini.* Oliv. Inf. 83. tab. 4. fig. 42.  
*Curculio castaneus.* Degeer Inf. 5. 222. 15.  
 Frish. Inf. 11. tab. 23. fig. 5.  
 Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 7.  
 Habitat in Sueciae Pino.
22. *C. longirostris niger cinereo villosus rostro atro: Onopordi.*  
 utrinque fulco abbreviato baseos.  
 Habitat in Africae Onopordine Prof. Vahl.  
 Affinis sequenti at major & aliis. Rostrum reliquis brevius, nitidum, basi utrinque fulco parvo exaratum. Thorax scaber & elytra nigra villis vel potius squamis cinereis tecta.
23. *C. longirostris ferrugineo fuscus albo lineatus Ursus.*  
 rostro nigro: utrinque fulco abbreviato baseos.  
*Curculio vittatus.* Mant. Inf. 1. 18. 16.  
 Habitat in Italia Dom. Allioni.

*Rostrum cylindricum, nigrum inter oculos fulcis duobus abbreviatis. Thorax ferrugineo fuscus lineis quinque albis. Elytra laevia margine lineaque media albidis.*

- Jacea.* 24. *C. longirostris niger cinereo irroratus elytris puncto baseos distincto.*

Geoff. Inf. I. 281. 8.

Habitat in Cantarea Jacea Prof. Hermann.

*Rostrum crassiusculum, cylindricum, nigrum. Thorax ovatus, niger, cinereo irroratus. Elytra nigra atomis cinereis, villosis adspersa & puncto distincto baseos versus scutellum.*

*Aestate magis glaber & niger evadit.*

- planus.* 25. *C. longirostris niger immaculatus rostro cylindrico, elytris striatis.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

*Statura omnino C. Jaceae at minor. Rostrum breve, cylindricum, obtusum at nullo modo incrassatum. Antennae nigrae clava albo annulata. Thorax niger, obscurus, immaculatus. Elytra striata, nigra apice parum cinereo maculata. Pedes nigri.*

- punctulatus* 26. *C. longirostris flavo fuscoque varius, abdomine cinereo nigro punctato.*

Habitat in America Mus. Dom. Romani.

*Paullo minor C. Jaceae. Corpus totum villosum, flavo fuscoque varium. Antennae nigrae. Thorax inaequalis. Abdomen subtus cinereum punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis. Pedes cinerei.*

- ocularis.* 27. *C. longirostris nigro virescens rostro ferrugineo: orbita oculorum nivea.*

Habitat in Barbaria Mus. Desfontaines.

*Medius. Antennae cinereae articulo primo longiori, nigro. Rostrum elongatum, cylindricum*

- ferrugineum, aetate nigrum evadit. Caput nigrum orbita oculorum nivea. Thorax & elytra scabra, nigra, viridi subvillosa. Pedes nigri, antici parum elongati.
28. *C. longirostris niger* virescenti irroratus rostro *Cynarae.*  
nigro subcarinato.  
Curculio Cardui. Ross. Fn. Etr. I. 111. 284.  
tab. 5. fig. II.  
Panz. Naturf. 24. 18. 25. tab. I. fig. 25.  
Habitat in Cynarae floribus Africae D. Vahl.  
Affinis *C. Jaceae* at duplo fere major. Rostrum nigrum linea media elevata. Thorax planus, scaber linea laterali virescente. Elytra punctato striata atomis plurimis, villoso virescentibus irrorata. Subtus cinereus.
29. *C. longirostris griseus* elytris puncto albo. *Colon.*  
Paykull. Monogr. 33. 32.  
Curculio Colon. Linn. Mant. 531. Oliv. Inf.  
83. fig. 76. Geoff. Inf. I. 280. 6.  
Curculio palustris Scop. carn. 104.  
Herbst Arch. tab. 24. fig. I.  
Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 9. & tab. 62. fig. 10.  
Habitat in Germania.
30. *C. longirostris fuscus* elytris puncto cinereo, 2 *maculatus*  
rostro pedibusque atris.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Paullo minor *C. Colon.* Rostrum incurvum, atrum,  
nitidum. Thorax fuscus linea laterali cinerea.  
Elytra laevia, fusca puncto distincto cinereo.  
Pedes nigri.
31. *C. longirostris ater* elytris striatis: puncto medio *punctatum,*  
albo, antennis pedibusque rubris.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Praecedentibus duplo minor. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum. Antennae ferrugineae

clava fusca. Thorax gibbus, subpunctatus linea media glabra, ater, immaculatus. Elytra striata, atra puncto parvo pone medium albo. Pedes ferruginei.

*biguttatus.* 32. C. longirostris niger elytris puncto elevato, ab domine pedibusque posticis flavis.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Caput nigrum. Thorax cylindricus, niger, immaculatus. Elytra laevia, nigra puncto magno, elevato, globoso, flavescente ad basin. Abdomen flavum. Pedes antici elongati, nigri, reliqui flavi.

*bilineatus.* 33. C. longirostris fuscus elytris lineis duabus punctorum alborum.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Rostrum crassiusculum, nigrum. Thorax niger lineis tribus albis. Elytra striata, nigra lineis duabus e punctis quadratis, albis, quarum altera ad marginem, altera ad futuram. Pedes nigri.

*fordinus.* 34. C. longirostris niger obscurus immaculatus elytris striatis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr. Pflug.

Corpus medium, nigrum, obscurum, minime nitidum, immaculatum. Elytra striata.

*suillus.* 35. C. longirostris obscurus thorace scabro, elytrum striis pilosis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.

Magnitudo & statura praecedentis. Rostrum arcuatum, nigrum antennis obscuris. Thorax obscure cinereus, punctis elevatis scaber. Elytra pilosa, striata striis scabris.

36. *C. longirostris cinereus elytris apice striis al- tessellatus.*  
bis nigro punctatis.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Medius. Caput & antennae fusca. Thorax &  
elytra grisea, at elytra apice striis quinque albis  
& in his puncta distincta, atra.
37. *C. longirostris ater thorace plano punctato, abbreviatus*  
elytris abbreviatis substriatis.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Quadruplo minor *C. Palmarum*. Antennae ni-  
grae, apice cinerascentes. Rostrum incurvum.  
Thorax planus, punctatus linea media parum  
elevata. Elytra obscura, substriata.
38. *C. longirostris ater nitidus thorace plano laevi, nitens.*  
elytris striatis.  
Habitat in Gallia meridionali.  
Minor *C. abbreviato* & aliū. Corpus totum  
atrum, nitidum antennarum clava apice cine-  
rascente. Thorax planus, laevis, nitidus. Ely-  
tra striata longitudine abdominis.
39. *C. longirostris thorace laevi, elytris muricatis Equiseti.*  
nigris: punctis duobus apiceque albis. Herbst  
Arch. tab. 24. fig. 2. Paykull. Monogr. 39,  
36.  
Curculio nigrogibbosus. Degeer Inf. 5. 224. 17.  
Curculio scaber. Linn. Syst. nat. 2. 609. 22.  
Fn. Sv. 592.  
Habitat in Angliae Equisito aruensi.  
Rostrum atrum. Thorax niger, vix tuberculatus  
lateribus albis. Elytra muricata lateribus  
apiceque albis, in parte anteriori nigra puncta  
duo, parva, alba.
40. *C. longirostris niger elytris substriatis rufis.* *dimidiatus.*  
Curculio dimidiatus. Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 5.  
Habitat — — —

Duplo major C. atrirostris.

- Bufo.* 41. C. longirostris fuscus elytris subreticulatis:  
fascia media alba.

Curculio Bufo. Oliv. Inf. 83. fig. 118.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Rostrum elongatum, inflexum, fuscum litura dor-  
sali, cinerea antennisque piceis. Thorax fuscus  
dorso plano punctis duobus minutissimis, albis.  
Scutellum lateraque albida. Elytra plana, ful-  
ca, rufo subvillosa fascia in medio lata, com-  
muni, albida, ad apicem litura alba.

- atritostris.* 42. C. longirostris cinereus rostro arcuato atro. Pay-  
kull. Monogr. 40. 37.

Habitat Lipsiae Mus. Prof. Lefke.

Magnitudo & statura C. Equiseti. Corpus totum  
obscure cinereum, postice obtusiusculum rostro  
solo, arcuato, atro.

- brunniro-  
stris.* 43. C. longirostris griseus rostro pedibusque ferru-  
gineis.

Habitat in Daniae plantis Dom. Lund.

Medius. Rostrum elongatum, incurvum, ferru-  
gineum, nitidum. Antennae ferrugineae, apice  
cinereae. Thorax elytraque grisea, immacu-  
lata. Pedes brunnei.

- festivus.* 44. C. longirostris aeneo nitidus elytris basi angulo  
obtuso, rostro apice antennisque fuscis.

Habitat Surinami.

Magnitudo praecedentis. Rostrum cylindricum,  
aeneum, apice fuscum. Antennae fuscae. Tho-  
rax gibbus, aeneus, nitidissimus. Elytra pun-  
ctato striata, aenea, nitidissima margine baseos  
angulato. Pedes virides.

- Tragiae.* 45. C. longirostris aeneus rostro pedibusque subcon-  
coloribus.

Curculio Tragiae. Oliv. Inf. 83. fig. 112.

- Habitat in Tragiae volubilis seminibus Brasiliae  
Mus. Dom. Banks.
- Parvus. Caput paullo obscurius. Thorax aeneus,  
obscurus. Elytra aenea. Pedes obscuriores.
46. *C. longirostris niger elytris aeneis.* *aeneus.*  
Habitat in Anglia Mus. Dr. Hunter.  
Minutus. Corpus nigrum elytris solis aeneis.
47. *C. longirostris ater nitidus rostro arcuato.* *curvirostris.*  
Curculio curvirostris. Oliv. Inf. 83. fig. 115.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Thorax punctatus. Elytra striata.
48. *C. longirostris ater antennis tibiisque piceis,* *Aethiops.*  
elytris oblongis striatis.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Difficilius distinguitur. Magnitudo & statura omnino C. Cerasi, at femora mutica & color totus, ater, nitidus antennis tibiisque piceis. Elytra oblonga, striata.
49. *C. longirostris fuscus elytris substriatis ferrugineo-Scirpi.*  
gineo irroratis.  
Habitat in Galliae Scirpo Mus. Dom. Bosc.  
Affinis certe praecedenti at distinctus colore magis fusco, elytris minus striatis atomis ferrugineis, antennis pedibusque nigris.
50. *C. longirostris ater antennis ferrugineis,* *tho-Pruni.*  
race bituberculato. Linn. Syst. nat. 2. 507.  
12. Paykull. Monogr. 137. 128. at antennae omnino hujus generis.  
Habitat in Cerasi foliis.  
Valde distinctus utrinque tuberculo elevato thoracis. Elytra striata.
51. *C. longirostris ater immaculatus elytris crenato Armeniacae*  
striatis.  
Habitat Kiliae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis.  
Corpus totum atrum, minime nitidum. Antennae & pedes nigri. Thorax dorso plano. Elytra crenato striata.

- Camelus.* 52. C. longirostris fuscus thorace elytrisque tuberculatis, rostro apice rufo.

Habitat in Germaniae hortis Dom. Smidt.

Medius. Rostrum reliquis brevius, fuscum, apice obscure rufum. Antennae clava ferruginea. Thorax fuscus, obscurus tuberculis aliquot elevatis, acutis. Elytra obscura, striata: striis tuberculis plurimis, elevatis, acutis. Corpus fuscum, obscurum.

- tuberculatus.* 53. C. longirostris thorace quadrituberculato nigro, elytris striatis cinereo variegatis.

*Curculio quadricornis.* Payk. Monogr. 71. 69.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parvus. Rostrum atrum. Corpus cinereum. Pedes cinerei femoribus posticis nigris.

- teter.* 54. C. longirostris depresso villosum fuscum rostro atro.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo C. Campanulae, at supra magis planus. Antennae fuscae. Thorax planus, villosum, fuscus, immaculatus. Elytra striata, villosa, fusca. Corpus fuscum.

- Campanula-* 55. C. longirostris ovatus niger elytris striatis obtusis. Linn. Syst. nat. 2. 506. 7. Paykull. Monogr. 28. 27.

Degeer Inf. 5. 236. 23.

Habitat in Campanulae rotundifoliae pericarpis.

Corpus totum nigrum, postice obtusum.

56. *C. longirostris viridis rostro atro.* Paykull. *nigrirostris.*  
 Monogr. 56. 53.  
 Ross. Fn. Etrusc. I. 114. 292.  
 Herbst Arch. tab. 24. fig. 3.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
 Caput fuscum rostro cylindrico, atro, nitido.  
 Thorax gibbus, rotundatus, viridis lineis duabus dorsalibus, fuscis. Elytra tomentosa, viridia, immaculata. Pedes fuscii.
57. *C. longirostris subtestaceus thorace viridi linea-* *variabilis.*  
*to, rostro apice fusco.*  
*Curculio nigrirostris*  $\beta$ . Paykull. Monogr. 57.  
 53.  $\beta$ .  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
 Medius. Caput pallide testaceum rostro apice fusco. Antennae rufescentes clava cinerea. Thorax obscurus lineis tribus distinctis, viridibus. Elytra pallide rufescens, polline virescens adspersa. Pedes rufi.
58. *C. longirostris oblongus niger argento holoseri-* *picrostris.*  
*ceus rostro dimidiato pedibusque piceis.* Paykull. Monogr. 63. 60.  
 Habitat Hafniae Dom. Lund, in capitulis Trifolii Paykull.  
 Caput nigrum rostro dimidiato piceo. Pedum geniculi nigri.
59. *C. longirostris niger antennarum basi coleoptro-* *Salicariae.*  
*rum disco tibiisque testaceis.*  
*Curculio Lythri.* Paykull. Monogr. 74. 48.  $\beta$ .  
 Habitat in Lythro Salicaria Angliae Dom. Banks.  
 Corpus parvum, nigrum. Rostrum striatum & thorax nigra, immaculata. Coleoptra striata disco testaceo, margine omni nigro. Pedes testacei femoribus apice fuscis.

- floralis.* 60. *C. longirostris obscure griseus elytrorum futura pallida.*  
 Habitat in Sueciae floribus Dom. de Paykull.  
 Corpus parvum. Rostrum arcuatum, nigrum.  
 Thorax tuberculatus. Elytra striata futura albida.
- Pseudacori.* 61. *C. longirostris supra niger thoracis lateribus ferrugineis, elytris striatis: futura basi alba.*  
 Habitat in Galliae Pseudacoro Mus. Dom. Bosc.  
 Affinis certe sequentibus at distinctus & duplo major. Rostrum longum, arcuatum, nigrum, basi ferrugineum. Thorax supra niger, subitus lateribusque in primis antice ferrugineus. Corpus cinereum pedibus nigris.
- Castor.* 62. *C. longirostris ovatus thorace tuberculato, coleoptris striatis: futura basi albida, pedibus rufis.*  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Statura omnino *C. pericarpii* & ejus varietas teste Paykull. Rostrum crassiusculum, atrum. Thorax tuberculatus, fuscus lateribus pallidioribus. Elytra striata, interdum variegata, interdum obscure, semper tamen futura basi albita. Pedes rufi.
- pericarpius.* 63. *C. longirostris subglobosus nebulosus / elytrorum futura basi alba.* Linn. Syst. nat. 2. 609.  
 31. Fn. Sv. 602. Paykull. Monogr. 67. 65.  
*Herbst Arch. tab. 24. fig. 4.*  
 Habitat in Scrophulariis.  
 Totus supra obscure fuscus futura basi alba, subitus cinereus. Femora clavata. Pedes picei.
- quercicola.* 64. *C. longirostris ater thorace tuberculato, elytris striatis: futura basi alba, pedibus nigris.* Payk. Monogr. 70. 68.  
 Habitat in Sueciae Quercu Dom. de Paykull.  
 Affinis certe *C. castor* at minor & pedes nigri.

65. *C. niger thorace bituberculato canaliculatoque, assimilis.*  
 elytris striatis. Paykull. Monogr. 69. 67.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Paullo minor *C. pericarpio* cui affinis.
66. *C. longirostris albo fuscoque varius elytris Sisymbrii.*  
 puncto baseos elevato atro, rostro nigro. Pay-  
 kull. Monogr. 55. 52.  
 Habitat in *Sisymbrio amphibio* Kiliae lectus die  
 XX Maj.  
 Parvus. Rostrum elongatum, nigrum. Antennae  
 fuscae. Thorax albidus macula fusca, in qua  
 linea dorsalis, albida. Elytra albo fuscoque va-  
 ria & ad basin puncto parvo, atro. Corpus al-  
 bidum.
67. *C. longirostris coleoptris fasciis duabus abbre- capreae.*  
 viatis albis.  
 Habitat in Salice caprea Angliae Dom. Banks.  
 Parvus. Caput, thorax, corpus atra. Thorax  
 linea dorsali cinerascente. Elytra striata, atra  
 fasciis duabus sinuatis, albis, quae tamen mar-  
 ginem exteriorem haud attingunt. Pedes nigri.
68. *C. longirostris villosus cinereus elytris macula bipunctatus*  
 media fusca. Paykull. Monogr. 58. 55.  
*Curculio 2 punctatus longirostris cinereus ely-*  
*tris macula nigra, tibiis flavescentibus. Linn.*  
*Syst. nat. 2. 609. 28. Fn. Sv. 599.*  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Parvus. Antennae testaceae. Supra totus villo-  
 sus, cinereus macula elytrorum media, fusca.  
 Subtus obscurior vel nigricans tibiis testaceis.
69. *C. longirostris villosus virescens rostro nigro, Carpini.*  
 pedibus testaceis.  
*Curculio Carpini Knoch. Beytr.*  
 Habitat in Germaniae Carpino Dom. de Sehe-  
 stedt.

Statura & summa affinitas praecedentis. Differt  
tantum elytris immaculatis pedibusque totis  
testaceis.

*Erysimi.* 70. C. longirostris niger thorace bituberculato vi-  
rescente, elytris cyaneis. Paykull. Monogr.  
76. 73.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Praecedentibus magis gibbus. Rostrum nigrum.  
Thorax obscure viridis tuberculo utrinque ele-  
vato. Elytra striata, cyanea. Pedes nigri.

*maculatus* 71. C. longirostris nigricans coleoptris maculis  
quatuor albidis. Linn. Syst. nat. 2. 609. 29.  
Fn. Sv. 600.

Curculio cinereus elytrorum puncto quadruplici  
albo. Geoff. Inf. 1. 187. 22.

Habitat in Europae plantis.

*unifascia-* 72. C. longirostris supra fuscus elytris fascia media  
tus.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Medius. Caput fuscum rostro nigro. Thorax  
supra fuscus, cinereus. Elytra substriata fascia  
in medio lata, cinerea. Litura ad apicem cine-  
rea. Pedes nigri femoribus albidis.

*Lythri.* 73. C. longirostris ater elytris fascia media abbre-  
viata punctoque postico albis, pedibus flavis.  
Paykull. Monogr. 74. 71.

Habitat in Lythri floribus Uplandiae Dom. de  
Paykull.

Parvus. Caput & thorax atra, nitida. Elytra  
nigra fascia media alba, quae tamen marginem  
haud attingit. Pone fasciam punctum parvum,  
oblongum. Pedes flavi genibus nigris.

*bifasciatus.* 74. C. longirostris niger elytris fasciis duabus ci-  
nereis, baseos majore undata.

Habitat Kiliae Dom. Lund.

Rostrum atrum. Thorax rotundatus, ater linea dorsali pallidiore. Scutellum cinereum. Elytra striata fasciis duabus undatis, cinereis, vix marginem exteriorem attingentibus, quarum baseos ad futuram major, altera in medio angustior. Pedes nigri. Affinis C. Salicis at pedes mihi haud saltatorii videntur.

75. C. longirostris niger antennis pedibusque piceis, *acridulus*.  
abdomine ovato. Linn. Syst. nat. 2. 507. 13.  
Fn. Sv. 584. Paykull. Monogr. 50. 47.  
Degeer Inf. 5. 235. 22.  
Herbst Arch. tab. 24. fig. 12.  
Habitat frequens in floribus tetrodynamis.  
Elytra punctato striata.
76. C. longirostris fuscus thorace tuberculato, ely- *scabrus*.  
tris scabris, pedibus piceis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Affinis sequenti at paullo minor. Rostrum apice atrum. Thorax in medio basi canaliculatus, utrinque tuberculatus. Elytra striata, punctisque elevatis scabra. Pedes picei.
77. C. longirostris supra ater thorace bituberculato *alauda*,  
marginaque antico elevato.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo omnino C. acriduli. Rostrum arcuatum, atrum antennis nigris. Caput nigrum. Thorax in medio canaliculatus, utrinque tuberculatus margine antico elevato, acuto. Elytra ovata, striata, nigra, immaculata. Corpus cinereum pedibus nigris.
78. C. longirostris elytris rubris: sutura dimidiata *dorsalis*.  
nigra. Linn. Syst. nat. 2. 608. 17. Fn. Sv.  
588. Paykull. Monogr. 14. 13. at femora  
dentata.  
Curculio dorsalis. Oliv. Inf. 83. fig. 169.

- Habitat in Ranunculo Ficaria.  
 Parvus, nimis affinis C. Refinae at femora iner-  
 mia. Tibiae flavae.
- Quercus.* 79. C. longirostris cinereus thoracis dorso fuscō,  
 elytris testaceis cinereo undatis.  
 Curculio Quercus. Linn. Syst. nat. 2. 614. 59.  
 Curculio Rana thorace fuscō: limbo testaceo,  
 elytris testaceis: fasciis tribus undatis cine-  
 reis. Mant. Inf. 1. 101. 52.  
 Habitat in Kiliae, Sueciae Quercu.  
 Parvus. Corpus cinereum. Rostrum nigrum.  
 Thoracis dorsum fuscum linea media pallidiori.  
 Elytra striata, pallide testacea fasciis 4-5 un-  
 datis, cinereis. Pedes testacei.
- futuralis.* 80. C. longirostris ovatus fuscus: linea longitudi-  
 nali alba.  
 Habitat in Germaniae Salice.  
 Corpus parvum. Rostrum arcuatum, nigrum.  
 Thorax fuscus linea dorsali alba. Elytra stria-  
 ta, gibba futura alba, subtus cinereus.
- Crux.* 81. C. longirostris ater thorace punctis duobus ba-  
 seos, elytris futura punctisque sparsis albis.  
 Habitat Hamburgi Dr. Schulz.  
 Caput atrum rostro incurvo. Thorax rotundatus,  
 ater utrinque puncto oblongo baseos albo.  
 Scutellum album. Elytra striata, nigra futura  
 ad basin punctisque plurimis, sparsis, albis. Pe-  
 des nigri. Corpus subtus albidum.
- Lemnae.* 82. C. longirostris ater rostro apice plano, elytris  
 striatis.  
 Habitat in Germaniae Lemna Prof. Helwig.  
 Minutus. Rostrum elongatum, apice planum.  
 Thorax punctatus. Elytra striata.
- exclamatio-* 83. C. longirostris ater elytris puncto lineolaque  
 apicis albis.

- Curculio exclamationis.** Oliv. Inf. 83. fig. 167.  
**Habitat** in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
**Parvus, ater, nitens puncto in medio & lineola**  
**ad apicem elytrorum albis.**
- 84. C. longirostris fuscus thorace elytrisque albo venustus.**  
**lineatis, pedibus testaceis.**  
**Curculio albovittatus.** Herbst Arch.  
**Habitat** in Anglia Mus. Dom. Banks.  
**Parvus. Caput fuscum antennis testaceis linea-**  
**que dorsali albida. Thorax fuscus lineis tribus**  
**albidis. Elytra punctato striata, dilutiora lineis**  
**duabus subinterruptis, albis. Pedes testacei.**
- 85. C. longirostris elytris cinereis: macula media Plantagi-**  
**fusca.** Paykull. Monogr. 44. 41. **ginis.**  
**Curculio Plantaginis.** Degeer Inf. 5. 237. 24.  
**tab. 7. fig. 17. 18.**  
**Habitat** Halae Dom. Hybner.  
**Rostrum nigrum. Thorax cinereus, medio fus-**  
**cus linea dorsali, cinerea. Elytra cinerea ma-**  
**cula magna, media, fusca & praeterea puncta**  
**aliquot ejusdem coloris.**
- 86. C. longirostris griseus nigro nebulosus antennis Rumicis.**  
**fuscis.** Linn. Syst. nat. 2. 613. 60. Fn. Sv.  
**390.** Paykull. Monogr. 43. 40.  
**Degeer Inf. 5. 231. 20. tab. 7. fig. 10. 11.**  
**Raj. Inf. 85. 36.**  
**Habitat** in Europae borealis Rumice.  
**Femora in nostris speciminibus mutica.**
- 87. C. longirostris griseus thorace nigro cinereo li- adspersus.**  
**neato, elytris punctis nigris tessellatis.**  
**Habitat** Kiliae.  
**Statura & summa affinitas C. Ruminis. Ro-**  
**strum cylindricum, atrum, immaculatum.**  
**Thorax niger linea laterali, albida. Elytra ob-**  
**scura, albo sublineata punctisque numerosis**

nigris tessellata punctoque majori, communis apicis. Corpus griseum.

*granarius*. - 88. C. longirostris piceus thorace punctato longitudo elytrorum. Linn. Syst. nat. 2. 608. 16.

Fn. Sv. 587. Payk. Monogr. 54. 51.

Geoff. Inf. 1. 255. 18.

Raj. Inf. 88.

Joblot. Obs. Microscop. 1754. tab. 7. fig. 1.

Degeer Inf. 5. 239. 25.

Devastat granaria. Pellitur Isatide, Hyoscyamo, Sambuco, Thlaspide.

*Oryzae*. 89. C. longirostris piceus thorace punctato longitudo elytrorum, elytris punctis duobus rufis.

Curculio Oryzae. Linn. Amoen. acad. 6. 395. 19.

Curculio Oryzae. Oliv. Inf. 83. fig. 81.

Habitat in Oryza faepius lectus inter grana ex Oriente ad portata.

Statura & summa affinitus C. granarii at puncta duo in elytris rufa.

*2 tuberculata*. - 90. C. longirostris ferrugineus thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorsalibus elevatis.

Curculio 2 tuberculatus. Oliv. Inf. 83. fig. 165.

Habitat in nova Zealandia Mus. Dom. Banks.

Statura & summa affinitus praecedentium. Corpus obscure ferrugineum. Thorax punctatus punctisque duobus dorsalibus, elevatis. Elytra punctato striata.

*paraplecti-* 91. C. longirostris cylindricus subcinereus elytris mucronatis. Linn. Syst. nat. 2. 610. 24. Fn.

Sv. 604. It. Scan. 184. Paykull. Monogr.

53. 50.

Curculio paraplecticus. Oliv. Inf. 83. fig. 106.

Curculio oblongus elytris villoso cinereis, sutura nigra. Geoff. Inf. 1. 279.

- Schreber. Sammlung. Tom. XI. 336. tab. 4.
- Degeer Inf. 5. 224. 18. tab. 7. fig. 8.
- Sulz. Hist. Inf. tab. 4.. fig. 7.
- Schaeff. Icon. tab. 44. fig. 1.
- Habitat Larva intra caulem umbellatarum aquaticarum. Paraplegiam equorum cauſſare fertur.
- 92. C. longirostris cylindricus canus fusco lineatus. *anguinus.***
- Linn. Syst. nat. 2. 610. 35.
- Circulio anginus. Oliv. Inf. 33. fig. 168.
- Panz. Naturf. 24. 19. 26. tab. 1. fig. 26.
- Habitat in Germania.
- Mihi haud rite notus. Forte mera varietas sequentis.
- 93. C. longirostris oblongus obscurus elytris cinereis *striatellus.***
- fusco substriatis.
- Habitat in Barbariae plantis Mus. Dom. Desfontaines.
- Magnitudo & statura praecedentium. Antennae clava acuminata, cinerea. Thorax fuscus lateribus striisque obsoletis, albidis. Elytra cinerea, fusco substriata. Corpus obscurum.
- 94. C. longirostris thorace nigro cinereo lineato, *umbellata-***
- elytris mucronatis griseis.* rum.
- Habitat in Barbariae Umbellatis Dom. Vahl.
- Duplo fere minor C. paraplectico. Rostrum atrum, nitidum. Thorax niger, obscurus lineis quatuor cinereis: intermediis abbreviatis. Elytra grisea, apice mucronata.
- 95. C. longirostris cylindricus cinereus fusco linea-**
- mucronatus* *tus elytris mucronatis.*
- Habitat in Barbariae plantis.
- Statura & magnitudo C. paraplectici. Rostrum utrinque linea pallida, apice nigrum. Antennae breves, inflexae, extrorsum crassiores. Thorax cinereus dorſo fusco lineis duabus longi-

tudinalibus, cinereis, lateribus atris: margine  
albo, apice mucronata. Subtus albus punctis  
nigris.

- ferrugatus.* 96. C. longirostris niger ferrugineo villosum elytris obtusis.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Corpus cylindricum magnitudine C. paraplectici totum ferrugineo tomentosum rostro solo cylindrico, nigro.

- gages.* 97. C. longirostris ater nitidus elytris striatis obscuris, rostro truncato.

Habitat in Aquapim Guineae Dr. Isert.

Statura omnino & magnitudo C. paraplectici. Rostrum cylindricum, reliquis brevius, truncatum, atrum. Thorax planus, laevis, ater, nitidus. Elytra parum abbreviata, striata, obscura, minime nitida. Pedes breves, atri, nitidi.

- 8 lineatus.* 98. C. longirostris cylindricus niger thorace elytris que lineis quatuor albis.

Curculio 8 lineatus. Oliv. Inf. 83. fig. 89.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Reg. Galliae.

Statura & magnitudo C. paraplectici at distinctus.

- semipunctatus.* 99. C. longirostris cylindricus thorace lineis elytris punctis albis.

Curculio semipunctatus. Oliv. Inf. 83. fig. 141.

Brentus semipunctatus. Mant. Inf. 1. 96. 4.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput nigrum orbita oculorum alba. Thorax ater, canaliculatus lineis quinque albis. Elytra punctata, substriata, abdomine longiora, acutiuscula, nigra punctis numerosis albis, sparsis. Subtus albicans punctis aliquot nigris. Pedes fuscii.

- 4 pustulatus* 100. C. longirostris niger elytris maculis duabus ferrugineis.

*Curculio 4 pustulatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 117.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Antennarum clava apice albida. Rostrum cylindricum, atrum. Thorax ater macula utrinque marginali, albida. Elytra striata, truncata, nigra maculis duabus ferrugineis anteriori majori.

101. *C. longirostris cylindricus albo fuscoque nebulosus elytris submucronatis, antennarum clava testacea.*

Habitat in Barbariae plantis Mus. Dom. Desfontaines.

Statura & magnitudo fere *C. paraplectici*. Rostrum reliquias brevius, crassiusculum, nigricans. Antennarum clava acuminata, testacea. Thorax cinereo fuscoque mixtus punctisque elevatis atris, scaber. Elytra vix striata uti totum corpus colore fusco cineroque mixto.

102. *C. longirostris cylindricus subcinereus thorace filiformis.*  
lineis tribus fuscis.

Habitat in Italia Dom. Dr. Allioni.

Quadruplo minor *C. paraplectico*. Rostrum fuscum. Thorax cinereus lineis tribus fuscis. Elytra cinerea, immaculata, minime punctata, obtusa. Pedes fuscii.

103. *C. longirostris cylindricus supra niger elytris cylindricus.*  
acuminatis: fascia pallida.

*Curculio cylindricus.* Oliv. Inf. 83. fig. 123.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

*C. paraplectico minor.* Rostrum atrum antennarum clava acuminata, nigra fascia pone medium lata, alba, quae antice ad futuram extenditur. Abdomen nigrum apice album.

104. *C. longirostris thorace fuscō : punctis quatuor albinis, elytris fuscis : fascia sexquialtera testacea.*

Habitat in Barbariae plantis Dom. Vahl.  
 Caput fuscum, sive obscure rufum. Rostrum atrum. Thorax fuscus punctis quatuor transversim positis, parvis, albis. Scutellum album. Elytra striata, fusca fasciis duabus testaceis: anteriore abbreviata, posteriore ad futuram macula alba terminata. Litura alba ad futuram.

*barbirostris.* 105. C. longirostris niger rostro barbato, tibiis anticis tridentatis.

Curculio barbirostris. Oliv. Inf. 83. fig. 37.  
 Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 5.

Habitat in Indiis Mus. Dom. Kramer.

Paullo major C. paraplectico. Rostrum tenue barba laterali, densa, ferruginea. Thorax scaber. Elytra profunde sulcata sulcis scabris. Femora mutica at tibiae anticae tridentatae.

*angustatus.* 106. C. longirostris cylindricus ater elytris obtusis punctatis.

Curculio angustatus. Herbst Arch. tab. 24. fig. 7.

Curculio pulverulentus. Ross. Fn. Etr. I. III. 283.

Habitat in Anglia.

Paullo major C. paraplectico. Thorax scaber. Elytra striato punctata.

*Bardanae.* 107. C. longirostris cylindricus griseo tomentosus pedibus anticis elongatis.

Habitat in Bardana Saxoniae Mus. Dom. Romanus.

Statura & magnitudo C. paraplectici. Junior totus griseo tomentosus, adultior niger & glaber. Elytra rotundata, obtusa. Pedes antici parum elongati.

*Afcanii.* 108. C. longirostris cylindricus ater lateribus subcoerulecentibus. Linn. Syst. nat. 2. 610. 36.

**Curculio Ascanii.** Oliv. Inf. 83. fig. 83.

Herbst Arch. tab. 24. fig. 8.

Habitat in Europa australiori.

Paullo minor C. paraplectico.

**109.** *C. longirostris cylindricus niger elytris vitta lineola.*  
testacea.

*Curculio lineola.* Oliv. Inf. 83. fig. 185.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Parvus, cylindricus, niger. Antennae fuscae.

Thoracis dorsum planum. Elytra striata vitta lata, testacea.

Variat interdum elytris loco vittae solo puncto baseos apicisque testaceo.

**110.** *C. longirostris elongatus niger antennis pedi- linearis.*  
busque piceis, rostro basi attenuato. Payk.

Monogr. 51. 48.

Habitat Strasburgi Dom. Prof. Hermann.

Statura valde oblonga & tenuis. Minor C. Ascanii. Rostrum mediocre, basi valde attenuatum, apice multo crassius. Antennae ferrugineae. Thorax oblongus, punctatus. Elytra striata. Pedes picei.

Variat interdum corpore toto ferrugineo.

**111.** *C. longirostris femoribus anticis subclavatis, crassipes.*  
corpore atro.

Habitat Strasburgi Mus. Prof. Hermann.

Statura cylindrica C. Ascanii. Antennae nigrae, apice fuscae. Thorax elongatus, planus at crassitie fere elytrorum, postice rotundatus. Elytra abdomine breviora, laevia, atra.

**112.** *C. longirostris elongatus ater thorace nitido, Atriplicis.*  
elytris striatis obtusis.

*Curculio T. album.* Linn. Syst. nat. 2. 609. 23.

Fn. Sv. 594. Paykull. Monogr. 52. 49.

Habitat in Atriplici littorali Florae Kiloniensis  
Dom. Lund.

Statura & magnitudo C. linearis. Differt tamen  
antennis apice haud ferrugineis, rostro tenui,  
haud basi attenuato, thorace minus punctato,  
nitidiori.

*Lymexylon* 113. C. longirostris elongatus griseus thorace sea-  
bro, elytris striatis.

Habitat in Germaniae ligno Quercino Dr. Helwig.  
Statura & magnitudo omnino C. Atriplicis.  
Rostrum cylindricum, griseum, apice nigrum.  
Antennae breves clava ovata. Thorax & ely-  
tra grisea.

\*\* *Longirostres femoribus dentatis.*

*calcaratus.* 114. C. longirostris femoribus dentatis niger ely-  
tris fusco irroratis, tibiis anticis acute den-  
tatis.

Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 186.

Habitat — — Mus. Dom. Geoffroy.

Maximus in hoc ordine. Rostrum cylindricum.  
Thorax depresso, planus, punctatus. Ely-  
tra subacuminata, obscura, fusco irrorata.  
Pedes antici elongati femoribus tibiisque an-  
ticis in medio acute dentatis.

*bidens.* 115. C. longirostris femoribus posticis dentatis ni-  
ger elytris unispinosis.

*Curculio bidens.* Oliv. Inf. 83. fig. 113.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Corpus magnitudine C. viridis. Rostrum atrum,  
nitidum. Antennae fuscae. Thorax subrugoso-  
sus. Elytra striata striis crenatis, in medio  
spina erecta, valida, acuta armata. Pedes ni-  
gri femoribus posticis dente valido, comprepresso.

---

**116. C. longirostris femoribus dentatis griseus tho- *Taurus.***

race elytrisque tuberculatis, rostro cornubus  
duobus arcuatis.

*Curculio Taurus.* Oliv. Inf. 83. fig. 60.

Habitat in Cajennia.

Corpus magnum, griseum tuberculis elevatis,  
validis. Rostrum utrinque in medio cornu ar-  
cuato, elongato, valido. Pedes nigri.

**117. C. longirostris femoribus dentatis thorace tu- *cornutus.***

berculato, rostro utrinque acute spinoso.

*Curculio cornutus.* Oliv. Inf. 83. fig. 193.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Geoffroy.

Magnus, tuberculatus, ater rostro utrinque spina  
media, acuta, valida.

**118. C. longirostris femoribus dentatis fuscus tho- *miliaris.***

race elytrisque tuberculis numerosis atris.

*Curculio miliaris.* Oliv. Inf. 83. fig. 83.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Magnus. Rostrum cylindricum, arcuatum,  
atrum, nitidum. Thorax & elytra tuberculis  
numeroſiſſimis, elevatis, atris. Pedes antici  
parum elongati, atri.

**119. C. longirostris femoribus dentatis oblongus ni- *cyanicollis.***

gricans thorace cyaneo: lateribus scabris,  
elytris striatis.

*Curculio cyanicollis.* Oliv. Inf. 87. fig. 121.

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Magnus, oblongus. Rostrum longum, apice ob-  
tusum. Thorax cyaneus lateribus punctis  
elevatis scaber. Elytra striata, scabra.

**120. C. longirostris femoribus dentatis obscurus *Jamaicensis***

scaber thorace utrinque fasciculato tubercu-  
lato, elytris striatis.

*Curculio Jamaicensis.* Oliv. Inf. 83. fig. 83.

Habitat in America meridionali Mus. D. Banks.

Magnus. Rostrum cylindricum, incurvum, nigrum antennis cinereis. Thorax supra planus, obscure griseus punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis irroratus, lateribus utrinque tuberculo e pilis ferrugineis angulatis. Elytra striata, obscure grisea punctis itidem elevatis, atris. Femora acute dentata tibiisque apice dentatis.

*senegalensis* 121. C. femoribus dentatis ater elytris tuberculatis acuminatisque: maculis duabus tomentosae aureis.

Habitat in Senegal. Paykull.

Corpus magnum, atrum. Thorax planus, nittens, inmedio tuberculis tribus, ovatis, obtusis, postice pluribus, minoribus. Elytra striata striis punctatis tuberculatis plurimis elevatis, compressis: baseos majori, apice acuminata. Maculae duae aureae, altera ad basin, altera versus apicem, oblonga.

*validus.* 122. C. longirostris femoribus anticis dentatis oblongus scaber niger tibiis anticis dentatis.

*Curculio validus.* Oliv. Inf. 83. fig. 186.

Habitat Cajennae.

Corpus magnum, oblongum, nigrum thorace elytrisque scabris. Tibiae antice acute dentatae.

*coronatus.* 123. C. longirostris femoribus dentatis niger thorace antice spinis ciliato, elytris striatis.

*Curculio coronatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 70.

Habitat — —

Corpus magnum, oblongum, nigrum. Caput & thorax atra thorace antice spinis plurimis, subarcuatis ciliato. Elytra punctis elevatis striata.

124. C. longirostris femoribus quatuor anticis dentatis, elytris polline flavescentibus supra apicem gibbosus. Linn. Syst. nat. 2. 612. 49. Mus. Lud. Ulr. 53.

Habitat in India orientali.

125. C. longirostris femoribus quatuor posterioribus pugnoso-dentatis, elytris striatis nigris: linea repanda grisea. Linn. Syst. nat. 2. 612. 50. Mus. Lud. Ulr. 46.

Habitat in India orientali.

126. C. longirostris femoribus dentatis niger thorace lineis duabus, elytris strigis quatuor albis, tibiis anticis spinosis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Mus. Dr. Hunter.

Magnus. Rostrum cylindricum, incurvum, atrum. Thorax antice attenuatus, punctatus, ater linea utrinque alba. Elytra punctis elevatis scabri strigis tribus albis, quarum baseos arcuata cum secunda ad marginem exteriorem coit. Pedes nigri. Femora omnia acute dentata. Tibiae anticae in medio dentatae.

127. C. longirostris femoribus dentatis ferrugineo bombina; fuscus elytris striatis: tuberculis elevatis albis.

Curculio bombina. Oliv. Inf. 83. fig. 12.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Magnus. Caput fuscum rostro cylindrico antennisque nigris. Thorax laevis, glaber, ferrugineo fuscus. Elytra striata, ferrugineo fusca punctis elevatis, globosis, atris. Corpus & pedes ferrugineo fusca femoribus dentatis.

- Scorpio.* 128. *C. longirostris femoribus dentatis ater thorace*  
*plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis*  
*acuminatisque medio cinereis.*  
*Curculio Scorpio. Oliv. Inf. 83. fig. 14.*  
*Habitat Cajennae Dom. von Rohr.*  
*Magnus. Caput atrum rostro plano, laevi, atro.*  
*Thorax planus, utrinque angulatus, antice*  
*lateribusque niger, postice cinereus. Elytra*  
*punctato striata, tuberculato spinosa, apice*  
*acuminata, cinerea margine atro, qui color in*  
*medio excurrit & fere fasciam latam, abbreviatam*  
*constituit. Corpus atrum.*
- Chimaris.* 129. *C. longirostris femoribus posticis dentatis ni-*  
*ger albo maculatus pedibus anticis longif-*  
*fimis.*  
*Oliv. Inf. 83. fig. 130.*  
*Habitat in Americae meridionalis Chimaris*  
*cymosa Dom. Isert.*  
*Magnus. Rostrum elongatum, incurvum, atrum,*  
*nitidum, -parum depresso. Thorax scaber,*  
*niger, albolineatus. Elytra striata, nigra, albo*  
*maculata. Pedes nigri femoribus anticis valde*  
*elongatis, rectis, inermibus. Femora quatuor*  
*postica dentata.*
- guttatus.* 130. *C. longirostris femoribus subdentatis niger*  
*thorace maculis duabus baseos, elytris tuber-*  
*culatis: punctis albidis.*  
*Curculio guttatus. Oliv. Inf. 83. tab. 5. fig. 45.*  
*Habitat Cajennae.*  
*Corpus medium, nigrum. Caput atrum, imma-*  
*culatum. Thorax maculis duabus baseos albis.*  
*Elytra subacuminata, tuberculata, nigra pun-*  
*ctis plurimis, albis, sparsis.*
- fascicularis* 131. *C. longirostris femoribus dentatis niger elytris*  
*fasciculato pilosis, pedibus cinereo variis.*

*Curculio fascicularis.* Oliv. Inf. 83. tab. I. fig. 9.

Habitat Cajennae.

Medius. Rostrum cylindricum, incurvum, nigrum. Thorax pilosus. Elytra fasciculato pilosa; pilis nigris hinc inde cinereis. Pedes omnes cinereo variegati.

132. *C. longirostris femoribus dentatis niger elytris crenato striatis: punctis duobus albis.* *Hystrix.*

*Curculio Hystrix.* Oliv. Inf. 83. tab. 15. fig. 182.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Geoffroy.

Magnitudo praecedentium. Thorax antice scaber. Elytra puncto baseos alteroque pone medium albidis.

133. *C. longirostris femoribus dentatis brunneus marmoratus albo maculatus.*

*Curculio marmoreus.* Oliv. Inf. 83. tab. 13. fig. 153.

Habitat Cajennae.

Medius. Rostrum basi brunneum, apice fuscum. Orbita oculorum flavescens. Thorax laevius, flavo maculatus. Elytra striato punctata, flavo maculata.

134. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace carinato, elytris sulcatis tuberculato spinosis.* *scaber.*

Habitat Cajennae Dom. Mallet.

Magnitudo fere C. Palmarum. Rostrum nigrum. Thorax carinatus, niger. Elytra sulcata striis elevatis tuberculisque subspinosis, scabra. Pedes atri femoribus acute dentatis.

135. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace linea laterali, elytris albo punctatis maculisque duabus brunneis.* *3fasciatus,*

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Rostrum testaceum. Thorax punctatus, testaceus macula magna laterali, villoso brunnea,

quae tamen nec basin, nec apicem attingit.  
Elytra testacea punctis impressis, villoso albis  
striata maculisque duabus magnis holofericeo  
brunneis: posteriore biloba. Corpus testaceum.

- cylindriro-* 136. C. longirostris femoribus dentatis, thorace sca-  
bro, elytris postice bituberculatis.

*stris.* *Curculio cylindrirostris.* Oliv. Inf. 83. fig. 128.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

*Magnus.* Caputnigrum rostro cylindrico. Thorax fuscus, punctis numerosis, elevatis scaber. Elytra fusco griseoque varia lineis elevatis quatuor subserratis interstitiis punctato striatis. Tuberculorum duo paria erecta ad apicem elytri. Pedes variegati, antici elongati femoribus acute dentatis.

- figma.* 137. C. longirostris femoribus dentatis, elytris ma-  
cula magna ferruginea. Linn. Syst. nat. 2.  
612. 52. Mus. Lud. Ulr. 48.

Habitat in Indiis.

Macula magna ferruginea in medio elytrorum.

- hebes.* 138. C. longirostris femoribus subdentatis, thorace sca-  
bro, elytris sulcatis tuberculatis, ore bar-  
bato.

*Curculio hebes.* Oliv. Inf. 83. fig. 144.

Habitat in Bengalio Mus. Dom. Banks.

*Medius.* Rostrum scabrum, atrum ore pilis  
fasciculatis ferrugineis. Thorax rotundatus,  
punctis elevatis scaber, immaculatus. Elytra  
sulcata sulcis apice per paria coeuntibus, tu-  
berculis novem 3. 3. 3. oblique positis, atra  
maculis duabus cinereis, altera ad marginem  
crassiore, altera ad apicem. Pedes atri, sca-  
bri femoribus subdentatis.

- annulatus.* 139. C. longirostris femoribus dentatis pallidus  
thorace elytrisque strigis nigris.

- Curculio annulatus.** Oliv. Inf. 83. fig. 62.  
**Curculio annulatus.** Linn. Syst. nat. 2. 613.  
 54. Mus. Lud. Ulr. 51.  
 Habitat in India.  
 Striga unica in thorace & duae in elytris.
- 140. C. longirostris femoribus dentatis, elytrorum *caliginosus*.**  
 striis punctatis approximatis.  
 Habitat in Anglia Mus. Britann.
- Statura oblonga C. paraplectici at paullo minor,  
 totus ater, obscurus, minime nitens. Thorax  
 rotundatus, punctatus, carinatus. Elytra striato  
 punctata striis profundis per paria approxi-  
 matis. Femora acute dentata.
- 141. C. longirostris femoribus dentatis niger tho- *dubius*.**  
 race laevi, elytris striatis scabris.  
 Habitat — — Dr. Schulz.  
 Magnus. Rostrum atrum, apice planum. Tho-  
 rax laevis, niger, obscurus. Elytra obtusa,  
 striata punctisque elevatis, atris, nitidis scabra.  
 Pedes antici parum elongati.
- 142. C. longirostris femoribus dentatis fulvo irro- *roreus*.**  
 tus pedibus anticis elongatis.  
**Curculio adspersus.** Mant. Inf. 1. 106. 105.  
 Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
 Magnitudo & statura omnino C. Cynarae at  
 femora quatuor dentata. Corpus totum ato-  
 mis fulvis laetis tectum. Pedes fusci.
- 143. C. longirostris femoribus dentatis brunneus *brunneus*.**  
 rostro fusco, elytris testaceis punctato striatis.  
**Curculio brunneus.** Oliv. Inf. 83. fig. 120.  
 Habitat ad Cap. Bon, spei Mus. Dom. Banks.  
 Magnus. Caput brunneum rostro fusco basi  
 utrinque sulcato. Thorax punctatus, brun-  
 neus. Elytra striato punctata striis apice per  
 paria coeuntibus, testacea apice puncto elevato,



gibbo. Pedes testacei femoribus acute dentatis.

*Abietis.* 144. C. longirostris femoribus dentatis niger elytris fasciis linearibus interruptis albis. Linn. Syst. nat. 2. 613. 57. Fn. Sv. 615. Iter. Oeland, 26. Paykull. Monogr. 2. 2.

Degeer Inf. 5. 205. 1. tab. 6. fig. II.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 1.

Petiv. Gazoph. 14. tab. 8. fig. 9.

Habitat in Pini sylvestris Cortice & Resina.

*dentipes.* 145. C. longirostris femoribus dentatis, thorace albo, elytris nigris albo striatis, tibiis dentatis.

Curculio dentipes. Oliv. Inf. 13. fig. 93..

Habitat in Senegalliae Goffypio Mus. Reg. Galliae,

Statura C. frigidi. Caput atrum rostro cylindrico. Thorax albidus, postice trilobus. Elytra striata, nigra striis duabus albis, approximatis, postice coeuntibus. Pedes nigri femoribus tibiisque dentatis.

*multigutta-* 146. C. longirostris femoribus dentatis niger thorace elytrisque albo punctatis.

Curculio multiguttatus. Oliv. Inf. 83. tab. 13, fig. 163.

Habitat — — —

Magnitudo & statura C. Abietis. Caput nigrum, immaculatum rostro cylindrico. Thorax laevis, niger punctis utrinque duobus albis: posteriore majore. Elytra laevia punctis plurimis, albis.

*pupillator.* 147. C. longirostris femoribus dentatis tuberculatus fuscus elytris macula marginali cinerea nigro punctata.

**Curculio pupillator.** Oliv. Inf. 83. tab. 15.  
fig. 183.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Geoffroy.

Medius. Macula magna, cinerea, marginalis in  
medio elytrorum & in hac puncta tria atra,  
intermedio majori, linearis.

**148. C. longirostris femoribus dentatis oblongus pi-** *reticulatus*.  
**ceus elytris reticulatis:** fasciis obliquis palli-  
dis, tibiis anticis spinosis.

Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.

C. Abietis magis oblongus. Rostrum atrum.  
Elytra subtilissime reticulata fasciis obliquis,  
pallidis. Tibiae anticae apice spina valida, in-  
curva armatae.

**149. C. longirostris femoribus bidentatis albo nigro-** *Lapathi*.  
que variis, thorace elytrisque muricatis.  
Linn. Syst. nat. 608. 20. Fn. Sv. 591. Pay-  
kull. Monogr. 37. 35.

**Curculio Lapathi.** Oliv. Inf. 83. fig. 69. 6.

Degeer Inf. 5. 223. 16. tab. 7. fig. 1. 2.

Habitat in Europae Salice.

Caput albo nigroque varium rostro nigro. Tho-  
rax supra fuscus tuberculis quinque elevatis  
muricatus lateribusque albis. Elytra fusco al-  
boque variegata, muricata, alba. Abdomen  
nigrum. Femora omnia bidentata, alba.

**150. C. longirostris femoribus dentatis albus:** *supra irroratus*.  
**fuscus albo maculatus femoribus albo annu-**  
**latis.**

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Statura praecedentis. Caput albo nigroque va-  
rium rostro atro. Thorax elytraque laevia, ni-  
gra atomis plurimis, albis irrorata. Corpus  
album. Pedes albi femoribus dentatis an-  
nulis duobus fuscis.

*tricinctus.* 151. C. longirostris femoribus dentatis ater thoracis lateribus elytrorumque fasciis tribus albis, pedibus anticis elongatis.

Oliv. Inf. 83. tab. 6. fig. 61.

Habitat in Insula Guadeloupe de Badier.

Statura C. 6 guttati at major. Rostrum elongatum, incurvum, atrum, nitidum. Thorax niger lateribus subtusque albis. Elytra punctato striata, nigra fasciis tribus albidis, quae tamen futuram vix attingunt, anteriores duae subtus continuantur. Pedes atri, nitidi femoribus acute dentatis, antici elongati tibiis incurvis.

*statua.* 152. C. longirostris femoribus dentatis ater elytris sulcatis: macula communi alba, femoribus posticis elongatis.

Habitat — — Mus. Dom. Bosc.

Paullo minor C. Lapathi. Rostrum apice piceum antennis nigris. Thorax subscaber. Elytra sulcata sulcis impresso punctatis nigra litura humerali obscura maculaque postica, transversa, communi, alba. Pedes fuscii, cinereo annulati femoribus dentatis anticis posticisque elongatis.

*Guttatus.* 153. C. longirostris femoribus dentatis niger elytris maculis tribus albis.

Curculio 6 guttatus. Oliv. Inf. 83. tab. 14. fig. 170.

Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 1. 2.

Habitat in America Mus. Dr. Hunter.

Medius. Antennae nigrae. Rostrum nigrum linea longitudinali alba. Thorax niger lateribus albis. Elytra laevia, nigra maculis tribus magnis, albis. Pedes nigri.

- 154.** *C. longirostris femoribus dentatis ovatus ob-* *luridus.*  
*scure niger elytris punctato striatis.* Oliv.  
*Inf. 83. fig. 175.*  
*Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.*  
*Totus obscure niger, minime nitidus. Anten-*  
*nae apice fuscae. Thorax scaber linea dorsali*  
*glabra. Elytra punctis majoribus striata, quae*  
*striae postice per paria coeunt. Pedes dente*  
*brevissimo.*
- 155.** *C. longirostris femoribus dentatis fuscus tibiis stolidus.*  
*posticis incurvis dentatis.*  
*Curculio stolidus.* Oliv. Inf. 83. fig. 145.  
*Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.*  
*Caput nigrum, basi ferrugineum. Antennae ni-*  
*grae. Thorax punctis numerosissimis scaber,*  
*niger maculis aliquot indistinctis, ferrugineis.*  
*Elytra striato punctata, fusca, ferrugineo sub-*  
*fasciata. Pedes obscuri femoribus dentatis,*  
*posticis annulo cinereo. Tibiae posticae bre-*  
*ves, incurvae, apice denticulis duobus obtusis,*  
*altero interne, altero externe.*
- 156.** *C. longirostris femoribus dentatis fuscus ely-* *frigidus.*  
*tris striatis subtuberculatis ferrugineo variis.*  
*Curculio chinensis.* Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 97.  
*Habitat in Amboina Mus. de Paykull.*  
*Corpus fuscum punto ferrugineo ad basin ro-*  
*stri lineaque dorsali alba. Thorax niger linea*  
*dorsali punctoque uno alterove ferrugineis.*  
*Elytra punctato striata.*
- 157.** *C. longirostris femoribus dentatis niger ely-* *gibbus.*  
*tris excavato punctatis: striga abbreviata albida.*  
*Curculio gibbus.* Oliv. Inf. 83. tab. 8. fig. 88.  
*Habitat in Insula Bourbon. Mus. Reg. Galliae.*  
*Statura praecedentis. Thorax punctis elevatis*  
*scaber. Elytra punctis majoribus excavata*

striga posteriori albida, quae tamen suturam  
haud attingit.

*ocellatus.* 158. C. longirostris femoribus dentatis obscure ci-  
nereus elytris macula ocellari atra.

*Curculio ocellatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 31.

Habitat Cajennae.

Corpus medium. Macula atra, subocellata in  
medio elytrorum.

*meditabundus.* 159. C. longirostris femoribus dentatis, elytris stria-  
tis postice acuminatis.

*Curculio meditabundus.* Oliv. Inf. 83. fig. 132.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Totus obscure niger, minime nitens. Rostrum  
atrum, nitidum. Thorax sublaevis, obscurus.  
Elytra obscura, striata striis postice per paria  
coequentibus. Femora omnia acute dentata.

*stupidus.* 160. C. longirostris femoribus dentatis niger tho-  
racis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.

*Curculio stupidus.* Oliv. Inf. 83. fig. 151.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Totus obscure niger, opacus. Thorax latior  
quam in reliquis lateribus rotundatis scaber,  
obscurus. Elytra connata punctis elevatis,  
acutis subspinosa. Femora dentata, scabra.

*Mangiferae* 161. C. longirostris femoribus dentatis obscurus tho-  
race scabro: linea dorsali alba, elytris reti-  
culatis.

*Curculio Mangiferae.* Oliv. Inf. 83. fig. 137.

Hybn. Naturf. 24. 46. 12. tab. 2. fig. 13.

Habitat in Mangiferae nucleis Indiae Orientalis  
Dr. Koenig.

Thorax obscurus linea dorsali & juxta lineam  
puncto utrinque albo. Scutellum album. Ely-  
tra striata, grisea punctis nigris sparsis.

**162.** *C. longirostris femoribus dentatis griseus elytris macula communi lunata cinerea, rostro atro.*

Habitat in Coromandel Prof. Vahl.

Praecedente minor. Rostrum atrum. Thorax punctis elevatis scaber, griseus. Elytra striata.

**163.** *C. longirostris femoribus dentatis obscurus cinereo varius thoracis lateribus rotundatis.* *Araneus.*

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.

Pflug.

Statura & magnitudo omnino *C. squalidi*. Rostrum porrectum, piceum, nitidum. Thorax supra planus lateribus rotundatis, obscurus lineis tribus obsoletis, cinereis. Elytra sulcata, obscura, cinereo obsolete varia. Corpus nigrum.

**164.** *C. longirostris femoribus dentatis niger thorace ferrugineo lineato, elytris striatis ferrugineo punctatis.*

*Curculio Strix.* Oliv. Inf. 83. tab. 16.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Olivier.

Rostrum longum, arcuatum, atrum, basi ferrugineo striatum. Caput ferrugineum. Thorax niger margine lineisque tribus cinereis. Elytra brevia, striata, grisea. Femora acute dentata.

**165.** *C. longirostris femoribus dentatis villoso griseus rostro testaceo.* *squalidus.*

*Curculio squalidus.* Oliv. Inf. 83. fig. 184.

Habitat Surinami Mus. Dom. Banks.

Thorax griseus lineis tribus cinereis. Elytra brevia, striata, grisea. Femora acute dentata.

**166.** *C. longirostris femoribus dentatis ater thorace punctis duobus testaceis.* *germanus.* Linn. Syst. nat. 2.

613. 58. Paykull. Monogr. 1, 1.



Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 5.

Schaeff. Icon. tab. 62. fig. 9. tab. 101. fig. 6.

Frish. Inf. 13. 28. tab. 26.

Habitat in Germania haud infrequens.

*Scrophula-* 167. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace albo-*

*riae.*

*bido, coleoptris maculis duabus atris albae connatis.* Linn. Syst. nat. 2. 614. 61. Fn.

*Sv. 603.* Paykull. Monogr. 23. 22.

Geoff. Ius. 1. 296. 44.

Reaum. Inf. 3. tab. 2. fig. 12.

Degeer Inf. 5. 208. 3. tab. 6. fig. 17. 18. 19. 20.

Habitat in Europae Scrophulariis.

Elytra lineis elevatis quatuor holosericeis, albo nigroque variis.

*Thapsus.* 168. *C. longirostris femoribus dentatis, coleoptris maculis duabus dorsalibus atris simplicibus.*

*Curculio Scrophulariae.* Oliv. Inf. 83. fig. 21.

Habitat Kiliae in Scrophulariis, Verbasco.

Mera varietas praecedentis teste Dom. de Paykull. Caput & thorax villosa, cinerea, immaculata antennis ferrugineis. Coleoptra villosa, cinerea lineis plurimis e punctis nigris albisque alternis. In medio vel in futura puncta duo magna, orbiculata, omnino simplicia. Corpus & pedes cinerea.

*Verbasci.* 169. *C. longirostris femoribus dentatis niger thoracis lateribus flavescentibus, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis.*

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura & summa affinitas praecedentium. Caput nigrum, immaculatum. Thorax flavesiens linea dorsali sive potius dorso nigro. Elytra nigra punctis elevatis, holosericeis, albisque nigrisque alternis. In futura interdum puncta duæ alba distincta.

170. *C. longirostris femoribus dentatis albidus co- Blattariae.*  
*leoptris nigro variis: macula dorsali baseos apicisque nigris.*  
*Habitat in Italia Dr. Allioni.*  
*Duplo praecedentibus minor. Rostrum cylindricum, incurvum, atrum. Caput albidum. Thorax albidus macula media baseos nigra, quae cum macula coleoptrorum coit. Coleoptera albida, haud punctis albis nigrisque striata, sed potius variegata macula magna futurali baseos nigricante, quae & scutellum & thoracis basin tegit. Versus apicem macula altera magis atra. Corpus albidum.*
171. *C. longirostris femoribus dentatis obscurus Solani.*  
*elytris lineis elevatis nigris cinereo punctatis.*  
*Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.*  
*Statura praecedentium at duplo minor. Caput nigrum. Thorax cinereus. Elytra subhispidula, obscura striis elevatis, nigris, cinereo punctatis. Pedes cinerascentes femoribus acute dentatis.*
172. *C. longirostris femoribus dentatis niger elytris gravis.*  
*ferrugineo variis, femoribus canaliculatis.*  
*Curculio grayis. Oliv. Inf. 83. fig. 177.*  
*Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.*  
*Rostrum atrum. Antennae piceae. Thorax punctis elevatis scaber. Elytra striata, scabra, ferrugineo varia. Pedes nigri, postici ferruginei. Femora subtus late canaliculata dente valido.*
173. *C. longirostris femoribus dentatis, elytris super 5 punctatus*  
*tura punctisque duobus albis. Linn. Syst.*  
*nat. 2. 614. 64. Fn. Sv. 618. Paykull. Monogr. 15. 14.*  
*Schaeff. Icon. tab. I, fig. 12.*



Herbst Arch. tab. 24. fig. 18.

Habitat in Europae plantis.

Corpus supra purpureum, subtus cinereum,

Thorax linea dorsali alba.

- guttula.* 174. C. longirostris femoribus dentatis, thorace tuberculato niger, elytris striatis: puncto postico albo.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. litura at paullo major.

Rostrum nigrum. Thorax inaequalis linea dorsali impressa tuberculoque utrinque elevato, erecto. Margo anticus parum elevatus. Elytra vix striata, nigra puncto apicis albo. Corpus subtus cinereum.

- abbreviatu-* lus. 175. C. longirostris femoribus dentatis fuscus atomis griseis irroratus elytris abbreviatis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Statura omnino C. litura at paullo major. Antennae piceae. Caput cum rostro elongato fuscum. Thorax obscurus, fuscus atomis griseis. Elytra substriata, fusca atomis griseis, quae hinc inde fascias abbreviatas fere constituant, abdomine paullo breviora. Pedes fusi femoribus compressis, elongatis, clavatis, acute dentatis.

- Echii.* 176. C. longirostris femoribus dentatis niger thorace elytrisque albolineatis.

Curculio geographicus. Oliv. Inf. 83. fig.

Habitat in Germaniae Echo Dom. Prof. Helwig.

Statura & magnitudo omnino praecedentis, cuius forte mera varietas. Differt tantum thorace margine antico magis elevato, thorace elytrisque lineis albis striatis. Femora acute dentata annulo albo,

177. C. longirostris femoribus dentatis supra fuscus *didymus.*  
elytris striatis: macula laterali transversa alba. Paykull. Monogr. 29. 28.

Habitat in Germaniae Urtica urente Dom. de Hattorf.

Parvus. Corpus supra fuscum, subtus griseum.  
Rostrum atrum. Elytra striata, obscura: macula transversa, laterali, alba, e punctis tribus composita. Femora acute dentata.

178. C. longirostris femoribus dentatis niger thorace *Lamii.*  
tuberculato, elytris cinereo variis, rostro arcuato atro.

Habitat in Germaniae Lamio Prof. Helwig.

Parvus. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum.  
Antennae clava cinerascente. Thorax quadrituberculatus, niger, obscurus, minime nitidus. Elytra striata, nigra, cinereo varia,  
Pedes nigri femoribus acute dentatis.

179. C. longirostris femoribus dentatis cinereo villosus rostro arcuato atro. *Brafficae.*

Habitat Kiliae.

Parvus. Rostrum elongatum, arcuatum, atrum.  
Antennae capitulo cinerascente. Thorax laevis, obscure cinerascens. Elytra cinerascentia, striata. Pedes nigricantes femoribus omnibus dentatis.

180. C. longirostris femoribus dentatis cinereo villosus tarsis rufis. *Borraginis.*

Curculio Borraginis. Oliv. Inf. 83. fig.

Habitat in Galliae Boragine Dom. Olivier.

Paullo major C. Brafficae, totus cinero villosus tarsis solis rufis.

181. C. longirostris femoribus dentatis, thorace fuscoco: lateribus cinerascentibus, elytrorum sutura apice ferruginea. *haemorrhoidalis.*

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Parvus. Caput fuscum. Thorax ovatus, fuscus  
lateribus in mare cinereis, in faemina ferru-

gineis punctis aliquot fuscis. Elytra striata,  
obscura futura apice ferruginea. Pedes fusi,

- trimacula-* 182. *C. longirostris femoribus dentatis, coleoptris*  
*tus.* *nigris: maculis tribus cinereis; postica com-*  
*muni lunata.* Paykull. Monogr. 26. 24.

Habitat in Alsacia Prof. Hermann.

Caput nigrum. Thorax fuscus antice utrinque  
macula marginali cinerea lineaque dorsali brun-  
nea. Elytra fusca futura baseos brunnea: puncto  
parvo albo, macula magna alba in medio margi-  
nis exterioris & altera lunata ad apicem. Pectus  
& abdomen cinerea. Femora fusca annulo ci-  
nereo.

- litura.* 183. *C. longirostris femoribus dentatis albo nigroque*  
*varius rostro atro.* Paykull. Monogr. 26. 25.

Habitat in Europae Carduis.

Statura praecedentis. Thorax linea dorsali ni-  
gra, antice lineola, postice puncto albis.

- villosus.* 184. *C. longirostris femoribus dentatis villosus griseus*  
*scutello fascia que elytrorum postica al-*  
*bis.* Herbst Arch. tab. 24. fig. 19.

Habitat in Germania Dom. de Hattorf.

Rostrum porrectum, atrum. Thorax griseus  
linea longitudinali albicante. Scutellum al-  
bum. Elytra grisea postice fascia obliqua al-  
ba, quae tamen marginem exteriorem haud  
attingit. Pedes grisei.

- Raphani.* 185. *C. longirostris femoribus dentatis nigricans*  
*thorace tuberculato, rostro arcuato atro.*

Habitat in Germaniae Raphano Dom. Smidt.  
Statura & magnitudo C. litura. Antennae ar-  
ticulo primo ferrugineo. Rostrum arcuatum,

atrum. Thorax nigricans, utrinque tuberculatus margineque antico parum elevato. Elytra nigricantia, vix striata, immaculata. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

186. C. longirostris femoribus dentatis niger elytris rufis: margine omni nigro. Paykull. Monogr. 16. 15.

Curculio Beccabungae. Mant. Inf. 1. 108. 130.

Habitat in Sueciae Pino Dom. de Paykull.

Magnitudo & statura C. Cerasi. Rostrum atrum.

Elytra striata, rufa margine omni nigro. Pedes nigri.

Variat rarius forsitan aetate elytris nigris totis.

187. C. longirostris femoribus dentatis fuscus thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testaceis. Paykull. Monogr. 30. 29.

Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Parvus. Caput fuscum antennis subtestaceis.

Thorax fuscus linea dorsali albida. Elytra striata, subtestacea sutura nigra. Pedes testacei.

188. C. longirostris femoribus dentatis oblongus *carbonarius* ater antennarum clava villosa, elytris crenato striatis.

Curculio carbonarius longirostris femoribus omnibus dentatis, corpore nigro oblongo.

Linn. Syst. nat. 2. 617. 42. Fn. Sv. 614.

Habitat in Europa.

Simillimus C. Cerasi, pro cuius varietatem olim habui at thorax inermis, supra planus.

189. C. longirostris femoribus dentatis ater thorace apice bidentato, elytris nitidis. Linn.

Syst. nat. 2. 607. 10. Fn. Sv. 582.

Habitat in Europa.

Corpus totum atrum.

- Cerasi.* 190. *C. longirostris femoribus dentatis* ♂ *ter thorace apice bidentato, elytris oblongis opacis,* Linn. Syst. nat. 2. 607. 11. Fn. Sv. 583. Payk. Monogr. 8. 7. Geoff. Inf. 1. 299. 48. Frish. Inf. 11. 31. tab. 23. fig. 1. 3. Habitat in Cerasi foliis. Simillimus *C. aterrimo* at distinctus.
- violaceus.* 191. *C. longirostris femoribus dentatis niger* elytris striatis violaceis. Linn. Syst. nat. 2. 614. 63. Fn. Sv. 579. Paykull. Monogr. 9. 8. Geoff. Inf. 1. 271. 5. Degeer Inf. 5. 213. 5. Bergst. nomencl. 1. 16. 13. tab. 2. fig. 13. Habitat in Europae borealis Pinis.
- Nucum.* 192. *C. longirostris femoribus dentatis, corpore griseo longitudine rostri.* Linn. Syst. nat. 2. 673. 59. Fn. Sv. 616. Paykull. Monogr. 21. 20. Ross. Inf. 3. tab. 67. fig. 67. Oliv. Inf. 83. fig. 47. Schaeff. Elem. tab. 55. fig. 1. Icon. tab. 50. fig. 4. Degeer Inf. 5. 205. 2. tab. 6. fig. 14. 15. 16. Geoff. Inf. 1. 295. 42. Sulz. Hist. Inf. tab. 3. fig. 22. Habitat in Coryli Avellanae Nucibus.
- proboscideus.* 193. *C. longirostris femoribus dentatis griseus* rostro corpore duplo longiore. Curculio proboscideus. Oliv. Inf. 83. fig. 127. Habitat in America boreali Mus. Dom. Banks. Magis oblongus *C. Nucum.* Rostrum ferrugineum, nitens corpore fere duplo longiore. Corpus oblongum, griseum strigis obliquis obscurioribus.

**194.** *C. longirostris femoribus dentatis obscure brunneus pedibus testaceis gulosus.*

Habitat Parisiis Mus. Dom. Grandchamp.

Magnitudo & statura omnino *C. proboscidei*.

Rostrum elongatum longitudine corporis, brunneum, apice nigrum. Thorax & elytra obscure brunnea scutello paullo pallidiore. Pedes testacei femoribus acute dentatis.

**195.** *C. longirostris femoribus dentatis ferrugineus parasita. cinereo irroratus femoribus macula nigra.*

*Curculio parasita.* Oliv. Inf. 83. fig. 181.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Geoffroy.

Statura *C. Nucum*. Rostrum ferrugineum, corpore fere longius. Thorax ferrugineus linea dorsali roreque cinereis. Elytra laevia, ferruginea, cinereo irrorata. Pedes ferruginei femoribus macula magna nigra.

**196.** *C. longirostris femoribus dentatis griseus scutello elytrorumque macula postica albidis esuriens.*

Habitat in Gallia.

Statura *C. Cerasorum* & forte mera ejus varietas. Rostrum corpore longius, arcuatum, atrum. Thorax griseus linea dorsali albida. Elytra grisea macula magna, postice fere communi, albida. Pedes grisei.

**197.** *C. longirostris femoribus dentatis brunneus nasutus. elytris striatis cinereis apice brunneis.* Oliv.

Inf. 83. fig. 138.

Habitat — — Mus. Britann.

Statura omnino *C. Nucum*. Rostrum cylindricum, nigrum longitudine corporis. Caput brunneum. Thorax fere obscure griseus. Elytra elevato striata, cinerea, apice brunnea. Pedes brunnei femoribus acute dentatis.



*haustellatus* 198. *C. longirostris femoribus dentatis castaneus elytris striatis, rostro corpore quadruplo longiore.*

*Curculio haustellatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 171.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

*Corpus C. Nucum magis oblongum rostro longissimo.*

*varius.* 199. *C. longirostris femoribus dentatis griseo nigroque varius rostro pedibusque rufis.*

Habitat Cajennae Dom. Mallet.

*C. Nucum magis oblongus. Rostrum cylindricum, rufum antennis tenuissimis. Thorax elytraque cinereo fuscoque variegata. Pedes omnes rufi femoribus acute dentatis cinguloque nigro.*

*Cerasorum.* 200. *C. longirostris femoribus dentatis fuscus scutello elytrorumunque fasciis obsoletis cinereis.*

Paykull. Monogr. 22. 21.

Habitat in Anglia Dom. Lee.

*Triplo minor C. Nucum. Rostrum cylindricum, glabrum, atrum. Thorax fuscus linea dorsali obsoleta cinerea. Scutellum cinereum. Elytra striata fasciis duabus repandis cinereis, fere obsoletis.*

*amoenus.* 201. *C. longirostris femoribus dentatis ater thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis.*

*Curculio amoenus.* Oliv. Inf. 83. fig. 143.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

*Triplo minor C. Nucum. Caput atrum. Antennae fuscae. Thorax glaber, ater utrinque puncto baseos niveo. Elytra striata, nigra, in medio lineola suturali & postice punctis duobus niveis. Pedes atri.*

*metallinus.* 202. *C. longirostris femoribus dentatis nigro aeneus thorace punctato, elytris striato punctatis.*

- Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
Smith.
- Medius. Rostrum elongatum, arcuatum, nigrum. Thorax late punctatus, nigro aeneus. Elytra punctis majoribus striata, nigro aenea, nitida. Corpus concolor. Femora omnia clavata, acute dentata.
- 203. C. longirostris femoribus dentatis griseus capite bidentato.**
- Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.
- Corpus griseum sive cinereo fuscoque mixtum. Rostrum fuscum. Denticuli duo erecti, breves, in fronte. Elytra substriata. Pedes fusi.
- 204. C. longirostris femoribus dentatis niger elytris albo subfasciatis, antennis rufis.**
- Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.
- Minor. C. Ceraforum. Caput nigrum rostro tenui, atro, glabro. Antennae rufae clava cinerea. Thorax niger pilis brevissimis, cinereis. Scutellum cinereum. Elytra nigra fasciis plurimi, undatis, pallidioribus.
- 205. C. longirostris femoribus dentatis, elytris testaceis obsolete fasciatis.** *Druparum.* Linn. Syst. nat. 2, 614. 62. Fn. Sv. 617. Paykull. Monogr. II. 10.
- Curculio flavescens.* Geoff. Inf. 1. 296. 43.
- Degeer Inf. 5. 214. 7.
- Schaeff. Icon. tab. 1. fig. II.
- Sulz. Inf. tab. 3. fig. 21.
- Habitat in Pruni Padi nucleis.
- 206. C. longirostris femoribus dentatis ferrugineo fuscus capite dorsoque nigris.** *Fraxini.* Paykull. Monogr. 25. 23.
- Curculio Fraxini.* Degeer Inf. 5. 212. 4. tab. 5.

- Habitat in Sueciae Fraxino Dom. de Paykull.  
 Magnitudo C. Druparum. Thorax ferrugineo  
 fuscus dorso nigro. Corpus ferrugineo fuscum.
- melanoce-* 207. *C. longirostris femoribus dentatis brunneus*  
*phalus.* *capite fusco, rostro atro.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura parva C. Fraxini. Caput fuscum rostro  
 elongato, cylindrico, incurvo, atro. Thorax  
 brunneus, immaculatus. Elytra striata, brunnea  
 margine exteriori parum nigricante. Corpus  
 fuscum pedibus brunneis. Femora acute  
 dentata.
- depressus.* 208. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace de-*  
*presso: lateribus obtuse angulatis.* Linn.  
*Syst. nat. 2. 612. 53.* Mus. Lud. Ulr. 49.  
*Seb. Mus. 4. tab. 95. fig. 4.*  
 Habitat in America meridionali.
- Pomorum.* 209. *C. longirostris femoribus anticis dentatis, cor-*  
*pore griseo nebuloso.* Linn. *Syst. nat. 2. 612.*  
*46.* Fn. Sv. 612. Payk. Monogr. 13. 12.  
*Frish. Inf. 1. 32. tab. 8.*  
 Habitat in Pomonaefloribus.
- vorax.* 210. *C. longirostris femoribus dentatis griseo ful-*  
*coque maculatus rostro arcuato atro.*  
 Habitat in Italia Dr. Allioni.  
 Statura omnino C. tortrix, paullo major & di-  
 stinctus rostro omnino atro. Antennae testa-  
 ceae. Pedes antici elongati.
- tortrix.* 211. *C. longirostris femoribus dentatis, corpore te-*  
*staceo, pectore fuscō.* Linn. *Syst. nat. 2. 615.*  
*67.* Fn. Sv. 622. Payk. Monogr. 7. 6.  
*Curculio ferrugineus.* Geoff. Inf. 1. 300. 51.  
*Degeer Inf. 5. 214. 6.*  
 Habitat in Populo folia contorquens.

212. *C. longirostris femoribus dentatis nigricans ely-tris striatis griseoirroratis.* Payk. Monogr. 4.4.  
 Habitat in Sueciae Populo Dom. de Paykull.  
 Rostrum atrum. Thorax laevis, ater, nitidus,  
 postice rubro nitens. Elytra crenato striata,  
 nigra atomis plurimis griseis.
213. *C. longirostris femoribns dentatis fuscus cine-reo lineatus pedibus pallidis.*  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 Smidt.  
 Parvus. Rostrum obscurum, ante apicem ferrugineum. Thorax & elytra obscura, obsolete albo lineata linea thoracis dorsali tamen distinctiore. Pedes omnes pallidi.
214. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace nigro: margine antico posticoque rufis, elytris pallidis nigro maculatis.* Payk. Monogr. 6.5.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
 Minor *C. tortrix*. Rostrum nigrum ore sanguineo. Antennae testaceae clava cinerea. Thorax laevis, niger margine antico posticoque rufis. Elytra subvillosa, substriata, pallida, nigro maculata.
215. *C. longirostris femoribus dentatis, thorace elongatus.*  
 elongato, tibiis anticis bidentatis.  
 Habitat in Jamaica Dom. Drury.  
 Elytra punctato striata, nigra fasciis duabus ferrugineis. An potius ad *Brentus* genus emendandus.
- \*\*\* *Longirostres femoribus posticis saltatoriis.*
216. *C. longirostris pedibus saltatoriis niger coleoptratis testaceis: maculis duabus obscuris.* Payk.  
 Monogr. 20. 19.



*Curculio rufus, elytris maculis quatuor nigris.*  
Geoff. Inf. 1. 286. 20.  
*Curculio Alni.* Linn. Syst. nat. 2. 611. 42.  
Fn. Sv. 608.  
Degeer Inf. 5. 262. 49.  
Habitat in Angliae, Germaniae Alno.  
Thorax testaceus fascia abbreviata, nigra.

- pilosus.* 217. *C. longirostris pedibus saltatoriis niger cinereo variegatus.*  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
*Corpus parvum, hirtum, nigro cinereoque variegatum. Antennae testaceae.*
- hortorum.* 218. *C. longirostris pedibus saltatoriis ater elytrom fascia sesquialtera pedibusque testaceis.*  
*Curculio mutilatus.* Laichart. Austriac.  
Habitat in Germania Mus. Dom. de Sehestedt.  
*Corpus parvum praecedentis. Caput & thorax atra antennis testaceis. Elytra striata, nigra fascia media, lata, abbreviata, quae marginem exteriorem haud attingit alteraque posteriori, adhuc minori testaceis. Corpus nigrum pedibus omnibus testaceis: femoribus posticis nigris.*
- Calcar.* 219. *C. longirostris pedibus saltatoriis niger anten- nis plantisque testaceis, femoribus dentatis.*  
Paykull. Monogr. 18. 17.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
*Parvus. Corpus nigrum. Elytra vix striata. Femora postica incrassata, unidentata.*
- Saliceti.* 220. *C. longirostris pedibus saltatoriis niger tibiis testaceis.* Payk. Monogr. 66. 64.  
Habitat in Sueciae Salicetis Dom. de Paykull.  
*Parvus, totus niger, minime nitidus tibiis solis testaceis. Elytra striata.*

- 221.** *C. longirostris* pedibus saltatoriis niger coleop- *Beccabun-*  
*tris ante apicem rufis.* *gae.*
- Curculio Beccabungae longirostris fuscus, ely-*  
*tris subsanguineis: margine anoque fuscis.*  
*Linn. Syst. nat. 2, 611. 41. Fn. Sv. 604.*  
*Habitat in Sueciae Veronica Beccabunga Dom.*  
*de Paykull.*
- Differt omnino a C. Resinae, quem olim Bec-*  
*cabungae vocavi. Corpus duplo minus, ni-*  
*grum coleoptris ante apicem rufis.*
- 222.** *C. longirostris* pedibus saltatoriis, elytris atris: *Salicis.*  
*fasciis duabus albis. Linn. Syst. nat. 2. 611.*  
*43. Fn. Sv. 610. Paykull. Monogr. 64. 62.*  
*Degeer Inf. 5. 246. 51.*  
*Habitat in Salicis floribus.*
- 223.** *C. longirostris* pedibus saltatoriis, corpore te- *viminalis.*  
*staceo. Paykull. Monogr. 19. 18.*  
*Curculio Quercus pallide flavus, oculis nigris.*  
*Linn. Syst. nat. 2. 609. Fn. Sv. 596.*  
*Curculio Ulmi. Degeer Inf. 5. 260. 48. tab.*  
*8. fig. 5.*  
*Curculio rufus. Geoff. Inf. 1. 286. 19.*  
*Reaum. Inf. 3. 31. tab. 3. fig. 17. 18.*  
*Habitat in Europæ Salice.*  
*Nimis affinis C. Alni & forte mera ejus varie-*  
*tas. Differt tantum elytris immaculatis.*
- 224.** *C. longirostris* pedibus saltatoriis nigricans *Ilicis.*  
*elytris striatis cinereo variis: futura basi*  
*alba.*
- Curculio Roboris Bonsd. Curcul. Suec.*  
*Habitat in Uplandiae Quercu Dom. de Paykull.*  
*Parvus. Corpus nigrum. Thorax macula dor-*  
*fali, triloba, cinerea. Elytra cinereo varia fu-*  
*tura basi alba.*

- Josa.* 225. C. longirostris pedibus saltatoriis ater, elytris striatis: sutura basi alba. Paykull. Monogr. 66. 63.  
 Habitat in Uplandia Dom. de Paykull.  
 Parvus, totus ater sola sutura basi alba.
- Fagi.* 226. C. longirostris pedibus saltatoriis, corpore atro, femoribus albis. Linn. Syst. nat. 2. 64.  
 44. Fn. Sv. 609. Paykull. Monogr. 64. 61.  
 Habitat in Fagi sylvatici foliis.
- Fragariae.* 227. C. longirostris pedibus saltatoriis fuscus antennis tarsisque testaceis.  
 Habitat in Germaniae Fragariis Dom. Smidt.  
 Magnitudo C. Salicis. Caput nigrum. Antennae pallide testaceae. Thorax & elytra fusca, immaculata. Pedes fusci tarsis solis testaceis.
- Populi.* 228. C. longirostris pedibus saltatoriis ater scutello albo, antennis pedibusque testaceis.  
 Habitat in Selandiae Populo Dom. de Sehestedt.  
 Parvus. Antennae testaceae clava obscuriore.  
 Caput & thorax atra. Elytra striata, nigra, immaculata. Scutellum album. Pedes testacei femoribus posticis incrassatis: fasciata, nigra.
- \*\*\*\* *Brevirostres femoribus muticis.*
- argyreus.* 229. C. brevirostris corpore viridi argenteo aureo que maculato. Linn. Syst. nat. 2. 615. 74. Lud. Ulr. 54.  
 Habitat in Indiis.
- splendidus.* 230. C. brevirostris elytris striatis aureo maculatis basi gibbis apice acuminatis.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Statura & magnitudo omnino C. imperialis.  
 Thorax punctis elevatis atris scaber linea dorsali lateribusque aureis. Elytra striata macu-

lis variis, aureis, nitidissimis. Pedes hirsutissimi.

- 231.** *C. longirostris elytris striis elevatis atris ful-imperialis.*  
cisque punctatis viridi aureis alternis, basi gibbis, apice acuminatis.

*Curculio imperialis.* Drury Inf. 2. tab. 33.  
fig. 1.

Oliv. Inf. 83. fig. 1.

Naturf. 10. tab. 2. fig. 1.

Habitat in America meridionali, Brasilia.

- 232.** *C. brevirostris elytris virescentibus: punctis sumptuosus*  
elevatis atris basi gibbis.

*Curculio sumptuosus.* Oliv. Inf. 83. tab. 1.  
fig. 13.

Habitat Cajennae.

Statura & magnitudo omnino praecedentis.

Thorax ater linea dorsali grisea. Elytra vi-  
rescenti cinerea, striata striis punctis eleva-  
tis, atris.

- 233.** *C. brevirostris albidus elytris acuminatis: fas-chrysis.*  
ciis duabus punctisque duobus aureis.

*Curculio Chrysis.* Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 6.

Habitat in India orientali Mus. Reg. Galliae.

Magnus. Antennae nigrae. Thorax albodus  
linea dorsali aurea. Elytra acuminata, albida,  
nigro punctata fasciis duabus aureis. In me-  
dio punctum aureum ad basin & alterum ver-  
sus apicem.

- 234.** *C. brevirostris corpore viridi sericeo: fasciis regalis.*  
aureis repandis. Linn. Syst. nat. 2. 616. 75.

*Curculio regalis* Oliv. Inf. 83. tab. 1. fig. 8.

Habitat in Indiis.

- 235.** *C. brevirostris fuscus elytrorum sutura abdo-marginatus*  
minisque marginibus aureis.

*Curculio marginatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 82.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

*Magnus.* Caput nigrum, immaculatum rostro  
plano. Thorax fuscus pectore lineis duabus  
aureis. Elytra punctata sutura basi aurea.  
Abdomen subtus nigrum lateribus aureis. Pe-  
des nigri.

*15punctatus* 236. *C. brevirostris canescens thorace punctis ni-*  
*gris quatuor, coleoptris novemdecim.*

Curculio 19 punctatus. Oliv. Inf. 83. fig. 25.  
Habitat Cajennae Dom. Mauduit.

Statura C. regalis. Caput coerulescens oculis  
antennisque nigris. Thorax cinerascens pun-  
ctis quatuor nigris: lateralibus minoribus.  
Elytra cinerea punctis novem & communiba-  
seos 1. 2. 2. 2. tertio pari majori. Pun-  
ctum commune puncto minutissimo cinereo  
notatum. Pedes coerulecentes.

*16punctatus* 237. *C. brevirostris coerulescens thorace punctis ni-*  
*gris quatuor, coleoptris sedecim.*

Curculio 16 punctatus. Oliv. Inf. 83. fig. 17.  
Linn. Syst. nat. 2. 618. 92. Mus. Lud. Ulr. 58.  
Habitat in Brasilia.

Caput sulcatum. Thoracis latera aurea. Pun-  
ctum posticum elytrorum geminatum.

*decorus.* 238. *C. brevirostris supra fuscus thorace coleoptris-*  
*que vittis duabus viridi aureis.*

Curculio decorus. Oliv. Inf. 83. fig. 152.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Rostrum fuscum, apice canaliculatum. Thorax  
rotundatus, fuscus lineis duabus viridi aureis,  
nitidis. Elytra punctata, striata, fusca vitta  
in medio viridi aurea. Corpus subtus aureum  
abdominis medio fusco. Pedes fusi femori-  
bus clavatis, muticis.

**239.** *C. brevirostris viridi squamosus elytris pun- nitidulus.*  
ctatis.

*Curculio nitidulus.* Oliv. Inf. 83. fig. 38.

Habitat Cajennae.

Statura & magnitudo *C. argentati pulcherri-*  
*mus.* Rostrum sulcatum, cinereum. Thorax  
& elytra punctata, holofericea, viridi ni-  
tentia.

**240.** *C. brevirostris elytris spinosis albis: macula candidus.*  
laterali fusca.

Habitat Cajennae Dom. Mallet.

Caput aureo nitens. Thorax dorso fusco late-  
ribus albis. Elytra spinis paucis, sparsis, eleva-  
tis, alba postice macula magna, lateral, fusca.  
Pedes fuscii tibiis rufis.

**241.** *C. brevirostris niveus thoracis dorso rostroque niveus.*  
fuscis, elytris spinosis acuminatisque.

*Curculio niveus.* Oliv. Inf. 83. fig. 173.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Rostrum bifidum, ciliatum, supra fuscum. Tho-  
rax sublaevis, niveus linea dorsali, lata, fusca.  
Scutellum & sutura elytrorum basifusca. Ely-  
tra nivea striis elevatis, subdentatis, quarum  
exterior basi, interior apice spinam format.  
Elytra apice valde acuminata, distantia. Cor-  
pus niveum.

**242.** *C. brevirostris albus auro nitidulus elytris lacteus.*  
sulcatis acuminatis.

*Curculio lacteus.* Oliv. Inf. 83. fig. 172.

Habitat in Jamaica Mus. Dr. Hunter.

Medius. Caput album rostro emarginato. Tho-  
rax albus, auro splendens lineaque laterali, au-  
rea. Elytra sulcata sulcis punctatis, alba, postice  
acuminata, Pedes albi tibiis coerulecen-  
tibus.

*pulverulen-* 243. *C. brevirostris cinereus capite plano canaliculato.*

Habitat Tranquebariae Dom. de Sehestedt.

Statura & magnitudo omnino *C. squamosi*. Caput cum rostro brevissimo planum, canaliculatum, cinereum. Thorax cinerascens macula dorsali, impressa. Elytra punctato striata, cinerascentia, immaculata.

*squamosus.* 244. *C. brevirostris viridi squamosus rostro thoraceque canaliculatis.*

Habitat in China, India orientali M. de Sehestedt. Medius. Rostrum planum, depresso linea media, impressa. Thorax viridi squamosus linea media, impressa. Elytra villosa viridique squamosa, punctato striata.

Aestate squamae pereunt & totus glaber & niger evadit.

*cretaceus.* 245. *C. brevirostris albus elytris sulcatis unispinosis acuminatisque.*

Habitat in Insula Guadeloupe Dom. de Badier.

Nimis affinis *C. lacteo*. Rostrum breve, apice bifidum. Thorax niveus, immaculatus punctis tribus dorsalibus, impressis. Elytra nivea, immaculata, sulcata, quorum stria interior ante apicem spinam erectam validam format, apice acuminata. Corpus niveum.

*cinerascens.* 246. *C. brevirostris cinereus elytris puncto baseos, duobusque apicis albis.*

Habitat Cajennae Mus. Dom. Gigot d'Orcy.

Statura praecedentium. Corpus totum cinereum, tomentosum. Punctum album utrinque ad basin elytrorum & dua versus apicem.

*smaragdu-* 247. *C. brevirostris virescens elytris punctatis: lus.* spina antica posticaque erecta valida.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Paullo minor C. candido. Rostrum emarginatum, virescens antennis cinerascentibus. Thorax cylindricus, virescens linea transversa, subimpressa. Elytra punctata, viridia spina baseos versus marginem exteriorem & alia majori pone medium versus futuram. Praeterea spinae aliquot obsoletiores, quae cum posteriore striam formant. Corpus virescens.

- 248.** C. brevirostris cinereo fuscoque varius coleop- *octotuberculatus* punctatis postice gibbis: tuberculis octo. *latus.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Rostrum subemarginatum. Thorax punctatus, cinereus lineis tribus fuscis, lateralibus obsoletioribus. Elytra punctata, cinereo fuscoque varia, postice gibba tuberculis quatuor approximatis, obtusis. Corpus cinereum anno nigro.

- 249.** C. brevirostris capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae fuscae: articulo primo ferrugineo. Caput ferrugineum puncto inter oculos atro. Rostrum apice retusum, atrum. Thorax ferrugineus, immaculatus. Elytra punctato striata, fusca, apice ferruginea punctis maculisque albis.

- 250.** C. brevirostris cinereus thorace elytrisque *modestus*, fusco maculatis.

*Curculio modestus.* Oliv. Inf. 83. fig. 178.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Medius, cinereus. Thorax latior quam in reliquis, planus punctis dorsalibus, fuscis. Elytra striata, fusco maculata.

*flavescens.* 251. *C. brevirostris obscurus thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis.*

Habitat in America meridionali Dom. Schreber.

*Paullo major C. viridi. Caput obscurum, Thorax & elytra ferrugineo fusca lateribus laete flavis. Elytra valde acuminata. Corpus flavescens. Pedes virides.*

*pollinosus.* 252. *C. brevirostris squamoso flavescens elytris acuminatis.*

Habitat in Austria Dom. Schneider.

Differit a *C. viridi elytris omnino acuminatis.* Corpus totum flavo squamosum dorso obscuriore.

*lateralis.* 253. *C. longirostris viridi squamosus thoracis elytrorumque lateribus flavis.*

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Statura omnino praecedentis. Antennae fuscae. Caput, thorax, elytra squamoso virescentia lateribus late flavis. Elytra obtusa, nullo modo acuminata.

*viridis.* 254. *C. brevirostris virescens thoracis elytrorumque lateribus flavis.* Linn. Syst. nat. 2. 616. 76. Paykull. Monogr. 107. 103. Bonsd. Circ. Suec. 22. 6.

*Curculio viridis.* Oliv. Inf. 83. fig. 18.

Degeer Inf. 5. 256. 45.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 24.

Schaeff. Icon. tab. 53. fig. 6.

Habitat in Europae Pomona.

*gibber.* 255. *C. brevirostris virescenti albus elytris basi unidentatis postice gibbosis.*

*Curculio gibber.* Oliv. Inf. 83. fig. 189.

*Curculio gibber.* Pall. Icon. tab. B. fig. 14.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.

Medius. Rostrum canaliculatum, apice bifidum, albidum. Antennae albae clava nigra. Thorax virescenti albus, immaculatus. Elytra substriata basi spina depreßa, obtusa & postice gibbere communi, elevato.

- 256. C. brevirostris fulvus capite basi pedibusque *fulvus*. fuscis, rostro emarginato.**

Habitat in Saxonia Dom. Hybner.

Parvus. Caput fulvum, basi fuscum. Rostrum apice emarginatum. Thorax gibbus, laevis, fulvus. Elytra vix striata, obscuriora. Pedes fuscii.

- 257. C. brevirostris fuscus thoracis elytrorumque *palliatus*. margine cinereo.**

Habitat in Germania Dom. Schneider.

Paullo minor C. viridis. Corpus supra fuscum, subtus cinereum, quo colore & thoracis & elytrorum margo inficitur.

- 258. C. brevirostris corpore ferrugineo auro maculato.**

Curculio aurifer. Oliv. Inf. 83. fig. 124.

Brown. Jamaic. 429. tab. 43. fig. 3.

Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 1.

Habitat in Americae meridionalis Insulis.

Rostrum planum, ferrugineum punctis duobus apicis aureis. Elytra striato punctata, postice acuminata, ferruginea punctis lineolisque plurimis, vagis, aureis. Pedes antici elongati.

- 259. C. brevirostris albus elytris vitta abbreviata dentata pedibusque *cyanipes*.**

Curculio cyanipes. Oliv. Inf. 83. fig. 190.

Habitat Cajennae Mus. Dr. Hunter.



Antennae fuscae, cyaneo nitidae. Rostrum album, emarginatum. Thorax albus. Elytra substriata vitta a basi ad medium ducta, dentata, cyanea, nitida, apice obtusa. Pedes cyaneo nitidi.

- repandus.* 260. C. brevirostris thorace fusco albo lineato, elytris cinereis fusco fasciatis: margine corpore que viridibus nitidis.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch.

Statura omnio & magnitudo C. Tamarisci. Caput griseum. Thorax supra fuscus linea laterali dorsalique cinereis. Elytra cinerea fasciis obliquis, dentatis, repandis. Margo viridi nitens. Pedes cinerei.

- Tamarisci.* 261. C. brevirostris viridi nitens elytris viridi ferrugineo nigro cinereoque variis.

Curculio Tamarisci. Oliv. Inf. 83. fig. 71.

Habitat in Africae Tamarisco Dom. Prof. Vahl.

C. splendidulo duplo fere major. Caput, thorax, corpus viridia, nitida. Elytra variegata, distincta in primis maculis duabus, marginalibus, cinereis.

- splendidulus.* 262. C. brevirostris viridi nitens coleoptrorum disco cinereo nigro fasciato.

Habitat in Siberia Mus. Dom. Banks.

Statura omnino C. argentati at minor & femora inermia. Caput cinereum rostro apice subtestaceo. Thorax viridi nitens dorso cinerascente lineis duabus atris. Coleoptra limbo viridi nitente: dorso cinereo, fascia media angulata lituraque postica nigris. Corpus viridi nitens,

- curvipes.* 263. C. brevirostris argento squamosus, tibiis posticis arcuatis intus dentatis ciliatis.

Curculio curvipes. Oliv. Inf. 83. fig. 84.

Habitat in India orientali Dom. Lund.

Caput nigrum. Thorax & elytra squamis argenteis tecta. Elytra punctata. Pedes simpli-ces tibiis posticis arcuatis intus dente valido ciliisque densis armatis.

264. C. brevirostris thorace elytrisque fusco cinereo-*morbillosus*  
reoque variis: punctis elevatis atris numero-  
rosis.

Habitat in Gallia, Barbaria.

Major C. nebuloso. Antennae breves, cinereae.  
Caput nigricans rostro bisulcato. Caput &  
thorax fusco cinereoque varia, obscura pun-  
ctisque numerosissimis, elevatis, atris, glabris  
adspersa. Abdomen itidem punctis atris. Pe-  
des grisei.

265. C. brevirostris canus elytris fasciis obliquis *nebulosus*.  
nigris. Linn. Syst. nat. 2. 617. 84. Fn. Sv.

635. Paykull. Monogr. 104. 101. Bonsd.  
Curc. Suec. 20. 3.

Curculio albo nigroque varius. Geoff. Inf. 1.

278. 1. tab. 4. fig. 8.

Degeer Inf. 5. 241. 27.

Schaeff. Icon. tab. 25. fig. 3.

Frish. Inf. 11. 32. tab. 23. fig. 5.

Habitat in Europae plantis.

266. C. brevirostris oblongus nigricans elytris fas-*rorida*.  
ciis abbreviatis punctisque albis.

Curculio rorida. Pall. Icon. tab. A.

Habitat in Austria Dom. Schneider.

Rostrum breve, crassum, bisulcatum puncto  
utrinque ad oculos albido. Thorax scaber, ni-  
ger utrinque cruce puncto que antico albis.  
Elytra scabra fasciis tribus abbreviatis pun-  
ctisque indistinctis apicis albis. Corpus ni-  
grum ab domine pedibusque cinereis.

*marmoratus* 267. *C. brevirostris thorace nigro scabro albo linea-*  
*to, elytris albis: maculis nigris sparsis sub-*  
*quadratis.*

Habitat in Germania.

Statura & magnitudo *C. nebulosi*. Antennae  
 cinereae. Caput nigrum sulcis duabus ferru-  
 gineo villosis. Thorax scaber, niger, albo  
 lineatus. Elytra albida maculis plurimis, spar-  
 sis, nigris, subquadratis. Corpus & pedes ci-  
 nerea.

*fulcirostris.* 268. *C. brevirostris oblongus cinereus subnebulo-*  
*sus rostro trisulcato.* Linn. Syst. nat. 2. 617.  
 85. Paykull. Monogr. 103. 100. Bonsd.  
 Curcul. Suec. 21. 4. Degeer Ins. 5. 240. 26,  
*Curculio fulcirostris.* Oliv. Ins. 83. fig. 24.  
 Schaeff. Icon. tab. 25. fig. III.

Habitat in Europae plantis.

Statura & magnitudo omnino *C. nebulosi* at  
 rostrum trisulcatum.

*porculus.* 269. *C. brevirostris nigricans cinereo varius capite*  
*retuso rostroque carinato.*

*Curculio porculus.* Act. Suec. 6. tab. 2. fig. 20.  
 Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Magnus. Rostrum crassum in medio linea ele-  
 vata carinatum, vel potius bisulcatum. Ca-  
 put ante basin rostri valde retusum. Antennae  
 cinerascentes. Thorax niger, subvariolosus li-  
 nea media elevata, abbreviata, glabra, atra.  
 Elytra substriata, obscuro cinereoque mixta,  
 versus posteriora macula oblonga, atra. Cor-  
 pus nigrum.

*emarginatus.* 270. *C. brevirostris oblongus fuscus coleoptrorum*  
*dorso cinereo: lineis duabus punctorum im-*  
*pressorum atrorum.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Rostrum crassiusculum, bisulcatum, fuscum,  
Antennae apice cinereae. Thorax fuscus li-  
nea laterali, albida. Elytra punctis elevatis,  
minutissimis substriata, fusca, interne cinerea  
stria punctorum nigrorum. Coleoptra apice  
emarginata.

271. C. brevirostris niger abdomine albo: punctis *perlatus*.  
elevatis glabris atris, rostro sulcato.

Habitat in China Dom. de Sehestedt.

Rostrum nigrum sulcis duobus exaratum. Tho-  
rax punctis elevatis scaber, niger linea late-  
rali albida. Abdomen villosum, album punctis  
elevatis, glabris, atris.

272. C. brevirostris griseus elytris punctis duobus *distinctus*.  
distinctis albidis: anteriore didymo.

Habitat in Hungaria Dom. Hybner.

Statura & magnitudo omnino C. perlati at di-  
stinctus & aliis. Rostrum cylindricum sulcis  
duobus, profundis, albo villoso. Thorax gri-  
seus linea dorsali obscuriore, laterali albida,  
interrupta. Elytra vix striata, grisea futura  
obscuriore. Pone medium puncta duo alba,  
anteriore duplicato, oblongo. Corpus nigrum  
pectore maculis, abdomen fasciis cineraf-  
centibus.

273. C. brevirostris rostro carinato thoraceque inae- *glaucus*.  
quali obscuris, elytris glaucis: puncto po-  
stico elevato.

Panz. Naturf. 24. 22. 30. tab. 1. fig. 30.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Rostrum fuscum, supra ferrugineum carina  
elevata, acuta. Antennae fuscae clava cine-  
rea. Thorax inaequalis, nigro cinereoque va-  
rius. Elytra glauca puncto postico elevato,  
quasi fornicato, atro. Corpus cinereum.

- obliquus.* 274. *C. brevirostris cinereus elytrorum dorso albostrigis obliquis punctoque postico fornicato nigris.*  
 Habitat in Germania.  
*Distinctus elytrorum dorso albo strigis duabus obliquis, nigris. Thorax albotriatus.*
- albidus.* 275. *C. brevirostris oblongus fuscus elytris albidis: fascia media lituraque baseos apicisque fuscis.* Payk. Monogr. 106. 102.  
*Curculio niveus.* Bonsd. Curc. Suec. 21. 5.  
*Curculio candidus.* Herbst Arch. 33. 75. tab. 24. fig. 31.  
 Habitat in Germaniae plantis.  
*Thorax antice utrinque litura albida, nigro punctata. Elytra litura baseos, fascia media, quae interdum abbreviata, lituraque apicis fuscis. Abdomen albidum lineis punctorum nigrorum.*
- dispar.* 276. *C. brevirostris oblongus fuscus villis cinereis maculatus.*  
 Habitat in India orientali Prof. Abildgaard.  
*Statura & magnitudo omnino praecedentis totus fuscus, villis cinereis hinc inde maculatus. Aestate villi pereunt.*
- Vetula.* 277. *C. brevirostris griseus elytris rugosis nigris cinereo maculatis, rostro atro.*  
 Habitat Tranquebariae Dom. Lund.  
*Affinis videtur praecedenti. Rostrum cylindricum, atrum. Thorax obscurus, griseus. Elytra rugosa, nigricantia, cinereo maculata. Corpus griseum.*
- lusitanicus.* 278. *C. brevirostris oblongus supra fuscus elytris macula baseos alba.*  
*Curculio lusitanicus.* Oliv. Inf. 83. tab. 16. fig. 202.

- Habitat in Lusitania Dom. Dr. Gray.  
 Corpus supra fuscum, subtus squamoso aureum.  
 Elytra macula oblonga baseos.
- 279.** C. brevirostris cinereus elytris lineis elevatis *crenulatus*.  
 tribus crenulatis atris.  
 Curculio crenulatus. Oliv. Inf. 83. fig. 729.  
 Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae griseae clava fusca. Caput cinereum  
 dorso fusco. Thoracis dorsum fuscum. Elytra  
 lineis tribus elevatis, glabris, atris, utrin-  
 que punctis impressis, crenulatis. Pedes fusi.
- 280.** C. brevirostris niger elytris punctis nigris al- *punctatus*  
 bisque alternis holosericeis striatis.  
 Curculio punctatus. Oliv. Inf. 83. fig. 119.  
 Habitat Terra nova Americae Mus. D. Banks.  
 Caput nigrum, griseo subpubescens. Thorax  
 concolor. Elytra nigra striis e punctis albis  
 nigrisque alternis.
- 281.** C. brevirostris oblongus fuscus thoracis dorso *incanus*.  
 plano. Linn. Syst. nat. 2. 610. 81. Fn. Sv.  
 631. Paykull. Monogr. 102. 99.  
 Curculio cinereus, squamosus, alis carens,  
 elytris striatis. Geoff. Inf. 1. 282. 10.  
 Bonsdorf. Curc. Suec. 41. 36.  
 Degeer Inf. 5. 242. 28.  
 List. Scarab. Angl. 394. 30.  
 Habitat in Europae plantis.
- 282.** C. brevirostris ater thorace punctato, rostro *articulatus*.  
 basi articulato.  
 Habitat in Austria Schneider.  
 Medius. Caput globosum, atrum rostro bre-  
 visimo, apice emarginato, basi articulo in-  
 ter oculos distincto. Thorax gibbus, puncta-  
 tus. Elytra punctato striata. Abdomen ci-  
 nereo pubescens. Pedes nigri.

*costatus.* 283. C. brevirostris cinereus thorace nigro : linea  
quatuor cinereis.

Habitat in Gallia australiori Mus. Dom. Banks.  
Magnitudo C. incani. Antennae basi ferrugineae. Rostrum nigrum dorso cinereo. Thorax niger linea dorsali elevata, atra. Elytra pedesque cinerea.

*melancholicus.* 284. C. brevirostris fuscus elytris tibiisque testaceis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minor C. incano. Rostrum breve, cylindricum antennis ferrugineis clava obscuriore. Thorax niger linea laterali villosa, pallida, obsoleta. Elytra striata, obscure testacea, immaculata. Corpus nigrum tibiis testaceis.

*interruptus.* 285. C. brevirostris obscurus coleoptrorum fascia  
interrupta alba.

Curculio interruptus. Oliv. Inf. 83. fig. 122.  
Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.  
Rusticus. Orbita oculorum alba. Thorax fuscus scutello albo. Elytra striata, albo irrorata at pone medium fascia albida, obliqua, sutura interrupta. Pedes cinerei.

*scutellaris.* 286. C. brevirostris ater elytris crenato striatis, pe-  
dibus anticis elongatis.

Curculio scutellaris. Oliv. Inf. 83. fig. 142.  
Habitat in Terra Diemenii Mus. Dom. Banks.  
Antennae nigrae. Rostrum sulcatum. Thorax scaber, ater. Scutellum parvum, elevatum. Elytra crenato striata, obtusa, ante apicem unidentata, atra, immaculata. Pedes nigri anticis elongatis.

*longimanus* 287. C. brevirostris fuscus thoracis margine punctis-  
que duobus ferrugineis, pedibus anticis elongatis.

Curculio longimanus. Oliv. Inf. 83. fig. 114.

Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.

Rostrum fuscum dorso plano. Thorax globosus lateribus margineque antico ferrugineis. Dorsum fuscum punctis duobus ferrugineis. Elytra striata, fusca, viridi tincta. Abdomen subtus virescens. Pedes antici nigri, longiores femoribus incrassatis, tibiisque serratis, quatuor postici ferruginei tibiis fuscis.

Variat thorace elytrisque ferrugineis: linea nigra. Pedes nigri.

288. C. brevirostris cinereus fusco irroratus thorace acute spinoso.

Habitat — — Mus. Dr. Schulze.

Gibbus. Rostrum planum. Thorax utrinque acute spinosus, cinereus atomis fuscis. Elytra striata, cinerea, fusco irrorata. Abdomen nigricans striis tribus e punctis albidis.

289. C. brevirostris fusco aureus pedibus ferruginicaneis.

Curculio Pyri. Paykull. Monogr. 85. 82.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11.

Habitat in Daniae hortis Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura omnino C. Pyr. at femora omnino mutica, forte sexus varietas.

290. C. brevirostris fuscus thorace trilineato, elytris pallido striatis nigroque punctatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo C. Polygoni. Rostrum cylindricum, fuscum puncto albido inter oculos. Thorax fuscus lineis tribus dorsalibus, albis. Elytra striis alternis obscuris pallidisque punctis nigris. Sutura obscura ante apicem macula pallida in singulo elytro punctis duobus nigris. Pedes obscuri.

- Polygoni.* 291. *C. brevirostris thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuscis futuraque nigro punctata.* Paykull. Monogr. 42. 39. β.  
*Linn. Syst. nat. 2. 609. 26. Fn. Sv. 597.*  
*Curculio Polygoni. Oliv. Inf. 83. fig. 41.*  
*Habitat in Europae Polygono.*  
*Rostrum griseum linea longitudinali, alba. Thorax griseus lineis tribus albis. Elytra cinerea lineola baseos duabusque aliis in medio. Sutura fusco punctata. Pedes grisei.*
- griseus.* 292. *C. brevirostris supra griseo fuscus subtus cinereus rostro canaliculato.*  
*Habitat in Anglia, Italia.*  
*C. lineato longior. Rostrum sulco profundiori exaratum.*
- 3 guttatus.* 293. *C. brevirostris nigricans elytris griseis: maculis duabus albis; posteriori majori communi.*  
*Petiv. Gazoph. tab. 50. fig. 8.*  
*Schaeff. Icon. tab. 43. fig. 9.*  
*Sulz. Inf. tab. 4. fig. 11.*  
*Habitat in Anglia captus die VI. Maj. in fabuletis Richmondensibus.*  
*Rostrum canaliculatum & thorax fusca. Elytra substriata, grisea puncto parvo albo in medio & macula majori communi versus apicem.*
- Arundinis.* 294. *C. brevirostris lutescens, thorace lineis duabus dorsalibus fuscis.* Paykull. Monogr. 47. 44.  
*Curculio luteus. Knoch. Beytr. 1.*  
*Habitat in Germaniae, Sueciae Arundine Dom. Prof. Helwig.*  
*Statura media C. triguttati. Rostrum cylindricum, incurvum, nigrum dorso flavescente. Thorax flavescens dorso lineis duabus dorsa-*

ibus, latis, fuscis. Elytra substriata, lutescentia. Corpus lutescens pedibus fuscis.

- 295. C. brevirostris supra fusco cinereus subtus nigro moerens.**  
ger rostro subfulcato.

Habitat Halae Dom. Hybner.

Statura & magnitudo C. grisei supra totus fusco cinereus, subtus niger. Elytra substriata.

- 296. C. brevirostris griseus capite thorace que nigris: gressorius.**  
linea dorsali alba.

Habitat in Italia Dom. de Schlanbusch.

Medius. Caput nigrum, canaliculatum canali albido, subtus cinereum. Thorax supra ater linea dorsali alba, subtus cinereus. Elytra fusca. Abdomen cinereum. Pedes obscuri, antici elongati.

- 297. C. brevirostris cinereus thorace trilineato, geminatus.**  
elytris striis numerosis fuscis per paria approximatis.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Medius, fere globosus. Antennarum clava ferruginea. Rostrum cinereum. Thorax cinereus lineis tribus latis, fuscis. Elytra globosa, cincta striis longitudinalibus fuscis, per, paria approximatis. Pedes cinerei.

- 298. C. brevirostris niger elytris striatis, antennis gramineus.**  
pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germaniae Graminosis D. Smidt.

Statura ovata praecedentis. Antennae ferrugineae clava interdum apice cinerascente. Thorax canaliculatus, ater utrinque tuberculo parvo, elevato. Elytra crenato striata, abdome paullo breviora. Pedes omnes rufi. Corpus subtus cinereo villosum.

- 299. C. brevirostris flavescente villosus rostro apice diadema.**  
retuso atro.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

C. Coryli paullo major. Antennae cinereae.  
Rostrum obscurum, apice retusum, atrum.  
Thorax & elytra atomis vel villis flavescen-  
tibus tecta, immaculata. Pedes cinerei.

- Meles.* 300. C. brevirostris griseus thoracis dorso fusco:  
linea albida, elytris nigro punctatis: sutura  
ante apicem albida.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo minor C. Coryli. Caput griseum rostro  
cylindrico, nigro. Thorax supra griseus dorso  
lato, fusco linea media grisea. Elytra striata,  
mox grisea, mox magis ferruginea, nigro  
punctata sutura ante apicem linea distincta, al-  
bida. Pedes concolores.

- Coryli.* 301. C. brevirostris cinereo fuscoque varius elytro-  
rum sutura dimiata atra.

Habitat in Angliae Corylo Capt d. XX Maj.  
Rostrum apice atrum. Thorax elytraque glabra,  
cinereo fuscoque varia. Dimidia suturae pars,  
basi proxima atra, glabra.

- lineatus.* 302. C. brevirostris fuscus thorace striis tribus pal-  
lidioribus. Linn. Syst. nat. 2. 616. 80. Fn.  
Sv. 630. Paykull. Monogr. 112. 108. Bonsd.  
Curc. Sv. 30. 16.

Geoff. Ins. 1. 283.

Degeer Ins. 5. 247. 35.

Schaeff. Icon. tab. 103. fig. 8.

Habitat in Europae plantis.

- lunatus.* 303. C. brevirostris coleoptris elevato striatis: fas-  
cia semicirculari maculaque postica albis: lu-  
nula nigra.  
Habitat in Anglia capt. die VI Maj in arenosis  
Richmondensibus,

Rostrum cinereum puncto frontis impresso.

Elytra lineis tribus aut quatuor elevatis, acutis, quae tamen elytri apicem haud attingunt cinerea, fascia alba ab angulo humerali ad medium suturae ducta. Postice macula magna, communis, alba, in cuius medio lunula communis, nigra. Pedes fusco fasciati.

304. C. brevirostris fuscus thorace lineis elytrisque *caninus*.  
brunneis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas C. lineati. Antennae nigrae articulo primo rufo. Rostrum canaliculatum oculorum orbita pallida. Thorax rotundatus, fuscus lineis tribus brunneis. Elytra substriata, brunnea, fere immaculata. Corpus & pedes fusca.

305. C. brevirostris cinereus: dorso fuscus. *cinerascens*.

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo C. lineati. Antennae testaceae. Caput & thorax cinerea dorso fuscus. Coleoptra substriata, cinerea dorso itidem fuscus, parum cinereo lineato. Pedes pallide testacei.

306. C. brevirostris tomentoso cinerascens pedibus *fulvipes*.  
testaceis. Paykull. Monogr. 114. 109.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Rostrum planum. Corpus pubescens, viride. Abdomen argento pubescens. Antennae fuscæ. Pedes testacei.

307. C. brevirostris testaceus capite elytrisque stria- *ruficollis*.  
tis cinereo fuscis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Parvus. Caput fuscum antennis rufis clava fusca. Thorax laevis, testaceus. Elytra striata, cinereo fusca. Corpus testaceum.

- fulvicornis.* 308. *C. brevirostris brunneus elytris fasciis undatis cinereis.*  
*Curculio ruficornis.* Paykull. Monogr. 109. 105.  
 Bonsd. Curcul. Suec. 27. 13.  
 Habitat in Europae arboribus.  
 Affinis sequenti.
- pilosus.* 309. *C. brevirostris cinereus pilosus antennis nigris.*  
 Habitat in Germania Dom. Schneider.  
 Paullo major sequentibus. Corpus totum cinereum, obscurum pilis erectis, numerosis testum. Antennae nigrae. Thorax sublineatus.
- undatus.* 310. *C. brevirostris fuscus elytris apice pallidis: striga undata fusca.* Paykull. Monogr. 108. 104.  
*Curculio tereticollis.* Bonsd. Curc. Suec. 28. 14. Degeer Inf. 5. 246. 33.  
 Habitat in Europae Corylo Dom. de Hattorff.  
 Statura parva *C. lunati.*
- hispidulus.* 311. *C. brevirostris fuscus thorace cinereo lineato, elytris hispidis punctis obscurioribus striatis.*  
 Paykull. Monogr. 110. 106.  
 Habitat in Plantis aquaticis Kiliae Dom. Lund. Thorax punctatus, fuscus lineis tribus longitudinalibus, cinereis: media tenuiore. Punctum utrinque laterale, cinereum. Elytra fusca pilis albis, erectis hispida punctisque obscurioribus striata, interjectis pilis albis. Pedes nigricantes.
- hirsutulus.* 312. *C. brevirostris cinereus hispidus elytris striatis, antennis pedibusque flavescentibus.*  
*Curculio echinatus* Bonsd. Curc. Suec. 33. 21.  
 Paykull. Monogr. 92. 89.  
 Habitat in Germania Dom. Schmidt.  
 Statura & magnitudo omnino *C. scabriculi.*  
 Rostrum breve, obtusum, fuscum antennis

flavescentibus. Corpus totum cinereum pilis densis, erectis, griseis. Pedes omnes flavescentes. Differt a C. scabriculo rostro thoraceque haud canaliculatis.

313. C. brevirostris cinereus capite thoraceque *ca-* *scabriculus.*  
canaliculatis, elytris hispidis. Linn. Mant. 351.

Paykull. Monogr. 91. 88.

*Curculio scabriculus.* Bonsd. Curc. Suec. 32.20.

Habitat in Sueciae arenosis.

Magnitudo C. cervini totus cinereus. Caput & rostrum canaliculatum. Thorax punctis elevatis scaber. Elytra striata, hispida.

314. C. brevirostris ater elytris vitta marginali scutelloque inauratis. *limbatus.*

*Curculio lateralis.* Paykull. Monogr. 95. 92.

Habitat in Europa.

Statura & magnitudo C. cervini. Caput nigrum, immaculatum oculis prominulis. Thorax rotundatus, niger. Elytra substriata, punctata, nigra vitta fere marginali, inaurata. Scutellum inauratum.

315. C. brevirostris viridis antennis tibiisque testaceis. *parvulus.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

Parvus. Antennae pallide testaceae. Caput, thorax, elytra viridi squamosa. Fenora fusca. Tibiae testaceae.

316. C. brevirostris thorace viridi squamofo, elytris striatis nigris, *viridicollis.*

Habitat in Germaniae Quercu D. Prof. Helwig.

Statura omnino C. argentati. Antennae ferrugineae. Caput & thorax viridi squamosa. Elytra punctato striata, atra. Pedes inermes, nigricantes, interdum testacei.

- ceruinus.* 317. C. brevirostris griseus elytris puncto obsoleto baseos albo, antennis basi rufescentibus. Linn.  
Syst. nat. 2. 615. 70. Fn. Sv. 627.  
Degeer Ins. 5. 220. 13.  
Habitat in Europae plantis.
- striatus.* 318. C. brevirostris fuscus elytris striis cinereis nigro punctatis.  
Habitat in Barbaria Dom. Prof. Vahl.  
Parvus. Caput fuscum. Thorax fuscus linea dorsali cinerea. Elytra fusca striis tribus longitudinalibus futuraque cinereis, holofericeis, nigro punctatis.
- lacerta.* 319. C. brevirostris griseus elytris striatis, antennis apice nigris.  
Habitat in India orientali Mus. Dom. Banks.  
Triplo major C. cervino. Rostrum apice emarginatum. Antennae griseae clava apice nigra. Thorax rotundatus, griseus lateribus obscurioribus. Elytra striata striis crenatis, postice coeuntibus.
- velox.* 320. C. brevirostris pilosus niger elytris margine puncto baseos fascia interrupta punctoque apicis albis.  
Habitat Cajennae Dom. von Rohr.  
Caput carinatum, atrum. Thorax ater linea laterali, alba. Elytra pilosa, striata, atra margine exteriori, puncto magno baseos, fascia in medio interrupta punctoque apicis margine annexo albis. Pedes nigri.
- seminulum.* 321. C. brevirostris niger immaculatus elytris ovatis punctato striatis.  
Habitat in Hungaria Dom. Hybner.  
Corpus parvum, totum ovatum, nigrum, immaculatum. Elytra valde ovata, punctato striata. Pedes nigri.

322. *C. brevirostris ater antennis rufis, thorace ruficornis.*  
 utrinque bituberculato. Linn. Syst. nat. 2.  
 616. 78. Fn. Sv. 636.  
 Habitat in Europae plantis.  
 Thoracis tubercula utrinque duo. Elytra striata.
323. *C. brevirostris cylindricus niger elytris stria-* *cloropus.*  
 tis, antennis pedibusque rufis. Linn. Syst.  
 nat. 2. 617. 82. Fn. Sv. 635. Paykull. Mo-  
 nogr. 116. 110.  
*Curculio brevirostris oblongus ater anten-*  
 nis rufis. Linn. Syst. nat. 2. 617. 86. Fn.  
 Sv. 637. mera hujus varietas.  
*Curculio Piniperda* Herbst Arch.  
 Habitat in Europae Ligno quercino.  
 Parvus, totus cylindricus.
324. *C. brevirostris cylindricus ater pedibus rufis,* *canalicula-*  
 thorace canaliculato. *tus.*  
 Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom.  
 Smidt.  
 Parvus, cylindricus, totus ater, nitens pedibus  
 solis obscure rufis. Thorax imprimis basi  
 late canaliculatus. Elytra striato punctata.
325. *C. brevirostris niger obscurus elytris punctis multipun-*  
 plurimis griseo albis. *ctatus.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura & magnitudo omnino *C. nigritae* at  
 femora mutica. Rostrum apice emarginatum  
 lineaque dorsali parum elevata. Antennae ni-  
 grae. Thorax gibbus, obscurus, immacula-  
 tus. Elytra substriata, fusca punctis numero-  
 sissimis, griseis. Pedes nigri.
326. *C. brevirostris niger elytris sulcatis cinereis.* *tristis.*  
 Habitat in Suecia, Anglia.  
 Medius. Caput, thorax, abdomen & pedes ob-  
 scure nigra. Elytra sulcata, cinerea, immaculata.

- raucus.* 327. *C. brevirostris niger elytris striatis fuscis cinnereo maculatis.* Paykull. Monogr. 97. 94.  
*Curculio tristis.* Bonsd. Curc. Suec. 36. 27.  
*Habitat Halae Saxonum Dom.* Hybner.  
*Magnitudo & statura omnino praecedentis &*  
*forte mera ejus varietas.* Antennae piceae.  
*Caput glabrum, nigrum.* Thorax scaber, niger,  
*immaculatus.* Elytra striata, fusca punctis plurimis cinerascentibus, sparsis. Corpus nigrum.
- adspersus.* 328. *C. brevirostris ater elytris postice albo maculatis.*  
*Curculio adspersus.* Oliv. Inf. 83. fig. 156.  
*Habitat in nova Hollandia Mus. Dom.* Banks.  
*Duplo minor C. tristi, ovatus.* Thorax subglobosus, ater inacula utrinque ad basin obsoleta, alba. Elytra crenato striata, atra, postice in primis albo maculata. Pedes elongati.
- punctatus.* 329. *C. brevirostris fuscus elytris punctis elevatis holosericeis.* Paykull. Monogr. 111. 107.  
*Habitat in Suecia.*  
*Major, ovatus.* Thorax gibbus, glaber. Elytra striato punctata & praeterea punctis elevatis, holosericeis, atris albisque, alternis adspersa.
- obscurus.* 330. *C. brevirostris ovatus ferrugineo fuscus.* Paykull. Monogr. 98. 95.  
*Curculio murinus Bonsd.* Curc. Suec. 37. 80.  
*Habitat in Suecia.*  
*Totus obscure ferrugineus.* Elytra lineis elevatis, obsoletis.
- maxillosus.* 331. *C. brevirostris ovatus niger mandibulis exertis arcuatis.*  
*Habitat in Hungaria Dom.* Hybner.

Statura & magnitudo omnino C. nigri. Rostrum singulare, brevissimum mandibulis expertis, arcuatis. Thorax gibbus, laevis, niger, nitidulus. Elytra laevia, nigra punctis laevioribus striata. Pedes nigri.

332. C. brevirostris ovatus scaber niger pedibus rufis. Paykull. Monogr. 101. 198. *niger.*

*Curculio clavipes* Bonsd. Curc. Suec. 40. 35.  
Habitat in Germania.

Corpus totum obscure nigrum punctis parvis, elevatis scabrum. Antennae nigrae. Pedes rufi genubus plantisque nigris.

333. C. brevirostris ater nitidus rostro emarginato. *laevigatus.*  
Habitat Kiliae sub lapidibus.

Statura praecedentis. Antennae nigrae. Rostrum apice emarginatum. Thorax & elytra magis globosa, atra, nitida, laevia, immaculata. Pedes atri.

334. C. brevirostris niger elytris punctato striatis, *rotundatus.*  
antennis tibiisque rufis.

Habitat in Germania Dom. Leuwenkiold.

Parvus. Antennae ferrugineae clava fusca. Rostrum brevissimum, obtusiusculum. Thorax cylindricus, niger, immaculatus. Elytra punctato striata, nigricantia, paulo viridi nitentia. Pedes rufi femoribus nigris.

335. C. brevirostris niger thorace carinato varioloso, *variolosus.*  
elytris striatis.

Habitat in Saxonie.

Statura C. punctati totus niger. Thorax punctis majoribus, passim confluentibus excavatus. Elytra connata, postice acuminata.

336. C. brevirostris thorace elytrisque variolosis nigricans albo punctatis. *flavicus.*

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Parvus. Caput nigrum, immaculatum. Thorax variolosus, ater, albo punctatus. Elytra variolosa, atra, albopunctata & versus apicem fascia alba. Pedes & corpus alba.

- valgus.* 337. C. brevirostris ater nitens elytris punctato striatis, femoribus annulo cinereo.

Habitat in America.

Medius, totus ater, nitens. Femora apice annulo obsolete cinereo.

Varietas viridi squamosa in Mus. Dom. de Sehestedt vix distincta.

- succinctus.* 338. C. brevirostris ater elytris margine lineolisque duabus albis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee. Corpus magnum, oblongum. Caput sulcatum, atrum. Thorax punctatus, ater linea laterali, alba. Elytra postice gibba, punctata, atra margine lineolisque duabus albis, altera abasi ad medium, altera a medio marginis versus apicem ducta, reflexa. Pedes atri.

- Cameleon.* 339. C. brevirostris aeneus elytris futura vitta quibz abbreviatis viridi aureis.

Curculio Cameleon. Oliv. Inf. 83. fig. 166.

Drury Inf. 2. tab. 33. fig. 4. 5.

Habitat in Jamaica Mus. Dr. Hunter.

Major C. vittato at ejusdem staturalae.

- vittatus.* 340. C. brevirostris ater elytris striis albis rubrisque abbreviatis. Linn. Syst. nat. 2. 610. 33.

Curculio vittatus. Oliv. Inf. 83. fig. 192.

Sloan. Jamaic. 2. 210.

Habitat in Americæ Insulis. Destruit larva radices Citri medicae Dr. Schwarz.

Rostrum supra planum, atrum. Thorax planus, laevis. Elytra striata, punctata, atra stria alba ad futuram & latiori rufa impressa in medio,

quae ambae abbreviatae ultra medium haud extenduntur. Stria multa brevior, rubra, nigro subpunctata ad marginem exteriorem. Apex elytrorum parum cinerascit. Subtus ater pectore albo maculato.

341. C. brevirostris elytris flavis: lineis glaberrimis *Spengleri*.  
abbreviatis atris. Linn. Syst. nat. 2. 609. 32.

*Curculio Spengleri*. Oliv. Inf. 83. fig. 82.

Act. Berolinens. 4. tab. 7. fig. 7.

Habitat in Americae Insulis.

Variat elytris cinereis lineis atris, vix tamen distinctus.

342. C. brevirostris niger elytris punctato striatis: *bivittatus*.  
vitta marginali dorsalique interrupta flavis.

*Curculio bivittatus*. Oliv. Inf. 83. fig. 23.

Habitat in St. Thomas Americae Dr. Pflug.

Corpus atrum, immaculatum. Elytra punctato striata vittis duabus, haud punctatis, villosis, postice coeuntibus, flavis, altera marginali, altera dorsali, in medio interrupta. Lineola alba inter pedes secundi & tertii paris.

Alium nullo modo distinctum vidimus vittis duabus haud interruptis, dorsali virescente, basi tantum flava.

343. C. brevirostris griseus thorace elytrisque cine- *lividus*.  
reo atroque maculatis.

*Curculio lividus*. Oliv. Inf. 83. fig. 59.

*Curculio lividus* Brown. Illustr. tab. 49. fig. 8.

*Curculio histrionicus* Sparmann. Act. Holm.

1785. tab. 2. fig. 17.

Habitat in America meridionali.

Magnus. Rostrum ferrugineo griseum. Thorax griseus lineis tribus cinereis maculisque elevatis, atris. Elytra grisea maculis cinereis elevatisque atris numerosis.

*pulcher.*

344. *C. brevirostris coleoptris atris: striis sex dorsibus approximatis abbreviatis albis.*

*Curculio pulcher.* Oliv. Inf. 83. fig. 130.

*Curculio pulcher* Brown Illustr. tab. 49. fig. 6.

Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.

Caput & thorax punctata, atra, nitida. Elytra punctata, atra striis tribus approximatis, abbreviatis, albis & parva marginali, rubra. Apex fere obtusus parum cinerascit. Pedes atri.

*festivus.*

345. *C. brevirostris elytris flavescentibus: striis abbreviatis nigris marginalique sanguinea.*

Habitat in Americae meridionalis Insulis D. Isert.

Statura & magnitudo *C. Spengleri*. Rostrum breve, bisulcatum, nigrum. Antennae nigrae. Thorax niger lateralibus punctisque numerosis dorsalibus, impressis, flavis. Elytra flava vitta lata, marginali, sanguinea, longiori, margine tamen ipso tenuissime nigro. Praeterea lineae quatuor dorsales, abbreviatae, nigrae. Corpus nigrum abdominis basi parum pallida.

- histrionicus.* 346. *C. brevirostris griseus thorace lineis lateribus fulvis, elytris albis: maculis atris fulvisque.*

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lee.

Caput griseum. Thorax griseus linea laterali, lata, fulva margineque albido. Elytra alba maculis plurimis, elevatis, nigris duabusque oblongis, fulvis. Abdomen albidum utrinque linea longitudinali punctorum nigrorum. Pedes nigri.

*Rohrii.*

347. *C. brevirostris elytris acuminatis griseis: margine baseos flavescente.*

Habitat in Americae Insulis Dom. von Rohr.

Rostrum bisulcatum, nigrum. Thorax fuscus atomis albis margineque flavescente. Elytra apice acuminata, grisea. Pedes nigri.

348. C. brevirostris niger thorace elytrisque punctis *impressus*. impressis albis.

*Curculio impressus*. Oliv. Inf. 83. fig. 126.

Habitat in Jamaica Mus. Dom. Banks.

Rostrum atrum utrinque linea alba. Thorax ater punctis utrinque duobus lateralibus, duobusque majoribus, dorsalibus baseos impressis, albis. Elytra punctato striata, atra lineis duabus punctorum alborum impressis. Pedes nigri.

349. C. brevirostris niger thorace angulato, elytris *albipes*. tuberculatis basi apiceque albidis.

*Curculio albipes*. Oliv. Inf. 83. tab. 9. fig.

Habitat in Madagascar Mus. Reg. Galliae.

Magnitudo praecedentis. Rostrum crassum, nigrum orbita oculorum cinerea. Thorax utrinque angulo obtuso niger, postice cinereascens. Pedes albi femoribus basi tarsisque nigris.

350. C. brevirostris niger thorace rufo maculato, *rivulosus*. elytris lineis tribus impressis cinereis.

*Curculio rivulosus*. Oliv. Inf. 83. tab. 11. fig. 133.

Habitat in India orientali.

Rostrum breve, crassum, sulcatum. Thorax canaliculatus, rufo maculatus. Elytra crenato striata striis tribus impressis, cinereis, quarum intermedia duplice annulo notatur.

351. C. brevirostris fusco cinereoque varius rostro *depressirostris*. depresso plano apice atro.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Rostrum breve, depresso, planum, basi cinereum, apice atrum. Thorax & elytra fusco

cinereoque varia. Elytra striata, tuberculata basi ad suturam parum retusa, albida scutello nigro. Pedes variegati femoribus anticis elongatis, incurvis.

*marginellus* 352. C. brevirostris niger thoracis elytrorumque margine albo.

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Banks.  
Paullo minor C. verrucoso. Caput nigrum rostro sulcato. Thorax punctis elevatis, majoribus scaber, niger margine laterali albo. Elytra connata, scabra, nigra margine postice duplicato, albo. Pedes nigri.

*verrucosus*. 353. C. brevirostris aeneo niger elevato punctatus elytris postice verrucosis. Linn. Syst. nat. 2. 618. 90. Mus. Lud. Ulr. 60.

Curculio verrucosus. Oliv. Inf. 83. fig. 125.  
Drury Inf. 1. tab. 32. fig. 5.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Totus aeneus, minime splendens. Elytra striis tribus elevatis punctis elevatoribus adspersis. Inter striae striae duae punctorum impressorum. Postice in singulo elytro verruca elevata, obtusa.

*capensis*. 354. C. brevirostris ater thorace elevato punctato, elytris striato crenatis. Linn. Syst. nat. 2. 618. 82. Mus. Lud. Ulr. 59.

Curculio capensis. Oliv. Inf. 83. fig. 52.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

Rostrum fulcatum.

*6vittatus*. 355. C. brevirostris niger thorace scabro albo lineato, elytris acuminatis.

Curculio 6 vittatus. Oliv. Inf. 83. tab. 12. fig. 149.

Habitat — — Mus. Dr. Hunter.

Magnitudo & statura omnino C. verrucosi.  
Rostrum obtusum. Thorax scaber, albo lineatus. Elytra crenato striata, acuminata vittis tribus latis, apice coeuntibus, albis. Pedes nigri.

356. C. brevirostris niger fronte bidentata, elytris *vitulus*. unispinosis.

Habitat in Terra del Fuego Mus. Dom. Banks.  
Caput nigrum rostro canaliculato. Inter oculos dentes duo elevati, acuti. Thorax rugosus, ater antice punctis duobus elevatis. Elytra carinata, rugosa, atra, postice spina elevata, acuta. Pedes nigri.

357. C. brevirostris griseus thorace inaequali antece *inaequalis*. prominulo, elytris sulcatis postice bidentatis, rostro trifalcato.

Curculio inaequalis. Oliv. Inf. 83. fig. 164.  
Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.  
Rostrum sulcis tribus latioribus exaratum.  
Thorax inaequalis, canaliculatus, antice mucrone parvo, obtuso, prominente. Elytra sulcis subdentatis dentibusque duobus posticis, majoribus, distinctis.

358. C. brevirostris cylindricus fuscus elytris apice *acuminatus* acuminatis.

Curculio acuminatus. Oliv. Inf. 83. fig. 139.  
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
Statura longa, angusta. Antennae fuscae. Caput & thorax elytris angustiora, longiora, cylindrica, glabra, fusca. Elytra striata, fusca terminantur postice in spinam porrectam, acutam. Pedes ferruginei.

359. C. brevirostris fuscus elytris acuminatis crenato striatis, rostro sulcato. *capistratus*.

Habitat ad Cap. Bon. spei Prof. Lefke.

Magnus. Rostrum sulcis plurimis exaratum, nigrum. Antennae piceae. Thorax punctis elevatis scaber. Elytra acuminata striis plurimis, elevatis, valde crenatis exarata. Corpus & pedes nigra.

*emeritus.* 360. C. brevirostris niger thorace elytrisque spinosis, fronte excavata. Linn. Syst. nat. 2. 617.  
87. Mus. Lud. Ulr. 35.

Habitat in Indiis.

Forte ad Brachyceros emendandus, mihi haud rite notus.

*tuberculatus* 361. C. brevirostris ater thorace punctato, elytris striatis tuberculatisque.

Habitat in India orientali Doin. Prof. Abildgard.

Antennae fractae, nigrae. Rostrum cylindricum, scabrum, atrum. Thorax punctis plurimis impressis, ater, immaculatus. Elytra striata tuberculis elevatis sparsis 3. 3. 2. oblique positis, atra maculis duabus marginalibus, cinereis. Pedes scabri, atri.

*crispatus.* 362. C. brevirostris thorace mutico scabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis.

Curculio crispatus. Oliv. Inf. 83. fig. 160.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks.

Rostrum fulcatum. Thorax carinatus punctis magnis, elevatis scaber, ater. Elytra striis tribus elevatis, dentatis & inter has lineolae punctorum elevatorum, nigrorum.

*culturatus.* 363. C. brevirostris cinereus thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis postice cinereis.

Curculio cultratus. Oliv. Inf. 83. fig. 157.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

**Caput cinereum rostro atro.** Antennae fuscae.  
**Thorax scaber,** niger margine antico cine-  
rascente. Antice tubercula duo approximata,  
elevata, compressa. Elytra crenato striata  
tuberculis sex vel septem elevatis, sparsis ni-  
gra, postice cinerea tubercula nigro. Pedes  
grisei.

364. C. brevirostris cinereus thorace scabro antice *tribulus*,  
impresso, elytris spinosis.

**Curculio tribulus.** Oliv. Inf. 83. fig. 161.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

**Caput fusco cinereum.** Thorax scaber, obscure  
cinereus antice puncto majusculo, impresso.  
Elytra connata spinis plurimis, erectis, acutis:  
posticis duabus ad suturam majoribus.

365. C. brevirostris cinereus thorace scabro, elytris 4 *dens*,  
spinosis: spinis quatuor posticis longioribus.

**Curculio 4 dens.** Oliv. Inf. 83. fig. 187.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

**Antennae cinereae articulo ultimo fusco.** Ro-  
strum cinereum dorso canaliculato. Thorax  
punctis elevatis, obtusissimis scaber. Elytra  
spinosa: spinis quatuor posticis longioribus.  
Pedes cinerei.

366. C. brevirostris albidus elytris quadrispinosus, ro- 4 *spinosus*,  
stro fusco.

Habitat ad Cap. Bon. spei.

**Rostrum canaliculatum, fuscum.** Thorax ro-  
tundatus, albidus, immaculatus dorso plano.  
Elytra albida spinis quatuor erectis, validis:  
solitaria versus apicem. Pedes albi.

367. C. brevirostris albicans thorace canaliculato, co- *clavus*.  
leoptris spinosis: lineolis tribus baseos rubris.

**Curculio Clavus.** Oliv. Inf. 83. fig. 168.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Caput cinereum rostri dorso canaliculato, rufescente. Elytra albida spinis plurimis nigris, duabus lateralibus baseos & duabus dor salibus apicis longioribus. Lineola brevis, lateralis, rubra & adhuc minor, communis in futura. Pedes albi.

*nodulosus.* 368. C. brevirostris thorace lineis sex nodulosis, elytris spinosis.

Curculio nodulosus. Oliv. Inf. 83. fig. 188.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks. Rostrum dorsum canaliculatum canali apice dilatato. Thorax griseus lineis sex e nodulis elevatis, atris, nitidis consistentibus. Elytra grisea spinis plurimis, atris. Pedes cinerei.

*rubifer.* 369. C. brevirostris cinereus thorace scabro, elytris spinis elevatis sanguineis.

Curculio rubifer. Oliv. Inf. 83. fig. 159.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Banks. Statura & summa affinitas sequentis at thorax magis canaliculatus & elytrorum spinae sanguineae, nitidae.

*globifer.* 370. C. brevirostris thorace scabro, elytris spinosis postice acuminatis.

Curculio globifer. Oliv. Inf. 83. fig. 135.

Habitat ad Cap. Bon. Spei Mus. Dom. Banks. Rostrum laeve, apice incrassatum. Thorax rotundatus punctis plurimis, elevatis, obtusis, atris. Elytra nigra spinis plurimis erectis, postice acuminata. Pedes nigri.

Variat rarius thorace utrinque unispinoso.

*pillularius.* 371. C. brevirostris thorace utrinque spinoso noduloso, elytris tuberculato striatis apice acuminatis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Dom. Spengler.

Rostrum planum. Thorax utrinque spinosus, niger, globulis plurimis elevatis, glabris. Elytra nigra globulis itidem plurimis, elevatis, vix spinosis, apice acuminata. Pedes nigri.

372. C. brevirostris obscurus thorace scabro, elytris *glandifer*. lineis tribus elevatis spinosis.

Habitat ad Cap. Bon. spei Mus. Dom. Lund.

C. rubifer duplo minor. Rostri dorsum canaliculatum. Thorax punctis plurimis, elevatis, atris, nitidis. Elytra striis tribus elevatis, acutis, subspinosis. Pedes obscuri.

\*\*\*\*\* *Brevirostres femoribus dentatis.*

373. C. brevirostris femoribus dentatis, corpore viridi variegato. *specabilis.*

*Curculio specabilis.* Oliv. Inf. 83. fig. 180.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Rostrum nigro viridique varium. Antennarum clava ferruginea. Thorax elytraque reticulata, nigro viridique varia.

374. C. brevirostris femoribus anticis dentatis gibbus nigricans thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis flavescentibus. *pinguis.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Rostrum cylindricum, nigrum. Thorax niger, viridi nitens lineis utrinque duabus apicem haud attingentibus, flavis. Elytra concolora, punctato striata strigis duabus obliquis lineaque apicis flavis. Vitta praeterea flava a striga anteriore ad apicem ducta, fere marginalis. Ad apicem elytrorum spina brevis, obtusa. Pedes nigri femoribus anticis dentatis.

375. C. brevirostris femoribus dentatis cinereus *tridens.* elytris dentibus tribus apiceque emarginatis.

*Curculio tridens.* Oliv. Inf. 83. fig. 154.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Caput cinereum rostro oculisque atris. Thorax rotundatus, inaequalis, cinereus. Elytra cinerea dentibus tribus dorsalibus, longitudinaliter positis, elevatis, crassis, obtusis. Elytra apice valde emarginata. Pedes cinerei femoribus spina parva armatis.

*fuscomaculatus.* 376. C. brevirostris femoribus subdentatis ater thorace elytrisque laevibus fusco maculatis. Habitat in Germania boreali.

Corpus magnum, laeve, glabrum, atrum thorace maculis lateralibus, elytris numerosis fuscis. Pedes nigri.

*Ligustici.* 377. C. brevirostris femoribus dentatis, corpore obscuro. Linn. Syst. nat. 2. 615. 68. Fn. Sv. 621. Paykull. Monogr. 80. 77.

*Curculio Ligustici.* Oliv. Inf. 83. fig. 77.

Degeer Inf. 5. 218. 10.

Schaeff. Icon. tab. 2, fig. 12.

Habitat in Ligustico Levistico Europae.

Major obscurus. Thorax scaber, cinereus.

*Zebra.* 378. C. brevirostris femoribus dentatis niger elytris albo variis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Paullo minor C. nigrita. Antennae piceae. Rostrum apice retusum. Thorax scaber linea media, elevata, glabra niger lateribus albo subvariegatis. Elytra vix striata, nigra, albo valde variegata sutura tamen tota nigra. Pedes nigri femoribus acute dentatis.

*notatus.* 379. C. brevirostris femoribus dentatis obscurus elytris puncto postico cinereo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino C. Ligustici at distinctus puncto parvo, distincto versus api-

cem elytrorum. Corpus obscure cinereo undatum. Aestate obscurior evadit puncto elytrorum tamen semper albido.

380. C. brevirostris femoribus dentatis griseus elytris punctis obscurioribus numerosis subquadratis. Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 11. Payk. Monogr. 79. 76.

*Curculio tessellatus*. Bonsd. Diff. 38. 31.

Habitat Hamburgi Dr. Schulz.

Antennae nigrae clava acuminata. Caput & thorax grisea, immaculata. Elytra punctis striata punctisque plurimis vagis distinctis obscurioribus. Femora postica annulo albo, obsoleto.

381. C. brevirostris femoribus dentatis niger obscurus thorace scabro, elytris crenato striatis.

Habitat in Italia.

Statura & magnitudo C. fulcati, at elytra immaculata,

382. C. brevirostris femoribus dentatis ater elytris *fulcatus*-striatis ferrugineo maculatis. Paykull. Monogr. 81. 78. Bonsd. Curc. 40. 34.

Habitat in Saxonia.

Major, totus ater. Elytra crenato striata, testaceo maculata.

383. C. brevirostris femoribus acute dentatis, anten-*calcaratus*. nis pedibusque rufis.

Habitat in Austria Schneider.

Corpus magnum, oblongum, nigrum, obscurum elytris simpliciter striatis. Antennae rufae clava obscuriore. Pedes omnes rufi femoribus acute dentatis.

384. C. brevirostris femoribus dentatis, elytris pun-*gemma-tus*. etis viridibus.

*Curculio gemmatus*. Oliv. Inf. 83. fig. 74.

Naturf. 6. tab. 4.

Habitat in Europae plantis.

Punctis viridibus laetis distinctus.

- picipes.* 385. C. brevirostris femoribus dentatis griseus elytris nebulosis: punctis subocellatis striatis. Paykull, Monogr. 100. Geoff. Inf. 1. 281. 9. Curculio notatus. Bonsd. Curc. Suec. 39. 33. Habitat Kiloniae Dom. Lund. Elytra punctis elevatis, albis, annulo impresso cinctis striata.
- Morio.* 386. C. brevirostris femoribus dentatis ater nitens elytris glabris, rostro bisulcato. Paykull. Monogr. 99. 96. Curculio Morio. Oliv. Inf. 83. fig. 26. Habitat in Germania Dom. de Hattorf. Magnus, totus ater, glaber, nitidus. Thorax immaculatus.
- sulcatus.* 387. C. brevirostris femoribus dentatis niger thorace elytrisque scabris, rostro bisulcato. Habitat in Italia Dr. Allioni. Rostrum breve sulcis duobus dorsalibus, impressum. Thorax supra niger lateribus subcinerascens. Elytra scabra, nigra, margine antico & lateraliter in junioribus cinerascentia.
- collaris.* 388. C. brevirostris femoribus dentatis, thorace cinereo scabro, elytris nigris, rostro carinato. Habitat Kiliae. Statura & magnitudo praecedentis. Rostrum breve linea media elevata, nigra. Thorax cinereus, punctis nigris scaber. Elytra scabra, nigra. Pedes nigri.
- Iris.* 389. C. brevirostris femoribus dentatis cinereus elytris tessellatis. Habitat Kiliae.

Affinis C. Pyri at totus cinereus elytris solis fusco tessellatis. Scutellum album. Pedes cinerei.

Variat duplo minor & ambae varietates femoribus dentatis & muticis.

390. C. brevirostris femoribus dentatis viridiaeneus *Pyri.*  
pedibus rufis. Linn. Syst. nat. 2. 615. 72.

Fn. Sv. 623. Geoff. Inf. 1. 282.

Curculio Pyri. Oliv. Inf. 83. fig. 30.

Curculio aeruginosus. Paykull. Monogr. 88.  
85. Bonsd. Curcul. Suec.

Degeer Inf. 5. 246. 34.

Sulz. Inf. tab. 3. fig. 23.

Habitat in Pyro communi frequens.

391. C. brevirostris femoribus dentatis niger coeruleo squamosus *Alneti.*  
ruleo squamosus antennis pedibusque nigris.

Habitat in Germaniae Alno Dom. Smidt.

Statura & magnitudo praecedentis at paullo oblongior, totus squamis coerulescentibus tectus.

392. C. brevirostris femoribus dentatis cinereo sub-*vespertinus.*  
villosum, scutello albo.

Curculio ceruinus. Paykull. Monogr. 87. 84.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Corpus totum cinereo villosum scutello solo niveo. Antennae pedesque fusco cinereae, interdum rufae. Color supra saepe variat striatus.

393. C. brevirostris femoribus dentatis subpubescens *Mali.*  
fuscus antennis pedibusque testaceis. Paykull. Monogr. 86. 83.

Curculio Padi. Bonsd. Curc. Sueciae 26. 11.

Habitat Lipsiae Dom. Prof. Leske.

Statura & summa affinitas C. Pyri, at duplo fere minor. Corpus totum obscurum, fuscum antennis pedibusque testaceis.

- pallidus.* 394. C. brevirostris femoribus dentatis squamoso pallidus antennis tibiisque rufis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Forte mera varietas C. Mali at totus squamoso pallidus. Elytra striata. Antennae rufae. Pedes rufi femoribus nigris.

- arboreti.* 395. C. brevirostris femoribus anticis dentatis viridi cinereus elytris punctato striatis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Antennae cinereae clava fusca. Corpus totum cinereum, viridi paullo nitens. Elytra punctis majoribus striata. Femora antica dentata, reliqua mutica.

- dentifer.* 396. C. brevirostris femoribus dentatis cinereis, rostro antice canaliculato, femoribus posticis tridentatis.

Habitat in India orientali Dom. Prof. Abildgaard.

Statura & magnitudo omnino C. viridani. Corpus totum fusco cinereum, vix maculatum. Rostrum antice valde canaliculatum & fere bifidum, hirtum. Elytra substriata. Femora omnia acute dentata denteque femorum posticorum postice bidentata.

- curvicornis.* 397. C. brevirostris femoribus dentatis griseus: lateribus albis, femoribus intermediis bidentatis.

Habitat in India orientali Prof. Abildgaard.

Statura praecedentis. Rostrum canaliculatum, griseum. Antennarum primus articulus longissimus, incurvus. Thorax griseus linea dorsali lateribusque albis. Pedes grisei femo-

- ribus dentatis: intermediis denticulis duobus, anteriori minori.
398. *C. brevirostris femoribus dentatis, corpore viridi argentatus.*  
ridi argentato. Linn. Syst. nat. 2. 615. 73.  
Paykull. Monogr. 89. 86.  
*Curculio squamosus viridi auratus.* Geoff. Inf. I. 293. 38.  
*Curculio argentatus.* Oliv. Inf. 83. fig. 96.  
*Curculio Urticae.* Degeer Inf. 5. 219. 12.  
Sulz. Inf. tab. 4. fig. 9.  
Habitat in Europae Betula, Urtica.
399. *C. brevirostris femoribus dentatis viridis ore viridanus.*  
antennisque nigris, oculis atris.  
Habitat Tranquebariae Dr. Koenig.  
Statura & summa affinitas *C. argentati.* Corpus totum in junioribus laete viride, in adulterioribus magis obscurum. Os sive apex rostri antennaeque nigra. Oculi magni, atri.
400. *C. brevirostris femoribus dentatis, antennis oblongus.*  
elytris pedibusque ferrugineis. Linn. Syst. nat. 2. 615. 21. Fn. Sv. 625. Paykull. Monogr. 90. 87.  
*Curculio oblongus niger,* elytris pedibusque testaceis. Geoff. Inf. I. 294. 39.  
*Curculio oblongus.* Oliv. Inf. 83. fig. 30.  
Bonsd. Curcul. Suec. 25. 9.  
Habitat in Europae plantis.
401. *C. brevirostris femoribus dentatis griseus elytris striis elevatis hispidis, antennis rufis.*  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Rostrum brevissimum, cinereum ore nigro.  
Antennae rufae clava cinerea. Thorax griseus, immaculatus. Elytra grisea lineis plurimis, elevatis, hispidis. Pedes nigri tibiis piceis.

- ovatus.* 402. *C. brevirostris femoribus dentatis niger thorace scabro.* Linn. Syst. nat. 2. 615. 69. Fn. Sv. 626. Paykull. Monogr. 82. 79. Bonsd. Cnrc. 35. 25.  
*Curculio Rosae.* Degeer Inf. 5. 219. II.  
 Habitat in Europae Rosis.
- albolineatus* 403. *C. brevirostris femoribus dentatis cinereus thorace elytrisque albolineatis, rostro subtus atro.*  
 Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
 Statura & magnitudo *C. ovati.* Antennae fuscae. Rostrum atrum dorso carinato, cinereo. Thorax cinereus lineis quatuor albis. Elytra striata, cinerea, vittis duabus latis, albis. Corpus cinereum. Femora acute dentata.
- Picus.* 404. *C. brevirostris femoribus dentatis niger elytris albo maculatis.*  
 Habitat in Germaniae Betula Dom. Smidt.  
 Parvus. Antennae testaceae clava fusca. Thorax rotundatus, niger linea laterali, alba. Elytra crenato striata puncto uno alterove baseos, tribus in medio, transversim positis aliquotque apicis albis. Pedes nigri.
- attelaboides* 405. *C. brevirostris femoribus dentatis, rostro elytrisque unituberculatis.*  
*Curculio attelaboides.* Oliv. Inf. 83. fig. 174.  
 Habitat in Brasilia Mus. Dom. Banks.  
 Rostrum griseum tuberculo magno, elevato, carinato. Frons canaliculatus, spina brevissima utrinque armatus. Thorax scaber, griseo fuscoque varius, antice attenuatus. Elytra scabra, fusco griseoque varia, in medio ad suturam tuberculo magno, elevato, carinata. Pedes variegati femoribus clavatis, dentatis.

103. BRENTUS. *Os rostro porrecto, cylindrico.*

*Antennae moniliformes  
ultra rostri medium in-  
sertae.*

\* *Femoribus simplicibus.*

1. *B. cylindricus rostro longissimo subtus barbato, barbicornis.  
elytris elongato clavatis.*

Brentus barbicornis. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 5.  
tab. 2. fig. 5.

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Rostrum corpore longius, cylindricum, apice vix incrassatum, fuscum, subtus pilis densis barbatum. Antennae rostro breviores versus apicem rostri insertae. Oculi globosi, atri. Thorax cylindricus, canaliculatus, niger pilis griseis. Elytra abdome longiora, ante apicem compressa, ideoque clavata, fornicata, punctato striata, nigra maculis quatuor rufis, obsoletis. Pedes nigri pilis griseis.

2. *B. cylindricus rostro apice glabro atro, elytris *affimilis.*  
ferrugineo subfasciatis.*

Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.

Brenti corpus elongatum, cylindricum, immarginatum, tardum, capite ovato, porrecto in rostrum longissimum, cylindricum, oculis globosis, prominulis, lateralibus, ad basin capitidis insertis, antennis plerumque rostro brevioribus, ante apicem rostri insertis, thorace subcylindrico, antice parum attenuato: dorso canaliculato, scutello nullo, elytris rigidis, fornicatis, margine deflexo, abdome longioribus, pedibus longiusculis, brevibus, tarsis quadriarticulatis, colore nigro, obscuro, flavo maculato.



Affinis certe praecedenti at duplo minor. Rostrum corpore brevius, ad medium pilis griseis hirtum, apice glabrum, atrum, nitidum, subtus laeve. Antennae piceae, apice fuscae articulis undecim pilosif. Thorax cylindricus, canaliculatus, ater, pilis griseis adspersus. Elytra vix abdomine longiora, acuta, punctato striata, nigra maculis quatuor rufis.

- monilis.* 3. B. cylindricus ater elytris acuminatis unistriatis.  
Habitat in nova Hollandia.

Praecedentibus minor. Antennae moniliformes longitudine thoracis. Rostrum inter oculos canaliculatum. Thorax canaliculatus, ater. Elytra acuminata, ad suturam unistriata, atra, immaculata. Pedes nigri femoribus clavatis, at inermibus.

- brunneus.* 4. B. oblongus brunneus elytris integris immaculatis.

Brentus brunneus. Oliv. Inf. 84. tab. I. fig. 3.  
Habitat in Senegal Mus. Dom. Olivier.

Corpus reliquis minus & magis ovatum, totum brunneum. Antennae moniliformes. Rostrum breve, cylindricum.

### \*\* *Femoribus dentatis.*

- anchorago.* 5. B. linearis femoribus dentatis, elytris flavo striatis, rostro antennis longiore.

Curculio Anchorage. Linn. Syst. nat. 2. 613. 56.  
Mus. Lud. Ulr. 52.

Curculio longicollis. Degeer Inf. 5. 273. 8. tab. 25. fig. 28.

Sulz. Hist. Inf. tab. 4. fig. 6.

Brentus anchorago. Oliv. Inf. 84. tab. I. fig. 2.

Voet. Coleopt. 2. tab. 34. fig. I. H.

Gronoph. Zoophyl. 583. tab. 15. fig. 4.

Habitat in India orientali.

6. B. linearis femoribus dentatis, elytris flavo striatis *volvulus.*  
truncatis, rostro antennis breviore.

Brentus linearis. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 4.

Habitat in Insula Guadalupe Dom. de Badier.

B. anchorago minor. Antennae moniliformes articulis valde prominulis, rostro fere duplo longiores. Thorax elongatus, cylindricus, antice parum angustatus dorso valde canaliculato. Elytra striata lineolis tribus abbreviatis, flavis: intermedia duplicata. Ad marginem exteriorem praeterea duae minores. Apex haud elongatus, at truncatus. Pedes atri femoribus dentatis.

7. B. femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis, *nasutus.*  
thorace elongato aeneo, elytris acuminatis.

Brentus nasutus. Oliv. Inf. 84. tab. 2. fig. 7.

Habitat in Jamaica Insula.

Paullo major B. anchorago. Antennae filiformes articulis cylindricis longitudine capitis. Caput viridi aeneum rostro longissimo, apice depresso, crassiori. Thorax elongatus, canaliculatus, viridi aeneus. Elytra plana, punctato striata, nigra lineis, variis, abbreviatis, ferrugineis, apice valde acuminata. Pedes nigri femoribus omnibus tibiisque anticis dentatis.

8. B. femoribus dentatis linearis niger elytris rubro *dispar.*  
striatis.

Brentus dispar. Oliv. Inf. 84. tab. 1. fig. 1.

Curculio dispar. Linn. Syst. nat. 2. 613. 55.  
Mus. Lud. Ulr. 50.

Curculio minutus. Drury Inf. 1. tab. 42. fig. 3. 7.

Curculio anomiloceps. Pall. Inf. tab. B. fig. 4.

Habitat in America Dom. Drury.

Thorax ovatus, ater, nitidus macula utrinque obscure rufa, obsoleta. Elytra valde striata, nigra maculis quatuor obsoletis.

*cylindri-* 9. B. femoribus dentatis, thorace rotundato nigro  
*cornis.* aeneo, elytris ferrugineis flavo substriatis.

Habitat in nova Zelandia.

Rostrum obscure ferrugineum. Antennae thorace duplo longiores, obscure ferrugineae articulis cylindricis. Thorax rotundatus, nigro aeneus, nitidissimus, nullo modo canaliculatus. Elytra obtusa, striata, ferruginea lineolis numerosis, flavis, quae ad basin & apicem fere fasciam constituunt.

*bifrons.* 10. B. femoribus dentatis niger elytris striatis : maculis glabris flavis.

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Sexus alter rostro cylindrico, atro antennisque brevibus, moniliformibus. Thorax purpurascens lineis tribus atris. Sexus alter rosto porrecto, cylindrico, apice incrassato maxillis prominulis, incurvis. Thorax canaliculatus, niger. Elytra striata, nigricantia maculis aliquot glabris, flavis, postice truncata, acuminata.

**104. COLYDIUM.** *Palpi* quatuor clavati:  
articulo ultimo ma-  
jori.

*Labium* membrana-  
ceum, emarginatum.  
*Antennae* perfoliatae.

**1. C. ferrugineum** thorace sulcato. *fulcatum.*

Habitat in Germania sub arborum corticibus.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor breves, cla-  
vati. Anteriores vix maxillae longiores, qua-  
driarticulati: articulo ultimo ovato, majori,  
crassiori adhaerentes maxillae dorso. Posterio-  
res vix labio longiores, triarticulati: articulo  
ultimo, ovato, majori adnati labii medio. Man-  
dibula cornea, crassa, incurva, acuta, edentula.  
Maxilla membranacea, bifida: laciniis rotun-  
datis. Labium porrectum, membranaceum, cor-  
dato emarginatum.

Thorax fulcis duobus exaratus. Elytra laevia.

**2. C. atrum** pedibus ferrugineis. *elongatum.*

*Bostrichus elongatus.* Mant. Inf. 1. 36. 3.

*Ips linearis.* Oliv. Inf. 2. 18. 53. tab. 2. fig. 17.

Colydi corpus parvum, cylindricum, elongatum,  
glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, pla-  
no, latitudine thoracis, inserto, oculis globosis, late-  
ralibus, vix prominulis, antennis brevibus distan-  
tibus, sub oculis insertis, thorace elongato, plano,  
dorso canaliculato, scutello triangulari, elytris rigidis  
fornicatis, planis, longitudine elytrorum, pedibus  
brevibus, validis, compressis, tarsis quadriarticulatis,  
colore vario.



Ips linearis. Roff. Fn. Etr. 50. 123. tab. 2.  
fig. 45.

Habitat in Europae ligno antiquo Dom. de Pay.  
kull.

Corpus medium, filiforme. Antennae breves,  
perfoliatae. Thorax glaber, ater, nitidus lineis  
tribus impressis: intermedia altiori. Elytra cre-  
nato striata. Pedes ferruginei.

*filiformis.* 3. C. atrum elytris sulcatis: basi pedibusque ferru-  
gineis.

Habitat Halae Saxonum in truncis Querci Dom.  
Hybner.

Summa affinitas praecedentis & forte mera ejus  
varietas. Differt in primis elytris basi ferru-  
gineis.

*frumenta-* 4. C. testaceum thorace crenato: dorso carinato.  
*rium.* Anobium frumentarium. Mant. Inf. 1. 39. 5.

Ips frumentaria fusca thorace crenato: dorso  
tricarinato. Oliv. Inf. 2. 18. 10. 14. tab. 2.  
fig. 13.

Dermestes surinamensis testaceus elytris striatis,  
thorace striis tribus elevatis marginibusque den-  
ticulato. Linn. Syst. nat. 2. 562. 29.

Tenebrio surinamensis alatus elongatus testaceo  
fuscus, elytris striatis, thorace striis tribus ele-  
vatis marginibusque denticulato. Degeer Inf. 5.  
54. 5. tab. 13. fig. 12.

Habitat in Americæ meridionalis farina diutius  
conservata Mus. Dom. Banks.

Elytra striata.

Variat corpore fuso.

105. MYCETOPHAGUS. *Palpi* quatuor  
inaequales.

*Maxilla* mem-  
branacea, uni-  
dentata.

*Labium* rotun-  
datum, inte-  
grum.

*Antennae* ex-  
trorsum cras-  
fiores.

1. *M. rufus* thorace elytrisque nigris his maculis 4 *maculatus*  
duabus rufis.

*Ips* 4 *maculata*. Mant. Inf. 45. 8.

*Dermestes niger* coleoptris punctis rubris quater-  
nis, elytris striatis. Geoff. Inf. 1. 106. 16.

*Silphoides Boleti*. Herbst Arch. tab. 61, fig. X.

Habitat in Germaniae Boletis.

*Antennae ferrugineae*, ante apicem fuscae. Ely-  
tra striata, nigra macula baseos aliaque ante api-  
cem rufis. Corpus rufum.

2. *M. niger* subtus antennis pedibusque ferrugineis. *bicolor*.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dr.  
Pflug.

*Mycetophagi* corpus oblongum, glabrum, immar-  
ginatum, agile, capite parvo, rotundato, inserto,  
oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis  
brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace trans-  
verso, ovato, marginibus rotundatis, scutello rotun-  
dato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis,  
pedibus brevibus, curvioris, compressis, tarsis quin-  
quearticulatis, colore plerumque nigro, rufo vario.

Media, oblonga, supra tota glabra, nigra, subtus ferruginea.

*dermestoides* 3. M. fuscus abdomine pedibusque testaceis.

Habitat in Germaniae Boletis Dom. Smidt.

Statura & summa affinitas *Dermestes bicoloris*, at omnino hujus generis. Thorax & elytra vix striata, fusca, immaculata. Abdomen & pedes testacea.

*atomarius*. 4. M. niger elytris punctis fasciaque postica fulvis.

Ips atomaria. Mant. Inf. I. 46. 9.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Elytra striata, nigra macula majori ad basin, punctis quinque in medio, fascia postica undata puncto que apicis fulvis. Pedes nigri.

*multipunctatus*. 5. M. rufus elytris substriatis: punctis rufis numerosis.

Habitat in Sueciae Boletis Dom. de Paykull. Medius. Antennae & pedes picei. Caput & thorax nigra, immaculata. Elytra substriata punctis plurimis, distinctis, rufis.

Puncta elytrorum baseos interdum connata in maculam majorem, lunatam.

*picicornis*. 6. M. ater elytris striatis, antennis pedibusque piceis.

Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.

Medius. Antennae piceae. Caput & thorax laevia, atra, immaculata. Elytra striata. Corpus atrum pedibus obscure piceis.

*sanguinicollis*. 7. M. ater thorace elytrorumque maculis duabus pedibusque rufis.

Ips sanguinicollis. Mant. Inf. 146. 10.

Silpha glabra. A&t. Hall. I. 255.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Media. Caput atrum antennis apice cinerascentibus. Thorax glaber, rufus, nitidus, immacula-

- tus. Elytra glabra, laevia, nigra maculis duabus rufis. Corpus nigrum. Pedes rufi.
8. M. niger thorace rufo, elytris striatis: margine *fulvicollis*, maculisque duabus flavis.  
Habitat in Germania Mus. Dom. Lund.  
Statura M. multipunctati. Pedes rufi.
9. M. piceus elytris striatis nigris: basi fasciaque *piceus*. postica ferrugineis.  
Ips picea. Mant. Inf. I. 46. 11.  
Habitat in Germania Dom. de Hattorf.  
Minor M. maculata. Caput nigricans ore anten-  
nisque piceis. Thorax utrinque puncto baseos  
impresso. Caput & pedes picei.
10. M. piceus elytris subpunctatis nigris basi ferru- *punctatus*.  
gineis.  
Habitat in Germaniae fungis Dom. Helwig.  
Statura omnino M. picei at paullo minor. Tho-  
rax obscure piceus.
11. M. flavus antennis nigris. *nigricornis*.  
Ips nigricornis. Mant. Inf. I. 46. 12.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Antennae extrorsum crassiores, nigrae. Corpus  
flavescens, immaculatum.
12. M. ater elytris striatis antennis pedibusque ca- *castaneus*.  
staneis.  
Habitat in Germania Dom. Helwig.  
Parvus. Antennae castaneae. Caput & thorax  
atra, nitida, immaculata. Elytra striata, ca-  
stanea. Corpus atrum pedibus castaneis.
13. M. aeneus pedibus ferrugineis. *metallicus*.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Antennae nigrae, basi rufescentes. Corpus obscure  
aeneum elytris substriatis. Pedes rufescentes.
14. M. testaceus immaculatus. *testaceus*.  
Habitat in Germaniae Boletis Dom. Helwig.

Parvus, laevis, nitidus.

*bifasciatus*. 15. M. niger elytris fasciis duabus punctoque apicis ferrugineis.

Ips bifasciata. Mant. Inf. 1. 47. 17.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Minutus. Corpus totum nigrum. Elytra concolora fasciis duabus punctoque apicis rufis. Pedes nigri.

106. HYPOPHLAEUS. *Palpi* quatuor aequales, clavati.

*Labium* elongatum, membranaceum, integrum.

*Antennae* extorsum crassiores, utrinque serratae.

*castaneus*. 1. H. laevis nitidus castaneus antennis nigris.

Hispa picipes antennis fusiformibus atra elytris pedibusque piceis. Mant. Inf. 1. 47. 8.

Ips taxicornis fusco ferruginea, nitida, antennis perfoliatis. Oliv. Inf. 2. 18. 11. 15. tab. 1. fig. 2.

Ips taxicornis. Ross. Fn. Etr. 49. 122. tab. 4. fig. 2.

Hypophlaei corpus elongatum, cylindricum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, transverso, inferto, oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace elongato, planiusculo, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicate longitudine abdominalis, pedibus brevibus, validis, compressis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

Cemiterius. Herbst Arch. tab. 21. fig. 6.

Habitat sub Cortice Ulmi Dom. Helwig.

Os mandibulæ palpisque. Palpi quatuor aequales, breves, clavati. Anteriores quadriarticulati: articulo ultimo ovato, crassiori ad natum labii inferioris medio exteriori. Mandibula brevis, crassa, cornea, vix arcuata. Maxilla membranacea, medio unidentata, apice rotundata. Labium elongatum, filiforme, membranaceum, integrum.

2. *H. laevis* ater elytris antennis pedibusque testaceis. *linearis.*

Habitat sub Pini sylvestris cortice Germaniae Dom.

Prof. Helwig.

Praecedente minor. Antennæ testaceæ. Caput & thorax laevia, atra, nitida, immaculata. Elytra laevia, nitida, testacea. Corpus nigrum pedibus brevibus, testaceis.

3. *H. laevis* ater elytris testaceis: fascia atra, *fasciatus.*

Habitat sub cortice Quercus Germaniae Pr.

Helwig.

Nimis praecedenti affinis. Differt tantum loco fasciaque elytrorum lata, atra.

4. *H. laevis ferrugineus* elytris substriatis. *depressus.*

Ips unicolor fusco ferruginea, thorace laevi, antennis brevibus perfoliatis. Oliv. Inf. 2. 18. 12, 16. tab. 2. fig. 8.

Melinus. Herbst Arch. tab. 21. fig. B.

Habitat sub cortice Quercus Germaniae D. Helwig.

Corpus parvum, depresso, totum ferrugineum.

5. *H. oblongus rufus* elytris testaceis apice atris. *bicolor.*

Ips bicolor. Oliv. Inf. 2. 18. 12. 15. tab. 2. fig. 14.

Habitat in Gallia sub arborum corticibus.

Statura omnino praecedentium. Caput & thorax laevia, glabra, rufa, nitida. Elytra testacea, po-

stice ultra medium atra. Abdomen testaceum,  
apice atrum. Pedes testacei.

*bicornis.*

6. *H. oblongus rufus capite bicorni.*

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Antennae omnino hujus generis. Caput  
cornubus duobus erectis, brevibus. Corpus fer-  
ruginosum, nitidum, immaculatum.

107. LYCTUS. *Palpi* quatuor brevissimi,  
filiformes.

*Maxilla* brevis, membra-  
nacea, bifida.

*Labium* integrum.

*Antennae* clava solida.

\* *Antennarum articulo unico crassiori.*

*politus.*

1. *L. niger* antennis pedibusque ferrugineis, thora-  
ce plano oblongo punctato.

*Scarites clavicornis* piceus, antennis clavatis.  
Mant. Inf. 1. 207. 9.

*Ips picipes.* Oliv. Inf. 2. 13. 77. tab. 2. fig. 12.

*Tenebrio minutus* alatus niger, thorace margi-  
nato antennis clavatis, pedibus piceis. Linn.  
Syst. nat. 2. 1675. 12.

Habitat in Boletis arboreis Europae.

Varietatem duplo majorem e Saxoniam misit Dom.  
Hybner.

Lycti corpus oblongum, depresso-  
sculum, glabrum,  
immarginatum, tardum, capite magno, ovato, plano,  
inferto, oculis parvis, lateralibus, vix prominulis,  
antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis,  
thorace ovato, planiusculo, scutello minuto, elytris  
rigidis, fornicatis longitudine abdominalis, pedibus bre-  
vibus, validis, compressis, tarsis quinquearticulatis,  
colore plerumque nigro.

- Variat corpore toto ferrugineo.
2. L. brunneus pectore abdomineque nigranti- *depressus*.  
bus, thorace oblongo plano.  
Tenebrio brunnipes ater glaber nitidus, elytris  
striatis antennis pedibusque ferrugineis. Mant.  
Inf. 1. 212. 20.  
Habitat Dresdae Dr. Heisse.  
Parvus. Antennae clavatae, ferrugineae. Elytra  
striata, nitida, immaculata.
3. L. glaber ater elytris puncto ferrugineo. *2 pustulatus*  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Parvus. Caput & thorax laevia, depressa, atra,  
immaculata. Elytra vix striata, atra puncto parvo,  
rufo ante apicem. Corpus nigrum pedibus fer-  
rugineis.
4. L. niger thorace ovato plano utrinque dentato. *dentatus*.  
Habitat in America meridionali Mus. D. Lund.  
Statura omnino praecedentium. Antennae cla-  
vatae, brunneae. Caput & thorax ovata, plana,  
nigra, nitida thoracis margine utrinque sex den-  
tato. Elytra striata, picea. Pedes brunnei.
5. L. ferrugineus elytris laevibus testaceis. *brunneus*.  
Habitat in Americae Insulis Dr. Pflug.  
Praecedentibus minor & brevior. Antennae cla-  
vatae, brunneae. Caput & thorax laevia, gla-  
bra, brunnea, nitida. Elytra haud striata, testacea.
6. L. oblongus ferrugineus elytris punctato striatis. *terebrans*.  
Ips terebrans fusco ferruginea, immaculata, ely-  
tris striatis crenatis. Oliv. Inf. 2. 18. 5. 4. tab. 1.  
fig. 7.  
Habitat in Germania sub arborum corticibus Dom.  
Prof. Helwig.  
Antennae crassae, moniliformes articulo ultimo  
crassiori. Thorax punctatus, planus margine pa-  
rum reflexo.

*Juglandis.* 7. L. obscurus elytris striatis, antennis pedibusque testaceis.

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Antennae testaceae. Caput & thorax fusca, obscura, immaculata. Elytra crenato striata, fusca basi interdum tota, interdum puncto testacea.

*histeroides.* 8. L. ater nitidus antennis pedibusque piceis.  
Habitat in Dania sub arborum corticibus Dom. Lund.

Corpus parvum, oblongum, depresso. Antennae piceae clava solida. Elytra striata, nigra, Corpus nigrum pedibus piceis.

\*\* *Antennarum articulis duobus crassioribus.*

*crenatus.* 9. L. niger thorace rugoso, elytris striato crenatis: maculis duabus rufis.  
Ips crenata. Mant. Inf. 1. 46. 15.  
Ips crenata. Oliv. Inf. 2. 18. 6. 6. tab. fig. 9.  
Herbst Arch. 4. tab. 20. fig. 20.  
Habitat in Europa sub arborum corticibus.  
Variat rarius elytris totis rufis.

*navalis.* 10. L. ferrugineo fuscus oculis atris.  
Dermestes navalis elongatus ferrugineo fuscus oculis atris. Mant. Inf. 1. 35. 14.  
Habitat in nova Zelandia Mus. Dom. Banks.  
Parvus, totus ferrugineo fuscus elytris parum dilutioribus. Antennarum ultimi duo articuli crassiores.

*canalicula-* *tus.* 11. L. obscurus thorace canaliculato, elytris striatis brunneis.  
Dermestes oblongus fuscus, elytris striatis.  
Geoff. Inf. 1. 103. 9.  
Ips oblonga. Oliv. Inf. 2. 18. 7. 8. tab. fig. 5.  
Habitat sub arborum cortibus Dom. Lund.

Corpus medium, elongatum, cylindricum, mox testaceum, mox fuscum. Antennae articulis duobus crassioribus testaceae. Caput & thorax vix pubescentia, fusca thoracis medio impresso, canaliculato. Elytra striata, fusca.

12. L. ater glaber nitidus antennis pedibusque ferrugineis.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Praecedente duplo major, cylindricus. Antennae ferrugineae. Caput, thorax, elytra atra, nitida, laevia, immaculata. Pedes breves, ferruginei.

13. L. oblongus ferrugineus elytris punctato striatus: futura nigra.

Dermestes oblongus ferrugineus. Geoff. Inf. 1. 103.

Ips contracta. Oliv. Inf. 2. 18. 6. 5. tab. 2. fig. 10.  
Habitat in Galliae arboribus sub Cortice.

### 108. TRITOMA. *Palpi* anteriores secundiformes.

*Labium* emarginatum.

*Antennae* clava perfoliata.

1. T. atra elytris macula laterali coccinea.

Tritoma. Geoff. Inf. 1. 335. 1. tab. 6. fig. 2. 2 *pustulata*.

Panz. Naturf. 24. 12. 17. tab. 1. fig. 17.

Habitat in Boletis arboreis Angliae capta d. 17 Aprilis ad Hamstead.

Tritomae corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite parvo, ovato, inferto, oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace gibbo, transverso, ovato, scutello rotundato, elytris rigidis, forniciatis, gibbis, longitudine abdominalis, apice deflexis, pedibus brevibus; compressis, tarsis quinquearticulatis, colore nigro rufoque nitido.

Corpus totum atrum, glabrum, nitidum. Thorax postice acuminatus. Elytra striata basi laterali macula magna coccinea, in qua punctum parvum fuscum. Pedes nigri plantis pallidis.

- glabra.* 2. *T. glabra* atra antennis pedibusque piceis.  
Habitat sub arborum corticibus Sueciae Dom. de Paykull.  
Caput & thorax glabra, atra, nitida. Elytra striata, nitida, atra.
- marginata.* 3. *T. atra* abdominis margine sanguineo.  
Habitat in Americae meridionalis Insulis Dom. Smidt.  
Paullo minor *T. 2.* pustulata. Antennae piceae,  
Thorax ater margine antico ferrugineo. Elytra  
punctato striata, atra. Abdomen atrum margine  
sanguineo. Pedes picei.
- rufipes.* 4. *T. atra* nitida capite thorace pedibusque rufis.  
Habitat in Norwegiae, Germaniae fungis arboreis  
capt. d. 15 Jun. prope Swinsund.  
Differt omnino ab *I. rufipes* duplo fere minor &  
hujus generis. Caput & thorax rufa, nitida, im-  
maculata. Elytra atra. Corpus nigrum pedibus  
rufis.
- dubia.* 5. *T. nigra* elytris pedibusque testaceis.  
Habitat Kiliae Dom. Lund.  
Parva forte cum sequentibus proprii generis.  
Caput & thorax cinereo subtomentosa. Elytra  
postice acuta, testacea.
- vittata.* 6. *T. rufa* elytris nigris: vitta rufa.  
Habitat in India Mus. Dr. Hunter.  
Caput obscure rufum. Thorax glaber, obscure ru-  
fus lateribus incrassatis, flavescentibus. Ely-  
tra glabra, atra, nitida vitta lata rufescente, quae  
totam & basin & apicem tegit. Pedes rufescen-  
tes.

7. T. atra holosericea antennis pedibusque conco- *morio.*  
loribus.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Statura T. dubiae. Corpus totum atrum, holose-  
riceum, immaculatum.

8. T. nigricans holosericea pedibus testaceis. *sericea.*  
Habitat in Germania.

Statura omnino T. dubiae. Corpus totum pilis  
brevibus, cinereis holosericeum. Antennae pe-  
desque testacei.

9. T. nigra elytris pedibusque griseis. *minuta.*

Cistela minuta. Mant. Inf. 1. 118. 13.

Chrysomela minuta. Linn. Syft. nat. 2. 593. 50.

Fn. Sv. 533.

Habitat in Europae aquofis.

Cum praecedentibus convenit, forte omnes pro-  
prii generis mihi haud rite notae.

109. TETRATOMA. *Palpi* quatuor craf-  
siusculi, inaequa-  
les.

*Maxilla* membra-  
nacea, bifida.

*Labium* brevissi-  
mum, rotundatum,  
integrum.

*Antennae* articulis  
quatuor ultimis  
clavato perfolia-  
tis.

1. T. rufa capite elytrisque nigris. • *Fungorum.*

Habitat in Boletis arboreis Germaniae Dom.

Daldorff.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, crassiusculi. Antici quadriarticulati: articulo ultimo crassiori, ovato, subtruncato adhaerentes maxillae basi, postici breviores, triarticulati: articulo ultimo ovato adnati labii medio. Mandibula brevis, crassa, cornea, apice acuta. Maxilla membranacea, bifida, apice rotundata. Labium brevissimum, membranaceum, rotundatum, integrum.

Statura omnino Tritoma rufipes. Antennae rufae articulis ultimis quatuor clavato perfoliatis, nigris. Caput atrum, nitidum. Thorax glaber, rufus, nitidus, immaculatus. Elytralaevia, atra, nitida. Corpus rufum.

*ancora.* 2. T. capite thoraceque testaceis, coleoptris nigris: macula communi lobata alba.

Habitat in Germania Dom. Helwig.

Triplo praecedente minor. Antennae testacae articulis quatuor clavato perfoliatis, nigris. Caput & thorax testacea, immaculata. Coleoptra laetitia, nigra, nitida puncto utrinque baseos futuraque in medio antice posticeque ramum emitente ideoque maculam lobata formante, albis. Abdomen nigrum pedibus testaceis.

---

Tetratomae corpus oblongum, glabrum, immarginatum, tardum, capite ovato, inserto, oculis magnis, globosis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace gibbo, transverso, scutello rotundato, clytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, apice deflexis, pedibus tenuibus, longiusculis, tarsis quinquearticulatis, colore nitido, atro.

110. SCAPHIDIUM- *Palpi* quatuor filiformes.

*Maxilla bifida.*

*Labium corneum,*  
rotundatum, integrum.

*Antennae articulis  
quinque clavato  
perfoliatis.*

1. S. atrum elytris truncatis: maculis duabus rufis. 4 *macula-*  
*Scaphidum 4 maculatum.* Oliv. Inf. 2. 20. tab. I. *tum.*  
fig. I.

Habitat in Germaniae truncis putrescentibus.

Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, filiformes. Anteriores longiores, quadriarticulati: articulo ultimo longiori, acuto adhaerentes maxillae dorso, posteriores triarticulati: articulis subaequalibus; ultimo ovato, obtuso adnati labii medio. Mandibula brevis, crassa, cornea, subarcuata, apice fissa. Maxilla brevis, membranacea, bifida: laciniis subaequalibus. La-

Scaphidii corpus ovatum, antice posticeque acuminatum, glabrum, immarginatum, agile, capite parvo, acuto, inserto, oculis globosis, prominulis, lateribus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace transverso, antice parum angustato, scutello minuto, rotundato, elytris rigidis, fornicateis, abdome acutissimo brevioribus, pedibus longiusculis, teretibus, cursoriis, tarsis quinquearticulatis, colore atro rufoque nitido.

bium breve, corneum, rotundatum, integrum. Antennae elongatae articulis quinque ultimis clavato perfoliatis. Corpus breve, atrum, nitidum elytris truncatis, abdomine paullo brevioribus maculis duabus transversis, subsinuatis, rufis: posteriori fere terminali. Abdomen acutum. Pedes atri.

*4 pustula-* 2. *S. atrum nitidum thoracis margine elytrorumque tum.* macula fanguineis.

*Sphaeridium 4 pustulatum.* Mant. Inf. 1. 43. 11.

*Scaphidium 4 pustulatum.* Oliv. Inf. 2. 20. 4. 2. tab. 1. fig. 2.

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks.

Elytra truncata, atra macula magna rufa versus basin. Abdomen acutissimum. Pedes nigri.

*agaricinum* 3. *S. atrum nitidum antennis pedibusque flavis.*

*Scaphidium agaricinum nigrum nitidum antennis pedibusque rufis.* Oliv. Inf. 2. 20. 5. 4. tab. 1. fig. 4.

*Silpha agaricina ovata atra glaberrima hemiptera.* Linn. Syst. nat. 2. 670. 9.

*Dermestes hemipterus ovatus niger villosus antennis pedibusque fusco testaceis, elytris abbreviatis.* Panz. Naturf. 24. tab. 1. fig. 14.

Habitat in Europae Agaricis.

Statura omnino praecedentium at quadruplo minor. Corpus glabrum, atrum, immaculatum. Elytra truncata, abdomine breviora. Abdomen acutum.

III. IPS. *Palpi* quatuoraequales, brevissimi: articulo ultimo ovato.

*Maxilla* bifida.

*Labium membranaceum, conicum, emarginatum.*

*Antennae* perfoliatae.

1. I. atra elytris fasciis duabus rufis: anteriore nigro maculata. *fasciata.*

Habitat in America boreali.

Magna, oblonga. Antennae perfoliatae, nigrae.

Caput & thorax atra, nitida, immaculata. Coleoptra fasciis duabus dentatis, rufis, anteriore baseos maculis tribus atris, intermedia majori, communi.

2. I. glabra atra elytris maculis duabus rufis. *grandis.*

Habitat in Africa aequinoctiali Mus. Dom. Lee.

Magna in hoc genere. Caput & thorax atra, laevia, immaculata. Elytra laevia, atra maculis duabus rufis. Pedes atri.

3. I. atra elytris rufis: macula magna atra. *2 punctata.*

Habitat in Europa australiori Dom. Saldoner.

Magna. Corpus atrum elytris rufis macula magna atra. Anus rufus.

4. I. atra elytris macula baseos rufa. *2 pustulata.*

Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.

Ips corpus oblongum, gibbum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, planiusculo, inserto, oculis globosis, lateralibus, prominulis, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace transverso, subquadrato, scutello rotundato, elytris rigidis, fornicatis, longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tibiis compressis, tarsis quinquearticulatis, colore plerumque atro, nitido.

Antennae rufae. Corpus nigrum elytris macula magna baseos rufa. Pedes rufi.

- dorsalis.* 5. I. pallida coleoptris macula media nigra.  
Habitat in Europa australi Dom. Vahl.  
Paullo major I. 4 pustulatae. Caput & thorax pallida, iminaculata. Elytra striata, pallida macula magna, communi, lunata, nigra.

- 4 pustulata.* 6. I. nigra elytris punctis duobus ferrugineis. Naturf. 24. 12, tab. 1. fig. 18.

Silpha quadripustulata oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. Linn. Syst. nat. 2. 570.

5. Fn. Sv. 446.

Silpha nigra oblonga depressa, elytris singulis maculis duabus rubris. Degeer Inf. 4. 185. 12. tab. 6. fig. 20. 21.

Nitidula quadripustulata. Oliv. Inf. 2. 12. 8. 9. tab. 3. fig. 22.

Habitat in Europa boreali.

Palpi quatuor breves, aequales, filiformes: articulo ultimo ovato. Anteriores quadriarticulati adhaerentes maxillae dorso. Posteriores triarticulati adnati ante labii apicem. Mandibula brevis, cornea, arcuata, acuta. Maxilla longitudine palporum membranacea, apice rotundata, bifida: lacinis aequalibus. Labium breve, membranaceum, rotundatum, emarginatum. Antennae articulis tribus ultimis, clavato perfoliatis. Larva oblonga, hirsuta, grisea.

- 6 pustulata.* 7. I. nigra elytris striatis: maculis tribus rufis.  
Habitat in Europa boreali Mus. Dom. de Sehestedt.  
Statura & magnitudo praecedentis. Caput nigrum antennis piceis. Thorax niger margine ferrugineo. Elytra striata, nigra maculis tribus rufis, prima baseos sinuata, secunda in medio renifor-

- mi, tertia ante apicem minori, orbiculata. Corpus subtus rufum.
8. I. atra nitida elytris maculis duabus albis: ante- *4 guttata*.  
riore sinuata.  
Nitidula *4 guttata*. Oliv. Inf. 2. 12. 10. 11.  
tab. 3. fig. 25.  
Habitat in Europa.  
Macula elytrorum baseos sinuata, medii orbicularata.
9. I. ferruginea elytris testaceis. *ferruginea*.  
Habitat in Germania Mus. Dom. de Loewen-  
fkiold.  
Statura & magnitudo I. *4 pustulatae*. Antennae  
ferrugineae articulis tribus majoribus, perfolia-  
tis: ultimo ovato, majori. Caput & thorax gla-  
bra, laevia, ferruginea, immaculata. Elytra  
vix striata, pallidiora. Pedes ferruginei.
10. I. rufa antennis elytris pectoreque nigris. *nigripennis*.  
Silpha russica. Mant. Inf. 1. 48. 6. Linn. Syst.  
nat. 2. 570. 10. Fn. Sv. 449.  
Anthribus ruber. Degeer Inf. 5. 28. 30. tab. 8.  
fig. 12.  
Erotylus russicus. Oliv. Inf. 89. tab. 1. fig. 1.  
Herbst Arch. tab. 43. fig. 9.  
Habitat in Germaniae arboribus Dom. Smidt.
11. I. rufa elytris nigris apice rufis. *hemorrhoidalis*.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Statura omnino praecedentis at corpus totum  
rufum elytris solis nigris apice rufis.  
Mas cornubus duobus erectis capitis Dom.  
Schneider.  
An Hispa cornigera antennis ferratis, thorace  
rufo, elytris coeruleis, capite bicorni. Mantill.  
Inf. 1. 47. 5.

- rufipes.* 12. I. atra capite thorace pedibusque ferrugineis.  
Habitat in Norwegiae fungis.  
Vix differt ab I. nigripenni at abdomen totum nigrum.
- aenea.* 13. I. coccinea elytris aeneis immaculatis.  
Silpha aenea. Act. Hall. 1. 254.  
Habitat Halae Saxonum Dom. Hybner.  
Corpus medium, totum coccineum, immaculatum. Antennae nigrae. Elytra laevia, aenea, nitida, immaculata.
- humeralis.* 14. I. nigra capite thorace elytrorum puncto baseos pedibusque rufis.  
Dermestes 2 pustulatus. Thunb. nov. sp.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Medius. Caput cum antennis rufum, obscurum.  
Thorax laevis, rufus, nitidus. Elytra nigra, nitida puncto baseos rufo. Corpus nigrum pedibus rufis.
- lunata.* 15. I. nigra elytris puncto baseos lunulaque postica ferrugineis.  
Habitat Kiliae Holsatorum.  
Corpus parvum. Antennae perfoliatae, nigrae.  
Thorax niger margine parum ferrugineo. Elytra glabra, nigra puncto parvo baseos lunulaque versus apicem ferrugineis. Pedes ferruginei.
- rufifrons.* 16. I. atra fronte maculis duabus elytrorum pedibusque ferrugineis.  
Tritoma rufifrons. Syst. Ent. 69. 5.  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
Parva. Antennae nigrae clava perfoliata, rufa.  
Caput nigrum fronte ferruginea. Thorax laevis, ater, immaculatus. Elytra laevia, nigra punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.

112. UPIS. *Palpi* quatuor inaequales, clavati.

*Maxilla* unidentata.

*Labium* breve, membranaceum, emarginatum.

*Antennae* extrorsum crassiores.

1. Upis.

*ceramboides*

*Spondylis ceramboides* atra elytris rugosis thorace latioribus. Mant. Inf. 1. 127. 2.

*Attelabus ceramboides*. Linn. Syst. nat. 2. 621.

12. Fn. Sv. 643.

*Curculio maximus*. Udm. Diff. 26. tab. 1. fig. 1.

*Tenebrio variolosus*. Degeer Inf. 5. 32. 2. tab. 2. fig. 1.

Panz. Naturf. 24. 24. 33. tab. 1. fig. 33.

Habitat in Boleto fomentario Sueciae.

E novis observationibus monente Domino Helwigio, Germaniae Entomologo oculatissimo genus hoc constitui omnino distinctum. Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, clavati. Anteriores longiores, quadriarticulati: articulis obconicis; secundo longiori, ultimo crassiori, obtuso, truncato, adhaerentes maxillae dorso. Postici brevissimi triarticulati: articulo ultimo crassiori, truncato, obtuso adnati labii medio. Mandibula brevis, crassa, cornea, acuta, edentula. Maxilla membranacea, brevis, in medio unidentata. Labium brevissimum, membranaceum, apice obtusum, emarginatum. Antennae submoniliformes, extrorsum crassiores.

Corpus nigrum elytris rugosis tarsisque anticis quinquearticulatis, posticis quadriarticulatis.

113. DIAPERIS. *Palpi quatuor subfiliformes.*

*Maxilla bifida.*

*Labium cylindricum, apice palpigerum.*

*Antennae secundum totam longitudinem perfoliatae: foliolis compressis; ultimo ovato.*

*Boleti.*

1. *D. nigra elytris fasciis tribus flavis repandis.*  
*Diaperis.* Geoff. Inf. 1. 337. 1. tab. 6. fig. 3.  
*Chrysomela Boleti.* Mant. Inf. 1. 69. 34.  
*Chrysomela Boleti.* Linn. Syst. nat. 2. 591. 36.  
*Fn. Sv. 52. 7.*  
*Tenebrio Boleti alatus ovatus gibbus niger, elytris fasciis tribus transversis undatis fulvis.* Degeer Inf. 5. 49. 9. tab. 3. fig. 3.  
*Diaperis Schaeff.* Elem. tab. 58. Icon. tab. 77. fig. 6.  
*Habitat in Boletis arborum Europae.*  
*Os maxillis palpisque. Palpi quatuor inaequales, subfiliformes. Anteriores parum longiores, quadriarticulati: articulis brevibus, subglobosis; ultimo majori, ovato adhaerentes maxillae dorso.*

*Diaperis corpus ovatum, gibbum, glabrum, immarginatum, tardum, capite parvo, rotundato, deflexo, inserto, oculis globosis, prominulis, lateribus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis infertis, thorace transverso margine rotundato, subreflexo, scutello minuto, triangulo, elytris rigidis, fornicatis, apice deflexis longitudine abdominis, pedibus brevibus, validis, tarsis anticis quinque, posticis quadriarticulatis, colore vario, nitido.*

Postiores breviores, triarticulati: articulo ultimo ovato, crassiori adnati labii apice. Mandibula brevis, cornea, acuta, apice fissa: lacinia interiori breviori. Maxilla fere longitudine palpi anterioris, membranacea, bifida, lacinia exteriori majori, rotundata, interiori minori, acuta. Labium porrectum, corneum, cylindricum, apice palpigerum. Antennae secundum longitudinem perfoliatae: foliolis compressis, articulo secundo globoso, ultimo ovato. Variat junior nuper exclusa capite thoraceque pallide ferrugineis, elytrisque flavescentibus absque fasciis Dom. Daldorf.

2. D. nigro cyanea antennis apice ferrugineis. *violacea.*  
 Habitat in Germaniae Boletis Dom. Helwig,  
 Antennae omnino hujus generis nigrae: articulo ultimo ferrugineo. Corpus totum cyaneo nigrum plantis solis ferrugineis. Elytra punctato striata, Magnitudo D. Boleti at minus gibba.

114. MELOE. *Palpi* quatuor subfiliformes.

*Maxilla recta, bifida.*

*Labium corneum, emarginatum.*

*Antennae moniliformes.*

- I. M. corpore violaceo. Linn. Syst. nat. 2. 679. I. *proscara-*  
*baeus.*  
 Fn. Sv. 826.

Geoff. Inf. 377.

Frish. Inf. 6. tab. 6. fig. 5.

Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 5.

Degeer Inf. 5. 3. 1. tab. 1. fig. 1.

Sulz. Hist. tab. 7. fig. 54.

Habitat in Europae campis apricis, arenosis.  
*Animalculum molle, tardum, oleum limpidissimum,*  
*flavicans e poris praesertim pedum geniculis ex-*  
*fudat. Mas faemina triplominor. Ova suaveo-*  
*lentia.* Lister.

*majalis.* 2. *M. segmentis dorsalibus abdominis rubris.* Linn.

Syst. nat. 2. 679. 2.

Frish Inf. 6. tab. 6. fig. 4.

Schaeff. Icon. tab. 3. fig. 6.

Habitat in Europa australi.

Praecedenti affinis cuius varietatem credit Frish.

*marginata.* 3. *M. nigra thoracis elytrorumque margine ferru-*  
*gineo.* Oliv. Inf. 45. tab. 1. fig. 3.

*Meloe Hungarus Schrank Beytr. 71. 19.*

Habitat in Italia Dr. Allioni.

*Paullo minor M. proscarabaeo.* Elytra abbreviata,  
*laevia, coriacea, nigra margine exteriori ferru-*  
*gineo.* Abdomen & pedes nigra, obscure nitida.

*punctata.* 4. *M. atra thorace elytrisque varioloso punctatis.*

*Meloe Tuccia.* Roff. Fn. Etr. 1. 238. 591. tab.  
 4. fig. 5.

*Meloe Uralensis.* Pall. Iter. 2. 722. 56.

Habitat in Anglia Mus. Britann.

*Statura omnino M. proscarabaei, vix tamen mera*  
*varietas.* Differt colore magis atro corporeaque  
 supra punctis impressis, cicatrificantibus.

*Meloe corpus oblongum, molle, glabrum, imma-*  
*ginatum, tardum, capite magno, ovato, exerto, ocu-*  
*lis oblongis, lateralibus, haud prominulis, anten-*  
*nis mediocribus, inter oculos insertis, thorace*  
*elevato, quadrato, scutello vix ullo, elytris coriaceis,*  
*mollibus, abdome brevioribus, alis nullis, pedibus*  
*elongatis, compressis, tarvis anticis quinque posticis*  
*quadriarticulatis, colore nigro, obscuro.*

115. STAPHYLINUS. *Palpi quatuor filiformes.*

*Maxilla unidentata.*

*Labium membranaceum, trifidum.*

*Antennae monili-formes.*

1. St. capite thorace elytrisque villoso aureis, ab- *aureus*.  
domine nigro: fasciis cinereis.

Habitat in Siam Mus. Dom. Banks.

Antennae nigrae: articulo ultimo ovato, testaceo. Caput magnum, villosum, ferrugineo aureum. Clypeus porrectus, rotundatus, dilatatus, integer. Thorax & elytra villosa, ferrugineo aurea. Pectus villoso aureum. Abdomen atrum fasciis duabus latis, villoso cinereis, nigro punctatis. Pedes subtestacei femoribus nigris.

2. St. hirsutus niger thorace abdomineque postice *hirtus*.  
flavis. Linn. Syst. nat. 2. 683. 1. Fn. Sv. 839.

Geoff. Ins. 1. 362. 7.

Payk. Monogr. 8. 1.

Schaeff. Monogr. 1754. tab. 2. fig. 12.

Icon. tab. 36. fig. 6.

Degeer Ins. 4. 20. 5.

Staphylini corpus elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite magno, ovato, exerto, oculis globosis, lateralibus, vix prominulis, antennis brevibus, approximatis in articulatione labii superioris infertis, thorace plano, postice rotundato, marginibus deflexis, scutello majusculo, triangulari, elytris dimidiatis, rigidis, margine deflexo, alas tegentibus, pedibus validis, tarsis quinquearticulatis, colore vario.

Sulz. Hist. Inf. tab. 7. fig. 16.

Habitat in Europae locis arenosis.

*nebulosus.* 3. St. pubescens cinereus nigro nebulosus abdomine nigro, tibiis testaceis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Affinis certe St. murino at major. Antennae nigrae articulo primo ferrugineo. Caput, thorax, elytra cinerea, nigro nebulosa. Corpus nigrum, immaculatum. Pedes nigri femoribus apice tibiisque testaceis.

*murinus.* 4. St. pubescens cinereus nigro nebulosus abdomine atro, pedibus nigris. Linn. Syst. nat. 2. 683.  
2. Fn. Sv. 840.

Paykull. Monogr. 14. 8.

Schaeff. Icon. tab. 4. fig. 11.

Degeer Inf. 4. 12. 1. tab. 1. fig. 1.

Habitat in Cadaveribus, Fimo.

Elytra subtus coerulea, nitida.

Larva hexapoda, nuda, pallida, capite abdomine nigro, segmentis tribus anterioribus brunneis, cauda setis duabus articulatis subtus tuberculo pediformi cylindrico. Strom. Act. Hafn. 1.

*pubescens.* 5. St. pubescens cinereus nebulosus abdomine subtus villoso argenteo.

Staphylinus pubescens. Paykull. Monogr. 16. 9.

Geoff. Inf. 1. 303. 8.

Degeer Inf. 4. 17. 2.

Habitat in Suecia Dom. Com. de Souza.

Statura & magnitudo omnino St. murini ejusdemque coloris. Caput griseum, villosum striata antica flavescente. Antennae nigrae. Abdomen subtus totum pube argentea tectum. Pedes nigri femoribus apice ferrugineis.

*olens.* 6. S. niger opacus immaculatus capite thorace latiore.

- Staphylinus olens. Paykull. Monogr. 9. 4.  
 Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.  
 Myl. Zool. Dan. 97. 1090.  
 Degeer Inf. 4. 22. 3.  
 Habitat in Europae cadaveribus.
7. St. ater nitidus elytris obscuris, capite thorace *similis*.  
 latiore.  
 Staphylinus similis. Paykull. Monogr. 10. 5.  
 Schaeff. Icon. tab. 30. fig. 12.  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Statura omnino praecedentis at minor. Caput & thorax punctata, atra, nitida, immaculata linea dorsali elevata. Elytra brevissima, nigra, obscura. Corpus cum pedibus nigrum.
8. St. ater nitidus elytris piceis. *picipennis*.  
 Habitat in Germania Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Statura omnino St. similis at caput & thorax atra, laevissima, nitida. Caput minus latum & elytra picea, obscura, minime nitida.
9. St. pubescens niger fasciis cinereis. Linn. Syst. *maxillosus*. nat. 2. 683. 3. Fn. Sv. 841. Paykull. Monogr. 5. 2.  
 Geoff. Inf. 1. 360. 1. tab. 7. fig. 1.  
 Schaeff. Icon. tab. 20. fig. 1.  
 Degeer Inf. 4. 18. 4. tab. 1. fig. 7. 8.  
 Habitat in Europae sylvis vicitans rapina. Adul-  
 tior totus glaber & niger evadit.
10. St. ater nitidus capite utrinque macula fulva. *oculatus*.  
 Habitat in nova Hollandia, Zelandia Mus. Dom.  
 Banks.  
 Totus ater, glaber, nitens capite utrinque macula magna fulva, quae subtus fasciam constituit.
11. St. ater opacus thorace elytrisque coerulescen- *cyaneus*.  
 tibus. Geoff. Inf. 1. 361. 21.

*Staphylinus cyaneus.* Payk. Monogr. 13. 7.  
Habitat in Italia Dr. Allioni.

Statura & magnitudo St. maxillosi. Caput thorace latius & thorax laevia, coerulefcentia. Corpus atrum.

*dilatatus.* 12. St. thorace marginato atro nitidulo, elytris fuscis, antennis ferratis.

Habitat Halae Saxonum Prof. Lefke.

Antennae valde ferratae, pilosae, nigrae. Caput laeve, atrum mandibulis forcipatis. Thorax lateribus posticeque valde dilatatus, ater margine in primis variis coloribus nitidulo. Elytra fuscata. Abdomen atrum. Pedes nigrarufis anticus brevibus, dilatato pilosis.

*fulgens.* 13. St. cyaneus nitidus antennis apice nigris.

Habitat Cajennae Mus. Dom. Bosc.

Magnus at tenuis. Caput magnum, ovatum, coeruleum, magis obscurum. Antennae primo articulo longissimo, cyaneo, ultimis brevibus, nigris. Thorax antice angustatus. Elytra corporusque cyanea, nitidissima. Pedes cyanei.

*erythropterus.* 14. St. ater elytris antennarum basi pedibusque rufis. Linn. Syst. nat. 2. 683, 4. Fn. Sv. 842.

Paykull. Monogr. 7. 3.

Geoff. Inf. 1. 364. 9.

Frish. Inf. 5. 49. tab. 29.

Degeer Inf. 4. 21. 6.

Stroem. Act. nidros. 3. 404. tab. 3. fig. 8.

Schaeff. Icon. tab. 2. fig. 2.

Habitat saepius in fimo.

Variat paullo minor scutello aureo villoso.

*aeneocephalus.* 15. St. niger aeneo nitidus elytris pedibusque testaceis, antennis fuscis. Paykull. Mongr. 11. 6.

Degeer Inf. 4. 22. 8.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Nimis certe praecedenti affinis & forte mera ejus varietas. Corpus minus. Antennae fuscae. Caput & thorax nigra, aeneo nitida. Scutellum nigrum. Elytra testacea. Corpus nigrum pedibus rufis.

16. St. niger capite thoraceque obscure piceis, elytris aureis, tarsis anticis dilatatis.

Habitat in Germania Mus. Dom. de Sehestedt. Paullo minor St. erythrocephalo. Caput obscurum antennis nigris. Thorax villosus, obscure piceus linea media baseos paullo elevata. Elytra aurea. Corpus atrum maculis aliquot dorsibus, aureis. Pedes ferruginei femoribus nigris. Tarsi antici breves, dilatati.

17. St. ater capite rufo, elytris violaceis.

*erythroce-*  
*phalus.*

Habitat in nova Hollandia Mus. Dom. Banks. Antennae nigrae. Caput magnum, rufum ore punctoque frontali nigris. Thorax glaber, ater, nitidus margine antico in medio rufo. Scutellum atrum. Elytra cyanea. Abdomen & pedes atra.

18. St. pilosus niger abdomine fusco, elytris scabris. *pilosus.*

Habitat Cajennae Dom. von Rohr.

Corpus parvum, breve, crassum. Caput & thorax pilosa, nigra, cyaneo nitida antennis fuscis. Elytra punctis elevatis scabra, nigra. Pedes compressi, fusci.

19. St. capite thoraceque laevissimis atris, elytris *splendens.* aeneis nitidulis, capite thorace latiore.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Paullo major St. polito, cui valde affinis. Difert tamen capite multo latiore, thorace nullo modo punctato elytrisque aeneo colore nitidulis. Corpus atrum.

- politus.* 20. St. niger thorace elytrisque nitidis, thorace lineis punctorum impressorum. Linn. Syst. nat. 2. 683. 5. Fn. Sv. 843. Paykull. Monogr. 42. 31.  
 Geoff. Inf. 1. 361. 3.  
 Degeer Inf. 4. 22. 7.  
 Schaeff. Icon. tab. 39. fig. 12.  
 Habitat in Europae cadaveribus.  
 Odorem spargit ambrosiacum.
- tristis.* 21. St. niger thorace obscure aeneo, elytris pubescentibus obscurioribus.  
 Habitat in Dania Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Paullo major St. polito. Antennarum articulus primus apice ferrugineus. Caput laeve, atrum. Thorax laevis, nigro aeneus, nitidulus. Elytra pubescentia, obscuriora. Corpus nigrum.
- varians.* 22. St. ater nitidus punctatus alis albis.  
 Staphylinus varians. Payk. Monogr. 45. 33.  
 Habitat in Selandia Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Minor St. polito. Antennae nigrae articulorum apicibus parum pallescentibus. Caput thorace angustius, punctatum, atrum, nitidum. Thorax rotundatus, punctatus, ater, nitidus. Elytra laevia, obscuriora, rarius picea. Alae albae. Corpus nigrum.
- brunnipes.* 23. St. niger pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis.  
 Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
 Antennae nigrae articulo primo & ultimis duobus ferrugineis. Caput & thorax atra, nitida oculis albis. Elytra & abdomen atra at obscuriora. Pedes rufi.
- nitidus.* 24. St. ater nitidus elytris testaceis. Paykull. Monogr. 40. 30.  
 Habitat Kiliae Dom. Daldorf.

Nimis affinis St. polito. Corpus totum atrum,  
nitidum elytris solis testaceis.

25. St. ater nitidus elytris plantisque testaceis, ano *fulgidus*.  
subferrugineo.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo omnino St. politi. Caput  
atrum antennis nigris. Thorax ater, nitidus.  
Elytra testacea. Abdominis segmenta tenuissime  
anusque testacea. Pedes nigri plantis testaceis.

26. St. nigricans thorace marginato, elytris crenato *crenatus*.  
striatis.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo sequentis. Antennae fer-  
rugineae. Thorax mox ferrugineus, mox ni-  
gricans margine prominulo, pallidiore. Elytra  
ferruginea, crenato striata. Corpus mox obscure  
ferrugineum, mox nigricans pedibus rufis.

27. St. niger thorace canaliculato, elytris striatis. *striatulus*.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo St. fulgidi. Caput nigrum,  
nitidum antennis fuscis. Thorax canaliculatus  
five linea media impressa. Elytra striata. Cor-  
pus nigrum pedibus piceis.

28. St. niger thorace marginato, elytris testaceis. *strumosus*.

Habitat Halae Dom. Hybner.

Medius. Antennarum ultimus articulus acutus.  
Caput nigrum. Thorax canaliculatus lateribus  
valde marginatis, fuscus. Elytra laevia, testa-  
cea. Corpus fuscum.

29. St. ater nitidus elytris cyaneis. *cyanipen-*  
nis.

Habitat Parisii Mus. Dom. Bosc.

Statura omnino St. marginati. Caput ovatum,  
thorace angustius, atrum, nitidum. Thorax ater,  
nitidus lineis duabus punctorum impressorum.  
Elytra laevia, nitida, cyanea. Corpus atrum.

*marginatus* 30. St. ater thoracis lateribus pedibusque flavis.

Paykull. Monogr. 44. 32.

A&t. Nidros. 4. 3321. 33.

Habitat in Anglia, in Norwegia.

Paullo minor St. polito, totus ater, glaber, nitens,  
at thoracis latera & pedes omnes flavescentes.

*fulvipes*. 31. St. ater nitidus elytris pedibusque testaceis,  
thorace ovato.

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Statura & magnitudo St. marginati. Antennae  
nigrae, basi testaceae. Caput & thorax laevia,  
atra, nitida. Scutellum nigrum. Elytra testa-  
cea. Corpus nigrum pedibus testaceis.

*flavescens*. 32. St. ater pedibus rufis, elytrorum margine flavo.  
Linn. Syst. nat. 2. 684. 9. 830.

Habitat in Europa.

Statura praecedentium.

*alpinus*. 33. St. ater antennarum basi elytris pedibusque li-  
vidis.

Habitat in Betula & Salice in summis alpibus  
Lapponiae Dom. de Paykull.

Reliquis magis depresso. Antennae nigrae, basi  
pallidae. Caput & thorax atra. Elytra livida.  
Abdomen atrum. Pedes lividi.

*2 pustulatus* 34. St. niger elytris puncto postico ferrugineo. Linn.  
Syst. nat. 2. 685. 16. Fn. Sv. 847.

Habitat in Europa.

*analis*. 35. St. ater nitidus antennis elytris ano pedibusque  
testaceis. Paykull. Monogr. 47. 34.

Habitat Kiliae Dom. Daldorff.

Praecedente major. Caput & thorax atra, nitida.  
Elytra laevia, nitida, testacea. Abdomen atrum  
segmentorum marginibus ano que testaceis. An-  
tennae & pedes testacei.

36. St. niger elytris puncto albido, oculis prominentibus & guttatus.  
nulis. Linn. Syst. nat. 2. 685. 15. Fn. Sv.  
851.  
Staphylinus Juno. Paykull. Monogr. 33. β.  
Staphylinus Juno. Geoff. Inf. 1. 371. 24. β.  
Habitat ad littora maris baltici.  
Varietas sequentis teste D. de Paykull.
37. St. niger immaculatus thorace rotundato laevi, clavicornis.  
antennis extrorsum crassioribus.  
Staphylinus Juno. Payk. Monogr. 33. α.  
Staphylinus Juno. Geoff. Inf. 1. 371. 24. α.  
Habitat Kiliae Dom. Lund.  
Nimis certe praecedenti affinis & forte mera  
varietas. Variat pedibus fuscis & flavescen-  
tibus.
38. St. ater thorace subrotundo, elytris pedibusque fuscipes.  
piceis. Linn. Syst. nat. 2. 685. 23. Fn. Sv.  
857.  
Habitat in Europa.  
Parvus & brevis, crassus, ater, nitidus. Elytra  
picea marginē parum nigro.
39. St. niger elytris antennis pedibusque ferrugi-flavipes.  
neis. Linn. Syst. nat. 2. 685. Fn. Sv. 856.  
Habitat in Selandia Mus. Dom. de Sehestedt.  
Parvus & distinctus elytris pedibusque totis fer-  
rugineis.
40. St. thorace rufo, elytris fuscis: puncto baseos atricapillus  
marginē postico albis. Paykull. Monogr.  
49. 35.  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.  
Parvus. Antennae apice fuscae ultimo articulo  
ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax  
glaber, rufus. Abdomen ferrugineum, apice  
fuscum.

- angustatus.* 41. St. filiformis ater elytris apice pedibusque testa-  
ceis. Paykull. Monogr. 36. 27.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Parvus, omnino filiformis. Caput magnum, ova-  
tum, nigrum, antennis testaceis. Thorax ro-  
tundatus, ater. Elytra subtestacea, basi nigra.  
Abdomen nigrum. Pedes testacei.
- canalicula-* 42. St. flavus capite abdominalisque cingulo atris, tho-  
rus. Paykull. Monogr. 31. 23.  
Habitat Kiliae Dom. Daldorff.  
Caput atrum antennis basi flavis. Thorax gib-  
bus, canaliculatus. Abdomen planum ante api-  
cem cingulo atro. Pedes flavi.
- tenuis.* 43. St. ater nitidus thorace elytrorumque apicibus  
rufis.  
Habitat in Germania Dom. de Paykull.  
Statura parva praecedentium. Caput atrum, ni-  
tidum, thorace angustius. Thorax rufus, ni-  
tidus, immaculatus. Elytra nigra apice rufa.  
Corpus nigrum pedibus rufis.
- gracilis.* 44. St. filiformis flavus ano fusco.  
Staphylinus gracilis. Paykull. Monogr. 38. 28.  
Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
Parvus, omnino filiformis, totus flavus ano solo  
obscuro fine fusco.
- punctulatus* 45. St. filiformis ater nitidus capite ovato.  
Staphylinus punctulatus. Paykull. Monogr.  
30. 22.  
Habitat in Suecia.  
Statura filiformis praecedentis. Caput magnum,  
ovatum & thorax atra, nitida. Pedes nigri.
- emarginata-* 46. St. depresso brunneus elytris pallidioribus, tho-  
rus. Staphylinus emarginatus. Paykull. Monogr.  
56. 40.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Caput parvum. Thorax brunneus margine reflexo, elevato. Elytra brevia, testacea.

47. St. niger elytris pedibusque fuscis. *bicolor.*

Staphylinus bicolor fusco griseus capite thorace abdomineque supra nigris. Paykull. Monogr. 21. 13.

Habitat in Galliae fimetis Mus. Dom. Bosc.

Parvus. Caput & thorax nigra, immaculata antennis fuscis. Elytra longiora, fusca. Corpus nigrum pedibus fuscis.

48. St. ater nitidus elytris obscuris, pedibus rufis. *rufipes.*

Habitat in Germania Dom. Smidt.

Medius. Antennae nigrae articulo primo rufo.

Caput & thorax atra, nitida. Elytra nigra, obscura, minime nitida. Abdomen nigrum. Pedes rufi.

49. St. ferrugineus capite atro. Paykull. Monogr. *melanocephalus.*

Habitat in Suecia Dom. de Paykull.

Minutus, totus ferrugineus capite solo atro.

50. St. niger elytris lividis, pedibus ferrugineis, *crassicornis.*  
antennis extrorsum crassioribus.

Habitat in Dania Mus. Dom. de Sehestedt.

Minutus. Antennae extrorsum crassiores, ferrugineae. Caput nigrum. Thorax orbiculatus, gibbus. Elytra subfornicata, livida. Pedes flavescentes.

51. St. gibbus niger elytris sanguineis, antennis *sanguineus.*  
extrorsum crassioribus. Linn. Syft. nat. 2.

685. 25. Paykull. Monogr. 39. 29.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.

Corpus parvum, gibbum. Antennae longitudine corporis, extrorsum crassiores. Caput rugosum, nigrum. Elytra basi striata, laete sanguinea. Pedes flavescentes femoribus fuscis.

Variat corpore brunneo.

- floralis.* 52. St. depresso niger pedibus flavescens, antennis extrorsum crassioribus. Paykull. Monogr. 67. 47.

Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.  
Parvus, depresso. Antennae extrorsum crassiores, nigrae. Thorax planus, laevis, niger. Elytra laevia, nigra. Pedes flavescentes.

- caraboides.* 53. St. flavus immaculatus. Linn. Syst. nat. 685. 20. Fn. Sv. 854. Payk. Monogr. 19. 11.

Staphylinus fulvus. Degeer Inf. 4. 25. 12.  
Habitat in Europa.

- rugosus.* 54. St. niger thorace elytrisque rugosis.

Habitat in Anglia.

Sequente paullo major, totus niger. Caput planum. Thorax depresso, longitudinaliter rugosus. Elytra rugosa, nigra. Pedes nigri.

- piceus.* 55. St. niger thorace depresso: lineis elevatis tribus, elytris piceis. Linn. Syst. nat. 2. 686. 25.

Habitat in Europa.

- porcatus.* 56. St. niger obscurus thorace marginato, elytris elevato striatis.

Habitat in Sueciae stercore bovino Dom. de Paykull.

Minutus. Caput nigrum. Thorax ater margine utrinque prominulo. Elytra striis tribus elevatis. Abdomen breve, obtusum, nigrum segmentorum marginibus elevatis.

116. OXYPORUS. *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* filiformes.

*postici* securiformes.

*Labium* emarginatum cum mucrone.

*Antennae* moniliformes.

1. O. rufus capite elytrorum abdominisque postico *rufus*, nigris.

*Staphylinus rufus*. Linn. Syst. nat. 2. 684. 6.

Fn. Sv. 844.

Paykull. Monogr. 18. 18.

Geoff. Inf. 1. 370. 22.

Schaeff. Icon. tab. 85. fig. 3.

Degeer Inf. 4. 24. 10. tab. 1. fig. 11. 12.

Habitat in Europae Boletis.

2. O. ater elytris pallidis: angulo postico nigro, ab- *maxillosus*. domine rufo: ano fusco.

Habitat in Germaniae Dom. Schneider.

Magnitudo omnino O. rufi. Caput atrum, nitidum mandibulis porrectis, forcipatis. Antennae rufae. Thorax ater, nitidus interdum maculis dua-

Oxypori corpus parvum, elongatum, glabrum, immarginatum, agile, capite ovato, magno, exerto, mandibulis porrectis, forcipatis, oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis brevibus, distantibus, sub oculis insertis, thorace rotundato, margine deflexo, scutello parvo, rotundato, elytris dimidiatis, rigidis, fornicateis, alas tegentibus, pedibus longiusculis, tenuibus, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

bus, dorsalibus, rufis. Elytra pallida margine postico externe nigro. Abdomen rufum ano fuscum. Pedes rufi.

- lunulatus.* 3. O. flavus elytris nigris basi apiceque pallidis.  
*Staphylinus lunulatus.* Linn. Syst. nat. 2. 689. 7.  
 Fn. Sv. 845. Paykull. Monogr. 49. 35.  
 Habitat in Europae Boletis.  
 Caput nigrum. Abdomen apice nigrum annulo albo.
- subterraneus.* 4. O. ater laevis nitidus elytris macula baseos oblonga testacea.  
*Staphylinus subterraneus.* Linn. Syst. nat. 2. 690.  
 9. Paykull. Monogr. 52.  
 Habitat in Suecia Dom. de Paykull.  
 Caput & thorax atra, laevissima, nitida. Elytra atra, nitida macula magna, oblonga baseos testacea. Abdomen obtusissimum & fere truncatum, nigrum. Pedes nigri.
- cellaris.* 5. O. ater thorace utrinque puncto baseos rufo.  
 Habitat in Sueciae cellis subterraneis Dom. de Paykull.  
 Affinis certe O. subterraneo at paullo minor. Thorax utrinque puncto rufo & macula baseos elytrorum multo minore. Pedes rufi.
- marginatus.* 6. O. ater nitidus thoracis margine pedibus elytrisque rufis: his futura maculaque marginali nigris.  
 Habitat in Suecia Dom. de Sehestedt.  
 Statura praecedentium. Caput atrum, nitidum antennis rufis. Thorax laevis, ater, nitidus margine rufo. Elytra glabra, rufa futura postice latius maculaque magna, marginali nigris. Corpus atrum pedibus rufis.

7. O. thorace rufo, coleoptris pallescentibus: macu-<sup>3</sup> *maculatus*  
lis tribus nigris.  
Habitat in Dania Mus. Dom. de Sehestedt.  
Statura praecedentium. Caput atrum, nitidum.  
Antennae rufae. Thorax laevis, rufus. Coleoptra pallescentia macula communi baseos  
duabusque magnis posticis, nigris. Pectus  
atrum. Abdomen nigrum, basi rufum.
8. O. niger elytris macula baseos pedibusque pal-<sup>2</sup> *maculatus*  
lidis.  
Habitat in Selandia Mus. Dom. de Sehestedt.  
Parvus. Antennae nigrae, basi apice que ferrugineae. Caput atrum, nitidum ore ferrugineo.  
Thorax ater utrinque macula baseos ferruginea. Elytra laevia, nigra macula magna baseos pallida. Corpus nigrum pedibus ferrugineis.
9. O. ater nitidus elytris macula baseos anoque <sup>2</sup> *pustulatus*  
rufis.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura & summa affinitas praecedentis. Differt  
tamen thorace omnino immaculato, elytris  
macula magna baseos abdominisque ultimo seg-  
mento rufis. Antennae & pedes picei.
10. O. flavus elytris basi anoque atris. *analisis.*  
Habitat Kiliae Dom. Daldorf.  
Parvus. Antennae flavae, apice fuscae. Caput  
& thorax flava. Elytra flava, basi atra. Pectus  
atrum. Abdomen flavum, apice atrum. Pedes  
flavi.
11. O. ater thorace elytris pedibusque rufis. *merdarius.*  
Staphylinus merdarius. Mant. Inf. I. 221. 25.  
Habitat in Anglia Mus. Dom. Banks.

Parvus. Antennae ferrugineae, apice fuscae. Caput atrum. Thorax rufus scutello nigro. Elytra rufa. Corpus nigrum pedibus rufis.

*thoracicus.* 12. O. nigricans thorace rufo, elytris fuscis basi albis.

Staphylinus brunneus. Paykull. Monogr.  
Habitat in Holsatiae Boletis Dom. de Sehestedt.  
Antennae basi pallidae, apice nigrae. Caput atrum.  
Elytra fusco albida margine tamen crassiori  
fusco. Abdominis segmenta picea sive potius  
basi nigra apice rufescentia. Pedes flavi.

*pygmaeus.* 13. O. nigricans thorace elytrisque pallidis.

Habitat in Kiloniae Boletis Dom. de Sehestedt.  
Caput atrum, nitidum. Thorax obscure pallidus.  
Elytra pallida margine crassiori fusco. Abdo-  
men magis nigrum.

*flavipes.* 14. O. niger elytris pedibusque fuscis.

Habitat in Europa boreali.  
Affinis praecedentibus at paullo minor.

*chrysomeli-* 15. O. ater thorace rufo, elytris testaceis: margine baseos atro.

Staphylinus chrysomelinus. Mant. Inf. 1. 221.  
28. Linn. Syst. nat. 2. 685. 21. Fn. Sv. 855.  
Geoff. Inf. 1. 368. 18.  
Staphylinus dispar. Paykull. Monogr. 77. 54.  
Staphylinus obtusus. Mant. Inf. 221. 17.  
Habitat in Europae Boletis.  
Variat colore.

*melanoce-* 16. O. testaceus capite abdome que atris.

*phalus.* Habitat in Daniae Selandia Dom. de Sehestedt.  
Minutus. Caput atrum, nitidum. Thorax laevis,  
ferrugineus, nitidus. Elytra laevia, testacea.

Abdomen nigrum. Pedes flavi. Nimis affinis  
*O. pygmaeo*, an satis distinctus?

17. *O. rufus* abdomine atro nitido. *abdominalis.*  
 Habitat in Norwegia Mus. Dom. Lund.  
 Reliquis paullo minor.
18. *O. testaceus* abdomine obscuriore. *testaceus.*  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 A praecedentibus omnino distinctus. Corpus totum laeve, glabrum, testaceum abdomine solo parum obscuriore. Pedes testacei.
19. *O. brunneus* capite thoracisque medio atris. *brunneus.*  
 Habitat in Germania Dom. Smidt.  
 Minutus. Antennae brunneae. Caput atrum, nitidum. Thorax in medio ater lateribus brunneis. Elytra brunnea. Abdomen obscurum.
20. *O. nigricans* elytris pallidis. *minutus.*  
 Habitat in Selandia Mus. Dom. de Sehestedt.  
 Minutus. Caput atrum antennis basi ferrugineis. Thorax niger in margine parum pallido. Elytra albida vitta marginali nigra. Abdomen nigricans. Pedes pallidi.
21. *O. ater* nitidus pedibus rufis. *rufipes.*  
 Staphylinus rufipes. Mant. Inf. 1. 222. 31.  
 Linn. Syst. nat. 2. 6. 85. 21. Fn. Sv. 855.  
 Geoff. Inf. 1. 368. 18.  
 Habitat in Europa boreali.
22. *O. ater* nitidus thoracis margine elytris pedibusque testaceis. *hypnorum.*  
 Staphylinus Hypnorum. Mant. Inf. 1. 221. 23.  
 Staphylinus nitidus. Mant. Inf. 1. 221.  
 Habitat in Anglia.  
 Corpus atrum, glabrum, nitidum. Thoracis latera in primis basi testacea. Elytra immaculata scutello tamen nigro.

*marginellus* 23. O. ater nitidus thoracis elytrorumque marginibus ferrugineis.

*Staphylinus marginellus*. Mant. Inf. I. 221. 27.

Habitat Kiliae.

Parvus. Antennae nigrae primo articulo ferrugineo. Caput atrum, nitidum. Thorax ater, nitidus margine laterali & postico ferrugineis. Elytra glabra, nitida, atra margine omni tenuissime ferrugineo.

117. PAEDERUS. *Palpi* quatuor inaequales.

*antici* clavati.

*postici* filiformes.

*Labium* lineare, integrum.

*Antennae* moniliformes.

*riparius*. 1. P. rufus elytris coeruleis, capite abdominisque apice nigris.

*Staphylinus riparius*. Linn. Syst. nat. 2. 684. 8. Fn. Sv. 846. Geoff. Inf. I. 369. 21. Paykull. Monogr. 27. 19.

Schaeff. Icon. tab. 71. fig. 3.

Degeer Inf. 4. 28. 14. tab. I. fig. 18.

Habitat in Europa.

Paederi corpus elongatum, filiforme, glabrum, immarginatum, agile, capite subglobose, exerto, oculis globosis, prominulis, lateralibus, antennis mediocribus, distantibus, sub oculis insertis, thorace cylindrico: margine deflexo, scutello minuto, elytris dimidiatis, rigidis, fornicatis, alas tegentibus; pedibus brevibus, tarsis quadriarticulatis, colore vario.

2. *P. niger thorace rufo, elytris cyaneis.* *ruficollis.*  
*Staphylinus ruficollis.* Paykull. Monogr. 26.18.  
*Herbst Arch. tab. 48. fig. 5.*  
*Habitat sub lapidibus ad littora maris baltici Dom.*  
*de Sehestedt.*  
*Praecedente paullo minor. Caput atrum. Tho-*  
*rax rotundatus, gibbus, rufus. Elytra brevia,*  
*glabra, cyanea, nitida. Abdomen & pedes atra.*
3. *P. niger elytris postice pedibusque fulvis.* *elongatus.*  
*Staphylinus elongatus.* Linn. Syst. nat. 685. 14.  
*Paykull. Monogr. 25. 17.*  
*Habitat in Europa.*
4. *P. ater nitidus elytris totis pedibusque testaceis.* *fulvipennis*  
*Habitat Kiliae.*  
*Affinis certe P. elongato at paullo major. Anten-*  
*nae breves, ferrugineae: articulo primo longiori,*  
*incurvo. Caput & thorax atra, nitida. Elytra*  
*omnino testacea. Abdomen atrum ano subferru-*  
*gineo. Pedes testacei.*
5. *P. niger pedibus testaceis.* *brunnipes.*  
*Habitat in Holsatia.*  
*Statura & summa affinitas P. elongati at elytra*  
*tota nigra. Antennae obscurae.*
6. *P. ater nitidus elytris plantisque testaceis, capite fulgidus.*  
*punctulato.*  
*Staphylinus fulgidus.* Mant. Inf. 1. 220. 14. Pay-  
kull. Monogr. 22. 14.  
*Habitat Kiliae Dom. Daldorff.*  
*Distinctus capite punctis plurimis, impressis. Plan-*  
*tae testaceae.*
7. *P. ater antennis thoraceque rufis, elytris pedi- tricolor.*  
*busque testaceis.*  
*Staphylinus tricolor.* Mant. Inf. 1. 221. 30. Pay-  
kull. Monogr. 23. 15.

Habitat in Daniae Boletis Mus. Dom. de Sehestedt.  
Parvus. Caput atrum antennis obscure rufis.  
Thorax rufus, nitidus. Elytra testacea. Ab-  
domen nigrum. Pedes testacei.

- filiformis.* 8. P. filiformis niger pedibus piceis.  
Staphylinus quadratus. Paykull. Monogr. 29. 21.  
Habitat in Germania Dom. Smidt.  
Statura omnino praecedentium at magis filiformis.  
Caput magnum, ovatum. Antennae piceae  
articulo primo magno, incurvo. Thorax cylindriens,  
ater, nitidulus. Elytra nigra. Corpus  
nigrum pedibus piceis.
- orbiculatus.* 9. P. filiformis niger capite orbiculato.  
Staphylinus orbiculatus. Payk. Monogr. 35. 26.  
Habitat in Suecia rarius.  
Affinis certe praecedenti, attamen distinctus videtur.
- melanocephalus.* 10. P. filiformis niger thorace pedibusque fulvis.  
Habitat in Germania Dom. Schneider.  
Minutus, filiformis. Caput magnum, ovatum,  
nigrum antennis ferrugineis. Thorax globosus,  
ferrugineus. Corpus nigrum pedibus  
ferrugineis.
-







